

معاون اداری کتاب

حیوانیات

دسویں جماعت کے لیے

ڈاکٹر ریاض العزیز

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

معاون درسی کتاب

حیوانیات

دسویں جماعت کے لئے

مصنف

ڈاکٹر ریاض العزیز ایم ایس سی، پی ایچ ڈی (عثمانیہ)

لچکر ممتاز کالج حیدرآباد

مدیر

پروفیسر کے۔ آر۔ سکینہ

سابق ڈین فیکلٹی آف سائنس جامعہ عثمانیہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر آنندراج ورما



قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل حکومت ہند

ویسٹ بلاک - ا، آر - کے - پورم، نئی دہلی - 110066

بہا ہتمام

شاخ جنوبی ہند، حیدرآباد

Associate Text Book
Zoology
For X Std.
By Dr. Riaz-Ul-Aziz

© قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی

سند اشاعت : اکتوبر۔ دسمبر 2003ء تک 1925
پہلا ایڈیشن : 1100
سلسلہ مطبوعات : 1115
قیمت : 210/-

ناشر : ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

ویسٹ بلاک۔ ا۔آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی۔ 110066

طابع : جنی کپیوٹرس اینڈ پرنٹرس، دین دنیا ہاؤس، جامع مسجد، دہلی۔ ۶ فون نمبر 23280644

پیش لفظ

نصابی کتابیں وقت پر فراہم کرنے کا معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے یہاں معاون نصابی مواد کی کمی ہے۔ فروغ اردو کے لئے اردو زبان و ادب اور اردو ذریعہ تعلیم کو باہم مربوط کرنے کے لئے نصابی اور معاون نصابی کتابوں کا ابتدائی سے اعلیٰ جماعتوں تک مناسب قیمت اور وقت پر دستیاب ہونا اشد ضروری ہے۔ قومی اردو کونسل نے منصوبہ بند طریقے سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی پیہم کوشش کی ہے۔

معاون درسی کتب کی تیاری کا مقصد طلبہ کو ایسا مواد فراہم کرنا ہے جو نہ صرف ان کے شوق مطالعہ اور تجسس کی تسکین کا باعث ہو بلکہ نصابی مواد کی تنہیم اور مقابلہ جاتی امتحانوں کی تیاری میں بھی معاون ثابت ہو۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے دو حصوں پر مبنی ایک مبسوط منصوبہ تیار کیا گیا۔ ایک حصے کے تحت آٹھویں سے دسویں جماعت تک طبیعیات، کیمیا، نباتیات، حیوانیات، اور جدید ریاضی کی کتابیں تیار کی گئیں۔ منصوبے میں شامل مضامین کے لئے ایک ایسا جامع نصاب تیار کیا گیا ہے جس میں بشمول سی۔ بی۔ ایس۔ ای۔ (CBSE) اور آئی۔ سی۔ ایس۔ ای۔ (ICSE) ملک کے ہر صوبے کے متعلقہ نصاب کو ملحوظ رکھا گیا تاکہ یہ کتابیں تمام ملک میں یکساں طور پر مفید ہوں اور طلبہ کو ان میں کسی قسم کی تشنگی محسوس نہ ہو۔ نیز یہ احساس ہو کہ ان کتابوں میں نہ صرف ان کے نصاب کا پورا احاطہ کیا گیا ہے بلکہ دیگر کارآمد معلومات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے مطالعے سے طلبہ کو آئندہ جماعتوں کے مشکل اور پیچیدہ اسباق سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ دوسرے حصے میں سماجی علوم جیسے تاریخ، جغرافیہ، علم شہریت، معاشیات اور کامرس کی کتابیں شامل ہیں۔ مذکورہ کتابوں کی تیاری کے لئے متعلقہ مضامین کے ماہرین پر مشتمل دو پینل تشکیل دیے گئے۔ یہ کام ڈاکٹر آنند راج ورما کی ادارات میں کونسل کی جنوبی ہند کی شاخ میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔

ہمیں توقع ہے کہ یہ کتابیں اساتذہ اور طلبہ کے لئے یکساں طور پر مفید ثابت ہوں گی۔ یہ کتابیں اردو ذریعہ تعلیم کی کڑیوں کو نہ صرف تسلسل عطا کریں گی بلکہ اسے زیادہ مفید اور موثر بنانے میں بھی مفید ثابت ہوں گی۔ زیر نظر کتاب اسی منصوبے کے تحت شائع کی گئی ہے۔ جسے بہتر سے بہتر بنانے میں ہر مثبت تجویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

فہرست اسباق

صفحہ نمبر	عنوان	نشان سلسلہ
1	تغذیہ (Nutrition)	1
64	سوء تغذیہ (Malnutrition)	2
95	تنفس (Respiration)	3
130	حیوانات میں تنفسی اعضاء	4
	(Respiratory Organs In Animals)	
166	تنقلی نظام (Transport System)	5
200	انسانی دل کی ساخت اور افعال	6
	(Structure and Functions of Human Heart)	
224	خون (Blood)	7
264	تولید (Reproduction)	8
304	انسانی تولیدی نظام (Human Reproductive System)	9
346	انسانی عصبی نظام (Human Nervous System)	10
396	ضبط اور ہم ارتباط (Control and Co-Ordination)	11
431	خوردہ بنی عضویوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض	12
	(Diseases Caused By Micro-Organisms)	
482	صحت (Health)	13
526	پہلی طبی امداد (First Aid)	14
556	اندھا پن یا نابینائی کا انسداد (Prevention Of Blindness)	15
565	توانائی کی دنیا (World Of Energy)	16

سبق 1 تغذیہ (Nutrition)

سبق کا خاکہ	1
تہید	2
سبق کا متن	3
3.1 غذا کی اہمیت	
3.1.1 غذا کے افعال	
3.2 کاربوہائیڈریٹس	
3.2.1 کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی	
3.2.2 کاربوہائیڈریٹس کے افعال	
3.3 لحمیات	
3.3.1 لحمیات کی درجہ بندی	
3.3.2 لحمیات کے افعال	
3.4 فحمیات	
3.4.1 فحمیات کی درجہ بندی	
3.4.2 فحمیات کی حیاتیاتی اہمیت	
3.5 حیاتین	
3.5.1 حیاتین کی درجہ بندی	
3.5.1.1 پانی میں حل پذیر حیاتین	

3.5.1.2 چربی میں حل پذیر حیاتین

3.6 معدنیات

3.7 پانی

3.7.1 پانی کی انفرادی خصوصیات

3.7.2 جسم میں پانی کی اقسام

3.7.3 حیوانات میں پانی کا حصول

3.7.4 پانی کا جسم سے اخراج

4 خلاصہ

5 زائد معلومات

6 فرہنگ

7 نمونہ امتحانی سوالات

7.1 مختصر جوابی سوالات

7.2 طویل جوابی سوالات

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجیے

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

سبق کا خاکہ 1

اس سبق میں آپ تغذیہ سے متعلق درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ غذا کی اہمیت
- ☆ کاربوہائیڈریٹس، اقسام اور افعال
- ☆ لحمیات، اقسام اور افعال
- ☆ شحمیات، اقسام اور افعال
- ☆ حیاتین، اقسام اور افعال
- ☆ معدنیات کی ہمارے جسم کے لئے اہمیت
- ☆ پانی کی اقسام اور اہمیت

2 تمہید

اس سبق میں آپ غذا سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جسے آپ ہر جاندار کی زندگی کے لیے بنیادی ضروریات سمجھتے ہیں اور جس میں کاربوہائیڈریٹس، لحمیات، شحمیات، حیاتین، معدنیات اور پانی کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ یہ غذائی مادے ہمارے لئے کس طرح اہمیت کے حامل ہیں۔

سبق کا متن 3

3.1 غذا کی اہمیت


جاندار کا جسم ایک فیکٹری کے مانند ہے جس کی عمدہ کارکردگی کے لئے خام مادوں، ایندھن اور توانائی کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ لہذا روئے زمین پر پائے جانے والے تمام جاندار اجسام بشمول انسان کے لئے مستطلاً غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو باقاعدہ توانائی مہیا کرتی ہے اور جسم کو جاندار حالت میں قائم رکھنے کے لئے تعمیراتی اشیاء (خام مادے) بھی فراہم کرتی ہے۔

غذا سے مراد مختلف اشیاء کا مرکب آمیزہ ہے جس کو ماحول سے حاصل کرنے اور نگل لینے (Swallow) کے بعد ہضم (Digest) کے

ہو کر جسم میں استعمال (استعمال) (Assimilate) ہوتی ہے اور زندگی کی سرگرمیوں کو بہتر طور پر جاری رکھتی ہے۔ بقاء زندگی کے لئے ہوا اور پانی کی طرح غذا بھی ایک اہم بنیادی ضرورت ہے۔

تغذیہ (Nutrition) سے مراد وہ سائنس ہے جو غذا (Food)، مقویات (Nutrients) اور ان میں شامل دیگر اشیاء کے علاوہ صحت اور بیماری سے متعلق ان کا عمل، باہمی عمل اور توازن کے مطالعہ کا احاطہ کرتی ہے۔ تغذیہ کی تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں عضویہ (Organism) مقویات کو لگتا (Ingests)، ہضم کرتا (Digest) جذب کرتا (Absorb)، منتقل کرتا (Transports) اور استعمال کرتا (استعمال) (Assimilates) ہے اور ان کے اختتامی محصولات (End Products) کو جسم سے خارج کرتا ہے۔

مقویات (Nutrients) سے مراد غذا میں شامل بنیادی اجزاء ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)، لہسیات (Proteins)، شحمیات (Fats)، معدنیات، نمکیات (Salts) حیاتین (Vitamins) اور پانی (Water) شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام غذائی مادے زندگی کے لئے بے حد ضروری ہوتے ہیں لیکن صرف کاربوہائیڈریٹس، چربی اور لہسیات ہی توانائی مہیا کرتے ہیں جب کہ حیاتین اور معدنیات کئی حیولی تعاملات (Metabolic Reactions) میں ہم خامرے (Co-enzymes) اور کیمیائی ہم عوامل (Chemical Co-factors) کے طور پر فعل انجام دیتے ہیں۔ غذاؤں جیسے مکی، چاول، مونگ پھلی، مچھلی اور گوشت وغیرہ میں مختلف مقویات یعنی کاربوہائیڈریٹس، چربی، لہسیات اور پانی کی فی صد مقداریں مختلف ہوتی ہیں۔



فصل 1.1
چند عام غذاؤں میں مقویات کا تناسب

غذا سے حاصل ہونے والی توانائی کی قدر (Value) حرارہ (Calorie) کہلاتی ہے۔ ایک حرارہ (Calorie) سے مراد توانائی کی وہ مقدار ہے جو ایک گرام پانی میں ایک درجہ سنٹی گریڈ (1°C) تپش کے اضافہ کے لئے درکار ہوتی ہے۔ اور ایک کلو حرارہ (Kilo Calorie) 1000 حرارے کے مساوی ہوتی ہے۔ لہذا ایک کلو حرارہ (Kilo Calorie) سے مراد توانائی کی وہ مقدار ہے جو ایک لیٹر پانی میں ایک سنٹی گریڈ (1°C) تپش کے اضافہ کے لئے درکار ہوتی ہے۔

بیشتر لحمیات اور تمام کاربوہائیڈریٹس اور چربیوں کو کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) اور پانی (H_2O) میں تحلیل کیا جاسکتا ہے۔ اس تعامل کے نتیجہ میں آزاد ہونے والی توانائی کو حرارت احتراق (Heat of Combustion) کہا جاتا ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والی حرارت احتراق کی مقدار کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں 4.0 کلو حرارے فی گرام (Kcal/gm) لحمیات کی صورت میں 4.5 کلو حرارے (Kcal/gm) اور چربی کی صورت میں 9.5 کلو حرارے (Kcal/gm) ہوتی ہے۔ لہذا اس تخمینہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چربی میں فی گرام توانائی کی مقدار بہ نسبت کاربوہائیڈریٹس اور لحمیات کے زیادہ ہوتی ہے۔

فعلیاتی طور پر احتراق کی تقریباً نصف توانائی حرارت کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے جب کہ بقیہ تقریباً 38% توانائی اے۔ٹی۔

پی (ATP) کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو خلوی کیمیائی توانائی (Cellular Chemical Energy) کہا جاتا ہے۔

ایک سلم (Mole) گلوکوز (Glucose) سے حرارت کے علاوہ ATP کے 38 سالمات (Molecules) حاصل ہوتے ہیں جب کہ ایک سلم چربی (Fat) سے حرارت کے علاوہ ATP کے 463 سالمات دستیاب ہوتے ہیں۔ لہذا چربی سے حاصل شدہ توانائی بہ نسبت کاربوہائیڈریٹس کے دوگنی ہوتی ہے جب کہ لحمیات سے حاصل ہونے والی توانائی کاربوہائیڈریٹس سے حاصل ہونے والی توانائی کے تقریباً مساوی ہوتی ہے۔ تاہم لحمیات مکمل طور پر تحول پذیر ہوتے ہیں۔ لحمیات میں پائے جانے والے مشمولات یعنی امائنو ترشے (Amino Acids) خلوی لحمیات کی تیاری میں استعمال کرنے کی صورت میں کم توانائی درکار ہوتی ہے جب کہ ان کو تحلیل کرنے اور نئے امائنو ترشوں کی تیاری کی صورت میں زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔

لہذا مذکورہ بالا تشریح کے ذریعہ آپ غذائی مادوں کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جو ہماری زندگی کے عمل (Life

Process) میں ایک اہم اور مخصوص رول ادا کرتے ہیں۔ صحت مند زندگی کے لئے غذائی مقویات کی درکار مقدار میں موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے۔

جدول 1 غذائی مقویات اور ان کی توانائی قدریں

غذا	کلوجارے فی گرام
کاربوہائیڈریٹس	4.0
لحمیات	4.5
فحمیات	9.5

نیز مختلف عمر کے اشخاص کے لئے درکار توانائی کی مقدار ان کے کام کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ انڈین کونسل آف

میڈیکل ریسرچ (Indian Council Of Medical Research) ادارے کی تجویز کردہ توانائی کی قدروں کو ذیل کے جدول 2 میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 2 کام کی مختلف نوعیت کے لحاظ سے تجویز کردہ توانائی کی قدریں

کام کی نوعیت	مرد 55 کلوگرام	عورت 45 کلوگرام
نشہ کام	2400	1900
اوسط کام	2800	2200
وزنی کام	3900	3000
حمل کے دوران		3300
دودھ دینے کے دوران		3700

مختلف عمر کے بچوں اور بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے درکار توانائی کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے جس کو جدول 3 میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 3 مختلف عمر کے بچوں، بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے درکار توانائی کی قدریں۔

توانائی کی قدریں (حرارے فی کلو گرام)	بچے
120	۰ ۶ ۵ ۰
100	۰ ۱ ۲ ۵ ۷
1200	۱ ۳ ۱ سال
1500	۱ ۶ ۴ سال
1800	۱ ۹ ۷ سال
2800	۱ ۱۲ ۱۰ سال
2500	۱ ۱۵ ۱۳ سال بالغ لڑکے
2200	بالغ لڑکیاں
3000	۱ ۱۹ ۱۶ سال بالغ لڑکے
2200	بالغ لڑکیاں

3.1.1 غذا کے افعال


- غذا کئی اہم افعال انجام دیتی ہے جن کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔
- (1) غذا توانائی مہیا کرتی ہے جو روزمرہ کی سرگرمیوں کو قائم رکھتی ہے
- (2) غذا جسم اور جسمانی اعضاء کی نشوونما اور درنگی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔
- (3) غذا جسم کے لئے تپش مہیا کرتی ہے۔
- (4) بعض غذائی مادے جیسے حیاتیات حیوانات کی سرگرمیوں کو باقاعدہ بناتے ہیں۔
- (5) غذا جسم میں مختلف تعاملات میں باقاعدگی پیدا کرنے اور انھیں منضبط کرنے میں مدد کرتی ہے۔

(6) غذا جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

(7) غذا بھوک کو مٹاتی ہے اور نفسیاتی تسکین کا احساس دلاتی ہے۔

(8) غذا سماجی روابط کو قائم کرنے میں مدد و معاون ہوتی ہے۔

لہذا مذکورہ بالا افعال کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غذا فعلیاتی، نفسیاتی اور سماجی افعال کو انجام دیتی ہے۔



3.2 کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)

کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) نباتاتی (Organic) مرکبات ہیں جن کو سبز پودے شعاعی ترکیب کے دوران کلوروفیل (Chlorophyll) اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbondioxide) اور پانی کو استعمال کرتے ہوئے تیار کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس جو فطرت میں بکثرت پائے جاتے ہیں توانائی کے اہم، بہترین اور سستے ذرائع ہیں۔ ان کو عام طور پر جسم کا ایندھن (Fuel Of The Body) کہا جاتا ہے۔

کاربوہائیڈریٹس کو کاربن کے آہیدے (Hydrates) کہا جاتا ہے جن کا ایمپیریکل ضابطہ (Empirical Formula) CH_2O ہے۔ یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا تناسب 1:2:1 ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن اسی تناسب میں متحد ہوتے ہیں جس تناسب میں یہ پانی میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کو کاربوہائیڈریٹس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اگرچہ جدید تحقیقات کے ذریعہ دریافت کئے گئے بعض کاربوہائیڈریٹس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن اس تناسب میں نہیں پائے جاتے۔ نیز بعض کاربوہائیڈریٹس میں نائٹروجن (N) اور کنڈک (S) شامل ہوتے ہیں۔ تاہم ان مرکبات کے لئے کاربوہائیڈریٹس کی اصطلاح

ی استعمال کی جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ پالی ہائیڈرک الکحل (Polyhydric Alcohol) اور اس کے الڈیہائیڈ (Aldehyde) اور کیٹون (Ketone) محاصلات (Derivatives) ہیں۔ یہ نباتات اور حیوانات دونوں کی ہانتوں (Tissues) میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ حیوانی خلیہ میں گلائیکوجن (Glycogen) اور گلوکوز (Glucose) کی شکل میں اور نباتی خلیہ میں سیلولوز (Cellulose) اور نشاستہ (Starch) کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔



شکل 1.2 کاربوہائیڈریٹس کے ذرائع

3.2.1 کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی

کاربوہائیڈریٹس کو دو اہم گروہوں (Groups) (i) شکر (sugars) اور (ii) غیر شکر (Non-sugars) میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(i) شکر (Sugars)

شکر کی خاص خصوصیات میں محاس، قلمی (Crystalline) شکل اور پانی میں حل پذیری شامل ہے۔ ان کی دو اقسام میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔

(1) مالوسیکرائیڈس (Monosaccharides) اور (2) آلیگوسیکرائیڈس (Oligosaccharides)

(1) مالوسیکرائیڈس (Monosaccharides)

یہ سادہ شکر ہے جو دیگر اقسام کے کاربوہائیڈریٹس کی اساسی اکائیاں بناتی ہے۔ ان میں پینٹوسس (Pentoses) اور ہکٹوسس (Hexoses) حیاتیاتی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سب سے اہم پینٹوسس میں رائبوز (Ribose) شکر ہے جو آر۔ این۔ اے (RNA) اور ڈی۔ این۔ اے (DNA) میں موجود ہوتی ہے۔ اہم ہکٹوسس میں، گلوکوز (Glucose) فrukٹوز (Fructose)، کیلیکٹوز

(Galactose) اور مانوز (Mannose) شامل ہیں۔

گلوکوز (Glucose) کو ڈیکسٹروز (Dextrose)، انگور کی شکر (Grape Sugar) اور مکئی کی شکر (Corn Sugar) بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مٹھاس گنے کی شکر کی مٹھاس کی بہ نسبت کم ہوتی ہے۔ گلوکوز جسم کے لئے فوراً توانائی مہیا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ انسان کے خون میں گلوکوز کی تارل مقدار 80 ملی گرام فی 100 لیٹر خون ہوتی ہے۔ جسم میں زائد گلوکوز گلائیکوجن (Glycogen) کی شکل میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ جسم میں گلوکوز کی تارل مقدار کو توازن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن انسولین (Insulin) نامی ہارمون (Hormone) کی کمی یا غیر موجودگی میں جسم گلوکوز کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیفیت ذیابیطس (Diabetics) نامی بیماری کہلاتی ہے۔

انگور، مکئی، سنترہ، گاجر، شہد اور مولاسیس (Molasses) میں گلوکوز پائی جاتی ہے۔ انسانی جسم میں نشاستہ (Starch)، سکروز (Sucrose)، مالٹوز (Maltose) اور لیکٹوز (Lactose) کے ہاضم کا اختتامی حاصل گلوکوز ہی ہوتا ہے۔

فرکٹوز (Fructose) کو لیولوز (Levulose) یا پھل کی شکر (Fruit Sugar) بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مٹھاس گنے کی شکر کی مٹھاس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پھلوں کے رس، کچے ہوئے پھلوں اور بعض سبزیوں میں پائی جاتی ہے۔ فرکٹوز شہد میں تقریباً 40% اور مولاسیس (Molasses) میں تقریباً 8% ہوتی ہے۔


کیلکوز (Galactose) فطرت میں آزادانہ نہیں پائی جاتی۔ یہ جسم میں لیکٹوز (Lactose) نامی ڈائی سیکرائیڈ (Disaccharide) کے ہاضم کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے۔ فرکٹوز اور گلیکٹوز دونوں کا کیمیائی ضابطہ گلوکوز یعنی $C_6H_{12}O_6$ ہی ہوتا ہے لیکن کیمیائی ذخیرہ میں کیمیائی گروپس کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔

(2) آلیگوسیکرائیڈس (Oligosaccharides)


ایسی شکر جن کی آب پاشیدگی (Hydrolysis) انجام دینے پر 2 تا 10 مانوسیکرائیڈس (Monosaccharides) اکائیاں حاصل ہوتی ہیں آلیگوسیکرائیڈس (Oligosaccharides) کہلاتی ہیں۔ ان کی مزید ذیلی گروپس (Sub-groups) میں درجہ بندی ان کی آب پاشیدگی کرنے پر حاصل ہونے والی مانوسیکرائیڈس اکائیوں کی تعداد پر کی جاتی ہے۔ یہ ڈائی سیکرائیڈس (Disaccharides)، ٹرائی سیکرائیڈس (Trisaccharides) اور ٹیزائیکرائیڈس (Tetrasaccharides) وغیرہ کہلاتی ہیں۔ ان میں ڈائی سیکرائیڈس حیاتیاتی طور پر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔

ذاتی سیکرائیڈس (Disaccharides)


ذاتی سیکرائیڈس کو دگنی شکر (Double Sugars) کہا جاتا ہے جو مانوسیکرائیڈس کے دو سالمات (اکائیوں) پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی تیاری میں مانوسیکرائیڈس کے دو سالمات متحد ہوتے ہیں جس کے دوران پانی کا ایک سالمہ خارج ہوتا ہے۔ ذاتی سیکرائیڈس کی آب پاشیدگی کرنے پر مانوسیکرائیڈس کے دو سالمات حاصل ہوتے ہیں۔ ہماری غذا میں پائی جانے والی سکروز (Sucrose)، مالٹوز (Maltose) اور لیکٹوز (Lactose) اہم ذاتی سیکرائیڈس ہیں۔ سکروز (Sucrose) روزمرہ استعمال ہونے والی سفید یا بھورے رنگ کی شکر ہے جو گنے اور رتالو سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تھوڑی مقدار پھلوں اور سبزیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ مولاسس (Molasses) میں تقریباً 50% سکروز پائی جاتی ہے۔ ہاضمہ کے دوران سکروز کی آب پاشیدگی سے گلوکوز (Glucose) اور فرکٹوز (Fructose) شکر حاصل ہوتی ہیں۔



مالٹوز (Maltose) یا مالت (Malt) شکر عموماً روزمرہ غذا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جسم میں نشاستہ (Starch) کے ہاضمہ کے دوران درمیانی حاصل (Intermediate Product) کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ مالٹوز کی آب پاشیدگی سے گلوکوز (Glucose) کے دو سالمات حاصل ہوتے ہیں۔



لیکٹوز (Lactose) کو شیر شکر (Milk Sugar) کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ دودھ میں پائی جاتی ہے۔ انسانی دودھ میں 6.8% اور گائے کے دودھ میں 4.9% لیکٹوز شکر موجود ہوتی ہے۔ لیکٹوز کی آب پاشیدگی سے گلیکٹوز (Galactose) اور گلوکوز (Glucose) حاصل ہوتے ہیں۔



ii غیر شکر (Non-Sugars) یا پالی سیکرائیڈس (Polysaccharides)

پالی سیکرائیڈس (Polysaccharides) پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس ہیں جن کا سالمی وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر ایک پالی سیکرائیڈ کئی مانوسیکرائیڈس (Monosaccharides) کے سالمات سے تیار ہوتا ہے جن کی تعداد تقریباً 2000 تک ہو سکتی ہے۔ ان میں مٹھاس

نہیں پائی جاتی ہے۔ غذا میں استعمال ہونے والے اہم پالی سیکرائیڈس میں نشاستہ (Starch)، ڈیکسٹرین (Dextrin)، گلائیکوجن (Glycogen) اور سیلولوز (Cellulose) شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پیکٹن (Pectin)، قاطین (Chitin)، انولین (Inulin) اور اگار (Agar) بھی پالی سیکرائیڈس کی مثالیں ہیں۔

نشاستہ (Starch) انسانی غذا میں سب سے اہم کاربوہائیڈریٹ ہے جو پاول، مہبوس، رائی، بکنی اور ٹیٹ میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بعض پودوں کی جڑوں، تنوں اور جھلوں (Tubers) میں بھی بکثرت موجود ہوتا ہے۔ نشاستہ کی آب پاشیدگی سے گلوکوز کے سالمات حاصل ہوتے ہیں۔ ڈیکسٹرین (Dextrin) دراصل نشاستہ کی مالٹوز شکر میں آب پاشیدگی کے دوران حاصل ہونے والا درمیانی محاصل ہے۔

گلائیکوجن (Glycogen) کو حیوانی نشاستہ (Animal Starch) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حیوانات میں ذخیرہ شدہ پالی سیکرائیڈس ہے۔ یہ تمام حیوانات کے جگر (Liver) میں پایا جاتا ہے۔ گلائیکوجن کی آب پاشیدگی کے نتیجہ میں بھی گلوکوز کے سالمات حاصل ہوتے ہیں۔ جگری گلائیکوجن (Liver Glycogen) جسم کے تمام فلیوں کے لئے توانائی کا ذریعہ ہے۔ عضلی گلائیکوجن (Muscle Glycogen) صرف عضلاتی بافتوں (Muscle Tissues) میں استعمال کی جاتی ہے۔


سیلولوز (Cellulose) تمام نباتی فلیوں کی دیوار میں موجود ہوتی ہے۔ یہ انسانوں میں غیر ہضم پذیر ہوتی ہے۔ جب کہ یہ بھری خور حیوانات میں ہضم پذیر ہوتی ہے۔ سیلولوز سے توانائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے اس کا شمار غذا میں نہیں ہوتا۔ یہ صرف غذا میں ریشے (Fibres) اور ریشی چارہ (Roughage) کے طور پر کام انجام دیتی ہے۔ سیلولوز خشک پھل، جوزوں (Nuts)، تازہ میلوں اور بھریوں میں افراط سے موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دودھ، گوشت، انڈے، گیہوں کا میدہ، اور شکر میں بھی قلیل مقدار میں پائی جاتی ہے۔

3.2.2 کاربوہائیڈریٹس کے افعال


کاربوہائیڈریٹس کے اہم افعال کو ذیل میں مختصر بیان کیا گیا ہے۔

- (I) یہ توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ایک گرام کاربوہائیڈریٹس سے 4 حرارے توانائی (4 Cal/gm) حاصل ہوتی ہے جو روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں (افعال) کو انجام دینے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگرچہ کہ چربی سے توانائی زیادہ یعنی 9 حرارے فی گرام حاصل ہوتی ہے لیکن غذا میں کاربوہائیڈریٹس کی بہ نسبت چربی کم استعمال ہوتی ہے۔ دماغ (Brain) اور عصبی بافتوں (Nervous Tissues) کے لئے گلوکوز (Glucose) ہی توانائی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لئے کاربوہائیڈریٹس ہی توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔

- (2) یہ تحول (Metabolism) میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
- (3) یہ ریشی چارہ (Roughage) مہیا کرتا ہے۔
- (4) جب استعمال لی جانے والی غذا میں کاربوہائیڈریٹس کی وافر مقدار پائی جاتی ہے تو پروٹین (Protein) توانائی مہیا کرنے کے مقصد کے لئے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ پروٹین جسم کی تعمیر اور جسمی اعضاء کی درگلی جیسے بنیادی مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
- کاربوہائیڈریٹس کا یہ فعل پروٹین کو محفوظ رکھنے کا عمل (Protein Sparing Action) کہلاتا ہے۔
- (5) کئی غیر لازمی (Non-Essential) امائنو تھے (Amino Acids) کاربوہائیڈریٹس کے درمیانی حاصل سے تالیف کئے جاتے ہیں۔



شکل 1.3 کاربوہائیڈریٹس اور ان کا استعمال




شکل 1.4 کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی کا خاکہ

3.3 لحمیات (Proteins)

ملڈر (Mulder) ایک ڈچ ماہر کیمیا تھا جس نے 1838ء میں نامیاتی اقلیم (Organic Kingdom) میں پائے جانے والے نائٹروجن مرکبات کے ایک اہم اور بڑے گروہ کو دریافت کیا۔ برزلیں (Berzelin) نے اس نائٹروجنی مرکبات کے گروہ کو بنیادی (Fundamental) اہمیت کا حامل قرار دیا اور اس کو لحمیات (Proteins) کے نام سے موسوم کیا۔ پروٹینو (Proteo) ایک یونانی (Greek) اصطلاح ہے جس کے معنی رئیس (Prime) یا اول اہمیت یا اول مقام حاصل کرنے کے ہیں لہذا لحمیات کافی پیچیدہ نائٹروجنی نامیاتی مرکبات ہیں جن کا سالمی وزن (Molecular Weight) زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سادہ اکائیوں سے تیار ہوتے ہیں جن کو امانو ترشے (Amino Acids) کہا جاتا ہے۔ تمام پروٹینس میں کاربن (Carbon)، ہائیڈروجن (Hydrogen) اور

نائٹروجن (Nitrogen) پائے جاتے ہیں۔ بعض میں ان عناصر کے علاوہ گندک، فاسفورس (Phosphorus) اور آکسیجن (Oxygen) بھی شامل ہوتی ہے۔ بعض مخصوص لمبیات میں شائبہ عناصر (Trace Elements) جیسے لوہا (Iron)، آہڈین (Iodine) اور تانبہ (Copper) بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہر لمبیات کے ساتھ متحد ہو کر شئی۔ لمبیات (Lipo-Proteins) بناتی ہے۔ نیز حیاتین (Vitamins) جیسے تھامین (Thiamine) اور پانٹھینک ترشہ (Pantothenic Acids) کے ساتھ مل کر خامرے (Enzymes) تیار کرتے ہیں۔

لمبیات کی تیاری امانو ترشوں (Amino Acids) سے عمل میں آتی ہے۔ جن کی تعداد بائیس (22) ہوتی ہے۔ امانو ترشے کاربن کے مرکبات ہوتے ہیں جس میں امانو (NH_2) اور کاربو آکسلک (COOH) فعلی گروپس (Functional Groups) پائے جاتے ہیں۔ امانو ترشے کثیر پیپٹائیڈ زنجیر (Polypeptide Chain) جیسے پروٹین کی تیاری میں تعمیری ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ کثیر پیپٹائیڈ زنجیر میں دو امانو ترشے ایک پیپٹائیڈ بند (Peptide Bond) کے ذریعہ باہم جڑے رہتے ہیں۔ اس بند کی تیاری کے دوران پانی کا سالہ خارج ہوتا ہے۔



ہر ایک پروٹین میں امانو ترشوں کے تسلسل کی ترتیب معین ہوتی ہے۔ اس تسلسل میں کسی ایک امانو ترش کے مقام میں تبدیلی پروٹین کی خصوصیت میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔

پروٹین یا امانو ترشوں کے تحول (Metabolism) میں ازالہ امونیا (Deamination) یا امانو ترشوں کی تحلیل (Degradation) واقع ہوتی ہے۔ جگر میں زائد امانو ترشوں کے ازالہ امونیا (Deamination) کے نتیجہ میں کیٹو ترشہ (Keto Acids) اور امونیا (Ammonia) تیار ہوتے ہیں۔ کیٹو ترشے بالآخر لیسٹائل کو ایزائٹم اے (Acetyl CoA) میں تحول ہو جاتے ہیں۔ لیسٹائل کو ایزائٹم اے کرب کے دور (Krebs Cycle) میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح لیسٹائل کو ایزائٹم اے جو امانو ترشوں کی تحلیل کا حاصل ہے پروٹین تحول (Protein Metabolism)، کاربوہائیڈریٹ تحول (Carbohydrate Metabolism)، اور شئی تحول (Lipid Metabolism) کو باہم جوڑنے والی ایک کڑی ہے۔

لازمی اور غیر لازمی امائنو ترشے (Essential and Non-essential Amino Acids)

غذائی لحمیات میں تقریباً (22) امائنو ترشے پائے جاتے ہیں جن میں سے صرف چند امائنو ترشوں کی تالیف حیوانی جسم بشمول انسانی جسم میں انجام پاتی ہے جنہیں غیر لازمی (Non-Essential) امائنو ترشے کہا جاتا ہے۔ بقیہ 10 امائنو ترشوں کی تالیف جسم میں انجام نہیں پاتی اس لئے انہیں غذا کے ساتھ سربراہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے انہیں لازمی (Essential) امائنو ترشے کہا جاتا ہے۔ ذیل کے جدول میں لازمی (Essential) اور غیر لازمی (Non-Essential) امائنو ترشوں کو پیش کیا گیا ہے۔

جدول نمبر 4 لازمی (Essential) اور غیر لازمی (Non-Essential) امائنو ترشے

غیر لازمی امائنو ترشے (Non Essential Amino Acids)	لازمی امائنو ترشے (Essential Amino Acids)
(1) الانیٹن (Alanine)	(1) ارجینین (Arginine)
(2) اسپرائین (Asparagine)	(2) ہسٹیدین (Histidine)
(3) اسپارٹک ترشہ (Aspartic Acid)	(3) آئسولیوسین (Isoleucine)
(4) سیسٹین (Cystine)	(4) لیوسین (Leucine)
(5) گلوٹامک ترشہ (Glutamic Acid)	(5) لائسین (Lysine)
(6) گلوٹامائن (Glutamine)	(6) میتھونین (Methionine)
(7) ہائیڈروآکسی گلوٹامک ترشہ (Hydroxy Glutamic Acid)	(7) فینائل الانیٹن (Phenylalanine)
(8) گلائسین (Glycine)	(8) تھریونین (Threonine)
(9) ہائیڈروآکسی پرولین (Hydroxy Proline)	(9) ٹریپٹوفین (Tryptophan)
(10) پرولین (Proline)	(10) ویلین (Valine)
(11) سیرین (Serine)	
(12) ٹائرؤسین (Tyrosine)	

3.3.1 لحمیات کی درجہ بندی (Classification of Proteins)

لمبیات (Proteins) کی درجہ بندی تین ٹروہس میں کی جاتی ہے۔

1 سادہ لمبیات (Simple Proteins)

2 جفتی لمبیات (Conjugated Proteins)

3 ماخوذ لمبیات (Derived Proteins)

(1) سادہ لمبیات (Simple Proteins)

ایسے لمبیات جو صرف امانو ترشوں (Amino Acids) سے تشکیل پاتے ہیں سادہ لمبیات کہلاتے ہیں۔ مثلاً البومین

(Albumins)، گلوبولینس (Globulins)، گلوبینس (Globins)، ہسٹونس (Histones)، کولاجینس (Collagens)، کیراٹینس

(Keratins) اور ایلاستینس (Elastins) وغیرہ۔

(2) جفتی لمبیات (Conjugated Proteins)

ایسے سادہ لمبیات جو غیر پروٹینی شے سے جڑے رہتے ہیں جفتی لمبیات کہلاتے ہیں۔ مثلاً نوائی لمبیات (Nucleoproteins)، بخالی

لمبیات (Mucoproteins)، فاسفولمبیات (Phosphoproteins)، فحی پردٹین (Lipoproteins) اور دھاتی لمبیات

(Metalloproteins)۔

(3) ماخوذ لمبیات (Derived Proteins)

ایسے لمبیات جو سادہ (Simple) اور (Conjugated) پر خامروں (Enzymes) کے عمل کے باعث حاصل ہوتے ہیں

ماخوذ لمبیات کہلاتے ہیں۔

3.3.2 لمبیات کے افعال (Function of Proteins)

حیوانات بشمول انسان میں لمبیات حسب ذیل افعال کو انجام دیتے ہیں۔

(1) بیشتر خامروں کی نوعیت پروٹینی ہوتی ہے۔ یہ لمبیات حیاتی تھائس عامل (Biocatalysts) کا فعل انجام دیتے ہیں۔

(2) ہارمونس (Hormones) جو دروں افزائی غدود سے افزا ہوتے ہیں پروٹینی نوعیت کے ہوتے ہیں۔

(3) ہیموگلوبین (Haemoglobin) جو خون میں موجود ہوتا ہے گیسوں کے تبادلہ کو انجام دیتا ہے۔

(4) دمی دماپ (Blood Plasma) میں ماسونی گلوبولینس (Immunoglobulins) پائے جاتے ہیں جو ضد اجسام

(Antibodies) کا فعل انجام دیتے ہیں۔

(5) جسم کی نشوونما اور درنگی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔

(6) توانائی اور حرارت مہیا کرتے ہیں۔

(7) بعض پروٹین مختلف جسمی اعضاء میں ساختی مادوں کا فعل انجام دیتے ہیں جیسے اتصالی بافت میں کولاجن (Collagen)، جلد اور

تخنوں میں موجود کیراٹین (Keratin) اور عضلات میں پائے جانے والے مائیوسین (Myosin)۔

(8) نواتی لحمیات (Nucleoproteins) جنس (Genes) کے اہم اجزاء کو تیار کرتے ہیں۔

(9) زائد لحمیات چربی (Fat) میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جسم میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔

لحمیات کے ذرائع (Sources of Proteins)

لحمیات حیوانی اور نباتی دونوں ذرائع سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ حیوانی لحمیات کے ذرائع میں دودھ، انڈے، گوشت، پھلی اور

جگر ہیں نباتی لحمیات کے اہم ذرائع میں دالیں، اجناس، پھل، مونگ پھلی، مٹر کی پھلی وغیرہ شامل ہیں۔ سویا بینس (Soyabeans) میں

لحمیات سب سے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پھل، تیل، شکر، گڑ میں لحمیات قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

مختلف لحمیات اور ان کے متعلقہ ذرائع کو جدول میں پیش کیا گیا ہے۔



سویا بین



گوشت



انڈا

شکل 1.5

لحمیات کے ذرائع

جدول نمبر 5 حیوانی لحمیات اور ان کے ذرائع

ذرائع	پروٹین	ذرائع	پروٹین
بال	کیراٹین (Keratin)	عضلات	مایوسین (Myosin)
خون	کولاجن (Collagen)	دودھ	لیکٹوالبومین (Lactalbumin)
	ریشین (Fibrin)		لیکٹوگلوبین (Lactoglobulin)
	البومین (Albumin)		کیسینوجن (Caseinogen)
	گلوبولین (Globulin)	اٹھنے کی سفید زردی	البومین (Albumin)
			اوئیڈین (Avidin)

جدول نمبر 6 نباتی لحمیات اور ان کے ذرائع

ذرائع	لحمیات
گیہوں	گلوٹینین (Glutenine)
	گلیاڈین (Gliadin)
بارلی	ہورڈینین (Hordenin)
چادل	اوریزینین (Oryzenin)
مکئی	زینین (Zein)

تجزیہ کردہ لحمیات

انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (ICMR) (Indian Council of Medical Research) کی تجویز کے مطابق صحت مند بالغ انسان کے لئے 1.0 گرام لحمیات فی کلوگرام جسمی وزن درکار ہوتی ہے لیکن بچوں کے مختلف مراحل اور فعلیاتی مراحل کے دوران درکار لحمیات کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ حاملہ عورتوں میں اس کے علاوہ زائد 15 گرام پروٹین درکار ہوتی ہے۔ دودھ کی تیاری کے

دوران 18 تا 25 گرام لحمیات فی یوم درکار ہوتی ہے۔

3.4 شحمیات (Lipids)

شحمیات میں شحمیات (Fats)، تیل (Oils) اور موم (Waxes) وغیرہ شامل کئے جاتے ہیں۔ یہ تاسیاتی مرکبات ہیں جن میں کاربن (C)، ہائیڈروجن (H₂) اور آکسیجن (O₂) پائے جاتے ہیں۔ بعض میں ان کے علاوہ فاسفورس (Phosphorus) اور نائٹروجن (Nitrogen) بھی موجود ہوتے ہیں۔ شحم (Lipid) کی اصطلاح کا اطلاق ایسے فطری اشیاء کے گروپ کے لئے کیا جاتا ہے جن کی تفصیص پانی میں مائل پذیر اور شحمی محلول (Fat Solvents) جیسے ایٹر (Ether) کلوروفارم (Chloroform)، بنزین (Benzene) اور الکحل (Alcohol) میں حل پذیر کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کیمیائی طور پر شحمیات (Lipids) شحمی ترشوں (Fatty Acids) کے ایسٹرس (Esters) ہوتے ہیں یا ایسٹرس (Esters) کو تیار کرنے کی صلاحیت کی حامل اشیاء ہوتی ہیں۔ تاسیاتی ترش اور الکحل کا امیزہ ایسٹرس کہلاتا ہے۔ یہ حیوانات اور نباتات میں وسیع طور پر پائے جاتے ہیں۔

3.4.1 شحمیات (Lipids) کی درجہ بندی (Classification of Lipids)

شحمیات کی درجہ بندی تین گروہوں میں کی جاتی ہے۔

1 سادہ شحمیات (Simple Lipids)

2 مرکب شحمیات (Compound Lipids) یا جفتی شحمیات (Conjugated Lipids)

3 ماخوذ شحمیات (Derived Lipids)

(1) سادہ شحمیات (Simple Lipids)

سادہ شحمیات ثلاثی ہائیڈرو آکسی الکحل (Trihydroxy Alcohol) گلیسرال (Glycerol) شحمی ترشے (Fatty Acids) کے ایسٹرس (Esters) ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں گلیسر ایڈس (Glyceroids) یا ثلاثی گلیسر ایڈس (Triglyceroides) یا گلیسر آل ایسٹرس (Glyceryl Esters) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تعدیلی شحمیات (Neutral Lipids) بھی کہلاتے ہیں۔ سادہ شحمیات کی مزید درجہ بندی (i) چربیوں (Fats) اور تیل (Oils) اور (ii) موم (Waxes) میں کی جاتی ہے۔

(i) شحمیات (Fats) اور تیل (Oils)

یہ سادہ شحمیات ہیں۔ طبعی طور پر کمرے کی تپش پر شحمیات ٹھوس حالت میں اور تیل مائع حالت میں ہوتے ہیں۔ کیمیائی طور پر دونوں

ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن چربیوں میں غیر اشباع شدہ خمی ترشوں (Unsaturated Fatty Acids) اور تیل میں اشباع شدہ خمی ترشوں (Saturated Fatty Acids) کی مقداریں زیادہ ہوتی ہیں۔ چربیوں میں اگر خمی ترشے ایک ہی قسم کے ہوں تو انہیں سادہ خمیات (Simple Fats) کہا جاتا ہے اور اگر خمی ترشے مختلف اقسام کے ہوں تو انہیں مخلوط خمیات (Mixed Fats) کہا جاتا ہے۔

خمی ترشے (Fatty Acids)

خمی ترشے (Fatty Acids) چربیوں اور بیشتر خمیات کی بنیادی اکائیاں کہلاتی ہیں جو کاربن (C)، ہائیڈروجن (H) اور آکسیجن (O) پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں کاربہا کسلک گروپ (COOH) پایا جاتا ہے۔ خمی ترشے کا عام ضابطہ $(CH_2)_n COOH$ ہے۔ یہ دو اقسام کے ہوتے ہیں (a) اشباع شدہ خمی ترشے (Saturated Fatty Acids) مثلاً پالمیک ترشے (Palmitic Acid) جو مکہ میں موجود ہوتا ہے اور اسٹیرک ترشے (Stearic Acid) جو حیوانی چربی میں پایا جاتا ہے اور آکٹانویک ترشے (Octanoic Acid) جو تاریل کے تیل میں پایا جاتا ہے اور (b) غیر اشباع شدہ خمی ترشے (Unsaturated Fatty Acids) مثلاً اولیک ترشے (Oleic Acid) جو نباتی تیلوں میں موجود رہتا ہے۔

لازمی خمی ترشے (Essential Fatty Acids)

بعض خمی ترشے جو نمو (Growth) کو فروغ دیتے ہیں اور سالمیت (Integrity) کو قائم رکھتے ہیں لازمی خمی ترشے کہلاتے ہیں مثلاً لینولک ترشے (Linoleic Acid) اور اراکیدونک ترشے (Arachidonic Acid)۔ یہ نباتی تیلوں جیسے تاریل کا تیل اور بنولے کا تیل، سورج مکھی کے بیجوں کا تیل وغیرہ میں کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

(ii) موم (Waxes)

موم کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ بلند خمی ترشوں اور بلند پلیٹینک الکل (Aliphatic Alcohol) کے ایسٹرس (Esters) ہوتے ہیں۔ موم کی ہر قسمیں بیشتر پودوں کے تنوں، چوں، پھولوں اور پھلوں پر پکی غلاف کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں کے جسم سے بھی موم افراز ہوتا ہے۔

(2) مرکب خمیات (Compound Lipids) یا جفتی خمیات (Conjugated Lipids)

مرکب خمیات خمی ترشوں کے ایسٹرس (Esters) ہوتے ہیں جن کی آب پاشیدگی سے خمی ترشوں اور الکل کے علاوہ دیگر اشیاء بھی

حاصل ہوتی ہیں۔ اہم مرکبات میں (a) فاسفولیپڈس (Phospholipids)، (b) گلیکولیپڈس (Glycolipids)، (c) سلفولیپڈس

(Sulpholipids) اور (d) لائپو پروٹین (Lipoproteins) شامل کئے جاتے ہیں۔

(a) فاسفولیپڈس (Phospholipids) یا فاسفائیڈس (Phosphatides)

فاسفولیپڈس میں تھمے ترشے (Fatty Acids)، فاسفورک ترشے (Phosphoric Acids)، گلیسرال (Glycerol) اور ایک نائٹروجنی اساس (Nitrogenous Base) پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام جاندار خلیوں میں موجود رہتے ہیں۔ دماغ (Brain) اور عصبی بافتوں (Nervous Tissues) میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ چند اہم فاسفولیپڈس میں فاسفائیڈک ترشے (Phosphatidic Acids)، لیسیٹھین (Lecithin)، سیفالین (Cephalin)، پلاسما لوجن (Plasmalogen) اور اسپنگو مایلین (Sphingomylin) قابل ذکر ہیں۔

(b) گلیکولیپڈس (Glycolipids)

یہ ایسے مرکب تخمیات ہیں جن میں لانی زنجیری پلیٹنک ترشوں (Aliphatic Acids) کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) بھی پائے جاتے ہیں۔ انھیں سویا بین (Soyabean)، مکی، سورج مکھی کے بیجوں، بنولے اور گیہوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ گلیکولیپڈس کی مثالیں سیرامو سائیڈس (Cerebrosides)، گلینگلیو سائیڈس (Gangliosides) اور سائٹولیپڈس (Cytolipids) اہم ہیں۔

(c) سلفولیپڈس (Sulpholipids)

سلفولیپڈس میں سلفیورک ترشے (Sulphuric Acid) پایا جاتا ہے۔ یہ ترشے سیرامو سائیڈس (Cerebronic Acid Ester) کے طور پر موجود ہوتا ہے۔

(d) لائپو پروٹین (Lipoproteins)

یہ ایسے تخمیات ہیں جو پروٹین سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ خون کے دماغ (Plasma) میں بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بافتوں (Tissues)، خلیوں سطح، تو انیوں (Mitochondria) اور مائکرو ذوس (Microsomes) میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تخمیات کی حل پذیری حالت میں منتقلی کو انجام دیتے ہیں اور خلیہ کی سالمیت کو قائم رکھتے ہیں۔

(e) کرومولیپڈس (Chromolipids)

ان تخمیات میں صغے (Pigments) جیسے کیراٹینائیڈس (Carotenoids)، مثلاً کیراٹینس (Carotenes) پائے جاتے ہیں۔

(3) ماخوذ شحمیات (Derived Lipids)

یہ ایسے شحمیات ہیں جو سادہ یا مرکب شحمیات کی آب پاشیدگی (Hydrolysis) سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں فحمی ترشے،

الکحل، ہائیڈروکاربنس اور حیاتین شامل ہیں جن کو ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔

(a) فحمی ترشے (Fatty Acids)

ان میں سیر شدہ (Saturated) اور غیر سیر شدہ (Unsaturated) فحمی ترشے شامل ہیں۔

(b) الکحل (Alcohol)

ان میں ایساکیل الکحل (Acetyl Alcohol) اسٹیریل الکحل (Steryl Alcohol) وغیرہ اور اسٹیرالس (Sterols) جیسے

ارگوسٹیرال (Ergosterol) کولیسٹیرال (Cholesterol) وغیرہ شامل ہیں۔

(c) ہائیڈروکاربنس (Hydrocarbons)

ایسے مرکبات ہیں جن میں کاربوآکسل (Carboxyl) یا الکحل (Alcohol) گروپس نہیں پائے جاتے مثلاً کیراٹین

(Carotene) شارک جگر تیل (Shark Liver Oil) وغیرہ۔

(d) حیاتین (Vitamins)

جہ بی میں حل پذیر حیاتین جیسے حیاتین ڈی (Vitamin D)، حیاتین بی (Vitamin E) اور حیاتین کے (Vitamin K)

(K) ماخوذ شحمیات میں شامل کئے جاتے ہیں۔


جہ بی کے ذرائع (Sources of Fat)

حیوانات اپنے لئے جہ بی کی ضروریات کو حیوانی جہ بیوں (Animal Fats) اور نباتی جہ بیوں (Plant Fats) سے مکمل کرتے

ہیں۔ حیوانی جہ بیوں میں دودھ، پنیر (Cheese)، مسک، اڈے، گوشت، مچھلیوں جیسے کوڈ (Cod)، ہالباٹ (Halibut)، ہیرنگ

(Herring) وغیرہ شامل ہیں۔ نباتی جہ بیوں میں رائی کا تیل، سورج مکھی کے بیجوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، بنولے کا تیل اور ڈالفا وغیرہ

شامل ہیں۔



شکل 1.7 حیوانی شمیات کے ذرائع

شکل 1.6 نباتی شمیات کے ذرائع

3.4.2 شمیات کی حیاتیاتی اہمیت (Biological Importance of lipids)

- (1) عضویوں میں شمیات توانائی کے اہم ذرائع کے طور پر فعل انجام دیتے ہیں۔
- (2) یہ عضویوں میں ذخیرہ شدہ حالت میں موجود رہتے ہیں۔
- (3) یہ غلیہ کی نفوذ پذیری (Permeability) اور غلیہ کی تنظیم (Organization) کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
- (4) یہ غذا میں ذائقہ اور خوشبو فراہم کرتے ہیں۔
- (5) یہ جہلی میں حل پذیر حیاتین جیسے حیاتین "اے"، حیاتین "ڈی"، حیاتین "ای" اور حیاتین "کے" کی جسم میں مختلف مقامات کو منتقلی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔
- (6) جہلی کے حاصل سے برگرودی کارٹیکوائڈس (Adrenal Corticoids) اور جنسی ہارمونس (Sex Hormone) کی تالیف عمل میں آتی ہے۔
- (7) جلد کے نیچے جہلی کی پرت کی تیاری جسم پر حائل (Insulator) کا فعل انجام دیتی ہے جو زائد پیش کو جسم سے خارج ہونے سے روکتی ہے مثلاً دھیل (Whales) میں بلبر (Blubber)۔
- (8) شمیات جسم میں لازمی نمی ترشوں کو مہیا کرتی ہیں۔
- (9) شمیات کئی جسمی اعضاء جیسے قلب (Heart)، گردے (Kidney) اور آنت (Intestine) کو سہارا فراہم کرتی ہیں۔

3.5 حیاتین (Vitamins)

زمانہ قدیم میں 18th صدی سے قبل ملاح شب کورن (Night Blindness) سے افادہ حاصل کرنے کے لئے جگر (Liver) اور استر یوط (Scurvy) کی بیماری کے علاج کے لئے لیموں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے اور سوکھے کی بیماری، کساجی (Rickets) کے علاج کے لئے کاڈ جھری تیل (Cod Liver oil) کو دریافت کر چکے تھے لیکن وہ ان مختلف امراض کے علاج کی میکانیت سے ناواقف تھے۔ سر۔ ایچ۔ جی ہاپکنس (Sir.H.G.Hopkins) نے 1912ء وودھ میں ایسی اشیاء کو دریافت کیا جو جاندار کے نمو (Growth) کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء نہ تو کھجے (Proteins)، نہ تو کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) اور نہ ہی فٹے (Fats) تھے۔ اس لئے ہاپکنس (Hopkins) نے ان اشیاء کو معاون اضافی (Accessory) عامل (Factor) کے نام سے موسوم کیا۔ ڈاکٹر فنک (Dr. Funk) نے 1912ء میں جاپانی ملاحوں میں پالش کئے ہوئے چاول کے استعمال سے لاحق ہونے والی ہیری ہیری (Beriberi) کی مرض کے علاج کے لئے دھان کے بھوسے سے ایک شے کو دریافت کیا۔ اس شے میں امین (Amine) گروپ موجود تھا۔ اس لئے اس شے کو فنک نے وٹامین (Vitamin) کے نام سے موسوم کیا لیکن بعد کی تحقیقات نے یہ واضح کیا کہ دریافت کی گئی اس قسم کی تمام اشیاء میں امین گروپ موجود نہیں ہوتا لیکن یہ امراض کے علاج میں ان کا عمل ایک دوسرے کے مماثل ہوتا ہے۔ اس لئے وٹامین (Vitamin) کی اصطلاح سے آخری حرف "e" کو حذف کر دیا گیا اور وٹامین کی اصطلاح کو وٹامن (Vitamin) سے تبدیل کر دیا گیا۔ سینٹ گیورگائی (Szent Gyorggi) وٹامن (Vitamin) کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے جس کو غذا کے طور پر استعمال نہ کرنے سے ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں حیاتین (Vitamin) کی تعریف اس طرح کی گئی کہ یہ مختلف اقسام کے قوی (Potent) امیاتی (Organic) مرکبات ہیں جو غذا میں انتہائی کلیل تناسب میں پائے جاتے ہیں اور جن کا خارجی ذرائع سے عضویوں کو فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ زندگی کے فعلیاتی عمل حسب معمول بخوبی انجام پائیں۔ حیاتین کے اہم خصوصیات کو ذیل میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔

- (1) حیاتین نامیاتی مرکبات ہیں۔
- (2) نباتات میں حیاتین تیار کئے جاتے ہیں لیکن حیوانات صرف چند حیاتین ہی کو تیار کر سکتے ہیں۔
- (3) حیوانات حیاتین کو غذا کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔
- (4) انسان کو تقریباً 15 یا اس سے کم حیاتین درکار ہوتے ہیں۔

5) حیاتین قلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔

6) یہ ہارمونس (Hormones) کی طرح افعال انجام دیتے ہیں۔

7) حیاتین توانائی سپہا نہیں کرتے لیکن تھامی عامل (Catalysts) کے طور پر فعل انجام دیتے ہوئے فعلیاتی تعاملات کو باقاعدہ بناتے ہیں۔

8) حیاتین زیادہ قش (Temperature) پر اور طویل وقت تک پکانے پر ضائع ہو جاتے ہیں۔

9) جب غذا میں حیاتین کی کمی واقع ہو جائے تو کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کو حیاتین قلتی بیماریاں (Vitamin Deficiency Diseases) کہا جاتا ہے۔

10) حیاتین قلتی بیماریوں کا علاج ان ہی حیاتین سے کیا جاتا ہے۔

3.5.1 حیاتین کی درجہ بندی (Classification of Vitamins)

حیاتین کو ان کی دریافت کی ترتیب کے بالفاظ حروف موسوم کئے جاتے ہیں جیسے حیاتین اے، بی، سی، ڈی، کے، یو وغیرہ۔ حیاتین

کی درجہ بندی ان کی حل پذیری کی بنیاد پر دو گروہوں میں کی جاتی ہے۔

1) پانی میں حل پذیر حیاتین (Water Soluble Vitamins)

2) چربی میں حل پذیر حیاتین (Fat Soluble Vitamins)

حیاتین بی کا مپلکس (Vitamin B Complex) اور حیاتین سی (Vitamin C) پانی میں حل پذیر حیاتین ہیں جب کہ

حیاتین اے (Vitamin A)، حیاتین ڈی (Vitamin D)، حیاتین ای (Vitamin E) اور حیاتین کے (Vitamin K) چربی میں حل پذیر حیاتین ہیں۔

3.5.1.1 پانی میں حل پذیر حیاتین (Water Soluble Vitamins)

پانی میں حل پذیر حیاتین میں حیاتین بی کا مپلکس (Vitamin B-Complex) اور حیاتین سی (Vitamin C) شامل

کئے جاتے ہیں۔ یہ حیاتین پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔

حیاتین بی کا مپلکس (Vitamin 'B' Complex)

حیاتین بی کا مپلکس میں چار اقسام کے حیاتین بی (Vitamin B) شامل کئے جاتے ہیں جن میں بی₁ (B₁)، بی₂ (B₂)، بی


6 (B₆) اور بی₁₂ (B₁₂) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک گروہ میں مزید ایک یا ایک سے زائد حیاتین شامل کئے جاتے ہیں۔

(1) حیاتین بی₁ (Vitamin B₁) تھامین (Thiamine)

حیاتین بی₁ (Vitamin B₁) کو جانسن (Jansen) اور ڈوناث (Donath) نے 1926ء میں حاصل کیا۔ ویس (Williams) نے 1936ء میں اس حیاتین کی تالیف کو انجام دیا۔

ذرائع (Sources)

بغیر پالش کئے ہوئے چاول حیاتین بی₁ کا پر افراط ذریعہ ہیں۔ چاول کو پالش کرنے پر یہ حیاتین ضائع ہو جاتا ہے کیوں کہ چاول کی اوپری پرست میں حیاتین موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گیہوں، موگ پھلی، دودھ، گوشت، اٹھڑے، مچھلی اور ترکاریاں بھی حیاتین بی₁ کے لئے اہم ذرائع ہیں۔



دانے دار اجناس

شکل 1.8

بی₁ کے لئے اہم ذرائع

افعال (Functions)

- (i) تھامین (Thiamine) اے ٹی پی (ATP) کے ساتھ تعامل کے ذریعہ تھامین پارو فاسفیٹ (Thiamine Pyrophosphate) پی ٹی پی (TPP) تیار کرتا ہے جو گلیکولائک دور (Glycolytic Pathway) اور کرب دور (Kreb's Cycle) میں اہم خامرہ کو انزائم (Coenzyme) کے طور پر فعل انجام دیتا ہے۔


(ii) حیاتین بی ۱ خامروں کے نظام کی مدد کرتا ہے جو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس سے جڑیوں کی تالیف کو انجام دیتا ہے۔

(2) حیاتین بی ۲ (Vitamin B₂) رائبوفلے وین (Riboflavin)

اس حیاتین کو واربرگ (Warburg) اور کرسٹیان (Christian) نے ۱۹۳۲ء میں حاصل کیا یہ تاریخی زرد رنگ کا مرکب ہے جس میں ڈی رائبوز (D-Ribose)، الکحل (Alcohol) اور فلی وین (Flavin) پائے جاتے ہیں۔

ذرائع (Sources)

حیاتین بی ۲ کے انفرادی ذرائع میں دودھ، انڈے، جگر، گردے، عضلات، خشک بیج، ہرپے والی ترکاریاں، مٹر کی پھلی اور جو (Nut) شامل ہیں۔ حیاتین بی ۲، ایسٹ (Yeast) اور تخیری بیکٹریا (Fermenting Bacteria) میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔



شکل 1.9

حیاتین بی ۲ کے انفرادی ذرائع

انفعال (Functions)

(i) رائبوفلے وین (Riboflavin) ویتامین خامروں (Coenzymes) یعنی فلیوینو کلوٹائیڈ (Flavin Mononucleotide) (FMN) اور فلیوینو آڈینین ڈائی نیوکلیوٹائیڈ (Flavin Adenine Dinucleotide) (FAD)

کا جزء ترکیب ہے۔ اس لئے کئی خامروں کے نظام میں یہ عظیم ردل ادا کرتا ہے۔

(ii) یہ نمو (Growth) کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

(iii) یہ غلوی تنفس میں حصہ لیتا ہے۔

(iv) یہ فلیوں میں عمیدی تحویلی تعاملات کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

(3) حیاتین بی₃ (Vitamin B₃) پانٹوٹھک ترشہ (Pantothenic Acid)


اس حیاتین کو ولڈیرس (Wildiers) نے 1901ء میں دریافت کیا اور اسٹیلر (Stiller) نے 1940ء میں اس حیاتین کی تالیف

کی۔ یہ کیمیائی طور پر ڈائی پیپٹائیڈ (Dipeptide) ہے۔

ذرائع (Sources)

اس حیاتین کے پرافراہ ذرائع میں ایسٹ (Yeast) جگر، گردے، اٹھے، مٹر، گیہوں، مونگ پھلی، گوشت اور چاول کا بھوسا

شامل ہیں۔



شکل 1.10

حیاتین بی₃ کے ذرائع

افعال (Functions)

(i) حیاتین B₂ کو ایزائم اے (CoA) (Coenzyme) کا ٪ ترکیب ہے۔

(ii) یہ تحول میں کئی اساسی تعاملات کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

(iii) یہ کاربوہائیڈریٹس، بھجیات اور شحمیات کے تحول کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

(4) نکوٹینک ترشہ یا نیا سین (Nicotinic Acid or Niacin) (B₃)

اس حیاتیات کو سب سے پہلے ہوبر (Huber) نے 1807ء میں قلعوی نکوٹین (Alkaloid Nicotin) کی عکسید کے ذریعہ


حاصل کی۔ سوزوکی (Suzuki) نے 1912ء میں سب سے پہلے حیاتیاتی مادوں میں اس حیاتیات کی موجودگی کو ظاہر کیا۔ وائسرائے

(Viceroy) نے 1926ء میں اس حیاتیات کو ایسٹ (Yeast) سے عکسید کیا۔

ذرائع (Sources)

نکوٹینک ترشہ گردے، جگر، گوشت، مچھلی، ہارنی، بکئی، جوزوں (Nuts)، پھلیوں، کافی (Coffee)، چائے، مونگ، پھلی، تیس

ان اعضاء سے پایا جاتا ہے۔



شکل 1.11

نکوٹینک ترشہ کے ذرائع

افعال (Functions)

(ii) یہ امائنو ترشوں (Amino Acids) اور بعض دھاتی رداس (Ions) کی غلطی غشاء کے آر پار عامل منتقلی (Active Transport) میں مدد کرتا ہے۔


(iii) یہ کاربوہائیڈریٹس اور لحمیات سے چربیوں کی تالیف میں مدد کرتا ہے۔

(6) بائیوٹن (Biotin)

بائیوٹن کو ہالیمان (Bateman) نے 1916ء میں دریافت کیا۔

ذرائع (Sources)

بائیوٹن دالوں، جوزوں (Nuts)، ایسٹ (Yeast)، اٹھنے کی زردی، دودھ، جگر، گردے اور گوشت میں بافرطام موجود ہوتا ہے۔



فصل 1.13

بائیوٹن کے ذرائع

افعال (Functions)

(i) بائیوٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تثبیت (Fixation) میں اہم رول ادا کرتا ہے۔

(ii) یہ بعض امائنو ترشوں کے زائلہ امونیا (Deamination) میں مدد کرتا ہے۔

(iii) یہ لحمیات (Lipids) کی تالیف کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

(iv) یہ چوہوں اور کتوں میں جلدی سوزش (Dermatitis) کے انسداد میں معاون ہوتا ہے۔

(7) فولک ترشہ (Folic Acid) (B₉)

فولک ترشہ کوڈے (Day) نے دریافت کیا۔ اس کو پاک سے علیحدہ کیا گیا۔

ذرائع (Sources)

فولک ترشہ کے افراطی ذرائع سبز پتے والی ترکاریاں، ایسٹ (Yeast)، جگر، گردے، اور گوشت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔


افعال (Functions)

- (i) یہ ہم خامرے (Coenzyme) کے طور پر فعل انجام دیتا ہے۔
 - (ii) یہ آرین اے (RNA) کی تالیف کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
 - (iii) یہ سرخ خیموں (Red Corpuscles) کی تیاری اور پختگی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
- (8) حیاتین ب₁₂ ' (Vitamin B₁₂) یا کو بالامن (Cyanocobalamin)

حیاتین ب₁₂ کو اسمتھ اور پارکر (Smith and Parker) نے 1948ء میں جگر سے علیحدہ کیا۔ یہ غذا میں تیار شدہ حالت میں نہیں پایا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی آنت میں موجود بیکٹریا (Bacteria) اس حیاتین کو تیار کرتے ہیں۔ اس کا جگر میں کافی مقدار میں ذخیرہ ہوتا ہے۔

ذرائع (Source)

یہ جگر، اٹھڑے کی زردی، دودھ، گوشت اور پھل میں پایا جاتا ہے۔




شکل 1.14 حیاتین ب₁₂ کے ذرائع

افعال (Functions)

- (i) یہ نواتی ترشوں (Nucleic Acids) اور میتھائل گروپ (Methyl Group) کی تالیف کے لئے ضروری ہے۔

- (ii) یہ اشیاء کو بڑھاتا ہے۔
- (iii) یہ خوردبینی عضویوں کے نمونے مدد کرتا ہے۔
- (iv) یہ احمر جیسوں (RBC) کی تیاری اور ان کی پختگی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (v) یہ عظمی گودے (Bone Marrow) کو، بیض جیسوں (WBC) اور دوسری خلیوں (Blood Platelets) کی پیدائش کے لئے متحرک کرتا ہے۔
- (vi) جاندار غلیوں میں حیاتین ب₁₂ ہم خامرے ب₁₂ (Coenzyme-B₁₂) میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کئی حیوانی تعاملات میں حصہ لیتا ہے۔
- (vii) یہ کاربوہائیڈریٹس سے چربیوں کی تیاری کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (viii) یہ فوق گلائیسمیا (Hyperglycaemia) اور فقر الدم (Anaemia) کے انسداد کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (9) آئنوسیتال (Inosital)
- اس حیاتین کو شرر (Scherer) نے 1850ء میں عضلات سے علودہ کیا۔ اس حیاتین کا سرہ بیٹھا ہوتا ہے۔
- ذرائع (Sources)
- آئنوسیتال کے اہم ذرائع میں ایسٹ (Yeast) دماغ، معدہ، گردے، طحال، جگر، دودھ، خون، عضلات، سویا بین، لیموں اور بنریاں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔



آئنوسیتال کے اہم ذرائع

فصل 1.15

انفعال (Function)


- (i) انسان میں اس حیاتیات کا فعل ہنوز دریافت نہیں ہوا۔
- (ii) تاہم یہ مٹو کو فروغ دیتا ہے اور معمول کے مطابق تولید کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (iii) یہ جی کو ذخیرہ ہونے سے روکتا ہے اور جگر سے جی بی کے خارج ہونے کی شرح میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔

(10) حیاتیات 'سی' (Vitamin C) ایسکاربک ترشہ (Ascorbic Acid)

حیاتیات C کو زینٹ گیا ڈرجی (Szent Gyorgyi) نے 1928ء میں دریافت کیا اور ریچ اسٹین (Reichstein) نے 1933ء میں اس کو تیار کیا۔ یہ کاربوہائیڈریٹ کا محاصل ہے۔ یہ ٹھوس سفید قلم کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ گرم کرنے اور پکانے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ حرارت کے لئے کافی حساس ہوتا ہے۔

ذرائع (Sources)

یہ لیمونی پھلوں (Citrus Fruits) جیسے سنترہ، لیموں، آنولہ، لٹائر، پٹی، انگور، جام، آم، سیب، موز، ترکاریوں جیسے پھول، گوبھی، پتہ گوبھی، ہنر پھلیاں اور پالک میں ہا فراط موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس حیاتیات کی قلیل مقدار دودھ، جگر، گردے، دل، گوشت، مچھلی وغیرہ میں بھی موجود ہوتی ہے۔



شکل 1.16

حیاتیات سی کے ذرائع

افعال (Functions)

- (i) یہ ہائیڈروجن حامل (Hydrogen Carrier) کے طور پر فعل انجام دیتے ہوئے نکییدی تھوئی تعاملات کو باقاعدہ بناتا ہے۔
- (ii) یہ اتصالی بافت کی تیاری کے ذریعہ زخم کو مندرل کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
- (iii) یہ برگردوی (Adrenal) ہارمونس اور مولدی (Gonadal) ہارمونس کی تالیف کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (iv) یہ آنت میں لوہے کے انجذاب میں مدد کرتا ہے۔
- (v) یہ احمر جیسوں (RBC) کی پختگی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (vi) یہ ریشکی نہیوضوں (Fibroblasts) اور عظمی نہیوضوں (Osteoblasts) کی تیاری کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (vii) یہ کولاجن (Collagen) کی تیاری کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ کولاجن دموی وعادوں، اتصالی بافتوں، غضروف، اور دانتوں کے دئین (Dentine) کی تیاری کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (viii) یہ زہریلے مادوں (Toxins) اور تھکاوت (Stress) کے خلاف مدافعتی طاقت مہیا کرتا ہے۔
- (ix) یہ کاربوہائیڈریٹس کے تحول کو باقاعدہ بناتا ہے۔

3.5.1.2 چربی میں حل پذیر حیاتین (Fat Soluble Vitamins)

(1) حیاتین اے (Vitamin A)

حیاتین اے (Vitamin A) کو ایم سی کولم (Mc Collum) نے 1913ء میں دریافت کیا۔ یہ چربی میں حل پذیر حیاتین ہے۔ یہ دو شکلوں میں پایا جاتا ہے جنہیں حیاتین اے₁ (Vitamin A₁) اور حیاتین اے₂ (Vitamin A₂) کہا جاتا ہے۔ حیاتین اے₁ (Vitamin A₁) کا سائنسی نام ریتینال (Retinol) اور حیاتین اے₂ (Vitamin A₂) کا سائنسی نام ریتینال (Retinol) ہے۔ حیاتین اے₁ کا لکھیریکل ضابطہ (Empirical Formula) $C_{20}H_{30}O$ اور حیاتین اے₂ کا لکھیریکل ضابطہ $C_{20}H_{27}O$ ہے۔ حیوانات حیاتین اے کو کیراٹین (Carotene) سے تیار کرتے ہیں۔ اس لئے کیراٹین کو پرو حیاتین اے (Provitamin A) کہا جاتا ہے۔ کیراٹین نباتی غذا میں پایا جاتا ہے۔

ذرائع حیاتین اے

حیاتین اے کے اہم ذرائع حسب ذیل ہیں۔

نباتی ذرائع میں بڑے پتے والی ترکاریاں جیسے پالک، گوہی، گاجر، کدو، کوٹھیر اور لوکی؛ زرد پھل جیسے آم اور پپائی؛ حیوانی ذرائع میں مچھلی کا جگری تیل جیسے کاڈ جگری تیل (Cod Liver Oil) اور ہلبٹ جگری تیل (Halibut Liver Oil)، دودھ، مسک، آبی، انڈے مچھلی وغیرہ شامل ہیں۔



شکل 1.17

حیاتین اے کے ذرائع

افعال (Functions)

(i) حیاتین اے (Vitamin A) آنکھ کے شبکیہ (Retina) کے عصاؤں (Rods) کے ریبوڈاپسن (Rhodopsin) صبغوں

(Pigments) اور مخروطوں (Cones) کے آئیوڈاپسن (Iodopsin) صبغوں کی تیاری کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے یہ

بصارت کے لئے ضروری ہے۔

(ii) یہ نمو (Growth) کو فروغ دیتا ہے۔

(iii) یہ لحمیات (Proteins) کی تیاری کے لئے ضروری ہے۔

- (iv) یہ ہڈیوں کی ٹارل ہمواد شکل کو برقرار رکھتا ہے۔
- (v) یہ میوکوپالی سیکرائیڈس (Mucopolysaccharides) کی تالیف کے لئے ضروری ہے۔
- (vi) یہ بلوغیت کو فروغ دیتا ہے۔
- (vii) یہ کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) کے تحول (Metabolism) میں مخصوص افعال انجام دیتا ہے۔
- (viii) یہ سرطانی بافتوں (Epithelial Tissues) کی ٹارل ساخت اور افعال کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (2) حیاتین ڈی (Vitamin D)

حیاتین ڈی (Vitamin D) کو بھی ایم سی کولم (Mc Collum) نے 1922ء میں دریافت کیا۔ یہ اسٹیرائیڈ (Steroid) مرکبات ہیں۔ اس کو کیلسیفیرال (Calciferol) یا مانع کساح (Antirachitic) کہا جاتا ہے۔ یہ پانچ شکلوں یعنی حیاتین ڈی₁، ڈی₂، ڈی₃، ڈی₄ اور ڈی₅ میں موجود ہوتا ہے۔ حیاتین ڈی₂ (D₂) ایک عام طور پر واقع ہونے والا حیاتین ہے جس کا کیمیائی نام اردو کیلسیفیرال (Ergocalciferol) ہے۔ حیاتین ڈی₃ (D₃) کا سائنسی نام کو کیلسیفیرال (Cholecalciferol) ہے۔ حیاتین ڈی₅ (D₅) کو نباتی اسٹیرال (Sterol)، ارگو اسٹیرال (Ergosterol) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان کی جلد میں کو لیسٹرال (Cholesterol) کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس لئے جلد پر سورج کی روشنی پڑنے سے کو لیسٹرال حیاتین ڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

ذرائع (Sources)

حیاتین ڈی کے افرامی ذرائع میں مچھلی کے جگری تیل کے علاوہ مکہ، دودھ، انڈے اور جگر شامل ہیں۔



شکل 1.18

حیاتین ڈی کے افرامی ذرائع

افعال (Functions)


- (i) حیاتین ڈی آنت میں کیلشیم (Calcium) اور فاسفورس (Phosphorus) کے انجذاب میں مدد کرتا ہے۔
- (ii) یہ کیلشیم کے تحول (Metabolism) کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (iii) یہ ہڈیوں کی معتدل نشوونما میں معاون ہوتا ہے۔
- (iv) یہ ہڈیوں میں کیلشیم اور فاسفورس کے ذخیرہ ہونے میں مدد کرتا ہے۔

(3) حیاتین ای، (Vitamin "E")

حیاتین ای (Vitamin E) کو مائل (Matill) اور کونکلن (Conclin) نے 1920ء میں دریافت کیا۔ اس کو ٹوکوفرال (Tocopheral) یا ضد عقم (Antisterility) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الفا، بیٹا اور گاما ٹوکوفرالس (Tocopherals) کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ الفا ٹوکوفرال عام قوی حیاتین ہے۔

ذرائع (Sources)

حیاتین ای بننے کے تیل، سورج مکھی کے تیل اور حبیبیت پذیر بیجوں میں افراط سے پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں، ترکاریوں، گوشت، دودھ، انڈے کی زردی، گھوڑے کے جگر، سویٹشوں کے قلب اور گردے میں بھی موجود ہوتا ہے۔



حیاتین ای کے ذرائع

کل 1.19


افعال (Functions)

- (i) حیاتین ای مردوں میں بلوغیت اور عورتوں میں پیدائش کے عمل کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (ii) یہ چوبوں میں معمول کے مطابق تولیدی عمل کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (iii) یہ عضلات کی بہتر کارکردگی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (iv) یہ مائع تکسید کار (Anti Oxidant) کے طور پر فعل انجام دیتا ہے یہ حیاتین اے (Vitamin A) شحمی ترشوں (Fatty Acids) اور گندک بردار امائنو ترشوں (Amino Acids) کو تکسید ہونے سے روکتا ہے۔
- (v) یہ کو انزائم (Coenzyme) کی تالیف کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (vi) یہ جنسی اعضاء کی بہتر کارکردگی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (4) حیاتین کے (Vitamin K)

حیاتین "کے" (Vitamin K) کو ڈام (Dam) نے 1935ء میں دریافت کیا۔ اس حیاتین کو 'کے' کے نام سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ ترویج یا بھگی (انجماد خون) یا (Coagulation) کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

ذرائع (Sources)

حیاتین "کے" کی تالیف بزر پودوں اور خورد بنی عضویوں کے جسم میں انجام پاتی ہے۔ گو بھی، پالک، نماز، سویا بین میں حیاتین کے افراط سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر، مچھلی، دودھ، کھی، انڈے میں بھی قلیل مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کو مصنوعی طور پر بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔



شکل 1.20

حیاتین "کے" کے ذرائع

انحال (Functions)

(i) یہ جگر میں پروتھر وٹھین (Prothrombin) کی تیاری کے لئے ضروری ہے۔ پروتھر وٹھین انجماد خون میں مدد دیتا ہے۔

بالفاظ دیگر حیاتین "کے" انجماد خون کے لئے ضروری ہوتا ہے اس لیے اس کو ضد دسوی سیلانی

(Antihaemorrhagic) حیاتین کہا جاتا ہے۔

(ii) حیاتین "کے" تنفسی زنجیری میکائیت اور نکیدی فاسفوریت (Oxidative Phosphorylation) میں اہم رول ادا کرتا

ہے۔

(5) حیاتین "کیو" (Vitamin Q)

یہ ایک نیا حیاتین ہے جس کو ڈاکٹر اے۔ جے۔ کوئیک (Dr. A.J. Quick) نے 1972ء میں دریافت کیا۔ اس حیاتین کو

سیراین سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ فاسفولیپڈ (Phospholipid) ہے۔ یہ انسان میں انجماد خون کی میکائیت کو بہتر طور پر انجام دینے کے لئے

ضروری ہوتا ہے۔

(6) حیاتین 'یو' (Vitamin U)

یہ حیاتین بھی ایک نیا حیاتین ہے جس کو غذائی صنعتی ادارہ حیاتیاتی کیمیا (Biochemistry Food Industrial

Institute) اور ماسکو ٹیکنیکی ادارہ (Moscow Technological Institute) میں سائنسی تحقیقات کے ذریعہ دی (Curd) سے

علمدہ کیا گیا ہے۔

3.6 معدنیات (Minerals)


تمام عضویوں (Organisms) کا جسم نامیاتی مرکبات (Organic Compounds) اور غیر نامیاتی عناصر (Inorganic

Elements) سے تشکیل پاتا ہے۔ نامیاتی مرکبات از خود غیر نامیاتی عناصر یا معدنیات (Minerals) کے حاصل ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی

دنیا میں معدنیات کافی اہم افعال انجام دیتے ہیں۔

حیوانی ہفتوں (Animal Tissues) میں تقریباً 29 عناصر (Elements) پائے جاتے ہیں جن کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(1) لازمی عناصر (Essential Elements) اور (2) غیر لازمی عناصر (Non Essential Elements)



شکل 1.7 صحت کے لئے معدنیات کی ضرورت

(I) لازمی عناصر (Essential Elements)

جاندار اجسام میں بعض عناصر کے افعال واضح طور پر معلوم کئے گئے ہیں اور یہ عناصر زندگی کی سرگرمیوں کے لئے انتہائی ضروری ہیں۔ اس لئے ان عناصر کو لازمی عناصر (Essential Elements) کہا جاتا ہے۔ ان عناصر کو جاندار کے جسم میں ان کی حقیقی مقدار کی بنیاد پر دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ (a) کلاں عناصر (Macro Elements) اور (b) خرد عناصر (Micro Elements) (پاشانیہ عناصر (Trace Elements)۔

(a) کلاں عناصر (Macro Elements)

ایسے عناصر جن کی غذا میں موجودگی ایک ملی گرام سے زائد درکار ہوتی ہے کلاں عناصر کہلاتے ہیں۔ جسم میں پائے جانے والے جملہ عناصر میں 60 تا 80 فی صد کلاں عناصر ہوتے ہیں۔ جاندار کے لئے درکار کلاں عناصر کی تعداد تقریباً 12 ہوتی ہے جن کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 7 کلاں عناصر

کلاں عناصر	علامات	کلاں عناصر	علامات
کاربن (Carbon)	C	کیلشیم (Calcium)	Ca
ہائیڈروجن (Hydrogen)	H	مگنیشیم (Magnesium)	Mg
آکسیجن (Oxygen)	O	لوہا (Ferrum)	Fe
نائٹروجن (Nitrogen)	N	فاسفورس (Phosphorus)	P
سوڈیم (Sodium)	Na	گندک (Sulphur)	S
پوٹاشیم (Pottasium)	K	کلورین (Chlorine)	Cl

(b) خرد عناصر (Micro Elements)

جاندار اجسام میں بعض عناصر کافی قلیل مقدار یعنی مائکرو گرام (Microgram) میں درکار ہوتے ہیں۔ ان عناصر کو خرد عناصر

یا شاہ عناصر کہا جاتا ہے۔ جن کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 8 خرد عناصر (Micro Elements) جو جاندار کے لئے ضروری ہیں۔

خرد عناصر (Micro Elements)	علامت (Symbole)
تانہ (Copper)	Cu
زنک (Zinc)	Zn
کوبالٹ (Cobalt)	Co
منگنیز (Manganese)	Mn
مولیبدینم (Molybdenum)	Mo
آیوڈین (Iodine)	I
فلورین (Fluorine)	F

(2) غیر لازمی عناصر

جاندار کے جسم میں بعض ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جن کے افعال ہنوز دریافت نہیں کئے گئے۔ یہ غیر لازمی عناصر کہلاتے ہیں جن کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 9 غیر لازمی عناصر

علامت	غیر لازمی عناصر
Br	برومن (Bromine)
B	بوران (Boron)
Si	سیلیکان (Silicon)
Ar	آرسینک (Arsenic)
Ni	نکل (Nickel)
Al	المونیم (Aluminium)
Pb	سیسہ (Lead)
St	اسٹانک (Stanic)
V	واناڈیم (Vanadium)
Ti	ٹائیٹیم (Titanium)

کیلشیم (Calcium)

انسان کے لیے کیلشیم ایک اہم عنصر ہے۔ بالغ انسان کے لئے جس کا وزن تقریباً 50 تا 70 کلو گرام ہوتا ہے تقریباً 850 تا 1400 گرام کیلشیم درکار ہوتی ہے۔ ہڈیوں میں تقریباً 99 فی صد کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ خون میں کیلشیم کی مقدار 10 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر

پائی جاتی ہے۔ بچوں اور حاملہ عورتوں میں کیلشیم کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے۔

ذرائع (Sources)

کیلشیم کے لئے دودھ اور دودھ سے حاصل ہونے والی پیداوار اہم ذرائع ہیں۔ گائے کے ایک لیٹر دودھ میں تقریباً 1200 ملی گرام کیلشیم موجود ہوتا ہے جب کہ انسان کے ایک لیٹر دودھ میں 300 ملی گرام کیلشیم پایا جاتا ہے۔ کیلشیم کے دیگر ذرائع میں پھلی، انڈے، پالک، وغیرہ۔

افعال (Functions)

- (1) کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کی تیاری اور ان کی بقاء کے لئے ضروری ہے۔
- (2) کیلشیم انجماد خون (Coagulation of Blood) کو فروغ دیتا ہے۔
- (3) یہ عضلاتی انقباض (Muscle Contraction) کے لئے ضروری ہے۔
- (4) یہ خامروں (Enzymes) کا اہم جزو ہے۔
- (5) یہ عصبی عضلاتی مقام اتصال (Neuromuscular Junction) پر اسٹائل کولین (Acetylcholine) کے افراز میں مدد کرتے ہوئے پہچان (Impulse) کی عصب (Nerve) سے عضلات (Muscles) کو منتقلی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
- (6) کیلشیم اعصاب کو متحرک کرنے یا اکسانے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
- (7) کیلشیم کے ذریعہ عظامی نفوذ پذیری (Membrane Permeability) میں کمی واقع ہوتی ہے اور یہ اثر سوڈیم (Sodium) اور پوٹاشیم (Potassium) کے شعریاتی نفوذ پذیری (Capillary Permeability) کے مخالف عمل کو متوازن کرتا ہے۔

لوہا (Iron)

تمام جاندار عضویوں کے لیے لوہا ایک اہم معدنی عنصر ہے۔ انسانی جسم میں لوہے کی جملہ مقدار تقریباً 3 تا 4 گرام ہوتی ہے۔ اس مقدار کا تقریباً 75 فی صد حصہ خون میں موجود ہوتا ہے۔

ذرائع (Sources)

لوہے کے افراطی ذرائع کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 10 لوہے کے ذرائع (Sources of Iron)

جیوانی ذرائع	نباتی ذرائع
جگر (Liver)	گاجر (Carrot)
گردہ (Kidney)	موز (Banana)
دل (Heart)	سیب (Apple)
مچھلی (Fish)	سنترا (Orange)
انڈا (Egg)	پنیر (Cheese)
مرغ (Chicken)	نٹ (Jaggery)
	مٹر (Peas)
	سب (Beans)

دودھ میں لوہے کی کافی قلیل مقدار ہوتی ہے اس لئے دودھ لوہے کا ناقص ذریعہ ہے۔

افعال (Functions)

- 1) لوہا آکسیجن کو شش (Lungs) سے ہاتھوں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہاتھوں سے شش تک منتقل کرتا ہے۔
- 2) لوہا خون کے اجزائوں (R B C) اور ہیموگلوبین (Haemoglobin) کی تیاری کے لئے اہم عنصر ہے۔
- 3) یہ تھولی نکسید (Metabolic Oxidation) میں اہم عامل رول ادا کرتا ہے۔
- 4) لوہا کئی خامروں (Enzymes) کا اہم اور اصل جزء ترکیب ہوتا ہے۔
- 5) لوہے کا مرکب مائیوگلوبین (Myoglobin) عضلات میں آکسیجن کا ذخیرہ کرتا ہے۔

3 فاسفورس (Phosphorus)

فاسفورس تقریباً تمام غذائی اشیاء میں موجود رہتی ہے اس لئے جسم میں فاسفورس کی قلت عموماً واقع نہیں ہوتی۔ انسانی جسم میں فاسفورس کی مقدار تقریباً 700 گرام ہوتی ہے۔ یہ جملہ وزن کا تقریباً ایک فی صد حصہ تیار کرتی ہے۔

ذرائع (Sources)

فاسفورس، دودھ، پنیر، ہادام، مٹر، جوزوں (Nuts) گوشت اور انڈے میں پائی جاتی ہے۔

افعال (Functions)

(1) فاسفورس کے مرکبات جیسے اے ٹی پی (ATP)، اے ڈی پی (ADP) اور سی پی (CP) وغیرہ سے توانائی استعمال کی جاتی ہے۔

(2) یہ تحول میں اہم ردل ادا کرتی ہے۔

(3) یہ ہڈیوں اور دانتوں کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔

(4) یہ پردٹین کے ساتھ مل کر فاسفورڈٹین تیار کرتی ہے۔

(5) یہ نیوکلیائی ترشوں (Nucleic Acids) جیسے آر این اے (RNA) اور ڈی این اے (DNA) کی تیاری میں اہم جز ترکیب کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

(4) میگنیشیم (Magnesium)

میگنیشیم بھی تقریباً تمام غذائی اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ بالغ انسان میں میگنیشیم کی مقدار تقریباً 12 گرام ہوتی ہے جس میں سے 11 گرام ہڈیوں میں موجود رہتی ہے۔

ذرائع (Sources)

میگنیشیم کے اہم ذرائع میں ہادام، مٹر کی بھلی، بنیز ترکاریاں، آلو، اجناس اور پنیر (Cheese) شامل ہیں۔

افعال (Functions)

میگنیشیم رواں بیشتر خامروں (Enzymes) کے لئے عامل کار (Activators) کا فعل انجام دیتے ہیں۔

سلفر (Sulphur)

انسان کے جسم میں سلفر کی مقدار جسمی وزن کا 0.25% حصہ ہوتی ہے۔

ذرائع (Sources)

سلفر کا اہم ذریعہ پردٹین ہے جو ہماری غذا کا ایک جزء ہے۔

انفعال (Functions)

(1) یہ لحمیات جیسے غضروفی پروٹین (Chondroproteins)، کیراٹین (Keratins) اور ہپارین (Heparin) کے علاوہ، ہم

خامروہ (Coenzyme A) کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔

(2) یہ S-H گروپ بناتی ہے جو خامروہ کی عاملیت کا مرکز ہے اور ہائیڈروجنس میں اہم ردول ادا کرتی ہے۔

(3) یہ S-S بند بناتی ہے جو پروٹین کی ساخت کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

(4) یہ زیادہ توانائی کے حامل سلفر بند بناتی ہے جو تحول (Metabolism) میں اہم ردول ادا کرتی ہے۔

سوڈیم (Sodium)، پوٹاشیم (Potassium) اور کلورین (Chlorine)

ذرائع (Sources)

سوڈیم (Sodium)، پوٹاشیم (Potassium) اور کلورین (Chlorine) وسیع طور پر نباتات اور حیوانات میں پائے

جاتے ہیں۔ سوڈیم اور کلورائیڈ (Chloride) کا سب سے اہم ذریعہ عام نمک ہے۔ پوٹاشیم کے لئے چائے، کافی، کوکا (Coca) سوکھی

پھلیاں، بیشتر سبز ترکاریاں، دودھ، پھل، مرغ، جگر، موز، سنترہ، انناس اور آلو وغیرہ اہم ذرائع ہیں۔

انفعال (Functions)

(1) سوڈیم، پوٹاشیم اور کلورین جسم میں دلوئی دباؤ (Osmotic Pressure) کو قائم رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں تابدیگی واقع نہیں ہوتی۔

(2) سوڈیم اور پوٹاشیم کے نمکیات ان کے متعلقہ کنزروٹرشوں کے ساتھ جسم میں بفر نظام (Buffer System) قائم کرتے ہیں جو

pH کو قائم رکھنے میں اہم ردول ادا کرتے ہیں۔

(3) یہ عصبی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہیں۔

آئیوڈین (Iodine)

انسان کے جسم میں تقریباً 20 تا 30 ملی گرام آئیوڈین پائی جاتی ہے۔ یہ درقہ ہارمون (Thyroid) کی تیاری کے لئے

ضروری ہوتا ہے۔

ذرائع (Sources)

آئیوڈین کے لئے غذا اور پانی عام ذریعہ ہے۔ یہ عام نمک، سمندری مچھلی اور کاڈجگری تیل میں بہ افراط پائی جاتی ہے۔

انفعال (Functions)

آئیوڈین در قیہ غدود (Thyroid Gland) کے ہارمون تھائراکزن (Thyroxine) کی تیاری کے لئے ضروری ہے۔

فلورین (Fluorine)

فلورین قدرت میں آزادانہ نہیں پائی جاتی۔ یہ ہڈیوں، دانتوں اور سخت ہاتھوں میں موجود رہتی ہے۔ فلورین کو عام طور پر دودھ جاری کنوار کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کی زیادہ اور کم مقدار دونوں مضر اثرات پیدا کرتی ہیں۔

تانبہ (Copper)

بالغ انسان میں تانبہ کی مقدار 100 تا 150 ملی گرام پائی جاتی ہے۔

ذرائع (Sources)

تانبہ دودھ، جگر، پھلیوں اور پتہ دار بریوں میں پایا جاتا ہے۔

انفعال (Functions)

- (1) تانبہ بعض خامروں کا جز ترکیب ہوتا ہے۔
- (2) یہ لوہے کے انجذاب، منتقلی اور استعمال میں مدد کرتا ہے۔
- (3) یہ ہڈیوں کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔
- (4) یہ عصبی ریشوں کے نفاذی غلاف کی تیاری کے لئے ضروری ہے۔
- (5) یہ ہیوسیانین (Haemocyanin) نامی صدف کا اہم جز ہوتا ہے۔

3.7 پانی (Water)

پانی ایک قدرتی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ 100°C سے زائد تپش پر کسی حالت میں 0°C سے کم تپش پر ٹھوس حالت میں اور 0°C سے 100°C تپش کے درمیان مائع حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ہائیڈروجن (H_2) اور آکسیجن (O) پر مشتمل ہوتا

ہے جن کے درمیان شریک گرہی بند (Covalent Bond) پایا جاتا ہے۔ پانی کا سالمہ دو قطبی (Dipolar) ہے یعنی اس کے ہائیڈروجن پر مثبت برقی بار اور آکسیجن پر منفی برقی بار ہوتا ہے۔ پانی کے سالمہ کی دو قطبی حالت ایک اہم خصوصیت ہے جو مختلف سالمات کے درمیان کیمیائی تعاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

3.7.1 پانی کی انفرادی خصوصیات

- (1) پانی ایک عالم گیر محلول (Universal Solvent) ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا محلول ایسا نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ اور کئی اقسام کی اشیاء حل ہوتی ہیں جتنی کہ پانی میں حل ہوتی ہیں۔
 - (2) یہ نامیاتی نمکیات کے لئے عام محلول ہے۔ یہ ایک ایسا واسطہ ہے جس میں جاندار عضویوں کی اہم سرگرمیاں جاری رہتی ہیں
 - (3) اس کی حرارتی گنجائش (Heat Capacity) قابل عبارت ہوتی ہے۔ اس کی تپش میں قلیل تغیر کے باوجود اس میں حرارت کی کافی مقدار محفوظ رہتی ہے۔
 - (4) پانی کا سطحی تناؤ (Surface Tension) اعظم ترین ہوتا ہے۔
 - (5) پانی میں ایصال حرارت کی گنجائش اعظم ترین ہوتی ہے۔
 - (6) پانی کی نمکینیت (Salinity) تازہ پانی، کھارے پانی اور نمکین پانی میں مختلف ہوتی ہے۔
 - (7) پانی کی لزوجیت (Viscosity) کلوروفارم کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے۔
- پانی جسم کا ایک غیر نامیاتی (Inorganic) جزء ترکیب ہے۔ ایک بالغ انسان کے جسم میں پانی کی مقدار جسم کے جملہ وزن کا 60% تا 79% ہوتی ہے پانی کی مقدار مرد و اشخاص کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے جب کہ عورتوں میں کم ہوتی ہے۔ عمر کے اضافہ کے ساتھ جسم میں پانی کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے۔

3.7.2 جسم میں پانی کی اقسام

جسم میں پانی مقام کی مناسبت سے دو اقسام کا ہوتا ہے۔

(i) دروں خلوی سیال (Intracellular Fluid) اور

(ii) بروں یا بین خلوی سیال (Inter cellular Fluid)

(i) دروں خلوی سیال (Intracellular Fluid)

اس قسم کا سیال یعنی پانی خلیوں کے اندر بحر مایہ (Protoplasm) میں موجود ہے۔ یہ جسمی وزن کا 50% ہوتا ہے۔ یہ دو اقسام میں پایا جاتا ہے۔

(a) آزاد پانی (Free Water): آزاد پانی خلیوں میں موجود پانی کا 95% حصہ ہوتا ہے۔

(b) بندش پانی (Bond Water): بندش پانی خلیوں میں لحمیات اور خلیہ مایہ (Cytoplasm) میں دیگر کیمیائی اجزاء کے ساتھ کیمیائی طور پر متحد حالت میں رہتا ہے۔

(ii) بردں یا بین خلوی سیال (Extracellular or Intercellular Fluid)

اس قسم کا پانی جسمی خلیوں کے باہر ہوتا ہے جو جسمی وزن کے تقریباً 20% حصہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دو اقسام کا ہوتا ہے۔

(a) پلازما پانی (Plasma Water) جو دموئی دماوں (Blood Vessels) میں ہوتا ہے جو جسمی وزن کا 5% ہوتا ہے۔

(b) بین خلوی سیال (Intercellular Fluid) جو دموئی دماوں کے باہر خلیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ جسمی وزن کا 15% ہوتا ہے۔

حیوانات میں پانی کا حصول

حیوانات بشمول انسان پانی کو دو ذرائع سے حاصل کرتے ہیں (a) غذا (Diet) اور (b) تحولی پانی (Metabolic Water)۔

(a) غذا (Diet)

غذا پانی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ غذا میں پانی کی مقدار غذا کے جملہ وزن کا 70% to 90% ہوتی ہے۔

(b) تحولی پانی (Metabolic Water)

پانی تحول (Metabolism) کے دوران حاصل ہونے والی ذیلی پیداوار ہے جو جسم میں استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً 100

حرارے (Calories) توانائی کے پیدا ہونے کے دوران عموماً 10 تا 16 ملی لیٹر پانی دستیاب ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کی غذا کی صورت میں پیدا ہونے والے پانی کی مقدار مختلف ہوتی ہے جس کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول نمبر 11 مختلف مقویات سے حاصل ہونے والے تحولی پانی کی مقداریں

مقویات	پانی کی مقدار فی گرام
کاربوہائیڈریٹ	0.56 ملی لیٹر
لحمیات (لحمیات)	0.34 ملی لیٹر
چربی	1.07 ملی لیٹر

3.7.4 پانی کا جسم سے اخراج

پانی جسم سے پیشاب، فضلہ اور پسینہ کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ گردے روزانہ تقریباً 180 لیٹر پیشاب تیار کرتے ہیں جس میں سے 179 لیٹر جسم میں دوبارہ جذب ہو جاتا ہے۔ بقیہ صرف ایک لیٹر پیشاب کی شکل میں جسم سے خارج ہوتا ہے۔ فضلہ کے ذریعہ 80 تا 160 ملی لیٹر پانی خارج ہوتا ہے۔

4 خلاصہ

- ☆ تغذیہ سے مراد وہ سائنس ہے جو غذا، مقویات اور ان میں شامل دیگر اشیاء کے علاوہ صحت اور بیماری سے متعلق ان کا عمل، ماہی عمل اور توازن کے مطالعہ کا احاطہ کرتی ہے۔
- ☆ مقویات میں کاربوہائیڈریٹس، لحمیات، فحمیات، معدنیات، حیاتیں اور پانی شامل کئے جاتے ہیں۔
- ☆ کاربوہائیڈریٹس، لحمیات اور فحمیات ہی توانائی مہیا کرتے ہیں۔
- ☆ معدنیات اور حیاتیں کئی تحولی تعاملات میں کیمیائی ہم عوامل (Chemical Co-factor) اور ہم خامرے (Coenzymes) کے طور پر فعل انجام دیتے ہیں۔
- ☆ ایک حرارہ (Calorie) سے مراد توانائی کی وہ مقدار ہے جو ایک گرام پانی میں ایک درجہ سنٹی گریڈ 1°C تپش کے اضافہ کے لئے درکار ہوتی ہے۔
- ☆ ایک سالم (Mole) گلوکوز سے حرارت کے علاوہ اے ٹی پی (ATP) کے 38 سالمات حاصل ہوتے ہیں۔ لحمیات سے

- ☆ حاصل ہونے والے پی کے سالمات گلوکوز سے حاصل ہونے والے پی کے مسادی ہوتے ہیں۔
- ☆ ایک سلم چربی سے اے پی (ATP) کے 463 سالمات حاصل ہوتے ہیں۔
- ☆ کاربوہائیڈریٹس کو کاربن کے آئیدے (Hydrates) کہا جاتا ہے۔
- ☆ کاربوہائیڈریٹس سے مراد پالی ہائیڈرک اکل (Polyhydric Alcohol) اور اس کے الڈیہائیڈ (Aldehyde) اور کیٹون (Ketone) ہیں۔
- ☆ اہم ہکڑیس (Hexoses) میں گلوکوز (انگور اور مکی کی شکر)، فکٹوز (پھلوں میں)، کیلیکٹوز اور مانوز شامل ہیں۔
- ☆ ایک گرام کاربوہائیڈریٹس سے 4 حرارے توانائی حاصل ہوتی ہے جب کہ ایک گرام چربی سے 9 حرارے توانائی حاصل ہوتی ہے
- ☆ گلوکوز کو توانائی کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔
- ☆ کیمیائی طور پر شحمیات (Lipids) شحمی ترشوں (Fatty Acids) کے ایسٹرس (Esters) ہوتے ہیں یا ایسٹرس تیار کرنے کی صلاحیت کی حامل اشیاء ہوتی ہیں۔
- ☆ چربیوں اور دیگر شحمیات کی بنیادی اکائیاں شحمی ترشے (Fatty Acids) ہوتے ہیں۔
- ☆ بعض شحمی ترشے جو نموکفر دغ دیتے ہیں اور سالمیت کو قائم رکھتے ہیں "لازی شحمی ترشے" کہلاتے ہیں۔
- ☆ شحمیات کی درجہ بندی
- (1) سادہ شحمیات
 - (2) مرکب شحمیات
 - (3) ماخوذ شحمیات میں کی جاتی ہے۔
- ☆ پروٹین (لحمیات) کافی پیچیدہ ٹائٹر دجینی مرکبات ہیں جو امانو ترشوں (Amino Acids) سے تیار ہوتے ہیں
- ☆ امانو ترشے کاربن کے مرکبات ہوتے ہیں جن میں امانو (NH_2) اور کاربو آکسلک (COOH) فعلی گروپس (Functional Groups) پائے جاتے ہیں۔
- ☆ غذائی لحمیات میں 22 امانو ترشے پائے جاتے ہیں۔
- ☆ امانو ترشے جن کو غذا کے ساتھ فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے لازمی امانو ترشے کہلاتے ہیں۔

☆ لحمیات کی درجہ بندی۔

(1) سادہ لحمیات

(2) جفتی لحمیات اور

(3) ماخوذ لحمیات میں کی جاتی ہے۔

☆ حیاتین سے مراد مختلف اقسام کے قوی نامیاتی مرکبات ہیں جو غذا میں انتہائی کلیل، تناسب میں واقع ہوتے ہیں اور جن کا خارجی

ذرائع سے عضویوں کو فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔

☆ حیاتین کی درجہ بندی

(1) چربی میں حل پذیر حیاتین اور

(2) پانی میں حل پذیر حیاتین میں کی جاتی ہے۔

☆ چربی میں حل پذیر حیاتین میں حیاتین 'A'، حیاتین 'D'، حیاتین 'E' اور حیاتین 'k' شامل ہیں۔

☆ پانی میں حل پذیر حیاتین میں حیاتین بی کا مپلکس (B-Complex) اور حیاتی 'C' شامل کئے جاتے ہیں۔

☆ تمام عضویوں کا جسم نامیاتی مرکبات اور غیر نامیاتی عناصر سے تشکیل پاتا ہے۔

☆ حیوانی ہاتھوں میں تقریباً 29 عناصر پائے جاتے ہیں جن کو لازمی عناصر اور غیر لازمی عناصر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

☆ لازمی عناصر کو (a) خرد عناصر اور (b) کلاں عناصر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

☆ پانی ایک عالمگیر محلول ہے۔ یہ جاندار کے جسم میں ایک غیر نامیاتی جزء ترکیب ہے۔

☆ جسم میں پانی (a) دروں غلوی سیال اور (b) بروں غلوی سیال اقسام کا ہوتا ہے۔

5. زائد معلومات

(i) سادہ لحمیات کی اقسام

(a) البومینس (Albumins)

البومینس (Albumins) انڈے کی سفید زردی میں پایا جاتا ہے۔ یہ پانی اور ہلکے نمک کے محلول میں حل پذیر ہے۔ یہ

گرم کرنے پر منجمد ہو جاتا ہے۔

(b) گلوبولینس (Globulins)

گلوبولینس (Globulins) ایڑے کی سفید اور دسمی مصل (Blood Serum) میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ہلکے محلول میں حل پذیر ہوتے ہیں لیکن پانی میں ناسل پذیر ہوتا ہے۔

(c) گلوبینس (Globins)

گلوبینس (Globins) ہیموگلوبینس (Haemoglobins) اور عضلی ہیموگلوبینس (Muscle Haemoglobins) میں موجود ہوتا ہے۔ یہ امونیم ہائیڈروآکسائیڈ (Ammonium Hydroxide) میں حل پذیر ہوتا ہے۔

(d) ہسٹونس (Histones)

یہ لونی اجسام (Chromosomes) میں پائے جانے والے ہر دو ڈی این اے (DNA) کے سالمات کو باہم جوڑتا ہے۔ یہ پانی میں حل پذیر ہوتا ہے۔ ہسٹونس میں آر جینین (Arginin) اور لائسین (Lysine) کی کافی مقدار میں موجود رہتی ہیں۔

(e) کولاجینس (Collagens)

یہ جلد (Skin)، وتر (Tendon) اور ہڈیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ہائیڈروآکسی پرولین (Hydroxyproline) کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ سفید ریٹے (White Fibres) تیار کرتے ہیں۔

(f) کیراٹینس (Keratins)

یہ لمبیات جلد، ناخنوں، سیگوں (Horns)، کھڑ (Hoofs)، بالوں اور پروں وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں۔

(g) الاستینس (Elastins)

یہ پلک دار زرد رنگ کے ریٹے (Fiber) تیار کرتے ہیں۔ یہ وتر (Tendons) اور شریانوں (Arteries) میں موجود رہتے ہیں۔

(ii) جفتی لمبیات (Conjugated Proteins)

یہ سادہ لمبیات ہوتے ہیں جو غیر پروٹینی شے سے جڑے رہتے ہیں ان کی درجہ بندی مزید چھ اقسام میں کی جاتی ہے۔ نواتی لمبیات، مخاطی لمبیات، فاسفولمبیات، لونی لمبیات، فٹی لمبیات اور دھاتی لمبیات۔

(a) نواتی لحمیات (Nucleoproteins)

جیونواتی ترشوں (Nucleic Acids) سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نواتی لحمیات کہلاتے ہیں مثلاً هستونس (Histones) اور پروٹامائینس (Protamines) وغیرہ۔ مرکزے میں پائے جانے والے ڈی آکسی رائبونیوکلک ترش (Deoxyribonucleic Acid) ڈی این اے (DNA) سے جڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح خلیہ مایہ (Cytoplasm) میں لحمیات رائبونیوکلک ترش (Ribonucleic Acid) (آر این اے RNA) سے جڑے رہتے ہیں۔

(b) معطلی لحمیات (Mucoproteins) یا گلیکولحمیات (Glycoproteins)

ان لحمیات میں کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) پائے جاتے ہیں مثلاً انڈے میں پایا جانے والا اویو کائیڈ (Ovomucoid) اور دوسری مصل (Blood Serum) میں موجود سیرومیو کائیڈس (Seromucoids) اور سیرو گلیکائیڈس (Seroglycoids) جو گلوبین (Globin) کے کسری اجزاء ہوتے ہیں۔

(c) فاسفولحمیات (Phosphoproteins)

ایسے لحمیات جو فاسفورک ترش (Phosphoric Acids) سے جڑے رہتے ہیں فاسفولحمیات کہلاتے ہیں مثلاً انڈے کی زردی (Yolk) میں پایا جانے والا وٹیلین (Vitellin) دودھ میں موجود کیسینوجن (Caseinogen) اور پپسن (Pepsin)۔

(d) لونی لحمیات (Chromoprotein)

لحمیات جو رنگین مادوں سے جڑے رہتے ہیں لونی لحمیات کہلاتے ہیں مثلاً ہیموگلوبین (Haemoglobin)، معصنی گلوبین (Myoglobin) اور غلبوی لون (Cytochrome) وغیرہ۔ ہیموگلوبین میں گلوبین (Globin) نامی ہر دھنن ٹوہے ہر مشتمل ہیم (Heme) سے جڑا رہتا ہے۔ ہیمو سیانین (Haemocyanin) میں تانبہ (Copper) اور کلوروفیل (Chlorophyll) میں میگنیشیم (Magnesium) عناصر پائے جاتے ہیں۔

(e) فمچی پروٹین (Lipoproteins)

ایسے لحمیات جو فمچی ترشوں (Fatty Acids) کے سالمات سے جڑے رہتے ہیں فمچی لحمیات کہلاتے ہیں مثلاً انڈے کی زردی (Yolk) میں موجود لپوڈا ٹیلین (Lipovitellin) اور لپوڈا ٹیلین (Lipovitellin)۔

(f) دھاتی لمبیات (Metalloproteins)

لمبیات جو دھاتوں (Metals) سے جڑے رہتے ہیں دھاتی لمبیات کہلاتے ہیں مثلاً ارجینیز (Arginase) میں
میکنیشیم (Mg) یا مینگز (Mn) ہوتا ہے اور کاربونک انہائیڈریز (Carbonic Anhydrase) جس میں زنک (Zn) موجود ہوتا ہے۔

6 فرہنگ

انگریزی اصطلاح	لفظ	اردو اصطلاح	تشریح
Active Transport	ایکٹیو ٹرانسپورٹ	عالم منتقلی	سالمات کی منتقلی کا عمل جو مخالف ارتکازی ہوتا ہے جس کے دوران توانائی درکار ہوتی ہے۔
Assimilation	ایسمیلیشن	استحالہ	ایسا عمل جس میں جذب شدہ غذائی مادے جسمانی خلیوں میں استعمال کئے جاتے ہیں۔
Calorie	کیلوری	حرارہ	توانائی کی قدر کی اکائی کو حرارہ کہا جاتا ہے۔
Coagulation	کواگولیشن	ترویب یا بنگلی	انجماد خون۔ مائع کی تبدیلی کا عمل جس میں مائع حالت ایک دبیز نمجند حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
Coenzymes	کوائزائمس	ہم خامرے	جفتی خامروں کے پروسٹھیک گروپ (Prosthetic Group) بنانے والے غیر پروٹینی ناسیاتی سالمات مثلاً NAD, FAD, CoA وغیرہ

Combustion	کم بسشن	احتراق	کسی شے کا آکسیجن کی موجودگی میں جلتا۔ ایسا غیر قابو یافتہ نمکیدی ثقل جس کے دوران شے کی نمکسید آکسیجن کی موجودگی میں انجام پاتی ہے اور شے میں پائے جانے والے تمام کیمیائی بند بہ یک وقت ٹوٹ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں توانائی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کا اخراج کل میں آتا ہے۔
Co-Factors	کو فیکٹرس	ہم عوامل	جفتی خامروں (Conjugated Proteins) کے لئے پروتھینک گروپ (Prosthetic Group) کو تشکیل دینے والے غیر پروٹینی، غیر نامیاتی سالمات جیسے Cu, Zn, Mn, Mo وغیرہ۔
Deamination	ڈی امینیشن	ازالہ امونیا	ایسا کیمیائی تعامل جس کے دوران امونیا کا سالمہ خارج ہوتا ہے۔
Dehydration	ڈی ہائیڈریشن	ناہیدگی	پانی کا ضائع ہونا۔
Dipolar	ڈائیپولار	دو قطبی	ایسا کیمیائی سالمہ جس کے ایک سرے پر مثبت چارج اور دوسرے سرے پر منفی چارج پایا جاتا ہے۔
Empirical Formula	ایمپیریکل فارمولا	سادہ ضابطہ	ایسا کیمیائی ضابطہ جو کیمیائی مرکب میں پائے جانے والے عناصر کے سادہ تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔
Hydrolyses	ہائیڈرولائسس	آب پاشیدگی	ایسا کیمیائی تعامل جس میں کیمیائی مرکب پانی کے ساتھ تعامل کے نتیجے میں سادہ اجزاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
Osteoblast	اوسٹیو بلاسٹ	عظمیٰ نہو ضہ	ہڈی میں پائے جانے والے غیر پختہ خلیے۔

Roughage	رنج	رنجی چارہ	رنجی مادے جو نباتات اور نباتات کے حاصلات جیسے پھلوں اور ترکاریوں میں پائے جاتے ہیں جو ہاضمی نظام کی بہتر کارکردگی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔
Saturated	ساچورٹڈ	سیر شدہ	تکمیلی حالت جس میں اضافہ کی گنجائش باقی نہ ہو۔
Unsaturated	انساچورٹڈ	غیر سیر شدہ	غیر تکمیلی حالت جس میں اضافہ کی مزید گنجائش باقی رہتی ہے۔

7 نمونہ امتحانی سوالات

7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) تغذیہ سے کیا مراد ہے؟
- (2) حرانہ (Calorie) سے کیا مراد ہے؟
- (3) ایک سلم (Mole) گلوکوز، چربی اور پروٹین سے ATP کے کتنے سالمات حاصل ہوتے ہیں۔
- (4) کاربوہائیڈریٹ کی تعریف کیجئے۔
- (5) شکر (Sugar) اور غیر شکر (Non-Sugar) کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟
- (6) آلیگوسیکرائیڈز (Oligosaccharides) کی تعریف کیجئے۔ ان کے گروپس کے نام لکھئے۔
- (7) چربی اور تیل کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟
- (8) مرکب ثعیمات کیا ہوتے ہیں؟ چند مثالیں دیجئے۔
- (9) کلاں عناصر (Macroelements) اور خرد عناصر (Microelements) کی تعریف کیجئے اور ان کے نام لکھئے۔
- (10) فولک ترشہ (Folic Acid) کے کوئی تین افعال لکھئے۔
- (11) تحولی پانی (Metabolic Water) سے کیا مراد ہے؟ مختلف مقویات سے حاصل ہونے والے تحولی پانی کی مقادیر نوٹ کیجئے۔

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی کیجئے اور انھیں مختصر بیان کیجئے۔
- (2) تغذیہ کی اہمیت پر ایک مضمون لکھئے۔
- (3) شحمیات کی درجہ بندی اور ان کی حیاتی اہمیت کو بیان کیجئے۔
- (4) لازمی اور غیر لازمی امائنو ترشے کیا ہوتے ہیں؟ ان کی فہرست تیار کیجئے۔
- (5) پروٹین کے افعال کو بیان کیجئے۔
- (6) کلاس عناصر کے افعال اور ذرائع کو بیان کیجئے۔
- (7) خرد عناصر کے افعال اور ذرائع کو بیان کیجئے۔
- (8) حیاتین کی عام خصوصیات اور ان کی درجہ بندی کیجئے۔
- (9) جہلی میں حل پذیر حیاتین کے سائنسی نام لکھئے اور ان کے افعال اور ذرائع کو بیان کیجئے۔
- (10) بی کاکسکس (B-Complex) پر ایک نوٹ لکھئے۔
- (11) پانی کی انفرادی خصوصیات کو قلمبند کیجئے دروں غلوی سیال اور بدوں غلوی سیال کو مختصر بیان کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

- (1) حیاتین اور معدنیات کی حیاتی تعلقات میں _____ اور _____ کے طور پر فعل انجام دیتے ہیں۔
- (2) ایک حرارہ سے مراد توانائی کی وہ مقدار ہے جو _____ پانی میں _____ سینٹی گریڈ کے اضافے کے لئے درکار ہوتی ہے۔
- (3) کاربوہائیڈریٹس کو کاربن کے _____ کہا جاتا ہے۔
- (4) کاربوہائیڈریٹس _____ اور اس کے الڈیٹائیڈ اور _____ ہیں۔
- (5) جسم میں زائد گلوکوز _____ کی شکل میں ذخیرہ کی جاتی ہے۔
- (6) گنے میں پانی جانے والی شکر کو _____ کہا جاتا ہے۔
- (7) _____ کو حیوانی نشاستہ کہا جاتا ہے۔

- [illegible]

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) ایک سلم (Mole) گلوکوز سے حرارت کے علاوہ اے ٹی پی (ATP) کے کتنے سالمات حاصل ہوتے ہیں؟
 (a) 38 (b) 32 (c) 2 (d) 8
- (2) آر این اے (RNA) میں کونسی شکر موجود ہوتی ہے؟
 (a) کیلیکٹوز (Galactose) (b) فrukٹوز (Fructose)
 (c) رائبوز (Ribose) (d) مانوز (Mannose)
- (3) انسان کے خون میں گلوکوز کی تارل مقدار کتنی ہوتی ہے؟
 (a) 80 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر خون (b) 80 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر خون
 (c) 80 ملی گرام فی 1000 ملی لیٹر خون (d) 8 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر خون
- (4) آلیگوسیکرائیڈس (Oligosaccharides) کی آب پاشیدگی انجام دینے پر مانوسیکرائیڈس (Monosaccharides) کی کتنی اکائیاں حاصل ہوتی ہیں؟
 (a) 10 (b) 10 (c) 10 (d) 10

(d) 1 2 10 (c)

(5) مسکہ میں کونسا کچھ ترشہ (Fatty Acids) موجود رہتا ہے؟

- (a) اولیک ترشہ (Oleic Acid) (b) اسٹیریک ترشہ (Stearic Acid)
(c) آکٹانویک ترشہ (Octanoic Acid) (d) پالمٹیک ترشہ (Palmitic Acid)

(6) ترشوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟

(a) 10 (b) 21 (c) 22 (d) 30

(7) لازمی امانو ترشہ کونسا ہے؟

- (a) ارجینین (Arginine) (b) الانیٹن (Alanine)
(c) سیسٹین (Cystine) (d) گلائسین (Glycine)

(8) غیر لازمی امانو ترشہ کونسا ہے؟

- (a) الانیٹن (Alanine) (b) لیوسین (Lysine)
(c) ارجینین (Arginine) (d) میتھونین (Methionine)

(9) اتصالی بانڈ میں کونسا پروٹین موجود رہتا ہے؟

- (a) کیراٹین (Keratine) (b) کولاجن (Collagen)
(c) مایوسین (Myosin) (d) پروٹین نہیں پایا جاتا

(10) انسان کو کم از کم کتنے حیاتین (Vitamin) درکار ہوتے ہیں؟

(a) 15 یا اس سے کم (b) 22 یا اس سے زیادہ
(c) 30 سے زیادہ (d) 10 سے کم

(11) حیاتین سے متعلق ذیل میں کوئی خصوصیت غیر درست ہے؟

- (a) حیاتین زیادہ تھش پر ضائع ہو جاتے ہیں۔
(b) حیاتین توانائی مہیا نہیں کرتے۔

(c) نباتات حیاتین کو تیار نہیں کر سکتے۔ (d) حیوانات حیاتین کو غذا کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔

12 آنکھ کے شبکیہ (Retina) کے عصاؤں (Rods) کے رہوڈاپسن (Rhodopsin) اور مخروطوں (Cones) کے آئیوڈاپسن

(Iodopsin) صبغوں کی تیاری کے لئے کونسا حیاتین درکار ہوتا ہے ؟

(a) حیاتین A (b) حیاتین D (c) حیاتین C (d) حیاتین بی کا پمپلس (B-Complex)

13 انجماد خون کے لئے کونسا حیاتین ضروری ہے ؟

(a) حیاتین A (b) حیاتین K (c) حیاتین D (d) حیاتین C

14 عضلاتی انقباض اور انجماد خون کے لئے کونسا عنصر درکار ہوتا ہے ؟

(a) کیلشیم (b) لوہا (c) فاسفورس (d) سوڈیم

15 تھائراکسن (Thyroxine) کی تیاری کے لئے کونسا عنصر درکار ہوتا ہے ؟

(a) آئیوڈین (b) فلورین (c) تانبہ (d) نہیں

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

B	A
() پائیریڈاکسن (Pyridoxine)	(1) ہیوسیانین (Haemocyanine)
() چربی میں حل پذیر	(2) ہیوگلوبین (Haemoglobin)
() سیانوکوبالامین (Cyanocobalamin)	(3) پانی
() ضد اجسام (Antibodies)	(4) حیاتین بی
() تانبہ	(5) حیاتین بی ₁₂
() لیموئی پھل	(6) حیاتین بی ₆
() عالم گیر محلل	(7) حیاتین اے
() فاسفولیپڈ (Phospholipid)	(8) مامونی گلیو پالین
() لوہا	(9) مائیوسین
() عضلات	(10) مرکب فحم

سبق 2 سوء تغذیہ (Malnutrition)

1	سبق کا خاکہ
2	تمہید
3	سبق کا مقصد
3.1	سوء تغذیہ کی تعریف
3.2	سوء تغذیہ کی وجوہات
3.3	سوء تغذیہ کے قلیل مدتی اثرات
3.4	سوء تغذیہ کے طویل مدتی اثرات
3.5	بچوں میں سوء تغذیہ کی اقسام
3.6	کثرت تغذیہ کے باعث پیدا ہونے والے امراض
3.7	حیاتی قلمی امراض
3.8	معدنیات قلمی امراض
4	سبق کا خلاصہ
5	زائد معلومات
6	فرہنگ اصطلاحات
7	نمونہ امتحانی سوالات
7.1	مختصر جوابی سوالات
7.2	طویل جوابی سوالات

7.3 معروضی سوالات

- 7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔
- 7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔
- 7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

1 سبق کا خاکہ

اس سبق میں آپ درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ سوء تغذیہ کی تعریف
- ☆ سوء تغذیہ کی وجوہات
- ☆ سوء تغذیہ کے قلیل اور طویل مدتی اثرات
- ☆ بچوں میں سوء تغذیہ کی اقسام
- ☆ کثرت تغذیہ کے باعث پیدا ہونے والے امراض
- ☆ حیاتیات قلتی امراض
- ☆ معدنیات قلتی امراض

2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ تغذیہ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ سوء تغذیہ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے جس کو آپ ایک فرد کی طبی، تعلیمی، ذہنی، جذباتی خصوصیات کی بہتر کارکردگی کو انجام دینے میں خطرہ کا باعث سمجھتے ہیں۔ ہمارے جسم کے تحولی تعاملات کے لئے مقویات کی موزوں فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ قلت تغذیہ، کثرت تغذیہ، غیر متوازن تغذیہ اور مخصوص تغذیائی قلت ہی دراصل سوء تغذیہ کا سبب بنتے ہیں جس کے نتیجہ میں مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے اس سبق کے مطالعہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ تغذیہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور بہتر زندگی گزارنے کے لئے صحت کی حفاظت کا خیال رکھ سکیں۔

3 سبق کا متن

3.1 سوء تغذیہ (Malnutrition) کی تعریف

سوء تغذیہ (Malnutrition) سے مراد ایک یا ایک سے زائد لازمی مقویات (Essential Nutrients) کی نسبت (Relative) یا مطلق (Absolute) قلت (Deficiency) یا کثرت کے نتیجہ میں واقع ہونے والی مرضیاتی (Pathological) حالت ہے۔

3.2 سوء تغذیہ کی وجوہات

سوء تغذیہ کی اہم وجوہات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

(1) قلت تغذیہ (Undernutrition)

تاکافی غذا یا قدرتی قلت تغذیہ (Undernutrition) کا باعث بنتی ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ (a) ابتدائی قلت تغذیہ (Primary Undernutrition) جو کم غذا کے استعمال سے ہوتا ہے اور (b) ثانوی قلت تغذیہ (Secondary Undernutrition) جو بعض امراض کے باعث جسم میں مقویات کا معمول کے مطابق استعمال نہ ہونے کے سبب واقع ہوتا ہے۔

(2) کثرت تغذیہ (Overnutrition)

طویل مدت تک زائد غذا کا استعمال کثرت تغذیہ کا باعث بنتا ہے۔


(3) غیر متوازن تغذیہ (Imbalance)

غذا میں عدم تناسب میں مقویات کی موجودگی غیر متوازن تغذیہ کا سبب بنتی ہے۔

(4) مخصوص تغذیائی قلت (Specific Nutrition Deficiency)

غذا میں کسی ایک مخصوص مقویات کی کمی کی مخصوص تغذیائی قلت کا باعث بنتی ہے۔

مندرجہ بالا وجوہات کے اسباب میں لازمی مقویات سے متعلق کم دافقت، غیر معقول اور غلط عقائد، فاقی اور معاشی مسائل، رہائش، صفائی اور پانی اور غذا کی فراہمی کا ناقص انتظام اور مختلف امراض سوء تغذیہ میں شامل ہیں۔



2.1 سوء تغذیہ کی وجوہات

3.3 سوہ تغذیہ کے لکلیل مدتی اثرات

بالغ اشخاص میں اگر مختصر مدت تک مقویات کی مطلوبہ مقدار بطور غذا استعمال نہ ہو تو سوہ تغذیہ کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ اس مدت کے دوران دراصل جسم میں ذخیرہ مقویات کو جسم استعمال کرتا ہے۔ تاہم بچوں میں ذخیرہ مقویات کی مقدار کافی کم ہوتی ہے۔ اس لئے بچوں میں یہ علامتی بہت ہی محدود ہوتی ہے۔

3.4 سوہ تغذیہ کے طویل مدتی اثرات

سوہ تغذیہ کے طویل مدتی اثرات بالغ اشخاص اور بچوں میں مختلف ہوتے ہیں۔

بالغ اشخاص

بالغ اشخاص میں کاربوہائیڈریٹس، شحمیات اور لحمیات کے ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ اگر ان کی مطلوبہ مقدار بطور غذا استعمال نہ ہو تو جسم توانائی کو پیدا کرنے کے لئے ان ذخائر کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس کو اور اس کے بعد شحمیات کو استعمال کرتا ہے۔ جب ان کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں تو جسم لحمیات کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عضلات جو لحمیات پر مشتمل ہوتے ہیں استعمال کر لئے جاتے ہیں جس کے باعث جسم کی کیت میں کمی واقع ہوتی ہے اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ صرف کمزور و نحیف ہو جاتا ہے بلکہ یہ بیماری کام کرنے سے گریز کرتا ہے اور اس میں مختلف امراض کے خلاف قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کے باعث ہیکٹر یا اور وائرس کے تغذیہ سے باسانی متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو موزوں غذا فراہم کر دی جائے تو وہ تیزی سے صحت مند ہو جاتا ہے۔

بچے

بچوں میں غذائی مقویات کافی کم مقدار میں ذخیرہ ہوتے ہیں۔ اگر انھیں مطلوبہ مقدار میں مقویات بطور غذا فراہم نہ کی جائے تو ان میں قلت تغذیہ کے اثرات شدید ظاہر ہوتے ہیں۔ بچہ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ان میں قوت مدافعت کے کم ہو جانے سے ہیکٹر یا اور وائرس کے ذریعہ مختلف امراض بار بار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان امراض میں خاص کر اسہال ایک عام مرض ہے جو بچہ کو کمزور بناتا ہے۔ دماغ کی نشوونما سست ہو جاتی ہے۔

3.5 بچوں میں سوہ تغذیہ کی اقسام

بچوں میں سوہ تغذیہ کی تین اقسام پائی جاتی ہیں۔

(a) حراری سوہ تغذیہ (Calorie Malnutrition)

(b) لحمیاتی سوء تغذیہ (Protein Malnutrition) اور

(c) لحمیہ حراری سوء تغذیہ (Protein-Calorie Malnutrition)

(a) حراری سوء تغذیہ (Calorie Malnutrition)

کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) اور لحمیات (Fats) کا شمار توانائی پیدا کرنے والے مقویات میں کیا جاتا ہے۔ اگر بچوں کو ان مقویات کی مطلوبہ مقدار فراہم نہ کی جائے تو مناسب مقدار میں توانائی پیدا نہیں ہوتی جس کے باعث زندگی کی سرگرمیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس سوء تغذیہ کو توانائی سوء تغذیہ بھی کہا جاتا ہے۔

(b) لحمیاتی سوء تغذیہ (Protein Malnutrition)

اگر بچوں کو ایسی غذا فراہم کی جائے جس میں لحمیات یا لازمی امائنو ترشوں (Essential Amino Acids) پر مشتمل لحمیات کی ناکافی مقدار پائی جاتی ہے تو یہ لحمیاتی سوء تغذیہ کا باعث بنتی ہے۔

(c) لحمیہ حراری سوء تغذیہ (Protein - Calorie Malnutrition)

اگر بچوں کو ایسی غذا فراہم کی جائے جس میں لحمیات (Proteins) اور توانائی پیدا کرنے والے مقویات دونوں ناکافی مقدار میں ہوں تو یہ لحمیہ حراری سوء تغذیہ کا باعث بنتی ہے۔ یہ بچوں میں عام قحطی بیماری ہے جو ترقی پذیر ممالک ہندوستان، جنوبی مغربی ایشیاء اور آفریقہ میں وسیع طور پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس بیماری سے متاثر ہونے والے پانچ سال کی عمر سے کم بچوں کی تقریباً نصف تعداد موت کا شکار ہو جاتی ہے اور بقیہ تعداد جو بچ جاتی ہے ان میں ناقص نشوونما اور دائمی انحطاط پذیر واقع ہوتی ہے۔

لحمیہ حراری سوء تغذیہ کے باعث پیدا ہونے والی اہم بیماریوں میں (1) کواشیورکر (Kwashiorkor) اور (2) ماراسمس (Marasmus) قابل ذکر ہیں۔

(1) کواشیورکر (Kwashiorkor)

یہ بیماری خصوصاً لحمیات (Proteins) کی قلت کے باعث پیدا ہوتی ہے جو بچوں میں ایک تا چار سال کی عمر کے درمیان واقع ہوتی ہے۔

علامتیں (Symptoms)

(1) بچوں کی نشوونما سست ہو جاتی ہے۔

(2) نائٹروجن کی زائد مقدار کا ضائع ہونا اور مین غلوی جگہ میں پانی کے ذخیرہ ہونے کے باعث سوجن (Oedema) پیدا

ہو جاتی ہے۔

(3) بیروں میں عموماً سوجن پیدا ہوتی ہے۔ چہرہ پر سوجن کے سبب چہرہ چاند کی مانند گول دکھائی دیتا ہے۔

(4) عضلات ضائع ہو جاتے ہیں یا ان کا تسخفیف پذیر ہو جاتا ہے۔

(5) بچہ میں اشتہا (بھوک) ضائع ہو جاتی ہے۔

(6) اسہال سے متاثر ہوتا ہے۔

(7) بال پتلے بے درجگ ہو جاتے ہیں۔ جلد خشک ہو جاتی ہے اور اھیلی پڑ جاتی ہے۔

(8) بچہ میں فقر الدم (Anaemia) واقع ہوتا ہے۔

(9) جگر کے خلیوں میں چربی ذخیرہ ہو جاتی ہے اور جگر کی جسامت بڑھ جاتی ہے۔



شکل 2.2

آفریقی بچوں میں کواشیور کر بیماری کی علامتیں۔ دماغی انحطاط پذیرگی اور اضطرابی کیفیات کا اظہار



شکل 2.3

کواشیورک بیماری سے متاثرہ بچہ

اسباب (Causes)

- (1) یہ بیماری لمبیات کی قلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔
- (2) بچے سے پیش پیشگی تہ پہلے ماں کے دودھ کو پھڑا لینا۔
- (3) زائد پانی ملائے ہوئے گائے کے دودھ کو استعمال کرنا۔
- (4) نفسیاتی، سماجی اور تمدنی عوامل۔
- (5) غربت۔
- (6) بچے کی نامناسب نگہداشت۔

انسداد (Prevention)

بچوں کو کواشیورک بیماری سے محفوظ رکھنے کے لئے حسب ذیل انسدادی تدابیر کو اختیار کرنا چاہئے۔

- (1) بچہ کی ماں کے ذریعہ بہتر نگہداشت کرنی چاہئے۔

- (2) فعل پیدائش، عین پیدائش اور موثر پیدائش ماں اور بچہ کی بہتر عہدانت رسی چاہئے۔
- (3) بچہ کو ماں کے دودھ کی موزوں فراہمی کے لئے مناسب اقدامات اختیار کرنی چاہئے۔
- (4) غذا میں بہتری کے لئے اقدامات اختیار کرنا چاہئے۔
- (5) مناسب طریقہ تغذیہ اور تغذیائی تعلیم کو فروغ دینا چاہئے۔
- (6) مختلف تعدیہ (Infections) اور اسہال جیسی بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے نیک اندازی کو اختیار کرنا چاہئے۔


- (7) حفظان صحت کا خیال رکھنا چاہئے۔
- (8) صاف اور صحت مند غذا کا خیال رکھنا چاہئے۔

علاج (Treatment)

- (1) بچوں میں کواشیور کر بیماری کے علاج کے لئے ذیل کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔
- (2) اسہال سے متاثر بچوں میں باز آ بیدگی (Rehydration) حالت کو قائم کرنے کے لئے لاکھ عمل کو فروغ دینا اور باز آ بیدگی کے لئے برقیروں یعنی سوڈیم، پوٹاشیم، کلورین، لیکٹیٹ (Lactate) کو گلوکوز کے ساتھ جسم میں داخل کرنا چاہئے۔
- (3) بچوں کے پیٹ میں پائے جانے والے دودوں (Worms) کو خارج کروانا چاہئے۔
- (4) معاون تغذیائی لاکھ عمل (Supplementary Feeding Programmes) کو اختیار کرنا اور فروغ دینا چاہئے۔
- (5) دواخانے میں علاج کروانا چاہئے۔
- (6) گائے کا دودھ استعمال کرنا چاہئے۔
- (7) پروٹینس کی مقدار 2 تا 4 گرام فی کلوگرام جسمی وزن فی یوم کی شرح سے بطور غذا استعمال کرنا چاہئے۔

مراسمس (Marasmus)

یہ بیماری بھی لحمیہ حراریہ سوء تغذیہ کے باعث بچوں میں عموماً واقع ہوتی ہے اور 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔



شکل 2.4

مراس سے متاثرہ بچہ

علامتیں (Symptoms)


اس بیماری کی اہم علامتیں ذیل میں درج ہیں۔

- (1) بچہ کی نشوونما میں تخفیف واقع ہوتی ہے۔
 - (2) عضلات ضائع ہو جاتے ہیں۔ زیرجلدی چربی (Subcutaneous Fat) بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ جسم صرف ہڈیوں کے ڈھانچہ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔
 - (3) چہرہ سکڑ جاتا ہے اور لنگور کے چہرہ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔
 - (4) سیالی اسہال کی وجہ سے تابدگی (Dehydration) واقع ہوتی ہے۔ جسم کا پانی اور برقیہ (Electrolytes) ضائع ہو جاتے ہیں۔
 - (6) شرح نبض (Pulse Rate) کم ہو جاتی ہے۔
 - (7) ہلکا سا بخار ظاہر ہوتا ہے۔
 - (8) جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، یہ پتلی ہو جاتی ہے اور اس کی پلک کی خاصیت غائب ہو جاتی ہے۔
 - (9) شکم گیس سے پھول جاتا ہے یا سکڑ جاتا ہے۔
 - (10) آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور
 - (11) بال خشک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا رنگ ضائع نہیں ہوتا۔
- مراس کے اسباب، انسدادی تدابیر اور علاج کو اشیور کر بیماری کی طرح ہوتے ہیں۔


3.6 کثرت تغذیہ (Overnutrition) کے باعث پیدا ہونے والے امراض

(a) موٹاپا یا فریبی (Obesity)

یہ بیماری زائد غذا کے استعمال اور زائد توانائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیماری ترقی پذیر ممالک میں عموماً 10 تا 15 فی صد بالغ اشخاص میں واقع ہوتی ہے۔ موٹاپا ایک ایسی مرضیاتی (Pathological) حالت ہے جس میں جسم کے اندر ضرورت سے زائد چربی ذخیرہ ہوتی ہے اور جسم کا وزن کافی بڑھ جاتا ہے۔ مرد اشخاص میں چربی اگر جسمی وزن کے 20 فی صد اور عورتوں میں 30 فی صد سے زائد ذخیرہ ہو تو انہیں فربہ ہی سمجھا جائے گا۔



شکل 2.6
موٹاپا سے متاثرہ آدمی



شکل 2.5
عام آدمی - موٹاپا سے قفل

سبب (Causes)

1. موٹاپا دراصل غذا کی شکل میں جسم میں داخل ہونے والے حراروں (Calories) اور توانائی کی شکل میں خرچ ہونے والے حراروں کے درمیان عدم توازن کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر جسم میں غذا زیادہ مقدار میں داخل ہوتی ہے لیکن کم طبعی کام (Physical Work) کی وجہ سے توانائی کم خرچ ہوتی ہے۔ یہ غیر استعمال شدہ حرارے (توانائی) چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو جسم کی شحمی ہافتوں (Adipose Tissues) میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔

(2) موٹاپا کے لئے جینیاتی (Genetic) عوامل بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اس لئے یہ موروثی ہوتا ہے۔

(3) دروں افزائی غدود جیسے خفاکی غدود (Pituitary Gland)، در قیہ غدود (Thyroid Gland) اور مولدوں

(Gonads) کی عاملیت میں تخفیف ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ کم مقدار میں ہارمونس (Hormones) کا افراز کرتے ہیں جو موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔

(4) زیادہ کاربوہائیڈریٹس اور زیادہ توانائی والی غذاؤں یعنی تلی ہوئی غذاؤں کا استعمال کرنا اور اس کے ساتھ زیادہ نیند لینا اور کم کام کرنا موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔

(5) فربہ شخص کافی حساس ہوتا ہے اس لئے اس کے جذباتی، نفسیاتی اور سماجی مسائل اس کے موٹاپے میں مزید اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔



شکل 2.8

عورت کے جسم پر چربی ذخیرہ ہونے کے مقامات



شکل 2.7

مرد کے جسم پر چربی ذخیرہ ہونے کے مقامات

موٹاپے کے اثرات

- (1) موٹاپا صحت کے لئے خطرہ ہے۔
- (2) موٹاپا قلبی امراض کے امکانات میں اضافہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ زیادہ وزن قلب کے کام پر زائد بوجھ کا سبب بنے۔
- (3) موٹاپے کی وجہ سے متاثرہ اشخاص میں مختلف بیماریوں کی شناخت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔
- (4) موٹاپے سے متاثرہ اشخاص ذیابیطس (Diabetes)، دق (Tuberculosis)، تھکی دھائی بے قاعدگیاں (Cardio Vascular Irregularities)، اختلاج (Hypertension)، گھٹیا (Arthritis)، تنگی امراض، عیروں

میں درد جیسے امراض کا شکار بہت جلد ہو جاتے ہیں۔

(5) جسم پر چربی کی پرت ہونے سے جسم کی حرارت بہت کم باہر خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے پسینہ کافی مقدار میں خارج ہوتا ہے جو

جلد پر چلن اور کھجلی (Rashes) کا باعث بنتا ہے۔

(6) موٹا پامورتوں میں جراحی (Surgery)، حمل (Pregnancy) اور پیدائش (Child Birth) کے دوران پیچیدہ گیاں پیدا کرتا ہے۔

(7) موٹا پامورتوں میں ہانچہ پن کا موجب بنتا ہے۔

3.7 حیاتین قلتی امراض (Vitamin Deficiency Diseases)

انسان میں حیاتین (Vitamins) کی قلت کے باعث کئی بیماریاں یا خامیاں لاحق ہوتی ہیں۔

حیاتین "اے" کی قلتی بیماریاں (Deficiency of Vitamin A)

حیاتین اے (Vitamin A) کی قلت یا غیر موجودگی کی وجہ سے مختلف قلتی اثرات اور خامیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

(a) شب کوری (Night Blindness) یا نیکٹالوپیا (Nyctalopia)

مدھم روشنی میں بصارت آنکھ کے شبکیہ (Retina) میں پائے جانے والے عصا خلیوں (Rod Cells) میں موجود رہوڈوپسن (Rhodopsin) نامی ضیائی حساس صبغہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رہوڈوپسن کی تیاری کے لئے حیاتین اے ضروری ہوتا ہے۔ حیاتین اے کی قلت کی وجہ سے رہوڈوپسن کی تیاری واقع نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مدھم روشنی میں بصارت متاثر ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی بصارت میں اس قسم کے نقص کو شب کوری (Night Blindness) یا نیکٹالوپیا (Nyctalopia) کہا جاتا ہے۔

(b) خشک چشمیہ (Xerophthalmia)

حیاتین اے کی قلت کے باعث آنکھ کے اشکی غدود (Lachrymal Glands) میں آنسو کی تیاری انجام نہیں پاتی جس کے باعث آنکھ کی ملتحمہ (Conjunctiva) خشک ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور چمک ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو خشک چشمیہ (Xerophthalmia) کہا جاتا ہے۔



شکل 2.9

خشک چشمیہ (Xerophthalmia)

(c) کیراٹومالاشیا (Keratomalacia)

حیاتین اے کی شدید قلت کے باعث آنکھ کا قرنیہ (Cornia) ملائم، غیر منظم اور پھٹ کر تباہ ہو جاتا ہے جو مستحکم اندھے پن کا سبب بنتا ہے۔ اس کیفیت کو کیراٹومالاشیا (Keratomalacia) کہا جاتا ہے۔ اس کو مقویاتی اندھا پن (Nutritional Blindness) بھی کہا جاتا ہے۔ یہی ہندوستانی بچوں میں اندھے پن کی اہم وجہ ہے۔

(d) اشکی غدد کا ضائع ہونا : حیاتین اے کی قلت کے باعث اشکی غدد ضائع ہو جاتے ہیں۔

(e) غدد میں انحطاط پذیری : صملاخی غدد (Sebaceous Glands) اور آنت کے غدد میں انحطاط واقع ہوتا ہے۔

(f) سر حملہ کا متاثر ہونا : تنفسی نالی کی سر حملہ طبقہ دار اور انحطاط پذیر ہو جاتی ہے۔

حیاتین ڈی کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin D)


حیاتین ڈی (Vitamin D) کی قلت کے باعث بچوں میں کساح (Rickets) اور بالغوں میں آسٹیو ملیشیا

(Osteomalacia) نامی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔

(a) کساح (Rickets)


یہ بیماری بچوں میں 6 تا 18 ماہ کی عمر کے دوران واقع ہوتی ہے۔ حیاتین ڈی کی قلت کے باعث ہڈیوں کی تیاری میں کیلشیم (Calcium) اور فاسفیٹ (Phosphate) حصہ نہیں لیتے بلکہ یہ فضلہ کے ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں ملائم اور غصرونی (Cartilagenous) بن جاتی ہیں۔ لانی ہڈیاں، خاص کر پیروں کی ہڈیاں، خم دار ہو جاتی ہیں جو کمانی دار پیروں (Bow legs) کے نمونہ کا باعث بنتی ہیں۔ کھڑکھڑاتے گھٹنے (Knock Knees) دکھائی دیتے ہیں۔ جوڑے (Joints) لانبے ہو جاتے ہیں۔ ہڈیوں کی عظم سازی (Ossification) متاثر ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں صدر (Chest) اور عاہے (Pelvis) بے وضع بن جاتے ہیں

ڈھانچہ (Skeleton) کمزور ہو جاتا ہے جو ریڑھ کی ہڈیوں کو خفیدہ بنادیتا ہے۔ دانت بھی تاخیر سے نکلتے ہیں۔




شکل 2.10

حیاتین ڈی کی قلت کے باعث دانتی بوسیدگی (Dental Caries)




شکل 2.11

درمیانی بچہ عام صحت مند دونوں جانبی بچوں میں کساح



شکل 2.13

کمانی دار پیر (Bow Legs)



شکل 2.12

کھڑکھڑاتے گھٹنے (Knock Knees)

(b) آسٹیمالیشیا (Osteomalacia)

یہ بیماری ہائپوفسفیٹیم کے نسکیات اور حیاتین ڈی کی قلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری عموماً حاملہ عورتوں اور دودھ دینے والی عورتوں میں کیٹیم کی کافی قلت کے باعث واقع ہوتی ہے۔ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔

حیاتین "ای" کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin E)

انسانوں میں حیاتین ای (Vitamin E) کی قلت کی وجہ سے حسب ذیل اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

(1) حیاتین ای کی طویل مدتی قلت کے باعث مردوں میں ایچے (Testes) انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں جو عقیم (Sterility) کو ظاہر کرنے کا موجب بنتا ہے۔

(2) اس حیاتین کی طویل مدتی قلت کے باعث عورتوں میں حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اس مرض کو انجیڈ الی عقیم (Resorption Sterility) کہا جاتا ہے۔ یہ انقطاع حیض (Menopause) کا سبب بھی بنتی ہے۔

(3) حیاتین ای کی قلت کے باعث عضلات میں انحطاطی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو فالج کا سبب بنتی ہیں۔ قلب میں انحطاط نیچ (Necrosis) پیدا ہوتا ہے۔

(4) حیاتین ای کی قلت کی وجہ سے مرغیوں کے چوزوں میں صدر، شکم، گردن اور پیروں پر زبردست اور مروجہ جن پائی جاتی ہے۔ مرغیوں میں

دوسری دماغی (Blood vessels) میں انحطاط پذیری چوزوں میں جنینی اموات (Embryonic Mortality) کا باعث

بھی ہے۔ اس کا علاوہ ہنسینا لولہ (Encephalomalacia) بیماری کے باعث چوزوں میں اموات واقع ہوتی ہیں۔

(5) حیاتین ای کی قتل کے باعث خون کے اجڑ جیسوں (R B C) کی حیاتی مدت جس کی واقع ہوتی ہے۔

حیاتین "کے" کی قلت بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin K)

حیاتین "کے" (Vitamin K) کی قلت کے باعث زخم ٹکنے پر انجماد خون (Coagulation) واقع نہیں ہوتا اور خون بہنے

کا عرصہ (Bleeding Time) طویل ہو جاتا ہے۔ جسم پر اگر زخم لگ جائے تو خون کا خارج ہونا عموماً 5 تا 8 منٹ میں رک جاتا ہے لیکن

حیاتین "کے" کی قلت کے باعث یہ عرصہ کافی طویل ہو جاتا ہے اور خون مسلسل خارج ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے خون کافی مقدار میں

ضائع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے۔

حیاتین "بی₁" کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin B₁)

انسان میں حیاتین بی₁ (Vitamin B₁) کی قلت بیری-بیری (Beri - Beri) نامی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اس بیماری کی

علامتیں حسب ذیل ہیں۔

- (1) پیروں پر سوجن (Oedema) ظاہر ہوتی ہے۔ عضلات نازک ہو جاتے ہیں۔
- (2) اشتہا (بھوک) کی کمی محسوس ہوتی ہے۔
- (3) خون، دماغی سیال (Cerebrospinal Fluid)، دماغ، اور اعصاب میں لیکٹک ترشے (Lactic Acid) اور پائریک ترشے (Pyruvic Acids) جمع ہو جاتے ہیں جو کثیر عصبی التهاب (Polyneuritis) کا باعث بنتے ہیں۔
- (4) قلب کمزور اور بڑا ہو جاتا ہے۔ شدید حالت میں قلب کا کام ہو جاتا ہے۔
- (5) ہاضمہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہوتی ہے۔
- (6) عضلاتی انحطاط پذیری واقع ہوتی ہے۔
- (7) پٹلی کے عضلات میں تناؤ واقع ہوتا ہے جو فالج کا سبب بنتا ہے۔
- (8) لرزہ، قے، دورہ جیسی علامتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔

حیاتین "بی₂" کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin B₂)

حیاتین "بی₂" (Vitamin B₂) کی قلت کے باعث حسب ذیل مختلف علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

- (1) زبان سرخ اور مجلا ہو جاتی ہے جس کو التهاب لسان (Glossitis) کہا جاتا ہے۔
- (2) لب اور دہن کے کنارے پھٹ جاتے ہیں جس کو کیلوسس (Cheilosis) کہا جاتا ہے۔
- (3) حیاتین بی 2 کی قلت کی وجہ سے آنکھ کا قرنیہ (Cornea) غیر وعادار (Avascularized) ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں آنکھوں میں خراش ہوتی ہے اور وہ روشنی کے لئے حساس بن جاتی ہیں جس کو شعاعی خوف (Photophobia) کہا جاتا ہے۔ مدہم روشنی میں بصارت ناقص ہو جاتی ہے جو شدید حالتوں میں کیراٹائٹس (Keratitis) نامی بیماری کا باعث بنتی ہے۔
- (4) جلد خشک ہو جاتی ہے اور جلد پر فلکس (Scales) دکھائی دیتے ہیں۔ بال ضائع ہو جاتے ہیں۔
- (5) نمو (Growth) رک جاتا ہے۔

پانٹوٹھینک ترشہ یا بی 3 کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Pantothenic Acid or B₃)
 انسانوں میں پانٹوٹھینک ترشہ (Pantothenic Acid) کی قلت بہت کم ہوتی ہے چونکہ یہ تقریباً تمام غذائی اشیاء میں موجود ہوتا ہے۔ تاہم یہ دریافت کیا گیا ہے کہ پانٹوٹھینک ترشہ کی قلت انسانوں میں پیروں میں جلن کے عارضہ (Burning Feet Syndrome) کا سبب بنتی ہے۔

نگوٹینک ترشہ یا نیاسن (بی 5) کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Nicotinic Acid or Niacin B₅)

نگوٹینک ترشہ (Nicotinic Acid) کی قلت کے باعث درشت جلدی (Pellagra) نامی بیماری واقع ہوتی ہے۔ اس کو سب سے پہلے ڈاکٹر جوزیف گولڈبرگر (Dr. Joseph Goldberger) نے ایک بچہ میں دریافت کیا۔ اس کے بعد اس کا سبب نگوٹینک ترشہ کی قلت کو کا سال (Casal) نے 1735 میں دریافت کیا۔ پیلاگرا (Pellagra) اٹالی (Italian) لفظ ہے جس کے معنی "غیر ہموار جلد" ہے۔ درشت جلدی بیماری تین اہم علامتوں یعنی التهاب جلد (Dermatitis)، اسہال (Diarrhoea) اور عتامت (Dementia) کے ذریعہ پہچانی جاتی ہے۔ اس بیماری سے متاثر مریض کی جلد سورج سے جل ہوئی جلد کے مانند دکھائی دیتی ہے اور وہیز ہو جاتی ہے۔ زبان دبیز (Glossy) اور سخت ہو جاتی ہے۔ ہاضمی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ معدی آنتی عارضہ (Gastrointestinal Disorder)، کثیر صبی التهاب (Polyneuritis) اور کئی اقسام کے دماغی عارضے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر علامتوں میں سر کا درد، خراب ہڈیری، وزن میں کمی، غیر معتدل ہمو، کمزوری اور فقر الدم (Anaemia) شامل ہیں۔



شکل 2.15

درشت جلدی (Pellagra) سے متاثرہ بچہ



شکل 2.14

ڈاکٹر جوزیف گولڈبرگر Dr. Joseph Goldberger
جس نے درشت جلدی کو دریافت کی



سخت زرد ہاتھ



درشت جلدی - سے متاثرہ ہاتھ

شکل 2.16

درشت جلدی (Pellagra)

حیاتین بی₆ پائریڈاکزن کی قلت بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin B₆ - Pyridoxine)

انسانوں میں حیاتین بی₆ پائریڈاکزن کی قلت بیماریاں ہنوز دریافت طلب ہیں۔ تاہم چھوٹے بچوں میں اس حیاتین کی قلت سے فقرا

لدم ہمرگی (Convulsions) اور اکروڈائینیا (Acrodynia) نامی جلدی التهاب جیسی بیماریاں واقع ہوتی ہیں۔

حیاتین بی₇ بایوٹن کی قلت بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin B₇ - Biotin)

انسانوں میں حیاتین بی₇ بایوٹن (Biotin) کی قلت کے باعث حسب ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

(1) جلدی التهاب جو انگلیوں کے راسی حصوں پر واقع ہوتا ہے۔

(2) خون میں کولیسٹرال (Cholesterol) کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔

(3) بائیوٹن کی قلت کے باعث واقع ہونے والی علامتیں حیاتین بی 1 کی قلتی علامتوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔

فولک ترشہ بی 9 (Folic Acid) (B₉) کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Folic Acid)

انسانوں میں فولک ترشہ (Folic Acid) کی قلت کی وجہ سے عورتوں میں حمل کے دوران کلاں نہ ہونی فقر الدم

(Megaloblastic Anaemia) واقع ہوتا ہے۔

حیاتین بی 12 سیانو کوبالامین کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Cyanocobalamin or

Vitamin B₁₂)

حیاتین B₁₂ (Vitamin B₁₂) کی قلت انسانوں میں (a) پر پٹی شیس فقر الدم (Pernicious Anaemia) اور (b)

ہائپر گلیکسیمیا (Hyperglycaemia) کا سبب بنتی ہے۔

حیاتین سی کی قلتی بیماریاں (Deficiency Diseases of Vitamin "C")


انسان میں حیاتین سی (Vitamin C) کی قلت کی وجہ سے مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔

(1) استر یوٹ (Scurvy)


استر یوٹ (Scurvy) حیاتین "سی" کی قلت کی وجہ سے عام طور پر واقع ہونے والی عام بیماری ہے۔ اس بیماری میں جسم میں

اندرونی طور پر خون خارج ہوتا ہے۔ مسوڑھوں میں سوجن آجاتی ہے اور ان سے خون مسلسل بہتا رہتا ہے۔ خون کے اس طرح ضائع ہونے


کے سبب ثانوی طور پر فقر الدم (Anaemia) واقع ہوتا ہے۔ جوڑوں سے بھی خون کا بہنا ایک عام علامت ہے۔



شکل 2.18
مسوڑھوں میں سوجن



شکل 2.17
عام مسوڑھے



شکل 2.19
ا۔ ترمیم حیات میں کمی کی قوتی بیماری

3.8 معدنیات قوتی امراض (Mineral Deficiency Diseases)

غذا میں معدنیات (Minerals) کی کمی کے باعث مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

کیلشیم کی قلت (Deficiency of Calcium)

غذا میں کیلشیم کی قلت کے باعث ہڈیوں اور دانتوں کے تکلس (Calcification) میں تخفیف واقع ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کے باعث ہڈیاں خمیدہ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ مخمخ اور کلائی چوڑی ہو جاتی ہیں۔ کیلشیم کی قلت کی وجہ سے بچوں میں کساجی (Rickets) اور بالغوں میں آسٹیو مالاشیا (Osteomalacie) کی قوتی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ عورتوں میں متعدد حمل کے باعث غذا میں کیلشیم کی کمی ہو جائے تو کیلشیم قوتی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

خون کے پلازما (Plasma) میں کیلشیم کی مقدار نارمل سے کم ہو جائے تو اس نوعیت کو زیر کلس (Hypocalcaemia) کہا جاتا

ہے۔ اس جسم کی قلت ضرور قیہ (Parathyroid) ہارمون کی کمی یا کیلشیم کے اخراج کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی بھائی (Tetany)

کا موجب بنتی ہیں۔ میکشیم کی کمی انقباض عضلات اور انجماد خون کی میکانیت کو متاثر کرتی ہے۔

لوہے کی قلت (Deficiency of Iron)

ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں 10 فی صد حاملہ عورتوں میں لوہے کی قلت پائی جاتی ہے۔

حیاتین سی کی قلت ہک ورم (Hookworm) کا تعدیہ (Infection)، غذا کے ساتھ لوہے کی کم مقدار کا استعمال یا آنت میں لوہے کا ناقص انجذاب یا جسم سے خون کا خارج ہونا لوہے کی قلت کا باعث بنتے ہیں۔ لوہے کی قلت فقر الدم کا باعث بنتی ہے۔ فقر الدم مختلف اقسام کا ہوتا ہے جس کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

(a) زیر لونی فقر الدم (Hypochromatic Anaemia)

اس قسم کے فقر الدم سے متاثرہ مریض پھیکا اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ متعدد بار سر کا درد واقع ہوتا ہے۔ ہیموگلوبین (Haemoglobin) کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ سرخ جیسوں کی جسامت چھوٹی ہو جاتی ہے جن کو خرد جیسے (Microcytes) کہا جاتا ہے جس کے باعث بانٹوں کو آکسیجن کم سہیا ہوتی ہے اور مریض میں تھکاوٹ ظاہر ہوتی ہے۔

(b) طبعی لونی فقر الدم (Normochromic Anaemia)

اس قسم کے فقر الدم سے متاثرہ مریضوں میں ظاہری علامتیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ لوہے کے ذخیرہ کی کمی واقع ہوتی ہے۔ خون کے دما ب میں لوہے کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔

(c) کلاں مہوضی فقر الدم (Megaloblastic Anaemia)

یہ بیماری حیاتین بی 12 اور فولک ترشہ (Folic Acid) کی قلت کے باعث واقع ہوتی ہے۔ خون کے جیسوں کی جسامت میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔

میکشیم کی قلت (Deficiency of Magnesium)

معمولاً صحت مند حالت اور معمول کے مطابق غذا استعمال کرنے والے اشخاص میں میکشیم کی قلت واقع نہیں ہوتی۔ میکشیم کی قلت


عموماً ناقص انجذاب عارضہ (Malabsorption Syndrome)، کہنہ شراب نوشی (Chronic Alcoholism)، حمل کے زہریلے اثرات یا پیشاب آور اشیاء (Diuretics) کے استعمال کے باعث واقع ہوتی ہے۔ میکشیم کی قلت کے باعث عصبی عضلاتی خراش پذیرگی (Neuromuscular Irritability)، ٹیٹانی مرگی (Tetanic Convulsions) Twitching Tremor۔ مرگی (Convulsions) وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔

تانبہ کی قلت (Deficiency of Copper)

تانبہ کی قلت کے باعث واقع ہونے والی عام بیماری ولسن کی بیماری (Wilson's Disease) ہے۔ یہ بیماری آنت میں تانبہ کے انجذاب میں قائل لحاظ اضافہ کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ اس بیماری میں خاص کر تانبہ کا تحول معمول کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تانبہ کی مقدار خون کے دما ب (Plasma) میں کم ہو جاتی ہے جب کہ پیشاب میں بڑھ جاتی ہے۔ دماغ اور جگر میں کافی تانبہ جمع ہو جاتا ہے۔ تانبہ کی قلت بالوں کو پھونک (Brittle) بنا دیتی ہے۔

آئیوڈین کی قلت (Deficiency of Iodine)

غذا میں آئیوڈین کی قلت گھٹڑ (Goitre) نامی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ تمام گھٹڑ آئیوڈین کی قلت کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ اس بیماری میں غدود درقہ (Thyroid Gland) میں تیار ہونے والے تھائر اکزن (Thyroxin) ہارمون آئیوڈین کی قلت کی وجہ سے تیار نہیں ہوتا جس کے باعث غدود درقہ میں سوجن واقع ہوتی ہے اور اس کی جسامت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے تسکیدی (Oxidative) تحول کی شرح اور جسمانی نشوونما میں تخفیف واقع ہوتی ہے۔ اس بیماری کے انسداد کے لئے آئیوڈینی نمک کا استعمال کرنا چاہئے۔



شکل 2.20
گھٹڑ (Goitre)

فلورین کی قلت (Deficiency of Fluorine)

فلورین کو دو دھاری تکوا کہا جاتا ہے۔ فلورائیڈس (Fluorides) بچوں کے دانتوں پر جمع ہوتا ہے لیکن بالعموم کے دانتوں پر جمع نہیں ہوتا۔ دانتوں پر جمع شدہ فلورائیڈس معدنیات کی حل پذیری اور ترشہ تیار کرنے والے بیکٹریا کے نمو (Growth) کو متاثر کرتا ہے۔ نمو

کے وقوع پذیری کی مدت کے دوران فلورین کی قلت واقع ہو جائے تو دانت بوسیدہ اور تباہ ہو جاتے ہیں۔

زنگ کی قلت (Deficiency of Zinc)

انسانوں میں زنگ کی قلت بہت کم واقع ہوتی ہے۔ تاہم خون میں زنگ کی قلت کے باعث جگری تشمع (جگری سکڑاؤ)

(Cirrhosis Of Liver)، مہلک فقر الدم (Pernicious Anaemia)، معمولی قلبی منہم (Myocardial Infarction)

(عارضہ قلب کی مہلک قسم) جیسی اہم بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زنگ کی قلت کی وجہ سے نشوونما رک جاتی ہے اور قلت

مولدیت (Hypogonadism) واقع ہوتی ہے۔

4 خلاصہ

☆ سوہ تغذیہ سے مراد ایک یا ایک سے زائد لازمی مقویات کی نسبتاً یا مطلق قلت یا کثرت کے نتیجہ میں واقع ہونے والی مرضیاتی حالت ہے۔

☆ سوہ تغذیہ کی اہم وجوہات میں قلت تغذیہ، کثرت تغذیہ، غیر متوازن تغذیہ اور مخصوص تغذیاتی قلت قابل ذکر ہیں۔

☆ بچوں میں سوہ تغذیہ کی تین اقسام پائی جاتی ہیں جن میں (a) حراری سوہ تغذیہ (b) لمبیاتی سوہ تغذیہ اور (c) لحمیہ حراری سوہ تغذیہ شامل ہیں۔

☆ لحمیہ حراری سوہ تغذیہ کے باعث پیدا ہونے والی اہم بیماریوں میں (1) کواشیورکار (Kwashiorkar) اور (2) مرائس (Marasmus) قابل ذکر ہیں۔

☆ کواشیورکار بیماری خاص کر بچوں میں ایک تا چار سال کی عمر میں لمبیات (Proteins) کی قلت کے باعث واقع ہوتی ہے۔

☆ مرائس بیماری بچوں میں چھ ماہ سے کم عمر میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی لمبیات کی قلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

☆ کثرت تغذیہ اور زائد توانائی کی وجہ سے موٹا پیمانہ فرہمی (Obesity) مرض لاحق ہوتا ہے جو صحت کے لئے خطرہ ہے۔

☆ موٹا پیمانہ عورتوں میں ہائپوٹائیس کا سبب بنتا ہے۔

☆ حیاتین کی قلت کے باعث کئی امراض پیدا ہوتے ہیں۔

☆ حیاتین "اے" کی قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض میں شب کوری (Night Blindness)، خشک چشمیہ

(Xerophthalmia)، کیراٹومالاشیا (Keratomalacia)، خشکی غرود کا ضائع ہونا، پسینہ کے غرود اور آنت کے غرود کا

انحطاط پذیر ہونا قابل ذکر ہیں۔

☆ حیاتین "ڈی" کی قلت کے باعث بچوں میں کساح اور بالغوں میں آسٹومالیسیا (Osteomalacia) نامی امراض پیدا ہوتے ہیں۔

☆ حیاتین "ای" کی قلت کے باعث مردوں میں عقم (Sterility) ظاہر ہوتی ہے اور عورتوں میں حمل ساقط ہوتا ہے۔

☆ حیاتین "کے" کی قلت کے باعث زخم لگنے پر انجماد خون واقع نہیں ہوتا۔

☆ حیاتین بی 1 کی قلت کے باعث خاص کر پیری بیری (Beri Beri) وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔

☆ حیاتین بی 2 کی قلت سے زبان سرخ اور مجلا ہو جاتی ہے جس کو التهاب لسان (Glossitis) کہا جاتا ہے اور دہن کے کنارے پھٹ جاتے ہیں جس کو کیلوسیس (Cheilosis) کہا جاتا ہے۔

☆ پانٹھویک ترشہ (بی 3) کی قلتی علامتوں میں پیروں میں جلن واقع ہوتی ہے۔

☆ کونیک ترشہ یا نیاسین (بی 5) کی قلت کے باعث درشت جلدی (Pellagra) نامی بیماری لاحق ہوتی ہے۔

☆ حیاتین بی 6 کی قلت فقر الدم، مرگی اور اکروڈنمیا نامی جلدی امراض کا باعث بنتی ہے۔

☆ حیاتین بی 7 یا بایوٹن کی قلت جلدی التهاب اور خاص کر خون میں کو لیسٹرال کی مقدار کے اضافہ کا باعث بنتی ہے۔

☆ حیاتین بی 9 یا فولک ترشہ کی قلت عورتوں میں حمل کے دوران کلاں نہوضی فقر الدم (Megaloblastic Anaemia) کا سبب بنتی ہے۔

☆ حیاتین بی 12 کی قلت کے باعث پرنیش فقر الدم (Pernicious Anaemia) واقع ہوتا ہے۔

☆ حیاتین سی کی قلت کی وجہ سے عام طور پر اسٹریٹ (Scurvy) بیماری لاحق ہوتی ہے۔

☆ غذا میں معدنیات (Minerals) کی قلت مختلف امراض کا سبب بنتی ہے۔

☆ معدنیات کی قلت کے باعث مختلف علامتوں میں خاص کر کیشیم کی قلت سے بچوں میں کساحی (Rickets)، بالغوں میں

آسٹومالیسیا (Osteomalacia)، ٹیٹانی (Tetany)، لوہے کی قلت سے مختلف اقسام کے فقر الدم، میگنیٹیم کی قلت سے عصبی عضلاتی خراش

پذیری، ناقص انجماد ابلی عارضہ، تانبہ کی قلت سے ولسن کی بیماری (Wilson's Disease)، آئیوڈین کی قلت سے گلپڑ (Goitre)، فلورین

کی قلت کے باعث دانت کا بوسیدہ ہو جانا، زنک کی قلت سے پرنیش فقر الدم، جگر کی تشمع (Cirrhosis of Liver) قابل ذکر ہیں۔

زائد حیاتین کے استعمال کے معضرات

آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نارمل نشوونما، نمو اور بہتر صحت کے لئے حیاتین درکار ہوتے ہیں۔ غذا میں حیاتین کی قلت مختلف امراض کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ غذا میں حیاتین کی زائد مقدار کا استعمال بھی مختلف امراض کا سبب بنتا ہے۔ پانی میں حل پذیر حیاتین کی زائد مقدار کو استعمال کرنے پر معضرات ظاہر نہیں ہوتے کیوں کہ یہ حیاتین جسم میں موجود پانی میں حل ہو کر جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں لیکن جہی میں حل پذیر حیاتین کی زائد مقدار کے استعمال کرنے پر معضرات ظاہر ہوتے ہیں کیوں کہ یہ حیاتین جسم کے مختلف اعضاء میں موجود جہی میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں اور اعضاء کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں جس کے باعث مختلف عارضے لاحق ہوتے ہیں اس حالت کو فوق حیاتینیت (Hyper Vitaminosis) کہا جاتا ہے۔

فوق حیاتینیت "اے" (Hyper Vitaminosis "A")

حیاتین اے (Vitamin A) کی زائد مقدار غذا کے ذریعہ یا انجکشن کے ذریعہ بچوں کے جسم میں داخل کی جائے تو کئی معضرات پیدا ہوتے ہیں۔ خاص کر جلد کا خشک ہونا۔ فوق خراش پذیری، جوارح کے اسی حصوں پر سوجن اور درد جس کی وجہ سے کھڑے ہونے میں دشواری، لانی ہڈیوں کی دہارت میں اضافہ اور انفاقا طحال (Spleen) کی جسامت میں اضافہ جیسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بالغ اشخاص میں زائد حیاتین اے کی وجہ سے ظاہر ہوتے والی علامتوں میں تھکان، عام کمزوری، قبض، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد اور ناختوں کی شکل میں تبدیلی وغیرہ شامل ہیں۔

فوق حیاتینیت "ڈی" (Hyper Vitaminosis "D")

حیاتین ڈی (Vitamin D) کی زائد مقدار بچوں اور بالغوں میں کافی مہلک اثرات پیدا کرتی ہے۔ زائد حیاتین ڈی کی علامتوں میں تھکان، قے، غڑھال پن، سر کا درد، قبض، وقتاً فوقتاً بخار، پیش دہاؤ (Hypertension)، گردوں کو نقصان، دموی دغاؤں کی دہروں میں کیمیم کا ذخیرہ، مصل (Serum) میں کیمیم اور فاسفورس کا اضافہ، ریڑھ کی ہڈیوں (فقریوں) کے شوکے (Spines) میں کیمیم کا جمع ہونا، فقر الدم اور چہرہ پر فالج کے اثرات وغیرہ شامل ہیں۔



انگریزی اصطلاح	لفظ	اردو اصطلاح	تشریح
Accessory	اکسیری	معاون	مددگار
Additional	ایڈیشنل	اضافی	زائد خصوصیات
Antihæmorrhage	انٹی ہیوڈریج	ضدیہلان	کیمیائی شے جو جسم کے خون کے خارج ہونے کو روکتی ہے۔
Antioxidant	انٹی آکسیڈینٹ	ضد عکسید	کیمیائی شے جو عکسیدی تعامل کو روکتی ہے۔
Bone Marrow	بون میرو	عظمیٰ مگودا	ہڈی کے کھد میں پایا جانے والا تودا جو چربی، خون کے مختلف جیسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
Deamination	ڈی امینیشن	ازالہ امونیا	ایسا کیمیائی تعامل جس میں امونیا کا سالہ خارج ہوتا ہے۔
Enzyme	اینزائم	خامرہ	جاندار کے جسم میں پایا جانے والا تھامی عامل جو کیمیائی تعاملات کو باقاعدہ بناتا ہے۔
Extracellular	ایکسٹراسیلر	بروں خلوی	خلیوں کے باہر۔
Fibroblast	فائبروبلاسٹ	ریختی نیو فیبر	انصالی ہافت میں ریشر افزا کرنے والے غیر ہفتہ خلیے۔
Hydrolysis	ہائیڈرولائسس	آب پاشیدگی	تعال جس میں پانی کے سالمات ٹوٹتے ہیں۔
Hyperglycaemia	ہائپر گلیسیا	فوق گلیسیا	خون میں شکر کا غیر معمولی اضافہ۔
Insulator	انسولیٹر	حاجز	ایسی شے جس میں سے برقی رو گزر نہیں سکتی۔
Intracellular	انٹراسیلر	درون خلوی	خلیہ کے اندر۔

Lachrymal Gland	لاکریمل گلائنڈ	آنکھ کی غدود	آنکھ میں موجود غدود جس سے آنسو کا افراز ہوتا ہے۔
Metabolism	میٹابولزم	تحول	جاندار کے جسم میں واقع ہونے والے تمام اقسام کے تعاملات
Night Blindness	نائٹ بلائنڈنيس	شب کوری	حیاتین "اے" کی قلت کے باعث واقع ہونے والا مرض جس میں مریض کو رات کے اوقات میں نظر نہیں آتا۔
Osteoblast	آسٹیوبلاست	عظمیٰ بنیادی	بڑی کو تیار کرنے والے غیر پختہ خلیے جو ہڈی کے قالب (Matrix) میں پائے جاتے ہیں۔
Oxidative Phosphorylation	آکسائیڈیٹو فاسفورائلیشن	تھکیدی فاسفوریت	ایسا تعامل جس میں آکسیجن کی موجودگی میں فاسفورس کا اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں ADP سے ATP حاصل ہوتا ہے۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) سوہ تغذیہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہم وجوہات کونسی ہیں؟
- (2) بچوں میں سوہ تغذیہ کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں؟
- (3) لحمیہ حراری سوہ تغذیہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے باعث کونسی بیماریاں واقع ہوتی ہیں؟
- (4) موٹا پامرض کے لاحق ہونے کی وجہ کیا ہے؟
- (5) حیاتین "اے" کی قلت سے بیماریاں کونسی ہیں؟
- (6) پائٹھینک ترشہ (بی 3) کی قلت کی وجہ سے انسانوں میں کونسا عارضہ لاحق ہوتا ہے؟

- (7) فولک تریشر (بیو) کی قلت کے باعث کونسا عارضہ لاحق ہوتا ہے؟
- (8) کلاں نہروسی فقر الدم (Megaloblastic Anaemia) کو نئے حیاتیات کی قلت کے باعث واقع ہوتا ہے؟
- (9) زہک کی قلت کے باعث کونسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟
- (10) حیاتیات بی 7 (ہائیوٹن) کی قلتی امراض کو علامتوں کو بیان کیجئے۔

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) سو تغذیہ کی درجات کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (2) سو تغذیہ کے قلیل مدتی اثرات اور طویل مدتی اثرات پر بحث کیجئے۔
- (3) کواشیورکر (Kwashiorkor) بیماری کی وجہ، علامتیں، اسباب اور انسدادی تدابیر کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (4) مرامس (Marasmus) نامی بیماری پر ایک بیان قلمبند کیجئے۔
- (5) موٹاپے کے اسباب اور اثرات کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (6) حیاتیات "اے" کے قلتی امراض پر بحث کیجئے۔
- (7) حیاتیات ڈی اور حیاتیات ای کی قلتی بیماریوں کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (8) حیاتیات بی 1 کی قلتی بیماریاں کونسی ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (9) غذا میں بیلٹیم کی کمی کے باعث واقع ہونے والے امراض کو بیان کیجئے۔
- (10) لوہے کی قلت کی وجہ سے واقع ہونے والی فقر الدم (Anaemia) کی اقسام کو بیان کیجئے۔
- (11) غذا میں آہوٹن کی قلت کے باعث پیدا ہونے والے امراض کی تشریح کیجئے۔

7.3 شعرونی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

- (1) کاربا ہائیڈرٹس اور جرمیوں کا شمار _____ پیدا کرنے والے مقویات میں کیا جاتا ہے۔
- (2) کواشیورکر بیماری _____ کی قلت کے باعث پیدا ہوتی ہے۔
- (3) موٹاپا عورتوں میں _____ کا موجب بنتا ہے۔
- (4) حیاتیات اے آکھ کے شبکیہ (Retina) کے مصاطیوں (Rod Cells) میں _____ نامی نیائی حساس مہذ کی بیماری کے

لئے ضروری ہوتا ہے۔

- (5) کی قلت کے باعث خشک چشمہ (Xerophthalmia) مرض لاحق ہوتا ہے۔
- (6) کی قلت کی وجہ سے جسم پر زخم کے لگنے پر خون کے بہنے کا وقت طویل ہو جاتا ہے۔
- (7) کو متویاتی اندھا پن بھی کہا جاتا ہے۔
- (8) خون کے دما ب (Plasma) میں عنصر کی قلت کہلاتی ہے۔
- (9) عنصر کی قلت کے باعث دانت بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔
- (10) کی کمی انقباض عضلات اور انجماد خون کی میکا نیت کو متاثر کرتی ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

- (1) کس حیاتین کی قلب کی وجہ سے اشکی غدود (Lachrymal Gland) میں آنسو کی تیاری انجام نہیں پاتی؟
- (a) حیاتین ڈی (b) حیاتین سی (c) حیاتین کے (d) حیاتین اے
- (2) کس حیاتین کی قلت کیراٹومالیشیا (Keratomalacia) نامی بیماری کا باعث بنتی ہے؟
- (a) حیاتین ڈی (b) حیاتین سی (c) حیاتین اے (d) حیاتین بی₁₂
- (3) کس حیاتین کی قلت کے باعث ہڈیاں ملائم اور غضروفی (Cartilagenous) بن جاتی ہے؟
- (a) حیاتین ڈی (b) حیاتین اے (c) حیاتین (d) حیاتین بی₁₂
- (4) مردوں میں کس حیاتین کی قلت عقیم (Sterility) کا سبب بنتی ہے؟
- (a) حیاتین ڈی (b) حیاتین ای (c) حیاتین بی₁ (d) حیاتین بی₆
- (5) اشتہا (بھوک) کی کمی کس حیاتین کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے؟
- (a) حیاتین بی₁ (b) حیاتین سی (c) حیاتین اے (d) حیاتین کے
- (6) بیروں میں جلن کا عارضہ کس حیاتین کی قلت کا نتیجہ ہے؟
- (a) پانٹھینک ترشہ (b) حیاتین بی₂ (c) حیاتین ڈی (d) حیاتین سی
- (7) کس حیاتین کی قلت مرگی مرض کا باعث بنتی ہے؟
- (a) پانٹھینک ترشہ (b) فولک ترشہ (c) حیاتین بی₆ (d) حیاتین سی

(b) ہائپرگلیکسیمیا (Hyperglycaemia) کس حیاتین کی قلت کی وجہ سے واقع ہوتا ہے؟

- (a) حیاتین بی₁₂ (b) حیاتین اے (c) حیاتین سی (d) حیاتین ڈی
- (9) عورتوں میں حمل کے دوران کلاں نہیوضی فقر الدم (Megaloblastic Anaemia) کس حیاتین کی قلت کی وجہ سے واقع ہو

تا ہے؟

- (a) حیاتین بی₁₂ (b) حیاتین اے (c) حیاتین سی (d) حیاتین ڈی
- (10) کس حیاتین کی قلت کے باعث سر کے بال جھڑ جاتے ہیں اور جلد پر قلوں (Scales) دکھائی دیتے ہیں؟
- (a) حیاتین ڈی (b) ککونیک ترشہ (c) پانٹوٹھیک ترشہ (d) حیاتین بی₂

7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

A	B
(1) مینیشیم کی قلت	() کساج (Rickets)
(2) قلو رین	() ناقص انجی اہلی عارضہ
(3) زینک کی قلت	() دسین بیماری
(4) مینیشیم کی قلت بچوں میں	() ککیر (Goitre)
(5) قلو رین کی قلت	() ٹیٹانی (Tetany)
(6) لوہے کی قلت	() دودھاری ہلوار
(7) تانبہ کی قلت	() کلاں نہیوضی فقر الدم
(8) مینیشیم کی قلت بالغوں میں	() ہیکلر یا کے سوکا متاثر ہونا
(9) خون کے جسموں کی جسامت میں اضافہ	() زیر لوئی فقر الدم (Hypochromatic Anaemia)
(10) آئیوڈین کی قلت	() عضلی قلبی منغصہ (Myocardial Infarction)

سبق 3 تنفس (Respiration)

1	سبق کا خاکہ
2	تمہید
3	سبق کا متن
3.1	تنفس کی تعریف
3.2	تنفس اور کیمیائی احتراق کے مابین تقابل
3.3	تنفس کی اقسام
3.4	تولیہ
3.5	آکسیجنی تنفس کی میکا نیت
3.6	اے ٹی پی (ATP) کے استعمال
3.7	تنفس پر اثر انداز ہونے والے عوامل
4	خلاصہ
5	زائد معلومات
6	فرہنگ
7	نمونہ امتحانی سوالات
7.1	مختصر جوابی سوالات
7.2	طویل جوابی سوالات
7.3	معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

سبق کا خاکہ

1



اس سبق میں آپ تنفس سے متعلق درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ تنفس کی تعریف
- ☆ تنفس اور کیمیائی احتراق کے مابین تقابل
- ☆ تنفس کی اقسام اور میکانیت
- ☆ تنفس پر اثر انداز ہونے والے عوامل

تمہید

2



پچھلے سبق میں آپ سوہ تغذیہ سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ تنفس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جو تمام جاندار عضویوں میں ایک لازمی فعلیاتی عمل ہے جس کے دوران غذائی نامیاتی سالمات کی شکستہ واقع ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں توانائی پیدا ہوتی ہے جو زندگی کی تمام سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس لئے آپ اس سبق کے متن کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لیجئے۔

سبق کا متن

3



3.1 تنفس کی تعریف (Definition of Respiration)

تنفس (Respiration) ایک لازمی فعلیاتی عمل ہے جو تمام جاندار عضویوں میں انجام پاتا ہے۔ تنفس سے مراد عضویہ (Organism) اور ارد گرد کے ماحول کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسوں کا تبادلہ ہے۔ تنفس کے دوران جسم کے خلیوں میں غذا کی شکستہ (Oxidation) واقع ہوتی ہے اور توانائی پیدا ہوتی ہے جو عضویہ کی زندگی کی مختلف سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ لہذا تنفس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ ایک حیاتیاتی شکستہ فعلیاتی تعامل (Biological Oxidative Reaction) ہے جو جاندار کے جسم کے خلیوں میں انجام پاتا ہے جس کے دوران نامیاتی سالمات (غذا) خامروں (Enzymes) کے زیر اثر آکسیجن کے ذریعہ شکستہ پاتے ہیں جس کے نتیجہ میں توانائی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی پیدا ہوتے ہیں۔

اصلی حیوانات بشمول انسانوں میں تنفس کا عمل حسب ذیل مراحل میں تکمیل پاتا ہے۔

i بیرونی تنفس (External Respiration)

تنفس کے اس مرحلہ میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسوں کا تبادلہ تنفسی اعضاء اور ارد گرد کے ماحول کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ تنفسی اعضاء میں جلد (Skin)، خیشوم (Gills) اور پیچھڑے (Lungs) شامل کئے جاتے ہیں۔ بیرونی تنفس کو سانس لینا (Breathing) بھی کہا جاتا ہے جس میں دو مراحل شامل کئے جاتے ہیں (a) شہیق (Inspiration) یا دم کشی (Inhalation) اور (b) زفير (Expiration) یا دم براری (Exhalation)۔

(a) شہیق (Inspiration) یا دم کشی (Inhalation)

شہیق یا دم کشی کے دوران ہوا یا پانی کو تنفسی اعضاء کے اندر لیا جاتا ہے جہاں ہوا یا پانی میں موجود آکسیجن خون میں جذب ہو جاتی ہے۔

(b) زفير (Expiration) یا دم براری (Exhalation)

اس مرحلہ کے دوران جسم میں داخل شدہ ہوا یا پانی کو تنفسی اعضاء کے ذریعہ باہر خارج کر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی خارج ہو جاتی ہے۔


ii اندرونی تنفس (Internal Respiration)

تنفس کے اس مرحلہ میں دم کشی کے دوران خون میں جذب ہونے والی آکسیجن خون میں موجود ہیموگلوبین کی شکل میں ہاتھوں (Tissues) کو منتقل کر دی جاتی ہے جب کہ ہاتھوں میں موجود CO_2 خون میں داخل ہو جاتی ہے اور ہیموگلوبین کے ساتھ مل کر کاربو آکسی ہیموگلوبین (Carboxyhaemoglobin) کی شکل میں تنفسی اعضاء کو پہنچادی جاتی ہے۔ لہذا اندرونی تنفس کے دوران O_2 اور CO_2 کا تبادلہ خون اور ہاتھوں کے بین خلوی مائع (Interstitial Fluid) کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

iii خلوی تنفس (Cellular Respiration)

خلوی تنفس دو مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلہ میں آکسیجن ہاتھوں کے بین خلوی مائع سے خلیوں کے اندر داخل ہوتی ہے اور CO_2 خلیوں سے بین خلوی مائع میں خارج ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلہ کے دوران خلیوں میں غذائی سالمات مختلف خامروں کے زیر اثر کیمیائی (Oxidative) اور غیر کیمیائی (Non-Oxidative) دونوں اقسام کے تعاملات کو مختلف مراحل میں انجام دیتے ہیں جس کے نتیجہ میں

توانائی، CO_2 اور پانی پیدا ہوتے ہیں اور حرارت بھی خارج ہوتی ہے۔ توانائی خلیوں کے مختلف افعال کو انجام دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے جب کہ حرارت جسم کی مستقل تپش کو برقرار رکھتی ہے۔



شکل 3.1

خون، بافتی سیال اور لٹنی دعام کے درمیان O_2 ، CO_2 اور گلوکوز کے تبادلہ کو ظاہر کرتا ہوا تعلق

3.2 تنفس اور کیمیائی احتراق (Chemical Combustion) کے مابین تقابل

احتراق (Combustion) ایک کیمیائی تھکیدی تعامل (Chemical Oxidative Reaction) ہے جس میں نامیاتی (Organic) سالمات جلائے جانے پر حرارت، CO_2 اور پانی پیدا ہوتے ہیں اور اس دوران نامیاتی سالمات میں پائے جانے والے کیمیائی بند بیک وقت غیر منظم طور پر ٹوٹ جاتے ہیں جب کہ تنفس (Respiration) ایک حیاتیاتی تھکیدی تعامل (Biological Oxidative Reaction) ہے جو جاندار کے جسم میں واقع ہوتا ہے جس کے دوران نامیاتی سالمات خامروں کے زیر اثر O_2 کے ذریعہ تھکید پاتے ہیں اور توانائی CO_2 اور پانی پیدا کرتے ہیں اور اس دوران نامیاتی سالمات میں پائے جانے والے کیمیائی بند بیک وقت نہیں

نوٹے بلکہ منظم طور پر مختلف مراحل میں ٹوٹتے ہیں۔ ذیل کے جدول میں تنفس اور احتراق کے مابین تقابل کو پیش کیا گیا ہے۔

جدول 1 تنفس اور احتراق کے مابین تقابل

احتراق (Combustion)	تنفس (Respiration)
1 کیمیائی یکسیدی تعامل ہے جو آکسیجن کی موجودگی میں جسم کے باہر انجام پاتا ہے۔	1 حیاتیاتی یکسیدی تعامل ہے جو آکسیجن کی غیر موجودگی اور موجودگی میں جاندار کے جسم کے اندر انجام پاتا ہے۔
2 کسی شے مثلاً شکر کو جلانے کے لئے بیرونی حرارت مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے۔	2 کسی شے مثلاً شکر کی یکسید جاندار کے جسم میں جسمانی پیش کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔
3 شکر کو جلانے پر یہ سب سے پہلے پگھلاتی ہے اور اس کے بعد سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو کجلاؤ (Charring) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ شعلہ کی شکل میں جلتی ہے۔	3 جسم میں شکر کا کجلاؤ (Charring) واقع نہیں ہوتا اور یہ شعلہ کی شکل میں نہیں جلتی۔
4 یہ غیر منظم عمل ہے۔	4 یہ منظم عمل ہے جو سلسلہ وار مراحل میں انجام پاتا ہے۔
5 شکر کے سالمات میں پائے جانے والے بند (Bonds) جلنے کے دوران بیک وقت غیر منظم طور پر ٹوٹتے ہیں اور تمام توانائی حرارت کی شکل میں بیک وقت خارج ہو جاتی ہے۔	5 شکر کے سالمات میں موجود بند (Bonds) منظم طور پر سلسلہ وار مختلف مراحل میں ٹوٹتے ہیں اور توانائی مختلف مراحل میں خارج ہوتی ہے۔
6 شکر کے سالمات میں موجود بند خامروں کے بغیر ٹوٹتے ہیں۔	6 شکر کے سالمات میں موجود بند مخصوص خامروں کے ذریعہ ٹوٹتے ہیں۔
7 کسی بھی قسم کا درمیانی مرکب تیار نہیں ہوتا۔	7 کئی درمیانی مرکبات تیار ہوتے ہیں۔
8 احتراق کا عمل پانی کی غیر موجودگی میں انجام پاتا ہے۔	8 تنفس کا عمل پانی کی موجودگی میں انجام پاتا ہے۔


9	تمام توانائی حرارت کی شکل میں فضائی کرہ (Atmosphere) 9 توانائی کا بڑا حصہ کیمیائی توانائی کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے جو جسم میں استعمال کے لئے موجود رہتا ہے۔ توانائی کا بقیہ چھوٹا حصہ حرارت کی شکل میں فضائی کرہ میں آزاد ہوتا ہے۔

3.3 تنفس کی اقسام (Types of Respiration)

تنفس ایک عمومی تعامل ہے جو آکسیجن کی غیر موجودگی اور موجودگی دونوں صورتوں میں واقع ہوتا ہے اس لئے اس کی درجہ بندی دو اقسام میں کی جاتی ہے۔ (i) غیر آکسیجنی تنفس (Anaerobic Respiration) اور (ii) آکسیجنی تنفس (Aerobic Respiration)

(i) غیر آکسیجنی تنفس (Anaerobic Respiration)

غیر آکسیجنی تنفس سے مراد ایسا تنفس ہے جس کے دوران نامیاتی غذا کی آکسیجن کی غیر موجودگی میں جزی کی تھید واقع ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں CO_2 ، ایتھانائل الکحل (Ethyl Alcohol)، لیکٹک ترشہ (Lacti Acid) اور توانائی پیدا ہوتے ہیں۔



غیر آکسیجنی تنفس خرد بینی عضویوں جیسے بعض جراثیموں (Bacteria)، پھپھوندی (Fungi) اور ایسٹ (Yeast) میں واقع ہوتا

ہے۔ غیر آکسیجنی تنفس کے دوران 180 گرام گلوکوز سے 92 گرام ایتھانائل الکحل (C_2H_5OH)، 88 گرام CO_2 اور 57 کلو حرارے (Kcal) توانائی حاصل ہوتی ہے۔


غیر آکسیجنی تنفس کی میکانیت

غیر آکسیجنی تنفس دو مراحل میں تحلیل پاتا ہے۔ (a) شکر پاشیدگی (Glycolysis) اور (b) تخمیر (Fermentation)

(a) شکر پاشیدگی (Glycolysis)

شکر پاشیدگی (Glycolysis) سے مراد سلسلہ دار کیمیائی تعلقات ہیں جس کے دوران گلوکوز نوے کر پائروک-ترش (Pyruvic Acid) میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

یہ عمل خلیہ کے خلیہ مایہ (Cytoplasm) میں واقع ہوتا ہے جس کے دوران گلوکوز (Glucose) کا ایک سالمہ پائروک-ترش (Pyruvic Acid) کے دو سالمات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آکسیجنی تنفس میں بھی واقع ہوتا ہے جس کو آکسیجنی تنفس کی میکانیت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔



شکل 3.2


شکر پاشیدگی

(b) تخمیر (Fermentation)

یہ ایک ایسا کیمیائی تعامل ہے جس میں شکر پاشیدگی (Glycolysis) کے اختتام پر حاصل ہونے والا پائروک-ترش ایسٹ کے خلیوں میں موجود زائیمز (Zymase) نامی خامرے کے ذریعہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں ایتھائل الکحل اور CO_2 میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے تخمیر کو الکحلی تخمیر (Alcoholic Fermentation) کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کو صنعتی پیمانہ پر الکحل کی تیاری کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز پھلوں کے رس سے الکحل آمیز مشروبات کی تیاری کے لئے بھی تخمیر (ایسٹ) کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تخمیر میں پیدا ہونے والا الکحل پھلوں کے رس میں شامل ہو کر الکحل آمیز مشروبات تیار کرتا ہے۔

بعض جراثیم جیسے لیکٹو بیسیلس (Lactobacillus) دودھ کو دہی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ جراثیم آکسیجن کی غیر موجودگی

میں پائروک ترش کو لیکٹک ترش (Lactic Acid) میں تبدیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہی کا حرہ ترش ہوتا ہے۔



شکل 3.3

الکھلی تخمیر


عضلات میں عارضی غیر آکسیجنی تنفس

ورزش کے دوران ہمارے جسم کے لئے توانائی کی کافی مقدار درکار ہوتی ہے۔ تنفس کے دوران پیدا ہونے والی توانائی ورزش کے وقت ناکافی ہوتی ہے۔ اس لئے ورزش کے وقت زائد درکار توانائی حاصل کرنے کے لئے عضلاتی غلیوں میں غیر آکسیجنی تنفس انجام پاتا ہے جس کے نتیجہ میں لیکٹک ترش تیار ہوتا ہے۔ آکسیجن کی دستیابی پر لیکٹک ترش کی دوبارہ عکسید واقع ہو جاتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصہ میں لیکٹک ترش جمع ہونے کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے۔

ii آکسیجنی تنفس (Aerobic respiration)

آکسیجنی تنفس سے سرادیا تنفس ہے جس کے دوران نامیاتی غذا کی مکمل عکسید آکسیجن کی موجودگی میں واقع ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2)، پانی اور توانائی حاصل ہوتے ہیں۔ اس جسم کا تنفس بیشتر نباتات، حیوانات بشمول انسانوں میں واقع ہوتا ہے۔ آکسیجن ان حیوانات کے جسم میں ہوا یا پانی کے ذریعہ داخل

ہوتی ہے اور خلیوں میں گلوکوز کی مکمل تکسید کو انجام دیتی ہے۔ آکسیجنی تنفس کے دوران 180 گرام گلوکوز کی مکمل تکسید کے نتیجہ میں 264 گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂)، 216 گرام پانی اور 686 کلو حرارے (Kcal) توانائی پیدا ہوتی ہے۔ آید گرام گلوکوز کی تکسید کے لئے 192 گرام آکسیجن درکار ہوتی ہے۔ آکسیجنی تنفس کو ذیل کی مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



گلوکوز کی تکسید کا عمل دو مراحل میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلہ میں گلوکوز کا ایک سالہ پائروک ترشہ کے دو سالمات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تکسید کے دوسرے مرحلہ میں پائروک ترشہ کے ہر ایک سالہ کی تکسید کے نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) کے تین سالمات حاصل ہوتے ہیں۔ پائروک ترشہ میں موجود ہائیڈروجن پانی کی تیاری کے لئے آکسیجن کو منتقل کر دی جاتی ہے چونکہ آکسیجن اختتامی حصول کنندہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس عمل کو آکسیجنی تنفس (Aerobic Respiration) کہا جاتا ہے۔

آکسیجنی تنفس خلیہ کے توانیہ (Mitochondria) میں انجام پاتا ہے۔ توانیہ کی ساخت اور افعال کے بارے میں آپ پہلی جماعت میں مطالعہ کر چکے ہیں تاہم اعادہ کی خاطر توانیہ کی ساخت اور افعال کو یہاں مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔

3.4 توانیہ (Mitochondria)

توانیہ تمام کامل نواتی خلیوں (Eukaryotic Cells) کے خلیہ مایہ (Cytoplasm) میں موجود رہتے ہیں جب کہ یہ اول نواتی خلیوں (Prokaryotic Cells) میں غیر موجود ہوتے ہیں۔ ان کی جسامت انتہائی چھوٹی دھا کہ نمادانوں (دھا کہ = 'Mito' دانے = Chondrin) کے مانند ہوتی ہے۔ ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں جیسے کر دی، ریشمی (Filamentous)، شاخدار، دھا کہ نما، مکدر یا ٹینس کی راکٹ (Tennis Racket)۔ یہ سادہ خوردبین کے ذریعہ دیکھے نہیں جاسکتے بلکہ ان کا مشاہدہ الکاثران خوردبین کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔

ہر ایک توانیہ کی ساخت حسب ذیل حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

(1) بیرونی طشاء (Outer Membrane)

توانیہ کی بیرونی طشاء ہموار اور مسطح ہوتی ہے۔ یہ لمبیاات اور قھمیاات سے بنی ہوتی ہے۔ بیرونی طشاء پر کوئی ابھار نہیں پائے

جاتے۔

(2) اندرونی غشاء (Inner Membrane)



اندرونی غشاء غیر ہموار ہوتی ہے جو اندرونی جانب کئی ابھاریا تہہ بناتی ہے۔ ان ابھاروں کو عرف (کرٹے Cristae) کہا جاتا ہے جو قالب (Matrix) میں اندرونی جانب بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کرٹے پر چھوٹے اجسام پائے جاتے ہیں جنہیں ابتدائی ذرات (Elementary Particles) یا F_1 ذرات (F_1 Particals) یا فرناٹز موران ذرات (Fernandez Moran Particles) یا آکسی زوس (Oxysomes) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک ذرہ ایک کروی سر (Head) اور ڈھکل (Stalk) پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ڈھکل کے ذریعہ اندرونی غشاء سے جڑے رہتے ہیں۔ ان ذرات کے سر (Head) پر الیکٹران منتقلی زنجیر (Electron Transport Chain) پائی جاتی ہے۔ لہذا ابتدائی ذرات ATP کی تیاری کو انجام دیتے ہیں۔ اس لئے توانیہ کوخلیہ کا بجلی گھر (Power House of Cell) کہا جاتا ہے۔

(3) بیرونی خانہ (Outer Compartment)

بیرونی اور اندرونی غشاؤں کی درمیانی جگہ کو بیرونی خانہ کہا جاتا ہے جس میں سیال بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(4) اندرونی خانہ (Inner Compartment)

توانیہ کی اندرونی جگہ کو اندرونی خانہ کہا جاتا ہے۔ یہ اندرونی غشاء سے گھری ہوئی جگہ ہے جس میں جلی کے مانند ہم جناس (Homogenous) مادہ موجود ہوتا ہے جس کو قالب Matrix کہا جاتا ہے۔ قالب میں 70s رائبوزوس (Ribosomes) 'داری ڈی این اے' (Circular DNA) 'دانے' (Granules) 'رنگیں' (Filaments) اور کرب کا دور (Krebs Cycle) میں حصہ لینے والے خامرے (Enzymes) پائے جاتے ہیں۔




شکل 3.6
ابتدائی ذرہ کی مکمل ساخت

شکل 3.5
کرے معدنیاتی ذرات

افعال (Functions)

- (1) تو ایے (Mitochondria) اے ٹی پی (ATP) کو تیار کرتے ہیں اور غلیہ کے مختلف افعال کے لئے توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اس لئے تو ایے کو غلیہ کا بجلی گھر (Power House) کہا جاتا ہے۔
- (2) تو ایے قالب (Matrix) میں موجود دائری ڈی این اے (DNA) اور رائبوزوم کی مدد سے خود کے لئے لحمیات کو تیار کرتے ہیں۔

- (3) تو ایسے الیکٹران منتقلی (Electron Transport) کے لئے جانے وقوع ہے جو تنفس کے دوران واقع ہوتی ہے۔
- (4) تو ایسے شحمیات (Lipids) کی تالیف میں حصہ لیتے ہیں۔
- (5) تو ایسے حرارت کی پیدائش میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ حرارت ہم حرارتیوں (Homotherms) میں جسم کی مستقل پیش کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔
- (6) تو ایسے منویوں (Sperms) کی حرکت کے لئے توانائی مہیا کرتے ہیں۔
- (7) توانیہ کے قالب میں موجود بعض دانوں میں میٹیم فاسفیٹ ذخیرہ کیا ہوا ہوتا ہے اس لئے توانیوں کو میٹیم ذخیرہ کنندہ کہا جاتا ہے۔
- میٹیم فاسفیٹ خلیہ میں مختلف حیاتیاتی سرگرمیوں کو باقاعدہ بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔



شکل 3.7

توانیہ خلیہ کا بجلی گھر

3.5 آکسیجن تنفس کی میکانیت (Mechanism Of Aerobic Respiration)


آکسیجن کی موجودگی میں نشاءتہ کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2)، پانی اور 686 کلو حرارے (Kcal) توانائی میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تمام کیمیائی تعاملات خلوی تنفس کے دوران آکسیجنی تنفس کے تین مراحل میں تکمیل پاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ شکر پاشیدگی (Glycolysis) دوسرا مرحلہ کرب کا دور (Kreb's Cycle) اور تیسرا مرحلہ الیکٹران منتقلی (Electron Transport) کہلاتا ہے۔

(1) شکر پاشیدگی (Glycolysis)

یہ عمل خلیہ کے خلیہ مایہ (Cytoplasm) میں انجام پاتا ہے۔ یہ آکسیجن اور غیر آکسیجن دونوں اقسام کے تنفس میں ایک مشترک مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ میں آکسیجن استعمال نہیں ہوتی اس لئے اس کو غیر آکسیجنی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ شکر پاشیدگی کے مختلف تعاملات کے سلسلہ کو

دو جرمن سائنسدان ایمڈین (Embden) اور میرہوف (Meyerhof) نے دریافت کیا۔ اس لئے شکر پاشیدگی (Glycolysis) کو ایمڈین میرہوف راستہ (Embden Meyerhof Path Way) کہا جاتا ہے۔

شکر پاشیدگی کے دوران سب سے پہلے گلوکوز کا ایک سالمہ اے ٹی پی (ATP) کے ایک سالمہ کے ساتھ تعامل کر کے فاسفیٹ (Phosphate) کے ایک سالمہ کو استعمال کرتا ہے اور گلوکوز 6 فاسفیٹ (Glucose -6 phosphate) میں تبدیل ہو جاتا ہے اس عمل کو فاسفوریلٹ (Phosphorylation) کہا جاتا ہے۔ گلوکوز 6 فاسفیٹ کی فرکٹوز 6 فاسفیٹ (Fructose-6Phosphate) میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ فرکٹوز 6 فاسفیٹ کا ایک سالمہ ATP کے ساتھ ترکیب کھا کر فرکٹوز 1،6 ڈائی فاسفیٹ (Fructose-1-6 Diphosphate) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرکٹوز 1،6 ڈائی فاسفیٹ سے پائروک ترشہ (Pyruvic Acid) کے دو سالمات حاصل ہوتے ہیں جس کے دوران کئی درمیانی مرکبات پیدا ہوتے ہیں۔



فصل 3.8 شکر پاشیدگی

گلوکوز کے ایک سالمہ کی شکر پاشیدگی کے اختتام پر پائروک ترشہ کے دو سالمات، ATP کے چار سالمات، $\text{NADH}_2 + 2\text{H}^+$

کے دو سالمات تیار ہوتے ہیں لیکن شکر پاشیدگی کے دوران ATP کے دو سالمات خرچ کر لئے جاتے ہیں۔ اس طرح اس مرحلہ میں نقد


حاصل ہونے والے ATP کے سالمات کی تعداد 2 ہوتی ہے $4 - 2 = 2$

شکر پاشیدگی کے اختتام پر حاصل ہونے والے پائروک ترشہ کو اگر آکسیجن دستیاب ہو جائے تو یہ کرب کے دور

(Kreb's Cycle) میں داخل ہو جاتا ہے جس کے دوران واقع ہونے والے تعاملات کے نتیجہ میں CO_2 ، پانی اور ATP حاصل ہوتے

ہیں۔ اگر آکسیجن دستیاب نہ ہو تو پائروک ترشہ کرب کے دور (Kreb's Cycle) میں داخل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایتھائل الکولیل یا لیکٹک

ترشہ اور CO_2 میں تبدیل ہوتا ہے۔



فصل 3.9

گلوکوز کی تبدیلی کا انحصار آکسیجن کی موجودگی اور غیر موجودگی پر ہوتا ہے۔

(2) کرب کا دور (Kreb's Cycle)

شکر پاشیدگی (Glycolysis) کے اختتام پر حاصل ہونے والا پائروک ترشہ (Pyruvic Acid) توانیہ

(Mitochondria) کے اندر قالب (Matrix) میں پہنچ جاتا ہے جہاں آکسیجن کے ذریعہ اس کی مکمل ٹھکید (Oxidation) عمل میں آتی

ہے۔

پائروک ترشہ کی مکمل ٹھکید کے دوران واقع ہونے والے کیمیائی تعاملات کا دوری سلسلہ جس کے نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) اور پانی (H_2O) حاصل ہوتے ہیں کربس دور کہلاتا ہے۔

ان تعاملات کو سرہانس کرب (Sri Hans Krebs) نے دریافت کیا۔ اس لئے ان کو کرب کے دور (Kreb's Cycle) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ کرب کے دور کو سیڑک ترشہ دور (Citric Acid Cycle) یا نرائی کار بوآ کز لک ترشہ دور



فصل 3.10


سرہانس کرب (Sri Hans Krebs)

(Tricarboxylic Acid Cycle) یا کار بوک ترشہ دور (Carbonic Acid Cycle) بھی کہا جاتا ہے۔ پائروک ترشہ توانیہ کے قالب میں ہم خامرہ اے (Coenzyme A) کے ساتھ تعامل کرتا ہے اور اسٹیکل ہم خامرہ اے (Acetyl CoA) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسٹیکل ہم خامرہ کرب کے دور میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا اسٹیکل ہم خامرہ دراصل شکر پاشیدگی (Glycolysis) اور کرب کے دور (Kreb's Cycle) کے درمیان اتھالی کڑی ہے۔ توانیہ کے قالب میں موجود آکزالوٹیک ترشہ (Oxaloacetic Acid) کے ساتھ تعامل کے نتیجے میں سیڑک ترشہ (Citric Acid) تیار ہوتا ہے جو کرب کے دور میں سب سے پہلے تیار ہونے والا

اس لئے کرب کے دور کو سٹرک ترشہ دور (Citric Acid Cycle) یا کاربوئک ترشہ دور (Carbonic Acid Cycle) کہا جاتا ہے۔ سٹرک ترشہ ایک کاربوآکزیٹک ترشہ (Carboxylic Acid) ہے جس میں تین COOH گروپس پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کرب کے دور کو ٹرائی کاربوآکزیٹک دور (Tricarboxylic Cycle) بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں کئی درمیانی مرکبات حاصل ہوتے ہیں اور بالآخر ایزووالرٹیک ترشہ (Oxaloacetic Acid) پیدا ہوتا ہے جو لیسٹائل ہم خامرہ اے (Acetyl CoA) جو پائروک ترشہ (Pyruvic Acid) سے حاصل ہوتا ہے کے ساتھ ترکیب کے لئے تیار رہتا ہے۔ اس طرح کرب کا دور متواتر عمل کے قابل رہتا ہے۔ گلوکوز کے ایک سالمہ کی مکمل بحید کے لئے دو مرتبہ کرب کا دور واقع ہوتا ہے۔ اس دور میں مختلف خامرے (Enzymes) استعمال کئے جاتے ہیں۔ الیکٹرانس (Electrons) کو آزاد کرنے والے خامرے کرب کے دور میں ازالہ ہائیڈروجن (Dehydrogenase) اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو آزاد کرنے والے خامرے (Decarboxylase) کہلاتے ہیں۔ پائروک ترشہ کے ایک سالمہ کی مکمل بحید کے نتیجہ میں 3CO_2 ، $4\text{NADH}+4\text{H}^+$ ، FADH_2 اور 1ATP کے سالمات حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا گلوکوز کے ایک سالمہ کی مکمل بحید کے نتیجہ میں 6CO_2 ، $8\text{NADH}+8\text{H}^+$ ، 2FADH_2 اور 2ATP کے سالمات پیدا ہوتے ہیں۔ کرب کے دور میں راست طور پر تشکیل پانے والے زیادہ توانائی کے مرکب گوانوسین ٹرائی فاسفیٹ (Guanosine Triphosphate) کہا جاتا ہے۔

الکٹران منتقلی (Electron Transport)

توانیہ (Mitochondrion) کی اندرونی عشاء کے کرسٹی (Cristae) پر الکٹران منتقلی نظام (Electron Transport System) پایا جاتا ہے۔ الکٹران کی منتقلی کرسٹی (Cristae) پر انجام پاتی ہے۔ الکٹران منتقلی نظام میں ایم این، ایم این (FMN) کو اینزائم اے (COA)، سائو کروم بی (Cytochrom-b)، سائو کروم سی (Cytochrom-C1)، سائو کروم سی 2 (Cytochrome C2)، سائو کروم اے (Cytochrom A) اور سائو کروم اے 3 (Cytochrom A3) پائے جاتے ہیں جن کو الکٹران قبل کنندہ (Electron Acceptors) یا (Electron Carriers) کہا جاتا ہے۔ یہ الکٹران قبول کنندے ایک زنجیر کی طرح کڑیوں میں ترتیب پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ شکر پاشیدگی (Glycolysis) اور کرب کے دور (Kreb's Cycle) کے دوران تیار ہونے والے تحویل شدہ $H^+ + NADH$ (Reduced) اور $FADH_2$ میں موجود الکٹران ایک قبول کنندہ Acceptor سے دوسرے قبول کنندہ کو منتقل کردئے جاتے ہیں۔ اس لئے اس الکٹران قبول کنندوں کی زنجیر کو الکٹران منتقلی زنجیر (Electron Transport) کہا جاتا ہے۔ الکٹرانس کی منتقلی کے دوران توانائی آزاد ہوتی ہے جو ATP کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ الکٹرانس اور پروٹانس بالآخر آکسیجن (Oxygen) کو منتقل کردئے جاتے ہیں جس کے باعث پانی تیار ہوتا ہے۔




ATP کی تیاری کے دوران ADP کا ایک سالمہ فاسفیٹ (Phosphate) کے ایک سالمہ کو قبول کرتا ہے۔ اس عمل کو فاسفوریت (Phosphorylation) کہا جاتا ہے۔



ظہوی تنفس کے دوران ATP کی تیاری آکسیجن کی موجودگی میں انجام پاتی ہے۔ اس لئے اس عمل کو تکیدی فاسفوریت (Oxidative Phosphorylation) کہا جاتا ہے۔ توانیہ (Mitochondrion) میں $NADH$ اور H^+ کے ہر ایک سالمہ کی تکید کے نتیجہ میں ATP کے تین سالمات اور پانی کا ایک سالمہ تیار ہوتا ہے جب کہ $FADH_2$ کے ایک سالمہ کی تکید کے نتیجہ میں ATP کے

صرف دو سالمات اور پانی کا ایک سالمہ حاصل ہوتا ہے۔




فکل 3.12

الکٹران منتقلی زنجیر

گلوکوز کے ایک سالمہ کی مکمل شکید کے نتیجہ میں ATP کے 40 سالمات حاصل ہوتے ہیں لیکن ATP کے دو سالمات استعمال کئے جاتے ہیں اس طرح گلوکوز کے ایک سالمہ کی شکید کے نتیجہ میں ATP کے نقد 38 سالمات حاصل ہوتے ہیں۔ ATP کے ایک سالمہ کی آب پاشیدگی سے 7200 حرارے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ATP کے جملہ 38 سالمات کی آب پاشیدگی کے نتیجہ میں $38 \times 7200 = 273600$ حرارے توانائی (273.6 کلو حرارے) حاصل ہوتی ہے جو گلوکوز کے ایک سالمہ میں ذخیرہ شدہ جملہ توانائی کا 40 فیصد ہوتی ہے۔

3.6 اے ٹی پی ATP کے استعمالات

تنفس کے دوران حاصل ہونے والے اے ٹی پی (ATP) کے سالمات جسم کی مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے کے لئے توانائی مہیا کرتے ہیں اے ٹی پی سے حاصل ہونے والی توانائی کاربوہائیڈریٹس، لچمیات (Protiens)، شمیات (Lipids) اور توانائی ترشوں (Nucleic Acids) کی تالیف، رواں (Ions) کی منتقلی، صمیی صمچامات (Nerve Impulse) کی ترسیل (Conduction)، ایمائی حرکت، ہدیوں (Cilia) اور سوطیوں (Flagella) کی حرکت، عضلاتی انقباض اور غذائی مقویات کی منتقلی وغیرہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔



شکل 3.13
ATP کے استعمال

3.7 تنفس پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors Affecting Respiration)

تنفس کی شرح پر مختلف بیرونی اور اندرونی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان عوامل کے متعلق معلومات پھلوں، بیجوں، ترکاریوں اور دوسری غذائی اشیاء کو نہ صرف محفوظ رکھنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں بلکہ تنفس کی شرح کو قابو میں رکھنے کے لئے، ادویات تجویز کرنے، ان ادویات کے استعمال کے ذریعہ مختلف امراض پر قابو پانے اور ضار (Pest) اور طفیلی تعدیے کو قابو میں رکھنے میں مدد و معاون ہوتی ہیں۔ ان

عوامل میں تبدیلی شرح تخفس کو متاثر کرتی ہے جس کے باعث توانائی کے اہم ذرائع یعنی کاربوہائیڈریٹس، لہسیات اور خمی ترشے بہتر طور پر استعمال نہیں ہوتے جس کے نتیجہ میں توانائی کم پیدا ہوتی ہے۔


(I) بیرونی عوامل (External Factors)

تخفس کی شرح پر اثر انداز ہونے والے بیرونی عوامل میں درجہ حرارت، روشنی، آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور بعض کیمیائی مرکبات وغیرہ شامل کئے جاتے ہیں۔

(ii) درجہ حرارت (Temperature)

درجہ حرارت شرح تخفس پر کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ 0°C تا 45°C درجہ حرارت کے درمیان ہر 10°C درجہ حرارت میں اضافے پر تخفس کی شرح دوگنی ہو جاتی ہے جس کو وائٹ ہاف کا قانون (Van Hoff's Law) کہا جاتا ہے۔ درجہ حرارت 30°C جس پر تخفس کی شرح اعظم ترین ہوتی ہے متوازن درجہ حرارت (Optimum Temperature) کہلاتی ہے۔ متوازن درجہ حرارت کے اوپر یا نیچے تخفس کی شرح میں کمی دیکھی جاتی ہے۔ کم درجہ حرارت پر خامرے (Enzymes) غیر عامل (Inactive) ہوتے ہیں جب کہ زیادہ درجہ حرارت پر خامرے ازالہ لہسیات (Deproteinization) ہو جانے کے سبب ضائع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت پر وقت کے ساتھ تخفس کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کے اس اثر کی بنیاد پر ریفریجریٹر اور سرد ذخیرہ خانوں میں غذائی اشیاء زیادہ مدت تک محفوظ رکھی ہے۔

لہذا درجہ حرارت اور تخفس کی شرح کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے جس کو ذیل میں ترسیم کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے۔




شکل 1.14 ترسیم (گراف) کے ذریعہ درجہ حرارت اور تخفس کے درمیان تعلق کا اظہار

عملی مشاہدہ: تنفس کے دوران توانائی خارج ہوتی ہے

جب تنفس کے دوران جسم کے خلیوں (Cells) میں غذائی مادوں کی تکسید واقع ہوتی ہے تو توانائی پیدا ہوتی ہے جس کی کچھ مقدار حرارت کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس مظہر کو ذیل کے تجربہ کے ذریعہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔
تجربہ:

تجربہ کو انجام دینے سے ایک دن قبل دو منقاروں (Beakers) کو لیجئے۔ ایک منقارہ میں پانی ڈالئے۔ دونوں منقاروں میں مٹریا سیم کی بیجوں کو ڈالئے اور تمام رات کے لئے چھوڑ دیجئے۔ پانی لئے ہوئے منقارہ میں بیج ابھرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب دو تھرماں بوتل لیجئے جن کے منہ چوڑے ہوں۔ ایک تھرماں بوتل میں ابھرتے ہوئے بیجوں کو ڈالئے اور دوسرے تھرماں بوتل میں خشک بیجوں کو ڈالئے۔ دونوں تھرماں بوتلوں کے منہ کو ڈاٹ سے اچھی طرح بند کر دیجئے۔ ڈاٹ میں ایک سراج کیجئے۔ اس سراج سے تھرما میٹر کو داخل کیجئے۔ اس بات کا خیال رکھئے کہ تھرما میٹر کا جوندہ (Bulb) بیجوں کے درمیان میں ہو۔ درجہ حرارت کو ہر دو یا تین گھنٹوں کے وقفہ سے تقریباً 24 گھنٹوں تک نوٹ کرتے جائیے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ابھرتے ہوئے بیجوں میں تنفس کا عمل واقع ہوگا جبکہ خشک بیجوں میں تنفس واقع نہیں ہوگا۔ لہذا آپ اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ ابھرتے ہوئے بیجوں کے تھرماں بوتل کی پیش خشک بیجوں والے تھرماں بوتل کی پیش کی بہ نسبت زیادہ ہوگی۔ اس مشاہدہ سے یہ ثابت ہوگا کہ ابھرتے ہوئے بیجوں میں تنفس کی وجہ سے حرارت خارج ہوتی ہے۔



شکل 3.15 "تنفس کے دوران توانائی خارج ہوتی ہے" ظاہر کرتی ہوئی بوتلیں۔

(ii) روشنی (Light)

روشنی بالواسطہ تنفس کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے چون کہ یہ درجہ حرارت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ خاص کر پودوں میں تنفس کی شرح پر روشنی کا اثر ہوتا ہے جس کو ضیائی تنفس (Photorespiration) کہا جاتا ہے۔ ہبز پودوں میں روشنی کی وجہ سے شعاعی ترکیب (Photosynthesis) کا عمل انجام پاتا ہے جس کے نتیجہ میں کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ تیار ہوتا ہے جو تنفس کے دوران نکسید یا کرتوانائی پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ لہذا روشنی شرح تنفس پر بالواسطہ اثر انداز ہوتی ہے۔

(iii) آکسیجن کا ارتکاز (Concentration of Oxygen)

ماحول میں آکسیجن کا ارتکاز شرح تنفس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کرہ فضاء میں آکسیجن کا ارتکاز 21 فی صد ہوتا ہے جو مستقل رہتا ہے۔ سٹلرک ایسڈ دور (Citric Acid Cycle) میں آکسیجن ضروری ہے اور الیکٹران عقلی زنجیر کے آخری مرحلہ پر الیکٹران کو قبول کرنے کے لئے آکسیجن پائی جاتی ہے۔ لہذا آکسیجن کی غیر موجودگی میں $FADH_2$ اور $NADH$ کی نکسید واقع نہیں ہوتی اور اے ٹی پی (ATP) کی تیاری عمل میں نہیں آتی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آکسیجن کا ارتکاز شرح تنفس پر اثر انداز ہوتا ہے۔


آکسیجن کی کمی یا غیر موجودگی کے دوران CO_2 کا اخراج صرف غیر آکسیجنی تنفس کے ذریعہ واقع ہوتا ہے۔ اگر ان صورتوں میں آکسیجن کے ارتکاز کو بڑھا دیا جائے تو غیر آکسیجنی تنفس کی جگہ آکسیجنی تنفس انجام پانا شروع ہو جاتا ہے۔

آکسیجن کا اعلیٰ ارتکاز مختلف تنفسی خامروں (Respiratory Enzymes) کو نکسید (Oxidation) کے ذریعہ غیر فعلی بنادیتا ہے جس کے باعث شرح تنفس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

عملی مشاہدات

(a) آکسیجن کی غیر موجودگی میں تنفس کا عمل

آکسیجن کی غیر موجودگی میں واقع ہونے والے غیر آکسیجنی تنفس (Anaerobic Respiration) کا عملی مشاہدہ کرنے کے لئے ایک چمڑے منہ والی کانچ کی بوتل لیجئے۔ اس بوتل میں 150 تا 200 ملی لیٹر گلوکوز کے محلول اور بیکرس خمیر (Bakers Yeast) کو داخل کیجئے۔ گلوکوز کے محلول پر تیل ڈالئے جو گلوکوز کے محلول کو ڈھانک لیتا ہے اور آکسیجن کو گلوکوز کے محلول سے راست تماس میں آنے سے روکتا ہے اس بوتل کو بر کے ڈاٹ سے بند کر دیجئے اور بوتل کے منہ پر گریس لگائیے۔ ایک یا دو دن تک اس بوتل کو اسی حالت میں رکھنے کے بعد کھولیں اس سے الکل کی بو کو آپ واضح طور پر محسوس کریں گے اس مشاہدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں خمیر (Yeast) میں غیر آکسیجنی تنفس انجام پاتا ہے جس کے دوران ایستھائل الکل پیدا ہوتا ہے۔




بیکری میں ۱۔ تھائل الکحل تیار نہیں ہوتا۔
 بیکری میں گلکوز کے محلول کو تیل کی پرت سے
 ڈھانکنے پر دو یا تین دنوں میں غیر آنکھنی تخفص کے
 واقع ہونے کی وجہ سے تھائل الکحل کی بو آتی ہے۔

(b) آکسیجن کی موجودگی میں تخفص کا عمل

آکسیجن کی موجودگی میں واقع ہونے والے آکسیجن تخفص (Aerobic Respiration) جس کے دوران CO_2 گیس پیدا ہوتی ہے کا عملی مشاہدہ کرنے کے لئے چوڑے منہ والی کاٹچ ٹی دو بوتلوں کو لیجئے۔ ایک بوتل میں اچھتے ہوئے بیجوں کو اور دوسری بوتل میں خشک بیجوں کو داخل کیجئے۔ دونوں بوتلوں میں ایک ایک منقارہ (Beaker) رکھیے جس میں چوڑے منہ والی موجود ہو۔ ان بوتلوں کے منہ کو ربر کے ڈاٹ سے اچھی طرح بند کر دیجئے اور ان کے منہ کے اطراف گرہیں لگائیے تاکہ CO_2 گیس باہر خارج نہ ہو سکے۔ اب ان بوتلوں کو ایک یا دو دن کے لئے اسی حالت میں رکھیے۔ بوتل میں رکھے ہوئے منقارہ میں چوڑے منہ والی کے پانی کے رنگ کا مشاہدہ کیجئے۔ صرف وہ بوتل جس میں

اجتہے ہوئے بیج موجود تھے اس کے منقار میں چونے کا پانی دو دھیافید دکھائی دے گا۔ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان اجتہے ہوئے بیجوں میں آکسیجنی تنفس واقع ہوا جس کے نتیجہ میں CO_2 گیس پیدا ہوتی ہے۔ CO_2 گیس چونے کے پانی میں سفید رسوب تیار کرتی ہے جس سے چونے کا پانی دو دھیافید دکھائی دیتا ہے۔




شکل 3.18
آکسیجنی تنفس

(iv) کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز (Concentration of Carbondioxide)
کرہ فضاء میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز 0.03 فی صد ہوتا ہے۔ اس کے ارتکاز میں اضافہ شرح تنفس میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ CO_2 کے اعلیٰ ارتکاز ان تمام سرگرمیوں کو روک دیتا ہے جنہیں توانائی درکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرہ فضاء میں CO_2 کے زیادہ ارتکاز پر پھلوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔

(v) موانع (Inhibitors)

بعض کیمیائی عناصر تنفس میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں جنہیں تنفس موانع (Respiratory Inhibitors) کہا جاتا ہے جیسے

کاربن مانو آکسائیڈ (Carbon Monoxide)، سیانائیڈ (Cyanide) اور میلوئیٹ (Malonate) تنفسی خامروں (Respiratory Enzymes) کی کارکردگی میں مائع ہوتے ہیں جس کے سبب شرح تنفس میں کمی واقع ہوتی ہے۔



فصل 3.19
گیاسنگ کا تنفسی میٹر

(II) اندرونی عوامل (Internal Factors)

شرح تنفس پر اثر انداز ہونے والے اندرونی عوامل میں خورمائی کیفیات (Protoplasmic Conditions) اور تنفسی مادے

(Respiratory Substances) شامل ہیں۔

(a) خورمائی کیفیات (Protoplasmic Conditions)

خورمائی کیفیات جیسے خورمائی کی مقدار، خورمائی میں تنفسی خامروں (Respiratory Enzyme) کی مقدار اور اقسام اور پانی

کی مقدار میں اضافہ شرح تنفس میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔

(b) تنفسی مادے (Respiratory Substances) تنفس کے دوران خمیدہ پانے والے مادوں جیسے گلوکوز، فرکٹوز اور مالٹوز وغیرہ کی دستیابی میں اضافہ بھی شرح تنفس میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔

4 خلاصہ

تنفس ایک حیاتیاتی خمیدی تعامل ہے جو جاندار عضوہوں کے تمام خلیوں میں انجام پاتا ہے جس کے دوران تنفسی مادے (Respiratory Substrate) جیسے گلوکوز، فرکٹوز، مالٹوز، وغیرہ نامیاتی سالمات (غذا) خامروں (Enzymes) کے زیر اثر خمیدہ پاتے ہیں جس کے نتیجہ میں توانائی، کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور حرارت پیدا ہوتے ہیں۔ توانائی زندگی کی تمام ہر گرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے حرارت اور جسمانی تپش کو برقرار رکھنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ بیرونی تنفس کے دوران O_2 اور CO_2 گیسوں کا تبادلہ تنفسی اعضاء اور اوگرڈ کے ماحول کے درمیان واقع ہوتا ہے جو دم درکشی اور دم براری دوسرے ماحول پر مشتمل ہوتا ہے۔ اندرونی تنفس کے دوران O_2 اور CO_2 گیسوں کا تبادلہ خون اور بافتوں کے بین خلی مائع کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ خلی تنفس کے دوران O_2 اور CO_2 کا تبادلہ بافتوں کے بین خلی مائع اور خلیوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ خلی تنفس کے دوران خلیوں میں خامروں کے زیر اثر غذائی سالمات خمیدی اور غیر خمیدی دونوں اقسام کے تعاملات کو مختلف مراحل میں انجام دیتے ہیں جس کے نتیجہ میں توانائی، CO_2 ، پانی اور حرارت پیدا ہوتے ہیں۔ تنفس کا تقابل احراق سے کیا جاسکتا ہے۔ تنفس ایک حیاتیاتی خمیدی تعامل ہے جو منظم ہوتا ہے اور خامروں کے زیر اثر سلسلہ وار مراحل میں جسم کے اندر انجام پاتا ہے اور توانائی سلسلہ وار مراحل میں آزاد ہوتی ہے۔ جب کہ احراق ایک کیمیائی خمیدی تعامل ہے جو جسم کے باہر آکسیجن کی موجودگی میں انجام پاتا ہے جو بغیر خامروں کے غیر منظم طور پر واقع ہونے والا عمل ہے جس کے دوران توانائی بیک وقت آزاد ہو جاتی ہے۔ غیر آکسجنی تنفس سے مراد ایسا تنفس جو آکسیجن کی غیر موجودگی میں انجام پاتا ہے جس کے دوران گلوکوز کا سالمہ خامرے کے زیر اثر CO ، 4 جھائل الکحل اور 57 کیلو حرارے توانائی پیدا کرتا ہے۔

غیر آکسجنی تنفس دو مراحل (a) شکر پاشیدگی (Glycolysis) اور (b) تخمیر (Fermentation) کے ذریعہ پیمیل پاتا ہے شکر پاشیدگی (Glycolysis) سے مراد ایسا کیمیائی عمل ہے جس کے دوران گلوکوز کا ایک سالمہ پائروک ترشہ کے دوسالمات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل خلیہ کے خلیہ مایہ میں انجام پاتا ہے۔ تخمیر سے مراد ایسا کیمیائی عمل جس کے دوران پائروک ترشہ ایسٹ کے خلیوں میں موجودہ

زائمز (Zymase) نامی خامرے کے ذریعہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں انحطاطی الکحل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہوتا ہے۔ درزش کے دوران عضلاتی خلیوں میں واقع ہونے والے غیر آکسجنی تنفس کے دوران لیکٹک ترش (Lactic Acid) تیار ہوتا ہے۔ آکسجنی تنفس سے مراد ایسا تنفس ہے جو آکسیجن کی موجودگی میں انجام پاتا ہے جس کے دوران گلوکوز کے ایک سالمہ کی آکسیجن کی موجودگی میں مکمل نمکد کے نتیجہ میں CO_2 ، پانی اور 686 کیلو حرارے توانائی پیدا ہوتی ہے۔

آکسجنی تنفس تین مراحل یعنی پہلا شکر پاشیدگی دوسرا کرب کا دور اور تیسرا الیکٹران منتقلی کے ذریعہ مکمل پاتا ہے۔ گلوکوز کے ایک سالمہ کی شکر پاشیدگی کے اختتام پر پائروک ترشے کے دو سالمات ATP کے چار سالمات $\text{NADH}_2 + 2\text{H}^+$ کے دو سالمات تیار ہوتے ہیں۔ شکر پاشیدگی کے دوران حاصل ہونے والے ATP کے چار سالمات میں سے دو سالمات صرف کر لئے جاتے ہیں اس طرح نقد حاصل ہونے والے ATP کے سالمات کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ کرب کا دور توانیہ کے قالب میں انجام پاتا ہے۔ شکر پاشیدگی کے اختتام پر حاصل ہونے والا پائروک ترشہ اگر آکسیجن موجود ہو تو کربس کے دور میں داخل ہوتا ہے۔ اس دور میں سب سے پہلے تیار ہونے والا مرکب سہڑک ترشہ ہے۔ کرب کے دور میں پائروک ترشہ کے ایک سالمہ کی مکمل نمکد کے نتیجہ میں CO_2 کے 3 سالمات، $\text{NADH} + \text{H}^+$ کے چار سالمات، FADH_2 کا ایک سالمہ اور ATP کا ایک سالمہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح گلوکوز کے ایک سالمہ کی مکمل نمکد کے نتیجہ میں 6CO_2 ، $8\text{NADH} + 8\text{H}^+$ ، 2FADH_2 اور 2 ATP کے سالمات حاصل ہوتے ہیں۔

الیکٹران منتقلی زنجیر توانیہ کی اندرونی خضاء کے کرشی (Cristae) پر واقع آکسی زومس (Oxysomes) پر پائی جاتی ہے۔ الیکٹران منتقلی زنجیر الیکٹران قبول کنندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ الیکٹران کی منتقلی کے دوران آزاد ہونے والی توانائی ATP کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ الیکٹرانس بالآخر آکسیجن کو منتقل کر دیئے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں پانی حاصل ہوتا ہے۔

خلوی تنفس کے دوران آکسیجن کی موجودگی میں ATP کی تیاری کا مکمل نمکدی فاسفوریلٹ کہلاتا ہے۔ گلوکوز کے ایک سالمہ کی نمکد کے نتیجہ میں ATP کے نقد 38 سالمات حاصل ہوتے ہیں ATP کے ایک سالمہ کی آب پاشیدگی سے 7200 حرارے توانائی پیدا ہوتی ہے اور ATP کے جملہ 38 سالمات کی آب پاشیدگی سے 273.6 کیلو حرارے توانائی حاصل ہوتی ہے جو گلوکوز کے ایک سالمہ میں ذخیرہ شدہ جملہ توانائی کا 40% ہوتی ہے۔

تنفس پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں بیرونی عوامل جیسے درجہ حرارت، روشنی، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور بعض کیمیائی مرکبات شامل کئے جاتے ہیں۔ متوازن درجہ حرارت (Optimum Temperature) پر تنفس کی شرح اعظم ترین ہوتی ہے۔ ایجتے

ہوئے بیجوں میں تنفس کی وجہ سے توانائی حرارت خارج ہوتی ہے۔ روشنی شرح تنفس پر بالواسطہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آکسیجن کا زیادہ ارتکاز شرح تنفس میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ CO_2 کے ارتکاز میں 0.03% سے زیادہ ارتکاز شرح تنفس میں کمی کا سبب بنتا ہے۔

کاربن مانو آکسائیڈ، سیانائیڈ، اور میلوینٹ شرح تنفس میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ انہیں تنفسی سوانح (Respiratory Inhibitors) کہا جاتا ہے۔ شرح تنفس پر اثر انداز ہونے والے اندرونی عوامل میں بخربائی کیفیات اور تنفسی مادے شامل ہیں۔ ان کی دستیابی میں اضافہ شرح تنفس میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔

5 زائد معلومات

کوری دور (Cori Cycle)

عضلاتی گلائیکوجن (Muscle Glycogen) کا جگری گلائیکوجن (Liver Glycogen) میں تبدیلی اور اس کا معکوس (Vice Versa) کوری دور کہلاتا ہے۔ کوری دور ذیل کے مراحل کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے۔

(1) عضلاتی انقباض کے دوران عضلاتی گلائیکوجن کی گلوکوز-6 فاسفیٹ (Glucose-6 Phosphate) میں تبدیلی واقع ہوتی

ہے۔


(2) گلوکوز-6 فاسفیٹ شکر پاشیدگی کے ذریعہ پائروک ترشہ (Pyruvic Acid) میں تبدیل ہوتی ہے۔

(3) پائروک ترشہ لیکٹک ترشہ (Lactic Acid) میں تبدیل ہوتا ہے۔

(4) عضلات میں تیار ہونے والے لیکٹک ترشہ کا 80% حصہ خون میں داخل ہو کر جگر میں پہنچ جاتا ہے جہاں یہ جگری گلائیکوجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

(5) جگری گلائیکوجن کی تقسیم سے گلوکوز حاصل ہوتا ہے۔

(6) گلوکوز خون میں نفوذ ہو کر عضلات کو پہنچا دیا جاتا ہے جہاں یہ عضلاتی گلائیکوجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



شکل 3.20

کوری کا دور (Cori Cycle)

فرہنگ اصطلاحات

6



انگریزی اصطلاح	تلفظ	اردو اصطلاح	تشریح
Eukaryotic Cell	ایوکیئر یا تک سیل	کامل نوائی خلیہ	ایسا خلیہ جس میں مرکزہ منظم ہوتا ہے جو مرکزی غشاء سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔
Prokaryotic Cell	پروکیئر یا تک سیل	پیش نوائی خلیہ	ایسا خلیہ جس میں مرکزہ غیر منظم ہوتا ہے۔
Oxidation	آکسید ڈیشن	تکسید	ایسا کیمیائی تعامل جس میں آکسیجن کا اضافہ ہوتا ہے یا ہائیڈروجن یا الیکٹرانس خارج ہوتے ہیں۔
Inhibitor	انہیٹر	موانع	تبادل کو روکنے والے عناصر یا عوامل



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) تنفس سے کیا مراد ہے؟
- (2) اندرونی تنفس اور بیرونی تنفس کے درمیان کیا فرق ہے؟
- (3) خلوی تنفس سے کیا مراد ہے؟
- (4) تخمیر سے کیا مراد ہے؟
- (5) غیر آکسیجنی تنفس کے دوران 180 گرام گلوکوز سے حاصل ہونے والی C_2H_5OH ، CO_2 اور توانائی کا محاسبہ کیجئے۔
- (6) شکر پاشیدگی (Glycolysis) سے کیا مراد ہے؟
- (7) آکسیجنی تنفس کے دوران 180 گرام گلوکوز سے حاصل ہونے والی CO_2 ، پانی اور توانائی کا محاسبہ کیجئے۔
- (8) توانیہ کو خلیہ کا بجلی گھر کیوں کہا جاتا ہے؟
- (9) گلوکوز کے ایک سالمہ کی شکر پاشیدگی کے اختتام پر پاروک ترشہ ATP اور $NADH_2 + 2H^+$ کے تجربہ کو پیش کیجئے۔
- (10) کرب کے دور (Krebs Cycle) میں پاروک ترشہ کے ایک سالمہ کی مکمل تکمید کا تجربہ پیش کیجئے۔

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) غیر آکسیجنی تنفس اور آکسیجنی تنفس سے کیا مراد ہے؟ کیمیائی مساوات لکھئے اور تشریح کیجئے۔
- (2) توانیہ (Mitochondria) کی ساخت اور افعال تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (3) کرب کے دور پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- (4) الیکٹران متقلی زنجیر سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (5) اے ٹی پی (ATP) کے استعمال پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- (6) شکر پاشیدگی (Glycolysis) کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (7) تنفس اور کیمیائی احتراق کے مابین مماثل کو پیش کیجئے۔

- (8) تنفس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (9) تھمیدی فاسفوریت (Oxidative Phosphorylation) سے کیا مراد ہے NADH اور $FADH_2$ کی تھمید کے

دوران ATP کس طرح بنتا ہے؟

- (10) تجربہ کے ذریعہ بتائیے کہ تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کی جاتی ہے۔
- (11) آپ کس طرح ثبوت فراہم کریں گے کہ تنفس کے دوران توانائی خارج ہوتی ہے؟
- (12) آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ درجہ حرارت اور تنفس کی شرح کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے؟

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پُر کیجئے

- (1) نامی جزو سے دودھ کو دسی میں تبدیل کرتے ہیں۔
- (2) جسم کے کسی بھی حصہ میں _____ کے منع ہونے سے درد محسوس ہوتا ہے۔
- (3) توانیہ کی اندرونی عطشاء پر پائے جانے والے ابھار _____ کہلاتے ہیں۔
- (4) کرب کے دور میں حصہ لینے والے خامرے (Enzymes) توانیہ کے _____ میں موجود رہتے ہیں۔
- (5) شکر پاشیدگی اور کرب کے دور کے درمیان _____ اتصالی تڑی ہے۔
- (6) توانیہ میں $FADH_2$ کے ایک سالمہ کی تھمید کے نتیجہ میں ATP کے _____ سالمات تیار ہوتے ہیں۔
- (7) گلوکوز کے ایک سالمہ کی تھمید سے حاصل ہونے والی توانائی گلوکوز کے ایک سالمہ میں ذخیرہ شدہ جملہ توانائی کا _____ فیصد ہوتی ہے۔

- (8) $45^{\circ}C$ to $80^{\circ}C$ درجہ حرارت کے درمیان ہر $10^{\circ}C$ درجہ حرارت میں اضافہ پر تنفس کی شرح دوگنی ہو جاتی ہے اس

قانون کو _____ کہا جاتا ہے۔

- (9) پھلوں کو سرد خانہ میں رکھنے سے _____ کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے۔
- (10) الیکٹران متعلق زنجیر کے آخری مرحلہ پر _____ الیکٹران کو قبول کرتی ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) شکر پاشیدگی کے دوران گلوکوز کے ایک سالمے سے ATP کے کتنے نقد سالمات حاصل ہوتے ہیں؟
 (a) 4 (b) 2 (c) 6 (d) 36
- (2) پائروک ترشہ اور ایٹائل ہم خامرہ کے درمیان تعامل سے کونسا مرکب تیار ہوتا ہے؟
 (a) ایٹائل ہم خامرہ اے (b) سیلرک ترشہ (c) FADH₂ (d) پانی
- (3) کرب کے دور میں تیار ہونے والا سب سے پہلا مرکب کونسا ہے؟
 (a) ایٹائل ہم خامرہ اے (b) سیلرک ترشہ (c) آکزالو سلیک ترشہ (d) پائروک ترشہ
- (4) کرب کے دور کے اختتام پر حاصل ہونے والا مرکب کونسا ہے؟
 (a) ایٹائل ہم خامرہ اے (b) سیلرک ترشہ (c) آکزالو سلیک ترشہ (d) پائروک ترشہ
- (5) تو ائیہ میں $\text{NADH} + 2\text{H}^+$ کے ہر ایک سالمے کی یکمید کے نتیجے میں ATP کے کتنے سالمات حاصل ہوتے ہیں؟
 (a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 38
- (6) گلوکوز کے ایک سالمے کی مکمل یکمید کے نتیجے میں ATP کے کتنے نقد سالمات حاصل ہوتے ہیں؟
 (a) 38 (b) 36 (c) 4 (d) 2
- (7) ATP کے ایک سالمے سے کتنے حرارے تو ائی حاصل ہوتی ہے؟
 (a) 7200 (b) 27360 (c) 14400 (d) 57
- (8) عضلات میں پائروک ترشہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں کون سے ترشہ میں تبدیل ہوتا ہے؟
 (a) لیا کٹک ترشہ (b) کسی بھی ترشہ میں بھی تبدیل نہیں ہوتا
 (c) لاکٹک (d) سیلرک ترشہ

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

B	A
() ایمڈین Embden میر ہوف Meyerhof	(1) تنخیر
() شرح تنفس میں کمی	(2) الکتران منتقلی زنجیر
() سر ہینس کرب (Sir Hans Krebs)	(3) توانیہ کے قالب
() میٹشیم ذخیرہ کنندہ	(4) شکر پاشیدگی کا مطالعہ
() پھلوں کا تحفظ	(5) سینرک۔ ترشہ کے دور کا مطالعہ
() فرمائندہ مواد ان ذرات	(6) آکسیجن کا اعلیٰ ارتکاز
	(7) CO_2 کا اعلیٰ ارتکاز
	() ضیائی تنفس
() ٹرائی کاربوآکزیلک دور	(8) تنفس کی شرح پر روشنی کا اثر
() زائیمز (Zymase)	(9) کربن کا دور
() غیر منظم عمل	(10) احتراق

سبق 4 حیوانات میں تنفسی اعضاء

(Respiratory Organs In Animals)

سبق کا خاکہ	1
تمہید	2
سبق کا متن	3
تنفسی اعضاء	3.1
سطحی تنفس	3.2
3.2.1 امیبا (Amoeba) میں تنفس	
جلدی تنفس	3.3
3.3.1 کچھوے میں جلدی تنفس	
3.3.2 مینڈک میں جلدی تنفس	
قصی تنفس	3.4
خیومی تنفس	3.5
3.5.1 مچھلیوں میں خیومی تنفس	
ششی تنفس	3.6
انسانی تنفس	3.7
خلاصہ	4
زائد معلومات	5
فرہنگ	6

7 نمونہ امتحانی سوالات

7.1 مختصر جوابی سوالات

7.2 طویل جوابی سوالات

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجیے

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

1 سبق کا خاکہ

اس سبق میں آپ کو درج ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

- ☆ حیوانات میں مختلف تنفسی اعضاء
- ☆ تنفسی اعضاء کی بنیاد پر تنفسی نظام کی اقسام پیسے سطحی تنفس، جلدی تنفس، قصبی تنفس، خیشوی تنفس، ششی تنفس
- ☆ انسانی تنفس

2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ تنفس کی فعلیات کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ مختلف حیوانات میں مختلف تنفسی اعضاء کی بنیاد پر تنفس کی مختلف اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے چوں کہ مختلف جانے وقوع میں زندگی گزارنے کے لئے حیوانات میں مخصوص جسم کا توازن ضروری ہوتا ہے۔ لہذا آبی اور بری جانے وقوع میں زندگی گزارنے کے لئے مختلف خصوصیات کے حامل حیوانات میں مخصوص تنفسی اعضاء مہیا کرتے ہیں تاکہ حیوانات ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکیں اور باسانی تنفس کے دوران آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ کر سکیں۔ اس لئے اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ حیوانات میں مختلف تنفسی اعضاء کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ نیز آپ انسان میں تنفس کے عمل کو بھی سمجھ سکیں گے۔

3 سبق کا متن

3.1 تنفسی اعضاء (Respiratory Organs)

تمام جاندار عضویوں میں تنفس کے عمل کو انجام دینے کے لئے آکسیجن جسم کے اندر داخل ہوتی ہے جو جسم کے خلیوں میں تنفسی مادوں یعنی گلوکوز کی کھسید (Oxidation) کو انجام دیتی ہے جس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے باہر ماحول میں خارج ہو جاتی ہے۔ لہذا تنفس کے دوران آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔ ان گیسوں کا تبادلہ مخصوص اعضاء کے ذریعہ انجام پاتا ہے جن کو تنفسی اعضاء (Respiratory Organs) کہا جاتا ہے۔ مختلف حیوانات مختلف جانے وقوع میں زندگی گزارنے ہیں۔ بری حیوانات جو خشکی پر زندگی گزارتے ہیں ہوا سے آکسیجن کو حاصل کرتے ہیں اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں ہی خارج

کرتے ہیں۔ جب کہ آبی حیوانات جو پانی میں زندگی گزارتے ہیں پانی میں حل شدہ آکسیجن کو حاصل کرتے ہیں اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پانی میں ہی خارج کرتے ہیں۔ تمام بری حیوانات میں ایک ہی قسم کے تنفسی اعضاء نہیں پائے جاتے کیوں کہ ان میں مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں جیسے جسم کی بناوٹ و جسامت، جائے وقوع کی قسم اور اس میں پانی کی دستیابی اور جسم میں دوران خون کے نظام کی قسم۔ لہذا انسان، جھینگر اور کچھوا جو کہ بری حیوانات ہیں لیکن ان میں پائے جانے والے تنفسی اعضاء بالترتیب پھیپڑے (Lungs)، قصیہ (Trachea)، اور جلد ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام آبی حیوانات میں بھی ایک ہی قسم کے تنفسی اعضاء نہیں ہوتے۔ مثلاً مینڈک اور مچھلی جو کہ آبی حیوانات ہیں مینڈک میں جلد اور پھیپڑوں کے ذریعہ تنفس واقع ہوتا ہے جب کہ مچھلی میں گھمروں (Gills) کے ذریعہ تنفس انجام پاتا ہے۔ لہذا مختلف حیوانات میں مختلف تنفسی اعضاء کی بنیاد پر تنفس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 1 تنفسی اعضاء، تنفس کی قسم معروضوں مثالیں


تنفسی اعضاء	تنفس کی قسم	مثالیں - حیوانات
پلازما غشاء (Plasma membrane)	سطحی (Surface)	امیبا (Amoeba) -
جلد (Skin)	جلدی (Cutaneous)	کچھوا، جو تک، مینڈک -
گھمروے (Gills)	خیشوی (Branchial)	مچھلیاں، بعض کیڑے، مینڈک کا غوطہ سردار۔
پھیپڑے (Lungs)	ششی (Pulmonary)	پستایے، پرند، ہوام اور بعض جل تھیلے۔
قصیہ (Trachea)	قصی (Tracheal)	حشرات -

3.2 سطحی تنفس (Surface Respiration)

ایسا تنفس جو پلازما غشاء کی سطح کے ذریعہ انجام پاتا ہے سطحی تنفس (Surface Respiration) کہلاتا ہے جو یک خلوی (Unicellular) حیوانات جیسے امیبا میں دکھائی دیتا ہے۔

3.2.1 امیبا (Amoeba) میں تنفس

امیبا (Amoeba) ایک خلوی حیوانات سے تعلق رکھتا ہے جن کا شمار جانداروں حیوانیہ (Protozoa) میں کیا جاتا ہے۔ یہ پانی میں زندگی گزارتا ہے۔ اس میں تنفس کا عمل نفوذ پذیری (Diffusion) کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ نفوذ پذیری سے مراد ایسا طبیعی عمل ہے جس میں کوئی شے زیادہ ارتکاز والے حصہ سے کم ارتکاز والے حصہ کی طرف منتقل ہوتی ہے تاکہ ہر حصہ میں اس شے کا ارتکاز مساوی ہو جائے۔ امیبا میں تنفس بیرونی غشاء کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ بیرونی غشاء انتخابی نیم نفوذ پذیری غشاء (Selective Semi Permeable Membrane) ہوتی ہے جو بعض مخصوص مادوں کو ہی خلیہ کے اندر یا خلیہ سے باہر گزرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ امیبا کے خلیہ میں پانی جانے والی آکسیجن کا ارتکاز بیرونی ماحول کے پانی میں پائی جانے والی مل شدہ آکسیجن کے ارتکاز کی نسبت کافی کم ہوتا ہے اس لیے آکسیجن بیرونی ماحول کے پانی سے امیبا کے خلیہ میں بیرونی غشاء کے ذریعہ عمل نفوذ پذیری کے باعث داخل ہوتی ہے۔ تنفس کے دوران تکسیدی تعامل کے نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز امیبا کے خلیہ میں بڑھ جاتا ہے۔ جو بیرونی ماحول کے پانی میں پائی جانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا کاربن ڈائی آکسائیڈ امیبا کے خلیہ سے بیرونی ماحول کے پانی میں نفوذ ہو جاتی ہے۔



شکل 4.1

امیبا میں نفوذ کے ذریعہ تنفس

3.3 جلدی تنفس (Cutaneous Respiration)

ایسا تنفس جو جلد کے ذریعہ انجام پاتا ہے جلدی تنفس (Cutaneous Respiration) کہلاتا ہے۔ جلد جو مرطوب رہتی ہے اور جس میں خون کی شعریائیں (Blood Capillaries) بکثرت موجود رہتی ہیں تنفسی اعضاء کا فعل انجام دیتی ہے۔ وینگلیس (Wigglesworth) کے مطابق تمام پس حیوانات (Metazoans) (کثیر خلوی حیوانات) میں حقیقی تنفسی عضو جلد ہے۔ جلدی تنفس بعض غیر فقریوں جیسے حلقیوں (Annelids) رخویوں (Mollusks) اور بری انبوڈس (Isopods) میں اور بعض فقریوں جیسے مچھلیوں (Fishes)، جل تھلیوں (Amphibians) اور سمندری سانپوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اس سبق میں کچھ، اور میٹازک میں جلدی تنفس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔


3.3.1 کچھ میں جلدی تنفس (Cutaneous Respiration in Earthworm)

کچھ (Earthworm) میں مخصوص تنفسی اعضاء نہیں پائے جاتے۔ اس میں تنفس مرطوب جلد کے ذریعہ ہی انجام پاتا ہے جو جلدی تنفس کہلاتا ہے۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسوں کا تبادلہ جسمی سطح یعنی جلد کے ذریعہ عمل نفوذ پذیری (Diffusion) کے باعث واقع ہوتا ہے۔ جلد میں خون کی شعریائیں (Blood Capillaries) بکثرت پائی جاتی ہیں۔ خون میں ہیموگلوبین (Haemoglobin) نامی تنفسی صدفہ موجود ہوتا ہے۔ کچھ کے جلد مرطوب حالت میں رہتی ہے جو تنفس کے لئے ضروری ہے۔ کچھ کے جسم میں جسمی دیوار اور ہضمی نالی کے درمیان جسمی کھد (Body Cavity) پایا جاتا ہے جس میں ایک سیال بھرا ہوا ہوتا ہے جو قعری سیال (Coelomic Fluid) کہلاتا ہے۔ یہ سیال جسم کی ظہری سطح پر پائے جانے والے ظہری مسامات کے ذریعہ جسمی سطح پر افزا ہوتا ہے جو پوری سطح کو مرطوب حالت میں قائم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جلد میں پائے جانے والے غاطی خلیے (Mucous Cells) مخاط (Mucous) کا افراز کرتے ہیں جو جسم کی سطح پر ایک پتلی پرت کے مانند موجود رہتا ہے۔ مخاط کی اس پتلی پرت میں پانی کے سالمات ایک پتلی پرت بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پانی کی اس پرت میں کرہ فضاء کی آکسیجن حل شدہ حالت میں پائی جاتی ہے جو جلد کی شعریائوں میں نفوذ ہو جاتی ہے۔ خون میں موجود ہیموگلوبین اس آکسیجن کے ساتھ متحد ہو کر آکسیجن کو جسم کی تمام ہفتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہفتوں کے خلیوں میں غذا (گلوکوز) کی نگید میں آکسیجن استعمال کی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور توانائی پیدا ہوتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم کی جلد کو دوران خون کے ذریعہ پہنچا دی جاتی ہے جہاں سے یہ جلد کے ذریعہ جسم کے باہر نفوذ ہو جاتی ہے۔ اس طرح جلد کے ذریعہ گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔

اگر جلد خشک ہو جائے تو گیسوں کا تبادلہ واقع نہیں ہوتا جو کچھ کے کی موت کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے گیسوں کی نفوذ پذیری کے لئے جلد کا

3.2.1 امیبا (Amoeba) میں تنفس

امیبا (Amoeba) ایک خلوی حیوانات سے تعلق رکھتا ہے جن کا شمار جانداروں میں حیوانیہ (Protozoa) میں کیا جاتا ہے۔ یہ پانی میں زندگی گزارتا ہے۔ اس میں تنفس کا عمل نفوذ پذیری (Diffusion) کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ نفوذ پذیری سے مراد ایسا طریق عمل ہے جس میں کوئی شے زیادہ ارتکاز والے حصہ سے کم ارتکاز والے حصہ کی طرف منتقل ہوتی ہے تاکہ ہر حصہ میں اس شے کا ارتکاز مساوی ہو جائے۔ امیبا میں تنفس بیرونی غشاء کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ بیرونی غشاء انتخابی نیم نفوذ پذیری غشاء (Selective Semi Permeable Membrane) ہوتی ہے جو بعض مخصوص مادوں کو ہی خلیہ کے اندر یا خلیہ سے باہر گزرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ امیبا کے خلیہ میں پانی جانے والی آکسیجن کا ارتکاز بیرونی ماحول کے پانی میں پانی جانے والی حل شدہ آکسیجن کے ارتکاز کی بہ نسبت کافی کم ہوتا ہے اس لیے آکسیجن بیرونی ماحول کے پانی سے امیبا کے خلیہ میں بیرونی غشاء کے ذریعہ عمل نفوذ پذیری کے باعث داخل ہوتی ہے۔ تنفس کے دوران تکسیدی تعامل کے نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ارتکاز امیبا کے خلیہ میں بڑھ جاتا ہے۔ جو بیرونی ماحول کے پانی میں پانی جانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا کاربن ڈائی آکسائیڈ امیبا کے خلیہ سے بیرونی ماحول کے پانی میں نفوذ ہو جاتی ہے۔



شکل 4.1

امیبا میں نفوذ کے ذریعہ تنفس

3.3 جلدی تنفس (Cutaneous Respiration)

ایسا تنفس جو جلد کے ذریعہ انجام پاتا ہے جلدی تنفس (Cutaneous Respiration) کہلاتا ہے۔ جلد جو مرطوب رہتی ہے اور جس میں خون کی شعریائیں (Blood Capillaries) بکثرت موجود رہتی ہیں تنفسی اعضاء کا فعل انجام دیتی ہے۔ ونگلیس (Wigglesworth) کے مطابق تمام پس حیوانات (Metazoans) (کثیر خلوی حیوانات) میں حقیقی تنفسی عضو جلد ہے۔ جلدی تنفس بعض غیر فقریوں جیسے حلقیوں (Annelids) رخویوں (Mollusks) اور بری اسوپوڈس (Isopods) میں اور بعض فقریوں جیسے مچھلیوں (Fishes)، جل تھلیوں (Amphibians) اور سمندری سانپوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اس سبق میں کچھ، اور مینڈک میں جلدی تنفس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

3.3.1 کچھ، میں جلدی تنفس (Cutaneous Respiration in Earthworm)

کچھ، (Earthworm) میں مخصوص تنفسی اعضاء نہیں پائے جاتے۔ اس میں تنفس مرطوب جلد کے ذریعہ ہی انجام پاتا ہے جو جلدی تنفس کہلاتا ہے۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسوں کا تبادلہ جسمی سطح یعنی جلد کے ذریعہ عمل نفوذ پذیری (Diffusion) کے باعث واقع ہوتا ہے۔ جلد میں خون کی شعریائیں (Blood Capillaries) بکثرت پائی جاتی ہیں۔ خون میں ہیموگلوبین (Haemoglobin) نامی تنفسی صبغہ موجود ہوتا ہے۔ کچھ، کی جلد مرطوب حالت میں رہتی ہے جو تنفس کے لئے ضروری ہے۔ کچھ، کے جسم میں جسی دیوار اور بعضی نالی کے درمیان جسی کہلہ (Body Cavity) پایا جاتا ہے جس میں ایک سیال بھرا ہوا ہوتا ہے جو قمری سیال (Coelomic Fluid) کہلاتا ہے۔ یہ سیال جسم کی ظہری سطح پر پائے جانے والے ظہری مسات کے ذریعہ جسمی سطح پر افزا ہوتا ہے جو پوری سطح کو مرطوب حالت میں قائم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جلد میں پائے جانے والے مخاطی خلیے (Mucous Cells) مخاط (Mucous) کا افراز کرتے ہیں جو جسم کی سطح پر ایک پتلی پرت کے مانند موجود رہتا ہے۔ مخاط کی اس پتلی پرت میں پانی کے سالمات ایک پتلی پرت بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پانی کی اس پرت میں کرہ فضاء کی آکسیجن حل شدہ حالت میں پائی جاتی ہے جو جلد کی شعریائوں میں نفوذ ہو جاتی ہے۔ خون میں موجود ہیموگلوبین اس آکسیجن کے ساتھ متحد ہو کر آکسیجن کو جسم کی تمام ہاتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاتوں کے خلیوں میں غذا (گلوکوز) کی یکسید میں آکسیجن استعمال کی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور توانائی پیدا ہوتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم کی جلد کو دوران خون کے ذریعہ پہنچا دی جاتی ہے جہاں سے یہ جلد کے ذریعہ جسم کے باہر نفوذ ہو جاتی ہے۔ اس طرح جلد کے ذریعہ گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔ اگر جلد خشک ہو جائے تو گیسوں کا تبادلہ واقع نہیں ہوتا جو کچھ، کی موت کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے گیسوں کی نفوذ پذیری کے لئے جلد کا

مرطوب حالت میں رہنا شرط ہے چوں کہ آکسیجن کی نفوذ پذیری پانی میں حل شدہ حالت ہی میں انجام پاتی ہے۔

3.3.2 مینڈک میں جلدی تنفس (Cutaneous Respiration in Frog)

مینڈک (Frog) ایک جل تھلیہ (Amphibian) حیوان ہے جو زمین اور پانی دونوں مقامات پر تنفس کو انجام دینے کے لئے متوافق ہوتا ہے۔ اس لئے مینڈک میں تین طریقوں کے ذریعہ تنفس واقع ہوتا ہے (1) جلدی تنفس (Cutaneous Respiration) جو جلد کے ذریعہ انجام پاتا ہے، (2) بوقی بلعوی تنفس (Bucco Pharyngeal Respiration) جو بوقی بلعوی کھد (Bucco Pharyngeal Cavity) کی اندرونی مخاطی غشاء (Mucous Membrane) کے ذریعہ واقع ہوتا ہے اور (3) ششی تنفس (Pulmonary Respiration) جو شش (Lungs) کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ اس سبق میں صرف جلدی تنفس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔


مینڈک میں جلد نہایت اہم تنفسی عضو ہے جو تقریباً 35 فی صد تنفس کو انجام دیتی ہے۔ جلد کے ذریعہ مینڈک کے جسم میں سال تمام تقریباً 50 ملی لیٹر آکسیجن فی کلوگرام جسمی وزن فی گھنٹہ داخل ہوتی رہتی ہے جو شش کے ذریعہ داخل ہونے والی آکسیجن سے زیادہ ہوتی ہے۔

مینڈک کی جلد کافی وعادار (Vascular) ہوتی ہے جس میں خوں کی شعریاں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ جلد میں مخاط کو افراز کرنے والے غدود پائے جاتے ہیں جن سے افراز ہونے والا مخاط جسمی سطح کو مرطوب اور چمکتا (Slimy) رکھتا ہے۔ مینڈک اپنی جلد کو مرطوب حالت میں رکھنے کے لئے بار بار پانی میں چھلاگ لگاتے ہیں۔ مینڈک جب زمین پر رہتا ہے تو کرہ فضاء کی آکسیجن جسم پر مخاط کی پرت میں موجود پانی کی پرت میں حل ہو جاتی ہے اور جلد کی شعریانوں میں نفوذ ہو جاتی ہے۔ آکسیجن خوں میں پائے جانے والے ہموگلوبین کے ساتھ متحد ہو کر جسم کی تمام ہاتھوں کو دوران خون کے ذریعہ پہنچادی جاتی ہے۔ ہاتھوں میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ جلد کی شعریانوں میں پہنچادی جاتی ہے جہاں سے یہ جسم کے باہر نفوذ ہو جاتی ہے۔ اس طرح مینڈک میں جلدی تنفس انجام پاتا ہے۔

مینڈک میں جلدی تنفس عام حالتوں میں واقع ہوتا ہے اس کے علاوہ سرما خوابی (Hibernation) اور گرما خوابی (Aestivation) کے دوران صرف جلدی تنفسی اعضاء کا کام انجام دیتی ہے۔ موسم سرما کے دوران مینڈک زمین کی گہرائی میں مل بناتے ہیں جہاں یہ حالت سکون میں قیام کرتے ہیں۔ اس حالت کو سرما خوابی (Hibernation) کہا جاتا ہے۔

بلوں میں نمی اور ٹھنڈک پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جلد مرطوب حالت میں رہتی ہے اور جلدی تنفس کو انجام دیتی ہے۔ اسی طرح۔

مینڈک موسم گرما کے دوران زمین کی گہرائی میں بتائے ہوئے بلوں میں قیام کرتے ہیں جس کو گرما خوابی (Aestivation) کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی یہ جلد کے ذریعہ تنفس کو انجام دیتے ہیں۔ مینڈک کی جلد کے خشک ہونے پر یہ مر جاتے ہیں۔




فصل 4.2

مینڈک کے جلد کی عمودی تراش

3.4 قصی تنفس (Tracheal Respiration)

حشرات میں قصیہ (Trachea) تنفسی عضو ہے۔ تمام حشرات کے جسم پر بیرونی ڈھانچہ (Exoskeleton) موجود رہتا ہے جو بشرہ (Cuticle) کی دیز غیر نفوذ پذیر پرت پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے جلدی تنفس واقع نہیں ہوتا۔ حشرات کے جسم میں دوران خون کا نظام خون کی نالیوں پر مشتمل نہیں ہوتا اور ان کے خون میں تنفسی مہذبہ ہیوگلوبین (Haemoglobin) بھی موجود نہیں ہوتا جو آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہذا خون کی نالیوں پر مشتمل دوران خون اور ہیوگلوبین کی غیر موجودگی میں جسم کے تمام حصوں تک آکسیجن کو پہنچانے کے لیے مخصوص ہوائی نالیوں کا نظام موجود ہوتا ہے جس کے ذریعہ بیرونی آکسیجن جسم میں تمام ہاتھوں تک پہنچادی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم کی تمام ہاتھوں سے اس ہی نظام کے ذریعہ باہر خارج کردی جاتی ہے۔ ان ہوائی نالیوں کو قصیہ (Trachea) اور نظام کو قصی نظام (Tracheal System) کہا جاتا ہے۔




شکل 4.3

باطنی قصبیہ

شکل 4.4

ظہری قصبیہ



شکل 4.5


جھینگر کے جسی قطعہ میں قصبی نظام

قصبی نظام منقبضوں (Spiracles) قصبیوں (Trachea) اور قصبیوں (Tracheoles) پر مشتمل ہوتا ہے۔

منقبضے (Spiracles)

حشرات کے جسم میں جانی طور پر قصبیہ (Trachea) چھوٹے سوراخوں کے ذریعہ باہر نکلتے ہیں۔ ان سوراخوں کو منقبضے

(Spiracles) کہا جاتا ہے۔ محبتکر میں ہر 10 جوڑ منہ سے پائے جاتے ہیں جن میں دو جوڑ صدری حصہ میں اور ہر 8 جوڑ شکمی حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ شکمی حصہ میں پائے جانے والے منہسوں میں صمام (Valves) موجود رہتے ہیں جو منہسوں کو کھولنے اور بند کرنے کا فعل انجام دیتے ہیں۔ صدری حصہ کے منہسوں میں صمام نہیں پائے جاتے ہیں۔



شکل 4.6

جنگریں قصبی نظام درمیانی شکل بانٹوں میں قصبہ کی وسیع شاخیں ظاہر کرتی ہے۔

قصیہ (Trachea)

ہر ایک منفیسہ (Spiracle) ایک چھوٹے کھنڈے میں کھلتا ہے جس کو اطاق (Atrium) کہتے ہیں۔ ہر ایک اطاق سے ایک قصی نالی (Tracheal Tube) نکلتی ہے۔ ایک جانب کے تمام قصیہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر ایک طویل قصی نالی (Longitudinal Tracheal trunk) بناتے ہیں۔ اس طرح بھیتر کے جسم میں دو طویل قصی نالیاں موجود رہتی ہیں۔ ہر ایک طویل قصی نالی سے کئی قصی نالیاں (Tracheal Tubes) نکلتی ہیں۔


قصیچے (Tracheoles)

قصی نالیاں کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ متعدد بار تقسیم کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی اختتامی مہین بند نالیاں قصیچے (Tracheoles) کہلاتی ہیں۔ قصیچے بافت کے خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے سروں میں ہافٹی سیال بھرا ہوا ہوتا ہے۔

تنفس کی میکانیت (Mechanism of Respiration)


دم درکشی (جھپٹی) (Inspiration) کے دوران حکم کشادہ ہو جاتا ہے اور ہوا قصیچوں میں داخل ہو جاتی ہے اور بالآخر قصیچوں (Tracheoles) کے سرے میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں موجود ہافٹی سیال میں حل ہو کر خلیوں میں نفوذ ہو جاتی ہے خلیوں میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ قصیچوں کے سروں میں نفوذ ہو جاتی ہے۔

دم براری (Expiration) کے دوران عضلات کے سکڑاؤ کی وجہ سے حکم چپٹا ہو جاتا ہے اور قصیچوں میں موجود ہوا کے دباؤ میں اضافہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قصیچوں میں موجود ہوا جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہوتی ہے قصی نالیوں سے گذرتی ہوئی منفیسوں (Spiracles) کے ذریعہ جسم سے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ اس طرح تنفس کا عمل انجام پاتا ہے جس کے دوران آکسیجن قصیچوں کے ذریعہ راست جسم کے تمام خلیوں کو پہنچادی جاتی ہے۔




3.5 حیوی تنفس (Branchial Respiration)

آبی حیوانات میں خیشوم (گھمڑے) (Gills) مخصوص تنفسی اعضاء ہوتے ہیں۔ خیشوم عموماً دھادار (Vascularised) ہڈے دار (Ciliated) اور متحرک ہوتے ہیں۔ سادہ ترین خیشوم کی مثالیں ادی خیشوم (Dermal Branchiae) ہیں جو خار جلدیوں (Echinoderms) میں پائے جاتے ہیں۔ رخویوں (Molluscs) میں مخصوص خیشوم موجود ہوتے ہیں جن کو کلنسی (Ctenidia) کہتے ہیں۔ بعض جوڑ پاویں (Arthropods) مثلاً جھیکا میں خیشوم کافی نمویانہ ہوتے ہیں۔ پیش حملیوں (Protochordates) میں بلحوی خیشوی درزیں (Pharyngeal Gill Slits) تنفسی اعضاء ہوتے ہیں۔ مچھلیوں (Fishes) میں خیشوم اعظم ترین نمویانہ ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم مچھلیوں میں پائے جانے والے بلحوی تنفسی نظام اور اس کی میکانیٹ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔




شکل 4.8

جھیکا میں تنفسی اعضاء "خیشوم"




شکل 4.9 صدقیہ (مولسکا) میں تنفسی اعضاء "خیشوم"



شکل 4.10

پھلی میں خیوم پوش سے ڈھکے ہوئے تنفسی اعضاء "خیوم"




شکل 4.11


پھلی میں تنفسی اعضاء "خیوم"

3.5.1 مچھلیوں میں خیومی تنفس (Branchial Respiration In Fishes)

مچھلیاں تنفس کو انجام دینے کے لئے پانی میں حل شدہ آکسیجن پر منحصر ہوتی ہیں۔ پانی میں حل شدہ آکسیجن تنفسی اعضاء کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے جن کو خیوم (Gills) کہتے ہیں۔ اس لئے پانی تنفسی راستہ (Respiratory Tract) کے ذریعہ تنفسی اعضاء یعنی خیوم کو پہنچا دیا جاتا ہے۔



4.13 شکل
مچھلی میں خیشوی تنفسی نظام




4.12 شکل
خیشوم کی ساخت

تنفسی راستہ (Respiratory Tract)

تنفسی راستہ، دہن، (Mouth)، بوتی کھد (Buccal Cavity)، بلعوم (Pharynx)، خیشوی تھیلیوں (Gill Pouches)، خیشوی خانوں (Branchial Chambers) اور بیرونی خیشوی روزنوں (External Branchial Apertures) اور اندرونی خیشوی روزنوں (Internal Branchial Apertures) پر مشتمل ہوتا ہے۔ دہن بطنی جانب ہوتا ہے جو بوتی کھد میں کھلتا ہے۔ بوتی کھد کا تعلق بلعوم سے ہوتا ہے۔ بلعوم کے چاروں طرف میں پانچ جوڑ تھیلی نما ساختیں پائی جاتی ہیں جن کو خیشوی تھیلیاں (Gill Pouches) کہا جاتا ہے ہر ایک تھیلی غشائی غشاء سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، ہر جانب کے خیشوی روزنوں کے ذریعہ ایک جگہ میں کھلتی ہیں جن کو خیشوی خانہ کہا جاتا ہے۔ جس پر ایک ڈھکن (Operculum) موجود ہوتا ہے۔ خیشوی خانہ ایک بڑے خیشوی روزن کے ذریعہ جسم سے باہر کھلتا ہے۔ ہر ایک خیشوی تھیلی ایک جانب بلعوم سے اندرونی خیشوی روزن (Internal Branchial Aperture) کے ذریعہ تعلق قائم رکھتی ہے۔ دوسری جانب بیرونی خیشوی روزن (External Branchial Aperture) کے ذریعہ باہر کھلتی ہے۔ متواتر خیشوی تھیلیاں ایک دوسرے سے ہین خیشوی قاضلوں (Interbranchial Septa) کے ذریعہ ملحدہ رہتی ہیں جن کو خیشوی کمانوں (Branchial Arches) اور خیشوی شعاعوں (Branchial Rays) کے ذریعہ سہارا ملتا ہے۔ خیشوی تھیلی کی اندرونی غشائی غشاء (Mucous Membrane) پٹی

افقی تہوں کا سلسلہ بناتی ہے جنہیں خیشوی درتے (Gill Lamellae) کہتے ہیں۔ ان درتوں میں خون کی شعریائیں (Blood Capillaries) پائی جاتی ہیں۔ خون میں ہیموگلوبین (Haemoglobin) نامی تنفسی صدف موجود ہوتا ہے۔



شکل 4.14

مچھلیوں میں تنفس کی میکانیت


3.6 ششی تنفس (Pulmonary Respiration)

تمام فقریوں (Vertebrates) میں ہیمپردے (Lungs) تنفسی اعضاء ہوتے ہیں۔ ہیمپردوں کے ذریعہ انجام دئے جانے والے تنفس کو ششی تنفس (Pulmonary Respiration) کہا جاتا ہے۔ یہ ہیمپردے ہوائی تنفس کے لئے متوافق ہوتے ہیں جو صدر (Thorax) میں پائے جاتے ہیں۔

ہیمپردے کافی دعاوار لچک دار قھلی نما ساختیں ہوتی ہیں۔ یہ جنین (Embryo) میں بلعوم (Pharynx) کی بطنی دیوار سے عطفہ (Diverticulum) کی شکل میں نمونپاتے ہیں۔ عطفہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں اور بائیں ہیمپردوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔


جل قھلیوں (Amphibians) اور ہوام (Reptiles) میں ہیمپردے سادہ پتلی دیوار والے لچک دار کیسہ یا قھلی نما ساختہ ہیں جن میں خون کی شعریائیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ پرندوں (Aves) میں ہیمپردے کافی نمونپازہ ہوتے ہیں جو سجا چھونے اور تقریباً ٹھوس ہوتے ہیں۔ ان میں پھلنے کی صلاحیت کم پائی جاتی ہے۔ ہیمپردوں کے ساتھ مخصوص پتلی دیوار والے شفاف غیر تنفسی ہوائی کیسے (Air

(Sacs موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہوائی کیسے پرداز کے دوران مخزن (Reservoir) کا کام انجام دیتے ہیں۔




شکل 4.15


مچھلی کا تیراک پھونکنا بھیچر دے کے ارتقاء کا پہلا مرحلہ




شکل 4.18
غوک کا بھیچر دے




شکل 4.17
میتھک کا بھیچر دے



شکل 4.16
سالا منڈر کا بھیچر دے




شکل 4.20
پرنڈوں کا بھیچر دے



شکل 4.19
عوام کا بھیچر دے


پستانوں (Mammals) میں پیچہ دے ملائم، اسٹیفی، پلک دار اعضاء ہیں جو فصوں (Lobes) میں منقسم رہتے ہیں۔ خرگوش (Rabbit) میں دائیں جانب چار فصیں (Lobes) اور بائیں جانب دو فصیں پائے جاتے ہیں۔ تمام فقریوں کے پیچہ دوں کی اندرونی سطح پر پست ابھاریں پائی جاتی ہیں جن کو فاصلیں (Septa) کہا جاتا ہے۔ فاصلوں میں اقل نشیبی حصوں کو جو فیڑے (Alveoli) واحد جو فیڑہ (Alveolus) کہتے ہیں جن کی تعداد کئی ہزار ہوتی ہے۔ فاصلیں (Septa) اور جو فیڑے ہوا کے سبھ تھامی رقبہ میں اضافہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اعظم ترین آکسیجن کی مقدار جو فیڑوں کی اندرونی سطح پر پائی جانے والی شعریانوں میں نفوذ ہوتی ہے۔




شکل 4.21

پستانوں کا پیچہ دہ

فہیق (Inspiration) یا دم در کشی (Inhalation) کے دوران پیچہ دوں کے حجم میں اضافہ کی وجہ سے پیچہ دوں میں ہوا کے دباؤ میں کمی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرہ نفاذ کی ہوا پیچہ دوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ زفیر یا دم براری (Exhalation) کے دوران پیچہ دوں کے حجم میں کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیچہ دوں میں موجود ہوا کے دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہوا جسم کے باہر خارج ہو جاتی ہے۔



شکل 4.23 زفیر (Expiration)



شکل 4.22 فہیق (Inspiration)

تنفسی نظام میں ہوا کے داخل اور خارج ہوتے وقت ہوائی سطح کی رطوبت حاصل کر لیتی ہے۔ مینڈک میں پائے جانے والے ہیرونی تنفسی (External Nares) انفی خانے (Nasal Chamber) میں کھلتے ہیں جو اندرونی تنفوں (Internal Nares) کے ذریعہ بوقی بلعوی کہلہ (Buccopharyngeal Cavity) میں کھلتے ہیں جس کا تعلق مزار (Glottis) کے ذریعہ حجری قفسی خانہ (Laryngotracheal Chamber) سے ہوتا ہے۔ یہ خانہ شعبات (Bronchi) کے ذریعہ بھپھڑے میں کھلتا ہے۔ کہہ فضاء کی ہوا ہیرونی تنفس سے داخل ہو کر بوقی بلعوی کہلہ میں پہنچتی ہے۔ بوقی بلعوی کہلہ کے حجم میں کمی پیدا کی جاتی ہے جس کے باعث ہوا کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے اور ہوا مزار سے گذرتے ہوئے بالآخر بھپھڑوں میں داخل کر دی جاتی ہے۔ بھپھڑوں کی اندرونی سطح پر واقع خون کی شعریانوں میں آکسیجن جذب کر لی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ شعریانوں سے بھپھڑوں کے ہوائی کیسوں میں خارج کر دی جاتی ہے جہاں سے یہ تنفسی راستہ سے گزرتے ہوئے ہیرونی تنفوں کے ذریعہ باہر خارج کر دی جاتی ہے۔

پستانوں میں بھی تنفس کا عمل اسی طرح انجام پاتا ہے لیکن اندرونی تنفسی بلعوم میں کھلتے ہیں۔ لہذا ان میں تنفسی راستہ ہیرونی تنفوں (External Nares)، انفی خانہ (Nasal Chamber)، اندرونی تنفوں (Internal Nares)، بلعوم (Pharynx)، مزار (Glottis)، حجرہ (Larynx)، قصبیہ (Trachea)، شعبات (Bronchia)، فسیچہ (Bronchiole) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہوا اس راستہ سے گذرنے کے دوران انفی خانہ کی اندرونی سطح پر مخاطی پرت (Mucous Layer) سے رطوبت حاصل کر لیتی ہے اور بھپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔

3.7 انسانی تنفس (Human Respiration)


انسان میں تنفسی نظام حسب ذیل اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔

ناک (Nose)، انفی خانہ (Nasal Chamber)، بلعوم (Pharynx)، حجرہ (Larynx)، قصبیہ (Trachea) اور بھپھڑے

(Lungs)

(1) ناک (Nose)

ناک ایک عضلاتی حصہ ہے جو چہرے پر بالائی لب کے اوپر پائی جاتی ہے۔ اس میں دو تنفسی (Nostrils) پائے جاتے ہیں جس کے اندرونی حصہ پر بال موجود ہوتے ہیں جو تنفسی پھلکیوں کا کام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا انفی خانے میں داخل نہیں ہوتی۔



4.24 شکل

انسانی تنفسی نظام

(2) انفی خانہ (Nasal Chamber)

ہر ایک بیرونی نتھنے کا تعلق انفی خانہ سے ہوتا ہے جو ناک میں پایا جانے والا ملی نما کبہ ہے۔ اس خانہ کا نفل داخل ہونے والی ہوا کو گرم رکھنا اور معززت رساں ذرات کو داخل ہونے سے روکنا ہے۔ دونوں ملی نما کھٹے ایک فاصل (Septum) کے ذریعہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں۔ انفی خانے اور دینی کبہ (Oral Cavity) کے درمیان ایک عظمیٰ تختی پائی جاتی ہے جس کو کھک (Palate) کہا جاتا ہے۔ انفی خانہ کی اندرونی سطح غامی غشاء (Mucous Membrane) کی ہوتی ہے جس کے خلیے مخاط (Mucous) کا افراز کرتے ہیں۔ انفی خانہ سے گزرنے والی ہوا کو غامی غشاء مرطوب بناتی ہے اور حرارت مہیا کرتی ہے جس کے باعث ہوا کی حرارت جسمانی حرارت کے مساوی ہو جاتی ہے۔ نیز مخاط میں گرد کے ذرات پھانس لئے جاتے ہیں۔ انفی خانہ ایک جوڑا اندرونی نتھنوں (Internal Nostrils) کے ذریعہ بلعوم میں کھلتا ہے۔


(3) بلعوم (Pharynx)

یہ ایک کشادہ عضلاتی کبہ ہے جو غذا اور ہوا دونوں کے لئے ایک مشترکہ راستہ ہے۔ سانس نالی اور غذائی نالی دونوں بلعوم میں کھلتے ہیں۔ بلعوم ایک روزن کے ذریعہ حجرہ (Larynx) سے مربوط رہتا ہے۔ اس روزن کو مزمار (Glottis) کہا جاتا ہے جس کے اوپر

غضروفی (Cartilagenous) ساخت پائی جاتی ہے جس کو برمزمار (Epiglottis) کہتے ہیں۔ غذا کے نگلنے کے دوران برمزمار کے ذریعہ مزمار کو ڈھانک لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے غذائی ذرات حجرہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور غذا مری (Oesophagus) میں داخل ہو جاتی ہے۔

(4) حجرہ (Larynx)

یہ ایک غضروفی ساخت ہے جو قصیبہ (Trachea) کے بالائی حصہ پر پائی جاتی ہے۔ اس کو صوتی صندوق بھی کہا جاتا ہے۔ اس صندوق میں صوتی ڈور (Vocal Cords) پائے جاتے ہیں۔ جب ہوا زفير (Expiration) کے دوران حجرہ سے بیرونی جانب باہر خارج ہونے کے لئے گذرتی ہے تو صوتی ڈور کو مرتعش کرتی ہے جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے حجرہ کو صوتی صندوق بھی کہا جاتا ہے۔




شکل 4.26
حجرہ کے پچھلے سرے کا منظر

شکل 4.25
حجرہ کے اگلے سرے کا منظر

(5) قصیبہ (Trachea)


قصیبہ کو عموماً ہوائی پائپ (Wind Pipe) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حجرہ سے شروع ہوتی ہے گردن سے گذرتے ہوئے صدری کھد کے بالائی حصہ میں داخل ہو کر فوراً دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان شاخوں کو شعبات (Bronchi) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک شعبہ (Bronchus) اپنی جانب کے متعلقہ پیچہ (Lungs) میں داخل ہو کر مزید متعدد بار تقسیم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انتہائی چھوٹی

اختصاصی شائیں حاصل ہوتی ہیں جن کو فصیچے (Bronchioles) کہا جاتا ہے۔ فصیچہ اور شعبات دونوں کی دیوار میں C' نما غضروبی حلقے موجود رہتے ہیں جو سہارا مہیا کرتے ہیں۔ یہ حلقے ان کو بچکے یا بند ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔



شکل 4.28

قصبیہ کا اگلا سطر




شکل 4.27

قصبیہ کی مرضی تراش

6 مچھوے (Lungs)


انسان میں مچھوے کا ایک جوڑہ ہوتا ہے۔ دل کی دونوں جانب ایک ایک مچھوہ ہوتا ہے۔ ہر ایک مچھوہ اسٹنچی (Spongy) اور لچک دار ہوتا ہے اور یہ دوہری دیوار والی غشاء سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس غشاء کو جانبیہ غشاء (Pleural Membrane) کہا جاتا ہے۔ جانبیہ غشاء کے دونوں دیواروں کی درمیانی جگہ میں آبی سیال بھرا ہوا ہوتا ہے جس کو جانبیہ سیال (Pleural Fluid) کہتے ہیں۔ جانبیہ سیال مچھوے کو آزادانہ حرکت انجام دینے کے لئے چکناٹی کا کام کرتا ہے اور کسی بھی قسم کے ہیرونی یا اندرونی دباؤ یا ضرر سے مچھوے کو محفوظ رکھتا ہے۔ دایں مچھوے کی جسامت بائیں مچھوے کی بہ نسبت بڑی ہوتی ہے۔ دایاں مچھوہ تین

فصوں اور بایاں پیچیدہ اور فصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیچیدہ میں جو فیئرے (Alveoli) پائے جاتے ہیں۔ جو فیروں کی سطح پر دھوی شعریائیں (Blood Capillaries) پائی جاتی ہیں۔ ششی تریان (Pulmonary Artery) پیچیدہ میں داخل ہو کر شعریائوں (Capillaries) میں تقسیم ہو جاتی ہے جو جو فیروں کی سطح پر پائی جاتی ہیں۔ ششی تریان قلب سے غیر آکسیجن خون پیچیدہ کو لے جاتی ہے۔ یہ خون جو فیروں کی شعریائوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔ آکسیجن شعریائوں میں نفوذ ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ شعریائوں سے جو فیروں میں نفوذ ہو جاتی ہے اور ششی ورید (Pulmonary Vein) ذریعہ جسم سے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔




شکل 4.30

تصویر: شش، ششیات، راسی ششیات، تنگی ششیات اور ششی جوئے



شکل 4.29

انسانی پیچیدہ



شکل 4.31

انسان کے پیپردوں کے جوفیہات اور معاون شعریات

تنفس کی میکانیت (Mechanism of Respiration)



تنفس کا عمل دو مراحل (a) شہیق (Inspiration) یا دم در کشی (Inhalation) اور (b) زفر (Expiration)

(a) شہیق (Inspiration) یا دم در کشی ((Inhalation)) یا دم برداری (Exhalation) پر مشتمل ہوتا ہے۔

ہوا کا بیرونی ماحول سے جسم کے اندر داخل ہونا یعنی سانس کا لینا شہیق (Inspiration) یا دم در کشی (Inhalation) کہلاتا ہے۔



اس عمل کے دوران پسلیوں (Ribs) کے مین الاضلاعی عضلات (Intercostal Muscles) میں پھیلاؤ واقع ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں

ڈائفرم (Diaphragm) نیچے کی جانب کھینچا جاتا ہے اور مسطح ہو جاتا ہے جس کے باعث صدر کشادہ ہو جاتا ہے۔



شکل 4.33

زیر کے دوران ڈائگرام کا اپری جانب کھنچاؤ، صدی
کیلے کے حجم میں کمی جس کے باعث پیپروں میں ہوا
کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔




شکل 4.32


شہیت کے دوران ڈائگرام کا سکڑنا اور سطح ہوتا، بیرونی
بین پٹی عضلات کے سکڑاؤ کے باعث صدی کہلے کا کشادہ ہوتا
جس کے باعث پیپروں میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔

صدی کہلے کے حجم میں اضافہ کی وجہ سے صدی کہلے میں موجود پیپروں میں گیسوں کا دباؤ بیرونی کرہ فضاء کے ہوائی دباؤ کی
بہ نسبت کم ہو جاتا ہے۔ اس لئے بیرونی کرہ فضاء کی ہوا بیرونی نشتوں (External Nostrils) کے ذریعہ انٹی خانہ (Nasal
Chamber) بلعوم (Pharynx)، حجرہ (Larynx)، قصیہ (Trachae)، شعبہ (Bronchus) اور شعبہ (Bronchioles)
سے گذرتی ہوئی پیپروں کے جو فیروں میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو فیروں میں داخل شدہ ہوا میں آکسیجن کا ارتکاز جو فیروں کی دیوار میں
موجود دموی شعریانوں میں آکسیجن کے ارتکاز کی بہ نسبت کافی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آکسیجن جو فیروں کی دموی شعریانوں میں نفوذ ہو
جاتی ہے۔ آکسیجن خون میں موجود ہیوگلوبین (Haemoglobin) کے ساتھ متحد ہو کر آکسی ہیوگلوبین (Oxyhaemoglobin) کی
شکل میں جسم کے مختلف خلیوں کو پہنچادی جاتے جہاں یہ آزاد ہو جاتی ہے اور گلوکوز کی تکید کو انجام دیتی ہے جس کے نتیجہ میں کاربن ڈائی
آکسائیڈ، پانی اور توانائی پیدا ہوتے ہیں۔ توانائی جسم کے مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے میں استعمال کی جاتی ہے۔ پانی کی درکار مقدار کو جسم
میں روک لیا جاتا ہے جب کہ زہد پانی کو پسینہ، پیشاب اور زہیر (Expiration) کے ذریعہ جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ کاربن ڈائی

آکسیجن بھی ہیموگلوبین کے ساتھ متحد ہو کر کاربکسی ہیموگلوبین (Carboxyhaemoglobin) بناتی ہے اور پیپروٹون کو دوران خون کے ذریعہ پہنچادی جاتی ہے جہاں سے یہ دم برداری یا زہیرہ کے ذریعہ باہر خارج کر دی جاتی ہے۔



4.34 شکل
شہین اور زہیرہ کے دوران تبدیلیاں



4.35 شکل
جوفیرہ میں کیسی تبادلہ



شکل 4.36
انسان میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی منتقلی

(b) زفير (Expiration) یا دم براری (Exhalation)


ہوا یعنی مختلف گیسوں کا جسم سے باہر خارج ہونا زفير (Expiration) یا دم براری (Exhalation) کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر سانس کا چھوڑنا زفير یا دم براری ہے۔ اس عمل کے دوران پبلیوں کے مین الصلصی عضلات میں سکڑاؤ واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائفرم اوپر کی جانب کھینچا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں صدری کھد کے حجم میں کمی واقع ہوتی ہے اور پھپھڑوں میں ہوا کا دباؤ بہ نسبت بیرونی کرہ فضاء کے ہوا کے دباؤ کے بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ دباؤ کے تحت کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات سانس نالی کے راستہ سے گذرتے ہوئے جسم سے باہر خارج کر دئے جاتے ہیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرد میں ڈائفرم اور عورتوں میں پبلیاں تنفس کے عمل میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ نیز تنفس کی شرح پر مختلف عوامل خاص کر عمر، جذباتی خلل، ورزش اور دیگر سرگرمیاں اثر انداز ہوتی ہیں۔

عموماً انسانوں میں کھنکھاہٹ (کھانسی) (Chronic Bronchitis) اور ایمفیسیما (Emphysema) کی منتقلی


امراض لاحق ہوتے ہیں۔ ان امراض میں شعبیہ (Bronchiole) اور پھپھڑے کے جو فیروں کی جو فیروں دیوار (Alveolar Wall) میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ شعبیہ کی دیوار دبیز ہو جاتی ہے، جو فیروں دیوار تباہ ہو جاتی ہے اور ہوائی کیسے کشادہ ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری واقع ہوتی ہے۔

آکسیڈ بھی جیوگلوبین کے ساتھ متحد ہو کر کاربکسی ہیوگلوبین (Carboxyhaemoglobin) بناتی ہے اور پیچھڑون کو دوران خون کے ذریعہ پہنچادی جاتی ہے جہاں سے یہ دم بھاری یا زفرہ کے ذریعہ باہر خارج کردی جاتی ہے۔




فصل 4.34

شہین اور زفرہ کے دوران تبدیلیاں



فصل 4.35

جوفیرہ میں کسی تبادلہ




شکل 4.36
انسان میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی منتقلی

(b) زفير (Expiration) یا دم براری (Exhalation)

ہوا یعنی مختلف گیسوں کا جسم۔ سے باہر خارج ہونا زفير (Expiration) یا دم براری (Exhalation) کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر سانس کا چھوڑنا زفير یا دم براری ہے۔ اس عمل کے دوران پٹیلوں کے بین العظمیٰ عضلات میں سکڑاؤ واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائفرم اوپر کی جانب کھینچا جاتا ہے جس کے نتیجے میں صمدری کہنے کے حجم میں کمی واقع ہوتی ہے اور پھیپھڑوں میں ہوا کا دباؤ بہ نسبت بیرونی کرہ فضاء کے ہوا کے دباؤ کے بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ دباؤ کے تحت کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات سانس نالی کے راستے سے گذرتے ہوئے جسم سے باہر خارج کر دئے جاتے ہیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرد میں ڈائفرم اور عورتوں میں پسلیاں تنفس کے عمل میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ نیز تنفس کی شرح پر مختلف عوامل خاص کر عمر، جذباتی خلل، ورزش اور دیگر سرگرمیاں اثر انداز ہوتی ہیں۔

عموماً انسانوں میں کہنہ التهاب شعبیہ (کھانسی) (Chronic Bronchitis) اور ایمفیمائسیما (Emphysema) تنفسی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ ان امراض میں شعبیہ (Bronchiole) اور پھیپھڑے کے جو فیروں کی جو فیروں کی دیوار (Alveolar Wall) میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ شعبیہ کی دیوار دبیز ہو جاتی ہے، جو فیروں کی دیوار تباہ ہو جاتی ہے اور ہوائی کیسے کشادہ ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری واقع ہوتی ہے۔



4.38 شکل

نارمل جگرے

4.37 شکل

کمزور التهابی معدیہ Chronic Bronchitis

4 سبق کا خلاصہ

تنفس کے دوران آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسوں کے تبادلہ کے لئے مخصوص اعضاء درکار ہوتے ہیں جنہیں تنفسی اعضاء کہا جاتا ہے۔ مختلف حیوانات میں مختلف تنفسی اعضاء کی بنیاد پر تنفس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایسا تنفس جو پلازما منشاء (جسمی سطح) کے ذریعہ انجام پاتا ہے سطحی تنفس کہلاتا ہے مثلاً ایک غولی حیوانات جیسے ایسا میں سطحی تنفس واقع ہوتا ہے۔

ایسا تنفس جو جلد کے ذریعہ انجام پاتا ہے جلدی تنفس (Cutaneous Respiration) کہلاتا ہے۔ مرطوب جلد جس میں خون کی شعریاں نہیں موجود رہتی ہیں تنفسی اعضاء کے طور پر فعل انجام دیتی ہے۔ اس قسم کا جلدی تنفس حلقیوں، رخویوں، بری انسو پوڈس، مچھلیوں، جل جھلیوں اور سمندری سانپوں میں انجام پاتا ہے۔

کچھ کے خون کے پلازما میں ہیموگلوبین نای تنفسی صہ موجود رہتا ہے۔ نفوذ پذیری کے لئے جلد کی سطح کا مرطوب ہونا ضروری ہوتا ہے کیوں کہ آکسیجن حل شدہ حالت میں ہی نفوذ ہوتی ہے۔

مینڈک کی جلد تقریباً 35% تنفس کو انجام دیتی ہے۔ مینڈک میں جلدی تنفس عام حالتوں میں واقع ہوتا ہے۔ گرما خوابی اور سرما خوابی میں صرف جلدی تنفس ہی انجام پاتا ہے۔ موسم گرما کے دوران مینڈک زمین کی گہرائی میں بنائے گئے بلوں میں قیام کرتے ہیں اور حالت سکون میں رہتے ہیں۔ اس حالت کو گرما خوابی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح موسم سرما کے دوران مینڈک سرما خوابی کی حالت میں بلوں میں حالت سکون میں رہتے ہیں۔

ایسا تنفس جو قصیدہ کے ذریعہ انجام پاتا ہے قصی تنفس (Tracheal Respiration) کہلاتا ہے۔ خون کی تالیوں اور خون میں ہیموگلوبین کی غیر موجودگی میں قصی تنفس کے ذریعہ آکسیجن راست جسم کی تمام ہاتھوں تک پہنچادی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اسی نظام کے ذریعہ باہر خارج کردی جاتی ہے۔ قصی نظام منطیسوں (Spiracles)، قصیوں (Trachea) اور قصیوں (Tracheoles) پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایسا تنفس جو خیموم (گھسورے) کے ذریعہ انجام پاتا ہے خیمومی تنفس (Bronchial Respiration) کہلاتا ہے جو آبی حیوانات کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔

رخپوں (Mollusca) میں مخصوص خیموم پائے جاتے ہیں جن کو کنگھی (Ctenidia) کہا جاتا ہے۔ جوڑ پاؤں میں اوی خیموم، پیش قلبوں میں بلعومی خیمومی درزیں (Pharyngeal Gill Slits) اور پھلیوں میں اعظم ترین نمویانہ خیموم تنفسی اعضاء کا فصل انجام دیتے ہیں۔ ایسا تنفس جو ہچھردوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے ششی تنفس (Pulmonary Respiration) کہلاتا ہے۔ تمام مری نقریوں میں ہچھردے ہوئی تنفس کے لئے متوافق ہوتے ہیں۔ ہچھردے میں اقل ششی حصے جو فیئرے (Alveoli) کہلاتے ہیں جو ہوا کے تمامی رقبہ میں اضافہ کرتے ہیں۔

مینڈک میں تنفسی راستہ بیرونی نقتوں (External Nares)، انٹی خانہ (Nasal Chamber)، اندرونی نقتوں (Internal Nares)، حرمار (Glottis)، حجری قصی خانہ (Buccopharyngeal Cavity) اور شعبات (Bronchi) پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہوا گذرتی ہوئی ہچھردے کے جو فیروں میں داخل ہوتی ہے جس کی سطح پر پانی جانے والی شعریالوں میں آکسیجن نفوذ ہو جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ شعریالوں سے جو فیروں کے کمرہ میں داخل ہو کر اسی تنفسی راستہ کے ذریعہ باہر خارج کردی جاتی ہے۔

بشمول انسان پستانوں میں تنفسی راستہ بیرونی نقتوں، انٹی خانہ، اندرونی نقتوں، بلعوم، حرمار، حجرہ، قصیدہ، فصیحات اور شعبے پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہوا گذرتی ہوئی ہچھردوں کے جو فیروں میں داخل ہو کر جو فیروں کی شعریالوں میں نفوذ ہو جاتی ہے۔ اسی


راستہ کے ذریعہ شعریانوں سے جو فیروں میں داخل ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم کے باہر خارج کردی جاتی ہے۔
حجرہ کو صوتی صندوق کہا جاتا ہے جہاں آواز پیدا ہوتی ہے۔

بھیچڑے دوہری خشاء سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں جس کو جانبیہ خشاء (Pleural Membrane) کہا جاتا ہے۔ تنفس کا عمل دو مراحل یعنی دم درکشی اور دم براری پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہوا کا باہر سے جسم میں داخل ہونا دم درکشی کہلاتا ہے اور ہوا کا جسم سے باہر خارج ہونا دم براری کہلاتا ہے۔ تنفس کی شرح پر مختلف عوامل خاص کر عمر، جذباتی خلل، ورزش اور دیگر سرگرمیاں اثر انداز ہوتی ہیں۔

5 زائد معلومات


تیراک پھکتا (Swim Bladder)

بعض عظمی پھیلیوں میں مری (Oesophagus) کے اوپر لیکن فقری ستون (Vertebral Column) کے نیچے کیسہ (Sac) نما ساخت پائی جاتی ہے جس کو تیراک پھکتا (Swim Bladder) یا ہوا پھکتا (Air Bladder) کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آب سکونی (Hydrostatic) فعل انجام دیتا ہے لیکن یہ تنفس کا فعل بھی انجام دیتا ہے۔ اس کو فقری بھپچڑے (Vertebral Lungs) کا پیش رو (Fore Runner) سمجھا جاتا ہے۔




4.41 شکل

برقیقرنس



4.40 شکل

لیپی ڈوٹیس



4.39 شکل

اسٹریجیون



4.43 شکل

پولکٹیس



4.42 شکل

ایسیرٹوڈس

عظمی پھیلیوں میں تیراک پھکتے

حالت سکون میں گرما کا موسم گزارنا جس کے دوران تحولی تعاملات تخفیف پا جاتے ہیں۔	گرما خرابی	ایسٹیویشن	Aestivation
پرندوں میں شش کے ساتھ مربوط جلی نما ساختیں جو دھری تنفس میں مدد دیتی ہیں۔	ہوائی کیے	ایرنیکس	Air sacs
ایک چھوٹا کھدہ جیسے پستانوی ہیمپروڈوں میں چھوٹے چھوٹے ہوائی کیے یا جو فیبری غدود کا افزائی حصہ یا دانت کا کھدہ۔	جو فیبرہ	الویولس	Alveolus
آبی حیوانات میں تنفسی اعضاء۔	خیشوم	برانکیا	Branchia
گھمبھوڑے کو سہارا دینے والی غضروفی (Cartilagenous) ساخت	خیشوی کمان	برانکیل آرچ	Branchial arch
قصیہ (Trachea) کی شاخیں	شعبات	برونکی	Bronchi
قصیہ کی دو بڑی شاخوں میں سے ایک شاخ۔	شعبہ	برونکس	Bronchus
شش میں پانی جانے والی باریک فصیاتی ٹالی۔	فصیہ	برونکیول	Bronchiol
دوسری رخویوں (Bivalve Mollusca) کے حیوانات جیسے پیکی میں پایا جانے والا تنفسی عضو یعنی گھمبھوڑا۔	کنکھی	مپڈیم	Ctenidium
کسی شے کی زیادہ ارتکاز والے حصہ سے کم ارتکاز والے حصے کی جانب منتقلی۔	نفوذ پذیری	ڈیفیوژن	Diffusion
سانس کا باہر چھوڑنا۔	دم براری	یکس ہلاشن	Exhalation

سانس کا باہر چھوڑنا۔	زفیر	یکس پائریشن	Expiration
آبی حیوانات میں تنفسی اعضاء۔	غیشوم یا گھمورا	گل	Gill
قریب ترین غیشوموں کی متعلقہ دیوار۔	غیشوی کمانیں	گل آرچس	Gill Arches
گھمورے میں ورق نما پتلی دیوار والی ساختیں جس میں پانی جانے والی دھوی شعریانوں سے گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔	غیشوی درجے	گل لاملے	Gill Lamellae
فقری حیوانات میں بلعوم (Pharynx) کے حصہ میں پائے جانے والے سوراخ یا درزیں جو بیرونی جانبی ہیں۔	غیشوی درزیں	گل سلیٹس	Gill Slits
بلعوم کے حصہ میں پانی جانے والی تنفسی تھیلی۔	غیشوی تھیلی	گل پاؤچ	Gill Pouch
بلعوم اور قصبیہ کے درمیان روزن۔	مزار	گلوتیس	Glottis
حالت سکون میں سرما کا موسم گزارنا جس کے دوران تمام تحولی تعاملات تخفیفی حالت میں رہتے ہیں۔	سرما خرابی	ہائبرنیشن	Hibernation
سانس کا اندر لینا۔	دم درکشی	انہلیشن	Inhalation
سانس کا اندر لینا۔	شہین	انسپائریشن	Inspiration
حجرہ اور قصبیہ دونوں مل کر مشترک خانہ بناتے ہیں۔	حجری	لارینگو	Laryngo -
	قصی خانہ	ٹراکیئل جمبر	tracheal
			Chamber
سوائے پرندوں کے تمام فقری حیوانات میں قصبیہ (Trachea) درزبان کے اساس کے درمیان پایا جانے والا عضو جس میں مزار (Glottis) کھلتا ہے آواز پیدا کرنے والا عضو اور جس میں صوتی ڈور موجود رہتا ہے۔	حجرہ	لارینکس	Larynx

Metazoan	مٹازون	پس حیوانات	کثیر خلوی حیوانات جس میں تمام حیوان سوائے پروٹوزو کے شامل کئے جاتے ہیں۔
Oesophagus	ایسوفیگیس	مری	بلعوم کے بعد پانی جانے والی غذائی نالی کا حصہ۔
Operculum	اوپرکیولم	ڈھکن	خوکچہ (Tadpole) اور کئی پھلیوں میں خیشوم کو ڈھانگی ہوئی ساخت یا گھونٹے (Snail) کے غول کے دہن کو ڈھانگی ہوئی ساخت۔
Palate	پالایٹ	تک	بوتی کہلہ جھت۔
Spiracle	اسپائریکل	منہ	جھینگر کے جسم کے دونوں جانب پائے جانے والے سوراخ جس کے ذریعہ تنفس کے دوران قصی نالیوں (Tracheal Tube) میں آکسیجن داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر خارج ہوتی ہے۔
Trachea	ٹراکیا	قصیہ	سانس نالی جو قہری حیوانات میں پائی جاتی ہے یا ہوئی نالی جو حشرات اور کڑی میں موجود ہوتی ہے۔
Tracheols	ٹراکیولس	قصیچوں	حشرات میں ہاریک اختتامی قصیہ نالی۔
Vocal Cord	اوکل کارڈ	صوتی ڈور	حجرہ میں پایا جانے والا ڈور جو آواز پیدا کرتا ہے۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) نفوذ پذیری سے کیا مراد ہے؟
- (2) جلد کس طرح تنفس کا عمل انجام دیتی ہے؟
- (3) جلدی تنفس کونسے حیوانات میں واقع ہوتا ہے؟

- (4) تنفس کے دوران تیسوں کی نفوذ پذیری کے لئے جلد کا کس حالت میں ہونا ضروری ہے؟
- (5) کچھ سے کچھ جسم میں موجود قمری سیال کس طرح تنفس میں مدد کرتا ہے؟
- (6) موسم سرما اور موسم گرما میں مینڈک کس طرح تنفس کو انجام دیتا ہے؟
- (7) حشرات میں فہیق (Inspiration) کے دوران آکسیجن کس طرح قصپوں (Tracheoles) میں پہنچ جاتی ہے؟
- (8) حشرات میں قصی تنفس کیوں واقع ہوتا ہے؟
- (9) مچھلیوں میں پایا جانے والا تنفسی راستہ کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟
- (10) جو فیرے سے کیا مراد ہے؟

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) ایما میں تنفس کس طرح واقع ہوتا ہے؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (2) کچھ سے کچھ جلدی تنفس کو بیان کیجئے۔
- (3) مینڈک میں جلدی تنفس کس طرح واقع ہوتا ہے؟ وضاحت کیجئے۔
- (4) حشرات میں قصی تنفس کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (5) مچھلیوں میں تنفس کا عمل کس عضو کے ذریعہ انجام پاتا ہے؟ اس کی ساخت اور کارکردگی کو بیان کیجئے۔
- (6) ششی تنفس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مکانیت کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (7) انسان میں تنفسی نظام کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (8) مینڈک کا ششی تنفس کس طرح پرندوں اور پستانوں کے ششی تنفس سے مختلف ہوتا ہے قائل کیجئے۔
- (9) آبیاد و بری حیوانات میں پائے جانے والے تنفسی اعضاء کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تشریح کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

- (1) جو تک میں تنفس کا عمل کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔
- (2) آکسیجن جسمی خلیوں میں گلوکوز کی کو انجام دیتی ہے۔

- (3) امیبا (Amoeba) میں بیرونی غشا..... ہوتی ہے۔
- (4) تنفس کے دوران خلیوں میں گلوکوز کی تکسید کے نتیجہ میں..... پیدا ہوتی ہے۔
- (5) جلد میں..... یکثرت موجود رہتی ہیں جو تنفس کو انجام دینے کے لئے ضروری ہیں۔
- (6) مخاطی خلیے..... کا افزائش کرتے ہیں۔
- (7) کیچڑے کے خون کے پلازما میں..... نای تنفسی صدفہ موجود رہتا ہے۔
- (8) آکسیجن..... حالت میں ہی نفوذ ہوتی ہے۔
- (9) مینڈک کی جلد میں..... کو افزائش کرنے والے غدود پائے جاتے ہیں۔
- (10) آکسیجن خون میں پائے جانے والے..... کے ساتھ متحد ہو کر دوران خون کے ذریعہ جسم کی تمام ہاتھوں کو پہنچائی جاتی ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) مینڈک میں جلدی تنفس کن حالتوں میں واقع ہوتا ہے؟
- (a) سراخوابی کے دوران (b) گرماخوابی کے دوران
- (c) صرف عام حالتوں میں (d) عام حالتوں کے علاوہ سراخوابی اور گرماخوابی کے دوران
- (2) حشرات میں تنفسی اعضاء کون سے ہیں؟
- (a) جلد (b) شش (c) کھمبڑے (d) قصبیہ
- (3) جھینگڑ کے کون سے منفیوں میں صمام نہیں پائے جاتے ہیں؟
- (a) شکمی حصہ کے منفیوں (b) صدری حصہ کے منفیوں
- (c) دونوں حصوں کے منفیوں (d) کسی بھی منفیہ میں صمام نہیں پائے جاتے
- (4) جھینگڑ میں کتنے جوڑ منفیوں (Spiracles) کے پائے جاتے ہیں؟
- (a) 4 (b) 10 (c) 12 (d) 8
- (5) جھینگڑ کے جسمی خلیوں میں آکسیجن کونسی تالیوں کے ذریعہ نفوذ ہوتی ہے؟

(a) منہ پیسے (b) اطاق (c) قصبیہ (d) قصبیہ

(6) سادہ ترین خیسوم یعنی ادی خیسوم کونے حیوانات میں پائے جاتے ہیں؟

(a) رخویوں (b) خارجہ جلدوں (c) پیش حملوں (d) جوڑ پالوں

(7) خیسوی قصبی کی اندرونی سطحی غشاء سے تیار ہونے والا پکی افقی تہوں کا سلسلہ کیا کہلاتا ہے؟

(a) خیسوم ورچے (b) شعریانیں

(c) خیسوی کانیں (d) خیسوی شعائیں

(8) سینڈک میں اندرونی تختے کس حصہ میں کھلتے ہیں؟

(a) انلی خانہ (b) حجرہ قصبی خانہ

(c) بھیچرے (d) بوقی بلعوی کہد

(9) پستانوں میں اندرونی تختے کس حصہ میں کھلتے ہیں؟

(a) بلعوم (b) بوقی بلعوی کہد (c) انلی خانہ (d)

(10) بری قہریوں میں کونے تنفسی اعضاء ہوائی تنفس کے لئے متوافق ہوتے ہیں؟

(a) شش (b) گھمروے

(c) شش اور گھمروے دونوں (d) جلد

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

B

A

()	بلعوی خیسوی درزیں	(1)	پلازما غشاء
()	حجرہ	(2)	خون کی نالیوں اور ہیموگلوبین کی غیر موجودگی
()	سنگھسی (Ctenidium)	(3)	سمندری سانچوں
()	جلدی تنفس	(4)	آبی حیوانات
()	منہ پیسے	(5)	رخویوں

()	خیونی تناس	خارجلدیوں	(6)
()	سطی تناس	جوفیرے	(7)
()	قصی تناس	جھیکر	(8)
()	ادی جیشوم	پیش جلیوں	(9)
()	پھپر دوں	صوتی صندوق	(10)

سبق 5 تنقیلی نظام (Transport System)

- 1 سبق کا خاکہ
- 2 تمہید
- 3 سبق کا متن
 - 3.1 تنقیلی نظام کا تعارف
 - 3.2 دورانی نظام کی اقسام
 - 3.3 مختلف حیوانات میں تنقیلی نظام
 - 3.3.1 کیچوے میں تنقیلی نظام
 - 3.3.2 جھینگڑ میں تنقیلی نظام
 - 3.3.3 مچھلیوں میں تنقیلی نظام
 - 3.3.4 جل تھلیوں میں تنقیلی نظام
 - 3.3.5 حوامیوں میں تنقیلی نظام
 - 3.3.6 پرندوں اور پستانوں میں تنقیلی نظام
 - 3.4 حیوانات میں تنقیلی نظام کا ارتقاء
- 4 خلاصہ
- 5 زائد معلومات
- 6 فرہنگ
- 7 نمونہ امتحانی سوالات
 - 7.1 مختصر جوابی سوالات

7.2 طویل جوابی سوالات

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

1 سبق کا خاکہ

اس سبق میں آپ کو درج ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

- ☆ تنہیلی نظام کا تعارف
- ☆ دورانی نظام کا تعارف
- ☆ دورانی نظام کی اقسام
- ☆ مختلف حیوانات جیسے کچوے، جھینگڑ، مچھلیوں، جل تھلیوں، حوام، پرندوں اور پستانوں میں تنہیلی نظام
- ☆ حیوانات میں تنہیلی نظام کا ارتقاء

2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ مختلف حیوانات میں تنہی اعضاء کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ مختلف حیوانات میں تنہیلی نظام اور اس کی ارتقاء کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جسے آپ حیوان کے جسم میں مختلف مادوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو حمل و نقل کا نظام سمجھتے ہیں جو حیوان کے لئے بہتر طور پر زندگی کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لئے کافی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ مختلف حیوانات میں تنہیلی نظام کے مطالعہ کے ذریعہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ کس طرح ایک خلوی حیوانات میں پائے جانے والے سادہ قسم کے ابتدائی درجہ کا تنہیلی نظام بتدریج ارتقائی تبدیلیوں کے باعث پستانوں کے ترقی یافتہ اعلیٰ درجہ کے تنہیلی نظام میں ارتقاء پا گیا ہے

3 سبق کا متن

3.1 تنہیلی نظام (Transport System) کا تعارف

مختلف مادوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو حمل و نقل کا نظام تنہیلی نظام (Transport System) کہلاتا ہے۔ یہ نظام جاندار اجسام میں بھی موجود ہوتا ہے جو بہتر طور پر زندگی کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لئے کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہم جس غذا کو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے جسم میں ہضم ہوتی ہے۔ ہضم شدہ مختلف غذائی مادوں کی ہضمی نظام سے جسم کے تمام خلیوں تک منتقلی ضروری ہوتی

ہے۔ اس طرح آکسیجن، پیچیدہ مادوں سے خلیوں کو منتقل کی جاتی ہے جو خلیوں میں غذائی مادوں کی تکمیل کو انجام دیتی ہے۔ خلیوں میں تکمیلی تعامل کے نتیجہ میں پیدا شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ، پیچیدہ مادوں کو منتقل کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جسم سے باہر خارج کر دی جاسکے۔ جسم کے مختلف حصوں میں تیار ہونے والے مہلک فاضل مادے مختلف اخراجی مقامات کو منتقل کر دئے جاتے ہیں جہاں سے وہ باہر خارج کر دئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ہارمونس (Hormones) جو دروں افزائی غدود (Endocrine Glands) سے افزائے جاتے ہیں جسم میں مختلف مقامات کو پہنچا دئے جاتے ہیں جہاں وہ مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مادے جیسے آمینو ترشے (Amino Acids)، شحمی ترشے (Fatty Acids)، حیاتین (Vitamins) اور معدنیات (Minerals) جو استعمال شدہ غذا سے حاصل ہوتے ہیں انہیں جسم کے تمام خلیوں کو فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جاندار خلیوں کے جسم میں واقع ہونے والا ایسا نظام جس میں جسمی نظام سے پانی اور ہضم شدہ غذائی مادوں اور پیچیدہ مادوں سے آکسیجن کی جسم کے تمام خلیوں کو منتقلی اور تمام خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پیچیدہ مادوں کو منتقلی اور ناکارہ فاضل مادوں کے اخراج کے لئے مختلف مقامات کو منتقلی انجام پاتی ہے جسمی نظام (Transport System) کہلاتا ہے۔ اس نظام کو دوران خون کا نظام بھی کہا جاتا ہے۔ دوران خون کے نظام کو سب سے پہلے ولیم ہاروی (William Harvey) نے دریافت کیا۔



شکل 5.1

ولیم ہاروی


3.2 دورانی نظام کی اقسام (Types of Circulatory System)

حیوانات میں دمی و عاوں (Blood Vessels) کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بنیاد پر دورانی نظام کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۴ -

(1) کھلا دورانی نظام (Open Circulatory System)


بعض حیوانات جیسے حشرات (Insects) اور رخویوں (Molluscs) میں دمای و عائنیں (خون کی تالیاں) غیر موجود ہوتی ہے۔ ان کے جسم میں مخصوص کھلے (Cavities) پائے جاتے ہیں جنہیں جوئے (Sinuses) کہا جاتا ہے۔ ان جوئے میں خون دل کے ذریعہ پمپ کیا جاتا ہے۔ اس قسم کا دورانی نظام جس میں خون دل کے ذریعہ جوئے میں پمپ کیا جاتا ہے کھلا دورانی نظام (Open Circulatory System) کہلاتا ہے۔



فصل 5.2 کھلا دورانی نظام

(2) بند دورانی نظام (Closed Circulatory System)

بیشتر حیوانات کے جسم میں دمای و عائنیں (خون کی تالیاں) موجود رہتی ہیں ان دمای و عاؤں میں خون دل کے ذریعہ پمپ کر دیا جاتا ہے۔ دمای و عائنیں خون کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہیں اور جسم کے مختلف حصوں سے خون کو جمع کر کے دل کو منتقل کر دیتی ہیں۔ اس قسم کا دورانی نظام جس میں خون دمای و عاؤں (Blood Vessels) میں گردش کرتا ہوا ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچتا ہے بند دورانی نظام (Closed Circulatory System) کہلاتا ہے۔




فصل 5.3 بند دورانی نظام

(Single Circuit Heart) کہا جاتا ہے اس قسم کا دورانی نظام مچھلیوں میں پایا جاتا ہے۔

(ii) دوہرا دورانی نظام (Double Circulatory System)

ایسا دورانی نظام جس میں خون جسم کے مختلف اعضاء کو سربراہ ہونے سے قبل دو مرتبہ دل میں سے گزرتا ہے دوہرا دورانی نظام (Double Circulatory System) یا دوہرا دوران (Double Circulation) کہلاتا ہے۔ پہلی مرتبہ میں خون جسم کے مختلف اعضاء سے دل کو پہنچایا جاتا ہے جہاں سے خون شش (Lungs) کو پہنچایا جاتا ہے۔ شش سے خون دل کو بھیجا جاتا ہے جس کے بعد خون دل سے جسم کے مختلف اعضاء کو سربراہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جسم کے اعضاء کو سربراہ ہونے سے قبل خون دل میں دو مرتبہ داخل ہوتا ہے یعنی پہلی مرتبہ جسم سے اور دوسری مرتبہ شش سے داخل ہوتا ہے۔ اس قسم کے دل کو جس میں سے خون دو مرتبہ گزرتا ہے دوہرا دورانی قلب (Double Circuit Heart) کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا دورانی نظام جل مچھلیوں (Amphibians)، حوامیوں (Reptiles)، پرندوں (Aves) اور پستانوں (Mammals) میں پایا جاتا ہے۔




فصل 5.5 دورانی نظام

3.3 مختلف حیوانات میں تنقلی نظام (Transport System in Different Animals)

3.3.1 کیچوے میں تنقلی نظام (Transport System in Earthworm)

کیچوے میں بند قسم (Closed Type) کا دوسری دعائی نظام (Blood Vascular System) پایا جاتا ہے جو (1) اہم دوسری دعوں (Main Blood Vessels)، (2) جانبی دل (Lateral Hearts)، (3) دیگر دوسری دعوں (Other Blood Vessels)، (4) خون (Blood) اور (5) دورانی راستہ (Course of Circulation) پر مشتمل ہوتا ہے۔



شکل 5.6

کیچوے میں دوسری دعائی نظام - تیر کے نشان دوسری دعوں میں خون کی گردش کو ظاہر کرتے ہوئے۔

(1) اہم دوسری دعوں (Main Blood Vessels)

کیچوے میں دو اہم دوسری دعوں پائی جاتی ہیں یعنی (a) ظہری دوسری دعوں (Dorsal Blood Vessel) اور (b) بطنی دوسری

دعوں (Ventral blood Vessel)


(a) ظہری دوسری دعوں (Dorsal Blood Vessel)

یہ جسم کے وسطی ظہری حصہ میں غذائی مالی کے اوپر جسم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پائی جاتی ہے اس کی دیوار ہنڈ

ہوتی ہے۔ جسم کے ہر قطعہ میں اس دعوں کے اندر مصرعوں (Valves) کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے۔ جن میں متواتر انقباض (Contraction)

واقع ہوتا ہے۔ انقباض کی موج پچھلے سرے سے اگلے سرے کی جانب پھیلتی ہے جس کی وجہ سے اس دعوں میں خون جسم کے پچھلے سرے سے

اگلے سرے کی جانب بہتا ہے۔ یہ دماغ جسم کے مختلف قطعوں سے خون کو جمع کرتی ہے اس لئے اس کو حصولی دماغ (Collecting Vessel) کہا جاتا ہے۔



شکل 5.7


کچھے میں اہم دموی دماغ

(b) بطنی دموی دماغ (Ventral Blood Vessel)


یہ جسم کے وسطی بطنی حصہ میں غذائی نالی کے نیچے اور صحنی ڈور (Nerve Cord) کے اوپر جسم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک موجود رہتی ہے۔ یہ غیر انتہائی ہوتی ہے۔ اس کی دیوار پتلی ہوتی ہے۔ اس میں صرے (Valves) غیر موجود ہوتے ہیں۔ اس دماغ میں خون جسم کے اگلے سرے سے پچھلے سرے کی جانب بہتا ہے۔ یہ جسم کے مختلف حصوں کو خون فراہم کرتی ہے اس لئے اس دماغ کو تقسیمی دماغ (Distributing Vessel) کہا جاتا ہے۔

(2) جانبی دل (Lateral Hearts)

کچھے کے جسم میں جانبی دل کے 8 جوڑ پائے جاتے ہیں۔ یہ جسم کے 6 تا 13 قطعوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ہر قطعہ میں جانبی دل کا ایک جوڑ ہوتا ہے۔ یہ عضلاتی اور انتہائی دماغی دماغ ہیں۔ ہر ایک دل میں ایک جوڑ صرے (Valve) پایا جاتا ہے۔ جانبی دل عکری دموی دماغ کو بطنی دموی دماغ سے باہم مربوط کرتا ہے جس کی وجہ سے خون عکری دموی دماغ سے بطنی دموی دماغ میں پمپ کیا جاتا ہے۔



شکل 5.9
جانی دل



شکل 5.8
جانی مری دل

(3) دیگر دموی دوائیں (Other Blood Vessels)

جسم کے ہر قطعہ میں تین جوڑ دموی دوائیں پائی جاتی ہیں جو بالترتیب جسمی دیوار، آنت اور گردینوں (Nephridia) سے خون کو نکری دموی دوا میں پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح ہر قطعہ میں بطنی دموی دوا سے تین جوڑ دموی دوائیں نکلتی ہیں جو بالترتیب جسمی دیوار، آنت اور گردینے کو خون فراہم کرتی ہیں۔

(4) خون (Blood)

کچھ عے کا خون دماہ (Plasma) اور ایض جسموں (Leucocytes) پر مشتمل ہوتا ہے۔ دماہ میں ہیوگلوبین (Haemoglobin) نامی تھنسی صبہ (Respiratory Pigment) حل شدہ حالت میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ خون میں امر جسمے (Erythrocytes) (سرخ جسمے) غیر موجود ہوتے ہیں۔ خون بند نالیوں (دعاوں) میں بہتا ہے۔ یہ ہاتھوں (Tissues) کو آکسیجن اور مقویات (Nutrients) فراہم کرتا ہے اور فاضل مادوں کو ان کے مقام پیدائش سے اخراجی اعضاء کو پہنچاتا ہے۔

(5) دورانی راستہ (Course of Circulation)

ظہری دموی وعاء جو حصولی وعاء (Collecting Vessel) کہلاتی ہے خون کو جسم کے ہر قطعہ میں موجود جسمی دیوار آنت اور گردینہ سے حاصل کرتی ہے۔ خون جب ظہری وعاء میں جسم کے پچھلے سرے سے اگلے سرے کی جانب بہتے ہوئے تیر حویں سے چنویں قطعہ تک پہنچتا ہے تو جانبی دلوں کے ذریعہ بطنی وعاء میں پمپ کر دیا جاتا ہے۔ خون بطنی وعاء میں جسم کے اگلے سرے سے پچھلے سرے کی جانب بہتا ہے تو جسم کے ہر قطعہ میں جسمی دیوار آنت اور گردینہ کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے بطنی دموی وعاء کو تقسیمی وعاء (Distributing Vessel) کہا جاتا ہے۔۔

3.3.2 جھینگر میں مقلی نظام (Transport System in Cockroach)

جھینگر میں دموی وعائی نظام ناقص مویافتہ ہوتا ہے کیوں کہ اس نظام میں خون کی شعریا نئیں (Capillaries) دریدیں (Veins) اور دموی صنف (Blood Pigments) غیر موجود ہوتے ہیں۔ دموی وعائی نظام کلمے قسم (Open Type) کا ہوتا ہے کیوں کہ خون بند نالیوں میں نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جوفوں (Sinuses) میں موجود ہوتا ہے۔

جھینگر کا دموی وعائی نظام (a) دموی قعر (Haemocoel) (b) جنائی عضلات (Alary Muscles) (c) دل (Heart) (d) اور خون پر مشتمل ہوتا ہے۔

(a) دموی قعر (Haemocoel)

جھینگر کے جسمی کہفہ (Body Cavity) میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کہفہ کو دموی قعر (Haemocoel) کہا جاتا ہے۔ دموی قعر ظہری اور بطنی ڈائفرام (Diaphragm) کے ذریعہ تین جوفوں (Sinuses) میں منقسم ہوتا ہے۔

- (i) ظہری جوفہ (Dorsal Sinus) جس کو گرد قلبی جوفہ (Pericardial Sinus) کہا جاتا ہے جس میں دل بند رہتا ہے۔
- (ii) وسطی جوفہ (Middle Sinus) جو غذائی نالی اور تولیدی اعضاء کو گھیرا ہوا ہوتا ہے گرد احشائی جوفہ (Perivisceral Sinus) کہلاتا ہے۔

(iii) بطنی جوفہ (Ventral Sinus) جو معصی ڈور کو گھیرا ہوا ہوتا ہے گرد معصی جوفہ (Perineural Sinus) کہلاتا ہے۔


(b) جنائی عضلات (Alary Muscles)

جھینگر میں تقریباً 12 جوڑ جنائی عضلات (Alary Muscles) پائے جاتے ہیں جن کی شکل پکھانما ہوتی ہے۔ یہ عضلات جسمی دیوار کو ظہری ڈائفرام (Dorsal Diaphragm) سے جوڑتے ہیں۔ ان عضلات میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون

دل میں داخل ہوتا ہے۔

(c) دل (Heart)


جھینگر کا دل لانا، عضلاتی، انقباضی (Pulsating) اور نلی نما ہوتا ہے جو صدر (Thorax) اور شکم (Abdomen) میں وسطی ظہری مقام پر موجود ہوتا ہے۔ دل تیرا خانوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب میں پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگلا خانہ اگلا اور طہ (Anterior Aorta) بناتا ہے جب کہ پیچھلا خانہ بندر ہوتا ہے۔ ہر خانہ کا اگلا حصہ چوڑا ہوتا ہے۔ ہر خانہ کا تنگ حصہ پہلے خانہ کے چوڑے حصہ میں روزن کے ذریعہ کھلتا ہے یعنی تیرا خانوں کا ہر ہویں خانہ میں، ہارواں خانہ گیارہویں خانہ میں اور گیارہواں خانہ دسویں خانہ میں کھلتا ہے۔ ہر روزن پر صرہ (Valve) پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے خون صرف اگلی سمت میں ہی بہتا ہے۔ بجو آخری خانہ کے ہر خانہ کے جانبی دیوار میں روزن پایا جاتا ہے جس کو دھنچے (Ostia) کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ خانہ گرد قلعی جوفہ (Pericardial Sinus) سے مربوط رہتا ہے۔ دھنچے میں صرہ (Valve) موجود ہوتا ہے جو خون کو گرد قلعی جوفہ سے صرف دل میں داخل ہونے دیتا ہے لیکن واپس ہونے نہیں دیتا۔ دل کے عضلات دھاری دار (Striated) ہوتے ہیں۔ خون دل کی ذودی حرکت (Peristaltic Movement) کے ذریعہ پمپ کیا جاتا ہے۔



فصل 5.10 جھینگر کے دل کا ظہری مہر

(d) خون (Blood)

جھینگڑ کا خون بے رنگ ہوتا ہے جس میں نامیاتی اور غیر نامیاتی اشیاء پائی جاتی ہیں۔ خون میں دو قسم کے بے رنگ دھوی خلیے (Haemocytes) پائے جاتے ہیں جن کو پیش ایض جیسے (Proleucocytes) اور دہلی خلیے (Plasmatocytes) کہا جاتا ہے۔ دہلی خلیے (Plasmatocytes) اکال خلیوں (Phagocytes) کے مانند فعل انجام دیتے ہیں جو خورد بینی عضویوں کو نگل لیتے ہیں۔ خون میں مخصوص شکر پائی جاتی ہے جس کو ٹریالوز (Trehalose) کہا جاتا ہے۔ خون اگرچہ غیر تنفسی ہوتا ہے لیکن کئی اشیاء کی منتقلی کے لئے واسطہ کا کام انجام دیتا ہے۔ خون کے ذریعہ ہضم شدہ غذائی مادے جسم کے تمام حصوں کو، تانہ و جینی فاضل مادے اخراجی اعضاء کو اور ہارمونس (Hormones) مخصوص اعضاء کو منتقل کئے جاتے ہیں۔




فصل 5.11

جھینگڑ کا دھوی لہف (خون)

دوران خون کی میکانیت (Mechanism of Blood Circulation)


جھینگڑ میں خون کا دوران جناتی عضلات (Alary Muscles) میں بالترتیب انقباض اور انبساط اور دل کی سوچی انقباض کے سبب واقع ہوتا ہے۔ جناتی عضلات میں انقباض واقع ہونے کی وجہ سے خون گرد احشای جوفہ (Perivisceral Sinus) سے گرد قلبی جوفہ (Pericardial Sinus) میں داخل ہوتا ہے جب کہ جناتی عضلات میں انبساط واقع ہوتا ہے تو خون گرد قلبی جوفہ سے دھجوں (Ostia) کے ذریعہ دل میں داخل ہوتا ہے۔ خون دل میں پچھلے خانہ سے اگلے خانہ کی طرف بہتا ہے۔ دل کی سوچی انقباض کی وجہ سے خون دل سے اورطہ (Aorta) میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے یہ سر کے جوفہ (Head Sinus) میں داخل ہو کر گرد عصبی جوفہ (Perineural Sinus) میں داخل ہوتا ہے۔

(Sinus) اور پھر گردا شائی جوفہ (Perivisceral Sinus) میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ خون کا دوران دہرایا جاتا ہے۔



شکل 5.12

جیسے تکر کا دوران نظام جس میں خون کی گردش کو ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل 5.13

دو خانوں کی مکمل شکل دھانچہ کو دیکھتے ہوئے


3.3.3 مچھلیوں میں تنقلی نظام (Transport System in Fishes)

مچھلیوں کا دل دو خانوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک از (Atrium or Auricle) اور ایک بطین (Ventricle) موجود ہے۔


موجودہ ہے۔ بطین کے ظہری سطح پر تلی دیوار والا ایک سہ ضلعی خانہ ہوتا ہے جس کو جوفہ وریڈی (Sinus Venosus) کہا جاتا ہے جو اذین میں جوفی اذینی روزن (Sinuauricular Aperture) کے ذریعہ کھلتا ہے۔ اس روزن پر جوفی اذینی مصرعہ

(Sinuaueicular Valve) موجود رہتا ہے جو خون کو واپس پلٹنے سے روکتا ہے۔ اذین (Auricle) ایک سہ خلیہ خانہ ہوتا ہے جو بطن میں اذنی بطنی روزن (Auriculo Ventricular Aperture) کے ذریعہ کھلتا ہے۔ اس روزن پر اذنی مصرعہ (Auriculo Ventricular Valve) پایا جاتا ہے جو خون کو اذین میں واپس لوٹنے سے روکتا ہے۔ بطن کے سامنے ایک ثقیل نسا خانہ ہوتا ہے جس کو مخروط شریانی (Conus Arteriosus) کہا جاتا ہے جس میں بطن ایک روزن کے ذریعہ کھلتا ہے۔ اس روزن پر نیم ہلالی مصرعے (Semilunar Valves) پائے جاتے ہیں۔

جسم کے تمام حصوں سے غیر آکسیجنی خون دو بڑی وریدوں کے ذریعہ جوف وریدی میں داخل ہوتا ہے جہاں سے یہ اذین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اذین سے خون بطن میں داخل ہوتا ہے اور مخروط شریانی (Conus Arteriosus) سے گزرتا ہوا بطنی اورط (Ventral Aorte) میں داخل ہوتا ہے۔ بطنی اورط سے خون دراندہ ضیوی شریانوں (Afferent Branchial Arteries) کے ذریعہ گھمروں (Gills) کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ گھمروں میں خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) علیحدہ ہو کر جسم سے باہر پانی میں خارج کردی جاتی ہے۔ اسی اثنا میں پانی میں موجود حل شدہ آکسیجن گھمروں کے خون میں نفوذ ہو جاتی ہے۔ گھمروں سے آکسیجن رسیدہ خون (Oxygenated Blood) برآرندہ ضیوی شریانوں (Efferent Branchial Arteries) کے ذریعہ قلبی اورط میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مچھلیوں کے دل سے صرف وریدی خون (Venous Blood) یعنی غیر آکسیجنی خون ہی بہتا ہے۔ اس لئے ان کے دل کو وریدی دل (Venous Heart) کہا جاتا ہے۔ دل چوں کہ گھمروں کو خون پہنچاتا ہے اس لئے اس کو ضیوی دل (Branchial Heart) بھی کہا جاتا ہے۔ مچھلیوں میں خون کے گردش کو اکہر اوران (Single Circulation) کہا جاتا ہے۔



شکل 5.14 ابتدائی فقروں کے قلب کے خانوں کا خاکہ (مثلاً اسکولیوڈان کا قلب)



شکل 5.16

مینڈک کے دل کا ظہری منظر


شکل 5.17

مینڈک کے دل کا بطنی منظر

(Systemic) اور ششی جلدی (Pulmocutaneous) کمانیں (Arches) کہا جاتا ہے۔

دل جسم کے تمام حصوں کو خون پہنچاتا ہے۔ دل کے خانوں میں متواتر ایک کے بعد دیگرے انقباض (Systole) اور انقباض (Diastole) واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون دل سے پمپ کیا جاتا ہے۔ انقباض کا عمل سب سے پہلے جوف وریڈی (Sinus Venosus) میں شروع ہوتا ہے۔ تب اذین (Atrium) اور پھر بطین (Ventricle) میں واقع ہوتا ہے اور بالآخر ساق شریانی (Truncus Arteriosus) میں واقع ہوتا ہے۔ خون بھی ان خانوں سے اسی تسلسل میں گزرتا ہے۔

جسم کے تمام حصوں سے غیر آکسیجنی خون تینوں وریڈ کلاں (Vena Cavae) کے ذریعہ جوف وریڈی (Sinus Venosus) میں داخل ہوتا ہے۔ جوف وریڈی میں انقباض واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون دائیں اذین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی دوران آکسیجنی خون پھیپھڑوں سے ششی وریڈ (Pulmonary Vein) کے ذریعہ بائیں اذین میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت دائیں اور بائیں دونوں اذین میں بہ یک وقت انقباض واقع ہوتا ہے اور خون دونوں اذین سے بطین میں داخل ہو جاتا ہے۔ بطین میں آکسیجنی اور غیر آکسیجنی دونوں خون مل جاتے ہیں تب بطین میں انقباض واقع ہوتا ہے اور ملوایں خون ساق شریانی (Truncus Arteriosus) سے گزرتا ہوا بہ یک وقت تینوں بڑی شریانی کمانوں میں داخل ہوتا ہے جہاں سے خون جسم کے تمام حصوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔



شکل 5.18

میزڈک کے دل کی اندرونی ساخت


جل تھلیوں کا دل پھپھڑوں کو خون آکسیجین کے لئے پمپ کرتا ہے اس لئے اس ایسے دل کو ششی دل (Pulmonary Heart) کہا جاتا ہے۔ اہلی حیوانات کی طرح جل تھلیوں میں بھی خون جسم کے مختلف اعضاء کو سربراہ ہونے سے قبل دل سے دوسرے گزرتا ہے یعنی ایک مرتبہ دل سے پھپھڑوں کو اور دوسری مرتبہ دل سے جسم کے تمام حصوں کو گزرتا ہے۔ ایسے دل کو دوہرا دورتی قلب (Double Circuit Heart) کہا جاتا ہے اور دوران خون کو دوہرا دوران (Double Circulation) کہا جاتا ہے۔

3.3.5 حوامیوں میں تنقلی نظام (Transport System in Reptiles)



حوامیوں (Reptiles) جیسے چمکی، گرگٹ اور سانپ وغیرہ میں بھی دوران خون کا نظام دل (Heart)، شریانوں (Arteries)، وریدوں (Veins) اور شعریانوں (Capillaries) پر مشتمل ہوتا ہے۔

حوام کا دل بھی تین خانہ دار ہوتا ہے جو دو اذین (Atrium) اور ایک بطین (Ventricle) پر مشتمل ہوتا ہے لیکن بطین نامکمل طور پر تقسیم شدہ دو خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دائیں اذین میں جوف وریدی (Sinus Venosus) کھلتا ہے۔ ساق شریانی (Truncus Arteriosus) غیر موجود ہوتا ہے۔ اس لئے اور طی کمانیں (Aortic Arches) راست طور پر بطین سے ہی نکلتی ہیں۔ حوام کا دل بھی ششی

دل کہلاتا ہے اور ان میں بھی دورانِ خون کو دہرا دوران کہا جاتا ہے




فصل 5.19
ہوام کے دل کا ظہری منظر



فصل 5.21 ہوام کے رول کی اندرونی ساخت (عمودی تراش)


3.3.6 پرندوں اور پستانوں میں تنقیلی نظام (Transport System in Birds and Mammals)

پرندوں جیسے کبوتر چڑیا اور طوطا وغیرہ اور پستانوں (Mammals) جیسے بلی، کتا، گھوڑا اور انسان وغیرہ میں دل مکمل چار خانہ دار (Four Chambered Heart) ہوتا ہے جن میں دو اذین (Atrium) اور دو بطن (Ventricles) پائے جاتے ہیں۔ جوف دریہ (Sinus Venosus) اور ساق شریانی (Truncus Arteriosus) دونوں غیر موجود ہوتے ہیں۔ دایاں اذین ہی جسم کے تمام حصوں سے غیر آکسیجنی خون کو تین دریہ کلاں (Vena Cavae) کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ دائیں اذین سے خون دائیں بطن میں دائیں اذینی بطنی روزن کے ذریعہ داخل ہوتا ہے جہاں سے یہ ششی شریان (Pulmonary Artery) کے ذریعہ پیچہروں میں آکسیجین کے لئے پہنچا دیا جاتا ہے۔ پیچہروں سے آکسیجن رسیدہ خون ششی دریہ (Pulmonary Vein) کے ذریعہ بائیں اذین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بائیں اذین سے خون بائیں بطن میں بائیں اذینی بطنی روزن کے ذریعہ داخل ہوتا ہے۔ بائیں بطن سے آکسیجن رسیدہ خون جسم کے تمام حصوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پرندوں اور پستانوں کا دل بھی ششی دل کہلاتا ہے اور دوران خون بھی دوہرا دوران قسم کا ہوتا ہے۔




شکل 5.23
پرند (کبوتر) کے دل کا ظہری منظر


شکل 5.22
پرند (کبوتر) کے دل کا بطنی منظر



شکل 5.24
پرندے کے دل کی تراش



شکل 5.25
خرگوش کے دل کی بیرونی ساخت



شکل 5.26

خرگوش کے دل کی اندرونی ساخت


3.4 حیوانات میں عمقیلی نظام کا ارتقاء

(Evolution of Transport System in Animals)


عضویوں میں واقع ہونے والی بتدریج ترقی پذیر تبدیلیوں کو ارتقاء (Evolution) کہا جاتا ہے جس کے دوران سادہ شکل ایک پیچیدہ شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ ابتدائی حیوانات جن کے جسم کی ساخت سادہ ہوتی ہے ان میں موجودہ مختلف نظام بھی سادہ قسم کے ہوتے ہیں۔ لہذا ان میں عمقیلی نظام (Transport System) بھی انتہائی سادہ قسم کا ہوتا ہے۔ یک خلوی حیوانات (Unicellular Animals) جیسے اول حیوانے (Protozoans) جن کے جسم کی ساخت سادہ یعنی یک خلوی ہوتی ہے زندگی کے تمام اہم افعال کو سادہ طریقہ پر انجام دیتے ہیں۔ لہذا اس میں عمقیلی نظام بھی ابتدائی درجہ کا ہوتا ہے۔ ان میں موجود غلیہ مایہ (Cytoplasm) مسلسل حالت حرکت میں رہتا ہے جس کو سیل حرکت (Streaming Movement) کہا جاتا ہے۔ غلیہ مایہ کی اس حرکت کے باعث مختلف مادے غلیہ میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل کئے جاتے ہیں۔ غلیہ مایہ میں مادوں کی منتقلی عمل نفوذ پذیری (Diffusion) کے باعث بھی انجام پاتی ہے۔

ارتقاء کے باعث یک خلوی حیوانات سے کثیر خلوی حیوانات کا وجود نسل میں آتا ہے۔ ارتقائی تبدیلیوں کے باعث ایک جیسے ظنی آپس میں مل کر بافت (Tissue) بناتے ہیں اور ایک جیسی ہائیں باہم مل کر عضو (Organ) بناتی ہیں اور اعضاء سے اعضائی نظام (Organ Systems) تشکیل پاتے ہیں جو باہم مل کر مکمل جسم کو تیار کرتے ہیں۔ لہذا کثیر خلوی حیوانات کے جسم کے مختلف اعضاء کی عمدہ کارکردگی کو انجام دینے کے لئے انھیں درکار مادوں کی فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے مخصوص قسم کا تقبلی نظام تشکیل پاتا ہے جس کو دورانی نظام (Circulatory System) کہا جاتا ہے۔ دورانی نظام قلب، دسوی وعاوں (Blood Vessels) اور خون پر مشتمل ہوتا ہے۔

مختلف حیوانات کے قلب میں خانوں کی تعداد ارتقائی رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ مچھلی کے قلب میں دو خانے، مینڈک کے قلب میں تین خانے، حوامیوں (Reptiles) جیسے گرگٹ کے قلب میں تین خانے اور ایک نصف خانہ، پرندوں (Aves) اور پستانوں (Mammals) کے قلب میں مکمل چار خانے پائے جاتے ہیں۔ بعض حوامیوں جیسے مگرچھ (Crocodile) اور الگھڑ (Alligator) کے قلب میں مکمل چار خانے موجود ہوتے ہیں جو ارتقائی سلسلہ کو ظاہر کرتے ہیں کہ پستانوں میں پائے جانے والے قلب کا ارتقاء حوامیوں کے قلب سے عمل میں آیا ہے۔ بالفاظ دیگر حوامیوں میں موجودہ تین اور ایک نصف خانوں والے قلب سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح تین خانوں والا قلب چار خانوں والے قلب میں ارتقاء پا گیا ہے۔



شکل 5.27. فقروں کی مختلف جماعتوں میں دل کا ارتقاء



A = اذین ، LA = پایاں اذین ، P = ششی ، SV = جوفہ وریدی

Ao = اورطہ ، LV = پایاں بطین ، RA = دایاں اذین ، V = بطین

شکل 5.28

نقروں کے مختلف حیوانات میں دل کی ساخت کا مقابلہ۔ تیر کے نشانات خون کے بہاؤ کو ظاہر کرتے ہوئے۔

جدول 1 مختلف حیوانات کے دل میں خانوں کی تعداد جو بتدریج ارتقائی مراحل کو ظاہر کرتی ہے۔

حیوانات کے گروہ	حیوانات کے نام	دل میں خانوں کی تعداد	خانوں کے نام
مچھلیاں (Fishes)	تمام مچھلیاں	2	ایک اذین (Auricle) ایک بطین (Ventricle)۔
جل تھلیے (Amphibians)	مینڈک ، غوک	3	دو اذین (Auricles) ایک بطین (Ventricle)۔
حواص (Reptiles)	گرگٹ ، ورنس	2 مکمل اور ایک دو خانوں میں جزوی تقسیم شدہ یعنی تین اور ایک نصف خانے۔	دو اذین (Auricles) ایک بطین (Ventricle) جزوی طور پر نامکمل دو خانوں میں تقسیم شدہ۔
مکرچھ ، اکیٹر	4 مکمل چار خانوں میں تقسیم دو اذین (Auricles) دو بطین (Ventricles)۔	4 مکمل چار خانوں میں تقسیم دو اذین (Auricles) دو بطین (Ventricles)۔	
پندے (Aves) اور پستانے	کبوتر ، چڑیا ، طوطا وغیرہ خرگوش ، چوہا اور انسان	4 4	دو اذین (Auricles) دو بطین (Ventricles)

- ☆ مختلف مادوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو حمل و نقل کا نظام تقابلی نظام کہلاتا ہے۔ اس نظام کو دورانی نظام بھی کہا جاتا ہے۔
- ☆ جسم میں پائے جانے والے مخصوص کہنوں کو جو نے (Sinuses) کہا جاتا ہے۔
- ☆ ایسا دورانی نظام جس میں خون دل کے ذریعہ جوفوں میں پمپ کیا جاتا ہے کھلا دورانی نظام (Open Circulatory System) کہلاتا ہے۔ اس قسم کا دورانی نظام حشرات اور رخویوں (Molluscs) میں پایا جاتا ہے۔
- ☆ ایسا دورانی نظام جس میں خون دموں و عموں (Blood Vessels) میں گردش کرتا ہو ایک مقام سے دوسرے مقام پہنچتا ہے بند دورانی نظام (Closed Circulatory System) کہلاتا ہے اس قسم کا نظام ایسے حیوانات میں پایا جاتا ہے جس میں دموں و عموں پائی جاتی ہیں۔
- ☆ بند دورانی نظام دو اقسام کا ہوتا ہے یعنی اکہر اورانی نظام (Single Circulatory System) اور دوہر اورانی نظام (Double Circulatory System)۔
- ☆ ایسا دورانی نظام جس میں خون جسم کے اعضاء کو سربراہ ہونے سے قبل دل میں سے صرف ایک ہی مرتبہ گزرتا ہے اکہر اورانی نظام کہلاتا ہے۔ اس قسم کا دورانی نظام مچھلیوں میں دیکھا جاتا ہے۔
- ☆ ایسا دورانی نظام جس میں خون جسم کے اعضاء کو سربراہ ہونے سے قبل دل میں سے دو مرتبہ گزرتا ہے دوہر اورانی نظام کہلاتا ہے۔ اس قسم کا نظام ہل مچھلیوں، ہوامیوں، پرندوں، پستانوں، بشمول انسان میں دیکھا جاتا ہے۔
- ☆ کچھ سے میں بند قسم کا دورانی نظام پایا جاتا ہے۔
- ☆ کچھ سے میں ٹکھری دموں و عموں کو حصول و عموں کہا جاتا ہے جو جسم کے مختلف قطعوں سے خون کو جمع کرتی ہے۔ بطنی دموں و عموں کو تنفسی و عموں کہا جاتا ہے جو جسم کے مختلف قطعوں کو خون تقسیم کرتی ہے
- ☆ کچھ سے میں جانبی دل کے 8 جوڑ پائے جاتے ہیں جو جسم کے 6 تا 13 قطعوں میں موجود رہتے ہیں یہ خون کو ٹکھری دموں و عموں سے بطنی دموں و عموں میں پمپ کرتے ہیں۔
- ☆ کچھ سے کا خون دما (Plasma) اور ابیش جسموں (Leucocytes) (سفید خون کے خلیوں) پر مشتمل ہوتا ہے۔ دما میں

ہیوگلوین نامی تنفسی صدفہ حل شدہ حالت میں موجود رہتا ہے اس لئے اگر جسے نہیں پائے جاتے ہیں۔

☆ جھینگر میں پھیلی نظام ناقص نمویانہ ہوتا ہے اور کھلے جسم کا ہوتا ہے۔

☆ جھینگر کا بھسی کہلہ دموی قعر (Haemoceol) کہلاتا ہے ایسا جھسی کہلہ جس میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے دموی قعر کہلاتا ہے۔

☆ جھینگر میں 12 جوڑ پنکھا نما جاتی عضلات (Alary Muscles) پائے جاتے ہیں جو خون کو دل میں داخل ہونے میں مدد دیتے

ہیں۔

☆ جھینگر کا دل لانا، عضلاتی، انقباضی، ٹلی نما ہوتا ہے جو 13 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون دل کی دودی حرکت (Peristaltic Movement) کے ذریعہ پسپا کیا جاتا ہے۔

☆ جھینگر کا خون بے رنگ ہوتا ہے۔ خون میں مخصوص شکر پائی جاتی ہے جس کو ٹریہالوز (Trehalose) کہا جاتا ہے۔ خون غیر

تنفسی ہوتا ہے۔

☆ جھینگر میں دوران خون کا راستہ مخصوص حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون گرد احشائی جوفہ (Perivisceral Sinus) سے گرد

قلبی جوفہ (Pericardial Sinus) میں داخل ہو کر دل میں داخل ہوتا ہے جہاں سے اورطہ (Aorte) میں سے گزرتے

ہوئے سر کے جوفہ (Head Sinus) میں داخل ہو کر گرد عصبی جوفہ (Perineural Sinus) میں داخل ہوتا ہے جہاں سے یہ

گرد احشائی جوفہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح یہ خون کا دوران دہرایا جاتا ہے

☆ مچھلیوں کا دل دو خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جن میں ایک اذین (Atrium) اور دوسرا بطن (Ventricle) ہوتا ہے۔ بطن

کے ظہری سطح پر جوفہ وریدی (Sinus Venosus) اور بطن کے سامنے ایک ٹلی نما خانہ مخروطی شریانی (Conus

Arteriosus) پائے جاتے ہیں۔

☆ غیر آکسیجنی خون در اندہ خیشوی شریانوں (Afferent Branchial Arteries) کے ذریعہ مکھڑوں کو پہنچایا جاتا ہے۔

☆ آکسیجن رسیدہ خون مکھڑوں سے برآرندہ خیشوی شریانوں (Efferent Branchial Arteries) کے ذریعہ ظہری اورطہ

(Dorsal Aorta) میں داخل ہوتا ہے جہاں سے جسم کے مختلف حصوں کو پہنچایا جاتا ہے۔

☆ جل تھلیوں کا دل تین خانوں یعنی دو اذین (Atrium) اور ایک بطن (Ventricle) پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوفہ

وریدی (Sinus Venosus) اور ساق شریانی (Truncus Arteriosus) بھی پائے جاتے ہیں۔

- ☆ جل تھلیوں میں ساق شریانی دو شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر ایک شاخ سے تین اور ملی کمائیں (Aortic Arch es) نکلتی ہیں جن کو سبائی (Carotid)، نظامی (Systemic) اور ششی جلدی (Pulmocutaneous) کمائیں کہا جاتا ہے۔
- ☆ صواسیوں میں دل تین خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دو اذین اور ایک بطن۔ بطن نامکمل طور پر دو حصوں میں منقسم رہتا ہے۔
- ☆ صواسیوں میں جوف وریڈی موجود ہوتا ہے لیکن ساق شریانی غیر موجود ہوتا ہے۔
- ☆ پرندوں اور پستانوں کا دل چار خانوں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں دو اذین اور دو بطن پائے جاتے ہیں۔ جوف وریڈی اور ساق شریانی دونوں غیر موجود ہوتے ہیں۔

5 زائد معلومات

حیوانات میں دل کی اقسام

دل دوران خون کے نظام میں مرکزی، عضلاتی اور پمپ کرنے والا ایک اہم عضو ہے۔ مختلف حیوانات میں دل کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔

(i) انقباضی دل (Pulsatile Hearts)

یہ دموئی وعائیں ہیں جن میں متواتر انقباض واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس قسم کا دل حلقوں (Annelids) اور ایفیاکس (Amphioxus) میں دکھائی دیتا ہے۔

(ii) ٹی ٹیوبول (Tubular Hearts)

یہ ٹی کی شکل میں ہوتے ہیں جو جڑ پائیں (Arthropods) بیلا نوگلاس (Balanoglossus) اور ایسڈین (Ascidian) میں پائے جاتے ہیں۔

(iii) خانہ دار دل (Chambered Hearts)

اس قسم کے دل خانوں میں منقسم رہتے ہیں۔ ان خانوں کو اذین اور بطن کہا جاتا ہے۔ یہ فقریوں میں پائے جاتے ہیں۔

(iv) معاون دل (Accessory Hearts)

یہ دراصل دموئی وعادوں کا کشادہ حصہ ہوتے ہیں۔ یہ بوسٹر پمپس (Booster Pumps) کے طور پر فعل انجام دیتے ہیں اور یہ

بعض اعضاء کو خون اضافہ دباؤ کے تحت پمپ کرتے ہیں۔ اس قسم کے دل (Insects) کاسپائیوں (Cephalopods) مچھلیوں (Fishes)، جل تصبیوں (Amphibians) اور حواسیوں (Reptiles) میں موجود ہوتے ہیں۔

(v) عضلی زائی دل (Myogenic Hearts)

ایسا دل جس میں قلبی دھڑکن (Heart Beat) دل کے عضلات میں پیدا ہوتی ہے عضلی زائی دل (Myogenic Hearts) کہلاتا ہے۔ اس قسم کے دل فقریوں (Vertebrates) اور رخویوں (Molluscs) میں پائے جاتے ہیں۔ قلبی دھڑکن مچھلیوں اور جل تصبیوں میں دل کے جوف وریہ (Sinus Venosus) میں شروع ہوتی ہے جب کہ حواسیوں، پرندوں اور پستانوں میں یہ دل کے جوفی افزئی عقدہ (Sinu Auricular Node) میں شروع ہوتی ہے۔

(vi) عصبی زائی دل (Neurogenic Hearts)

ایسے دل جس میں قلبی دھڑکن دل کے ظہری سطح پر پائے جانے والے عقدی خلیوں (Ganglionic Cells) میں پیدا ہوتی ہے عصبی زائی دل (Neurogenic Hearts) کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے دل اکثر قشریوں (Crustacean)، حشرات (Insects)، لیولس (Limulus) اور کئی حلقیوں (Annelids) میں موجود ہوتے ہیں۔

فرہنگ

6



Alary Muscle	الارے سلس	جنامی عضلات	جھینٹھر کے گرد قلبی جوف نامی جسی کہلہ کے حصہ میں پائے جانے والے پکھا نما عضلات جو خون کی گردش کو قائم رکھنے کے لئے قلبی دیوار کے سکڑنے اور پھیلنے میں مدد کرتے ہیں۔
Aortic Arches	اورٹیک آرچس	اورٹی کمانیں	دل سے نکلنے والی بڑی شریانیں۔
Atrium	ایٹریم	اذین	دل کا اگلا خانہ جس میں خون بڑی وریہ کے ذریعہ داخل ہوتا ہے پایرونی کہلہ۔
Carotid	کیروائیڈ	سباتی	اہم دہوی شریان جو خون سر کو پہنچاتی ہے۔

Conus Arteriosus	کونس آرٹیریوس	مخروط شریانی	تلی نما خانہ جس میں بھین کھلتا ہے۔
Diastole	ڈیاستول	دیسٹول	انبساط یا پھیلاؤ۔ دل کے خانوں کا پھیلاؤ۔
Haemocyte	ہیموسائٹس	دموی خلیے	خلیے جو خون کے دما ب میں پائے جاتے ہیں۔
Haemocoel	ہیموسیل	دموی قعر	جیسی کہہ خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
Leucocyte	لیوکوسائٹس	ابھیس جیسے	خون میں پائے جانے والے سفید جیسے جو بیرونی خوردبینی عضویوں کے خلاف مدافعتی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔
Nephridia	نفریڈیا	گردینہ	کچھ بڑے اور بعض دیگر غیر فحری حیوانات میں ملی نما اخراجی عضو۔
Ostium	آسٹیم (واحد)	دھنچ	راستہ کا روزن یا اسٹنچ میں تالیوں کے نظام کے
Ostia	آسٹیا (جمع)	دھنچ	روزن جس کے ذریعہ پانی ان تالیوں کے نظام میں داخل ہوتی ہے۔
Osculum	اسکیولم	رو دہن	بیرونی راستہ کا روزن یا اسٹنچ میں اسٹنچی قعر (Spongocoel) جیسی کہہ کا روزن جو بیرونی جانب کھلتا ہے جس کے ذریعہ پانی اسٹنچی قعر سے باہر خارج ہوتا ہے
Pericardial Sinus	پیری کارڈیل سائنس	گرد قلبی جوفہ	دل کے اطراف پایا جانے والا کہہ۔
Perineural Sinus	پیری نیورل سائنسی	گرد عصبی جوفہ	جھینگر میں جیسی کہہ کا وہ حصہ جس میں عصبی ڈور پائی جاتی ہے۔
Perivisceral Sinus	پیری ویرل سائنس	گرد احشائی جوفہ	جھینگر کے جیسی کہہ کا وہ حصہ جس میں غذائی مالی موجود ہوتی ہے۔

Peristaltic Movement	پری اسٹالٹک موومنٹ	دودی حرکت	مخصوص حرکت جو دائری عضلات اور طوی عضلات کے سلسلہ وار سکڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
Phagocyte Cells	فagosaitک سلس	اکال خلیے	ایسے خلیے جو بیرونی شے یا عضویوں کو نگل لیتے ہیں۔
Proleucocyte	پرو لیوکوسائٹ	چیش ابیش خلیہ	ابتدائی نوعیت کا سفید جسم۔
Pulmocutaneous Artery	پلمو کیوٹینیس آرٹری	ششی جلدی شریان	خون کی نالی جو دل سے شش اور جلد کو خون پہناتی ہے۔
Pulsating Heart	پلسٹینگ ہارت	انقباضی قلب	دل جو انقباض کرتا ہے۔
Sinus	سائی نس	جوزہ	کہنہ یا جگہ۔ چکی دیوار والی کشادہ جگہ یا کہنہ۔
Sinus Venosus	سائی نس دینوسس	جوف دریدی	چکی دیوار والی کشادہ خون کی نالی (درید) جو دل میں گھلتی ہے۔
Truncus Arteriosus	ٹرکس آرٹیریوسس	ساق شریانی	تند نما خانہ جو دل کے بطن سے نکلتا ہے جیسے مینڈک کے دل میں موجود رہتا ہے۔
Valve	وال	مصرعہ یا صمام	روزن پر پائی جانے والی عضلاتی ساخت جو کسی شے کو واپس لوٹنے سے روکتی ہے جیسے دل کے خانوں میں پائے جانے والے روزنوں پر موجود مصرعے جو خون کو واپس لوٹنے سے روکتے ہیں اور خون کو ایک ہی سمت میں بہنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔

Ventricles	وینٹریکلز	بطن	دل کے پچھلے خانے جو خون کو پمپ کرتے ہیں یا
Vena Cavae	وینا کیوا	ورید کلاں	دماغ میں پائے جانے والے کھنڈے۔
			بڑی ورید جو دل کے خانہ میں نکلتی ہے۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) تنقیلی نظام سے کیا مراد ہے؟
- (2) کھلے دورانی نظام اور بند دورانی نظام کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟
- (3) اکہرے دورانی نظام سے کیا مراد ہے؟
- (4) دوہرے دورانی نظام سے کیا مراد ہے؟
- (5) کچھوے کے تنقیلی نظام میں ظہری دموی دغا اور بطنی دموی دغا کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟
- (6) کچھوے کے خون میں احمر جیسے (Erythrocytes) کیوں غیر موجود ہوتے ہیں؟
- (7) کچھوے کے دموی قعر (Haemocoel) سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح جونوں (Sinuses) میں منقسم ہوتا ہے؟
- (8) جھینگڑ کے خون میں کتنے اقسام کے غلے پائے جاتے ہیں؟ ان کے نام لکھئے
- (9) مچھلیوں میں خون کس طرح دل سے گھمروں کو پہنچایا جاتا ہے؟
- (10) پرندوں اور پستانوں کے دل میں کونسے ابتدائی خانے غیر موجود ہوتے ہیں؟
- (11) ضیشوی دل (Branchial Heart) اور ششی دل (Pulmonary Heart) کے درمیان کیا فرق ہے؟

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) کچھوے کے تنقیلی نظام میں پانی جانے والی اہم دموی دغائیں کونسی ہیں؟ انہیں مختصر ایمان کیجئے؟
- (2) کچھوے کے دورانی نظام کا نام دغا کا تار پے اور دورانی راستے کو بیان کیجئے۔
- (3) جھینگڑ کا تنقیلی نظام کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ ان کی تشریح کیجئے۔

- (4) جھینگڑ کے دوران خون میں جناحی عضلات (Alary Muscles) کے ردل کو بیان کیجئے یا دوران خون کی میکانیت کو سمجھائے۔
- 5 مچھلی کے دل کی ساخت بیان کیجئے مچھلیوں کے دل کو ویدی دل کیوں کہا جاتا ہے؟ وضاحت کیجئے۔
- 6 جل تھلیوں میں دل کس طرح خون کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے؟ تشریح کیجئے
- 7 حوام (Reptiles) میں تنقیلی نظام کو بیان کیجئے۔
- 8 پرندوں اور پستانوں میں تنقیلی نظام کی تشریح کیجئے۔
- 9 اکہرے دورانی نظام اور دہرے دورانی نظام کے درمیان فرق کو بیان کیجئے۔
- 10 تنقیلی نظام کے تعارف پر ایک بیان قلمبند کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

(1) کچھوے کے تنقیلی نظام میں خون ظہری دموی دعا میں جسم کے ----- سرے سے -----

سرے کی جانب بہتا ہے۔

(2) کچھوے میں ----- ظہری دموی دعا کو بطنی دموی دعا سے باہم مربوط کرتے ہیں۔

(3) کچھوے کے دما ب (Plasma) میں ----- نای تنفسی صغہ حل شدہ حالت میں پایا جاتا ہے۔

(4) جھینگڑ کے دل کا اگلا خانہ ----- بناتا ہے۔

(5) جھینگڑ کے خون میں ----- نای شکر موجود رہتی ہے۔

(6) مچھلی کے دل کے اذین میں ----- کھلتا ہے۔

(7) مچھلی کا دل ----- کہلاتا ہے۔

(8) جل تھلیوں میں غیر آکسیجنی خون تین ----- کے ذریعہ ویدی جوف میں داخل ہوتا ہے۔

(9) حوام کے دل میں ----- نامکمل طور پر دو خانوں میں تقسیم شدہ رہتا ہے۔

(10) پرندوں اور پستانوں میں ----- کے ذریعہ خون پیچھڑوں کو آکسیجنت کے لئے پہنچایا جاتا ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) کن حیوانات میں کھلا دورانی نظام پایا جاتا ہے؟
 (i) حشرات (ii) جل تھلیوں (iii) مچھلیوں (iv) پرندوں
- (2) کن حیوانات کے جسم میں جوئے (Sinuses) پائے جاتے ہیں؟
 (i) مچھلیاں (ii) جل تھلیوں (iii) حشرات (iv) پرندوں
- (3) اکہر اور رانی نظام کس حیوان میں موجود رہتا ہے؟
 (i) بکری (ii) رخیہ (iii) جل تھلیہ (iv) مچھلی
- (4) دوہرا دورانی نظام کن حیوانات میں دیکھا جاتا ہے؟
 (i) جل تھلیوں اور پرندوں (ii) پرندوں اور مچھلیوں (iii) جل تھلیوں اور مچھلیوں (iv) مچھلیوں اور پستانوں
- (5) کچھوے میں جانی دل کے کتنے جوڑ پائے جاتے ہیں؟
 (i) 4 جوڑ (ii) 8 جوڑ (iii) 2 جوڑ (iv) 1 جوڑ
- (6) کچھوے کی کس دوسری دماغ میں مصرعہ نہیں پایا جاتا؟
 (i) ظہری دوسری دماغ (ii) بطنی دوسری دماغ (iii) ظہری اور بطنی دوسری دماغ (iv) کسی بھی دوسری دماغ میں مصرعہ نہیں ہوتا
- (7) کچھوے میں کونسی دوسری دماغ تقسیمی دماغ کہلاتی ہے؟
 (i) بطنی دماغ (ii) ظہری دماغ (iii) بطنی دماغ اور ظہری دماغ (iv) دیگر دوسری دماغیں
- (8) جھینگڑ کا دل کتنے خانوں پر مشتمل ہوتا ہے؟
 (i) 13 (ii) 10 (iii) 4 (iv) 2
- (9) جھینگڑ میں غذائی نالی اور تولیدی نالی کو گھیرے ہوا جوڑ کیا کہلاتا ہے؟
 (i) بطنی جوڑ (ii) گرد قلی جوڑ (iii) ظہری اور بطنی جوڑ (iv) گرد احشائی جوڑ
- (10) جل تھلیہ میں دل کے ظہری سطح پر کونسا خانہ پایا جاتا ہے؟

(i) جوف وریڈی (ii) ساق شریانی (iii) اذین (iv) بطین

7.3.3 جوڑیاں لکائیے

A	B
(1) جناجی عضلات	() ساق شریانی موجود
(2) جانی دل	() کچوے کے جسم کے
(3) حوام	() 6 تا 13 قطعوں میں
(4) جل تھلیہ	() غیر آکسیجنی خون
(5) جوف وریڈی	() آکسیجنی خون
(6) مچھلیوں	() پستانوں
(7) مخرد شریانی اور وریڈی جوف	() مچھلیوں
(8) مچھلی کے ظہری اور طہ	() بطین مکمل تقسیم شدہ
(9) ششی دل	() بطین مکمل طور پر تقسیم شدہ
(10) پرندوں	() وریڈی دل
	() مچھلیوں

سبق 6 انسانی دل کی ساخت اور افعال (Structure and Functions of Human Heart)

- 1 سبق کا خاکہ
- 2 تمہید
- 3 سبق کا متن
 - 3.1 کڈل کی بیرونی ساخت
 - 3.2 دل کی اندرونی ساخت
 - 3.3 دل کی کارکردگی کی میکانیت
- 4 خلاصہ
- 5 زائد معلومات
- 6 فرہنگ
 - 7 نمونہ امتحانی سوالات
 - 7.1 مختصر جوابی سوالات
 - 7.2 طویل جوابی سوالات
 - 7.3 معروضی سوالات
 - 7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔
 - 7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔
 - 7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

1 سبق کا خاکہ

اس سبق میں آپ کو انسانی دل کی ساخت اور افعال کے متعلق درجہ ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

- ☆ دل کی بیرونی ساخت
- ☆ دل کی اندرونی ساخت
- ☆ دل کی کارکردگی کی میکینیت

2 تمہید


پچھلے سبق میں آپ تقابلی نظام سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ انسانی دل کی ساخت اور افعال کا مطالعہ کریں گے جس کے ذریعہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ دل کی ساخت کس طرح خون کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے میں مدد و معاون ہوتی ہے۔

3 سبق کا متن


3.1 دل کی بیرونی ساخت (External Structure of Heart)

دل تمام اعضائے حیوانیہ میں سب سے اہم عضو رکھتا ہے۔ یہ ایک کھنکھلی عضلاتی ساخت ہے جو دراصل دوسری دعا (Blood Vessel) کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ یہ صدری کہفہ میں الٹا واقع ہوتا ہے یعنی اس کا اس پیچے کی جانب اور قاعدہ اوپر کی جانب رخ کیا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو "قلب" کہا جاتا ہے۔ یہ صدری کہفہ میں دونوں پیچھڑوں کے درمیان کسی قدر بائیں جانب پایا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت تمام ستوں سے ہیلوں کے پنجرے اور پچھلی ست سے فہری ستون (Vertebral Column) کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اس کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ مرد کے قلب کا وزن اس کے جسمی وزن کا 0.43 فی صد یا 280 تا 340 گرام ہوتا ہے جب کہ عورت کے قلب کا وزن اس کے جسمی وزن کا 0.40 فی صد یا 230 تا 280 گرام ہوتا ہے۔ اس کی جسامت ایک انسان کے مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 5 انچ، چوڑائی 3.5 انچ اور موٹائی 2.5 انچ ہوتی ہے۔ دل ایک قاعدہ (Base)، ایک راس (Apex)، تین سطوح (Surfaces) اور تین کنارے

(Borders) پر مشتمل ہوتا ہے۔



شکل 6.1
حجرت قلبی غلاف میں ملحقہ دل



شکل 6.2
انسانی دل کا بیرونی منظر

قاعہ (Base)

یہ چوڑا اور مستطیل شکل کا ہوتا ہے اس کا رخ اوپری اور دہائی جانب ہوتا ہے۔

راس (Apex)

یہ نوک دار ہوتا ہے اس کا رخ نیچے آگے اور بائیں جانب ہوتا ہے۔

دایاں کنارہ (Right Border) گول اور تقریباً عمودی ہوتا ہے جو دائیں اذین (Right Auricle) سے بنتا ہے۔ پایاں کنارہ

(Left Border) گول ہوتا ہے اور بائیں اذین (Left Auricle) سے ترچھی طور پر جلی جانب بڑھتا ہے۔ زیرین کنارہ

(Lower Border) افقی ہوتا ہے اور داہنے کنارے کی زیرین حد سے قلب کی راس تک بڑھتا ہے۔ یہ داہنے بطن


(Right Ventricle) سے بنتا ہے۔ دل کی بیرونی سطح پر دو کھانچے پائے جاتے ہیں۔ ایک کھانچہ اذین اور بطن کے درمیان

ہوتا ہے جو اذین اور بطن کو بیرونی طور پر جدا رکھتا ہے۔ دونوں اذین ایک دوسرے سے بین اذینی کھانچے کے ذریعہ جدا رہتے

ہیں۔ دوسرا کھانچہ دائیں اور بائیں بطن (Right and Left Ventricles) کے درمیان ہوتا ہے اور ان دونوں کو جدا رکھتا

ہے۔ ان کھانچوں کے ذریعہ دل بیرونی طور پر چار خانوں یعنی دایاں اذین (Right Atrium)، پایاں اذین (Left Atrium)،

دایاں بطن (Right Ventricle) اور پایاں بطن (Left Ventricle) میں منقسم ہوتا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔




شکل 6.3 انسانی دل کا بیرونی منظر اکللی شریانوں کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہوا

3.2 دل کی اندرونی ساخت (Internal Structure of Heart)

دل کا اندرونی جوف عضلی فاسلوں (Muscular Septa) کے ذریعہ چار خانوں میں منقسم رہتا ہے جن میں دو اذین (Auricles or Atria) اور دو بطن (Ventricles) پائے جاتے ہیں۔ اوپری جانب کے خانوں کو اذین اور نیچے جانب کے خانوں کو بطن کہتے ہیں۔ دایاں اور بائیں اذین ایک عمودی عضلی فاصل کے ذریعہ ایک دوسرے سے علحدہ رہتے ہیں۔ اس فاصل کو بین اذینی فاصل (Interauricular Septum) کہا جاتا ہے۔ دایاں اذین بہ نسبت بائیں اذین کے بڑا ہوتا ہے اور اس کی دیوار بھی بائیں اذین کی بہ نسبت تہی ہوتی ہے۔ اس میں تقریباً 10 انس خون کی گنجائش ہوتی ہے۔ دائیں اذین میں غیر آکسیجنی خون اور بائیں اذین میں آکسیجنی خون ہوتا ہے جو بین اذینی فاصل کی وجہ سے ایک دوسرے سے علحدہ رہتا ہے۔ بطن (Ventricle) کا جوف بھی بین بطنی فاصل (Interventricular Septum) کے ذریعہ دائیں اور بائیں بطن میں منقسم رہتا ہے۔ اس فاصل کے ذریعہ دائیں بطن میں موجود غیر آکسیجنی خون بائیں بطن کے آکسیجنی خون سے علحدہ رہتا ہے۔ بائیں بطن کی دیواریں بہ نسبت دائیں بطن کی دیواروں کے تین گنا دبیز ہوتی ہیں۔ نیز بائیں بطن کی دیواریں دل کے دیگر تمام خانوں کی دیواروں کی بہ نسبت دبیز ترین ہوتی ہیں کیوں کہ بائیں بطن جسم کے مختلف اور دور کے حصوں تک خون پہنچاتا ہے۔

اذین اور بطن کے درمیان افقی فاصل، اذینی بطنی فاصل (Auriculoventricular Septum) پایا جاتا ہے جس کے ذریعہ وہ ایک دوسرے سے علحدہ رہتے ہیں۔ دایاں اذین اس فاصل میں پائے جانے والے روزن، دائیں اذینی بطنی روزن (Right Auriculo Ventricular Aperture) کے ذریعہ دائیں بطن میں کھلتا ہے۔ اسی طرح بائیں اذین بھی فاصل میں پائے جانے والے بائیں اذینی بطنی روزن (Left Auriculo Ventricular Aperture) کے ذریعہ بائیں بطن میں کھلتا ہے۔ بائیں اذین اور دائیں اذین کی اندرونی سطح پر عضلات پائے جاتے ہیں جو عضلات مشطیہ (Musculi Pectinati) کہلاتے ہیں جو ستونی ریشوں (Columnar Cornae) کی شکل میں ہوتے ہیں۔ دائیں بطن کی اندرونی سطح پر ستونی ریشوں (Columnar Cornae) یا کڑیاں ریشے (Trabeculae Cornae) نامی عضلات پائے جاتے ہیں ان میں سے تین عضلات بڑے ہوتے ہیں جو بھنجی عضلات (Papillary Muscles) کہلاتے ہیں۔ بائیں بطن کی اندرونی سطح پر پائے جانے والے ستونی ریشے (Columnar Cornae) نسبتاً چھوٹے لیکن تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ بھنجی عضلات (Papillary Muscles)


صرف دوہتی ہوتے ہیں۔ بطن میں اتھالی بانٹوں کی ڈوریاں پائی جاتی ہیں جن کو حبال وتریہ (Cordae Tendinae) کہا جاتا ہے جن کے ذریعہ مسام (Valves) اپنے مقامات پر قائم رہتے ہیں۔




شکل 6.4

انسانی دل کی اندرونی ساخت

اذین اور بطن میں مختلف روزن پائے جاتے ہیں جن پر مسام موجود رہتے ہیں جو خون کو صرف ایک ہی سمت میں پہنچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں لیکن پھل سست میں خون کے بہاؤ کو روکتے ہیں جن کو ہڈیوں 1 پیش کیا گیا ہے۔




فکل 6.5 انسانی دل کی عمودی تراش




فکل 6.6

انسانی دل میں خون کے گزرنے کا راستہ کاتھروں کے نشان کے ذریعہ اظہار




شکل 6.8

انسانی دل کی اندرونی ساخت جو نیم ہلالی صمام کے کھلنے اور اڈین اور بطن کے درمیانی صمام کی بند حالت کو ظاہر کرتی ہے۔




شکل 6.7

انسانی دل کی اندرونی ساخت جو نیم ہلالی صمام کی بند حالت اور اڈین اور بطن کے درمیان کھلے ہوئے صمام کو ظاہر کرتی ہے۔




شکل 6.9

دل کا ارسابی نظام




شکل 6.11

مترالی صمام اور ملی




شکل 6.10

مترالی صمام




شکل 6.12

دل میں دو شرفی صمام کی کارکردگی جب کہ
بطن پھیلے ہوئے اور اذین سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔




شکل 6.13

دل میں دو شرفی صمام کی کارکردگی جب کہ بطین سکرتے ہوئے ہوتے ہیں۔




شکل 6.15

دل میں بطینی انتہاض، اوپری بطینی صمام بند، جو فی صمام کھلے ہوئے



شکل 6.14

دل کی حالت جب کہ اوپری سکرتے ہیں۔ A.V صمام کھلے ہوئے اور S.L صمام بند رہتے ہیں۔



فصل 6.16

انسانی دل کے صمام (اوپری منظر)

جدول 1 اذین اور بطین میں واقع مختلف روزن اور ان کے مقامات

نمبر	دل کے خانے	روزن کے نام	مقامات
1	دایاں اذین (Right Auricle)	منفذ ورید کلاں اعلیٰ (Orifice of Superior Vena Cava)	بالائی حصہ میں
		منفذ ورید کلاں اسفل (Orifice of Inferior Vena Cava)	زیرین حصہ میں
		منفذ ورید اکلیٹی (Orifice of Coronary Vein)	منفذ ورید کلاں اسفل اور منفذ اذینی بطین کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

دریدوں کے سروں پر پائے جاتے ہیں۔	آنتہات دریدات قلبیہ (Foramina Venarum Minimarum)		
دائیں اذین اور دائیں بطن کے درمیانی فاصل میں۔	اذنی بطنی روزن (Auriculo Ventricular Opening)		
دائیں بطن کے ہلائی بائیں زاویہ پر واقع ہوتا ہے۔	منفذ ششی اورط (Orifice of Pulmonary Aorta)	دایاں بطن (Right Ventricle)	2
بائیں اذین کی جھلی سطح کے ہلائی حصہ میں۔	ششی دریدوں کے روزن (Opening of Pulmonary Veins)	بایاں اذین (Left Auricle)	3
بائیں اذین اور بائیں بطن کے درمیانی فاصل میں۔	اذنی بطنی روزن (Auriculo Ventricular Opening)		
دریدوں کے سروں پر	یا منفذ مترانی (Mitral Orifice) آنتہات دریدات قلبیہ (Foramina Venarum Minimarum)		

جدول 2: دل کے خانوں میں پائے جانے والے صمام، ان کے مقامات اور خون کے بہنے کی سمت کارو کتا۔

خون کے بہنے کی سمت کارو کتا	مقام	صمام کا نام	سلسلہ نمبر
دائیں بطن سے دائیں اذین کی سمت خون بہنے سے روکتا ہے۔	دائیں اذنی بطنی روزن (Right Auriculo-Ventricular Opening)	سہ شرنی صمام (Tricuspid Valve)	1
بائیں بطن سے بائیں اذین کی سمت بہنے سے روکتا ہے۔	بائیں اذنی بطنی روزن (Right Auriculo-Ventricular Opening)	دو شرنی صمام (Bicuspid Valve) مترانی صمام (Mitral Valve)	2
ششی اورط سے دائیں بطن میں خون کو بہنے سے روکتا ہے۔	دائیں بطن میں منفذ ششی اورط (Pulmonary Aorta)	ہلائی صمام (Semilunar Valve) ششی صمام (Pulmonary Valve)	3

4	اور طی صمام (Aortic Valve) یا ہلالی صمام (Semilunar Valves)	بائیں بطن میں اور طی روزن (Aortic Opening)	اور ط (Aorta) سے بائیں بطن میں خون کو بہنے سے روکتا ہے۔
5	اکلی صمام (Coronary Valve)	منظور وید اکلی (Orifice of Coronary Vein)	تھ اذین کے انقباض کے وقت خون کو وید اکلی (Coronary Vein) میں واپس داخل ہونے سے روکتا ہے۔
6	استا کی صمام (Eustachian Valve)	جوف اسفل (Inferior Vena Cava) کے اگلے حاشے پر پایا جاتا ہے۔ اس کی جسامت جنینی زندگی (Embryonic Life) میں بڑی ہوتی ہے۔	ثقبہ بیضویہ (Foramen Ovale) سے جوف اسفل کی سمت خون کو بہنے سے روکتا ہے۔

3.3 دل کی کارکردگی کی میکانیت (Mechanism of Heart Functioning)

دل تمام جسمانی اعضاء میں عضوہ ریہ ہے جو جسم کے تمام حصوں کو خون پہنچاتا ہے۔ خون کو پہنچانے کے لئے دل کے مختلف خانوں کے عضلات میں متواتر انقباض (سکڑاؤ) اور انبساط (پھیلاؤ) ایک کے بعد دیگرے واقع ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ دل میں انقباض اور انبساط مسلسل دور کی شکل میں جاری رہتا ہے جس کو قلبی دور (Cardiac Cycle) کہا جاتا ہے۔ قلبی دور میں دو مراحل واقع ہوتے ہیں جن کو سیسٹول (Systole) اور دیسٹول (Diastole) کہا جاتا ہے۔ اذینی خانوں اور بطنی خانوں میں ایک کے بعد دیگرے سیسٹول اور دیسٹول واقع ہوتے ہیں۔ اذین اور بطن کا ایک مرتبہ انقباض ہوتا اور ایک مرتبہ انبساط ہوتا ایک قلبی دور کہلاتا ہے۔ ایک مکمل قلبی دور کے لئے 0.8 سکنڈس درکار ہوتے ہیں جس کا تجزیہ ذیل میں دیا گیا ہے۔

اذینی سیسٹول (Auricular Systole) کے لئے درکار وقت = 0.1 سکنڈس

اذینی دیسٹول (Auricular Diastole) کے لئے درکار وقت = 0.7 سکنڈس

بطنی سیسٹول (Ventricular Systole) کے لئے درکار وقت = 0.3 سکنڈس

بطنی دیسٹول (Ventricular Diastole) کے لئے درکار وقت = 0.5 سکنڈس

لہذا

جمدہ سسٹول (Total Systole) کے لئے جمذہ در کار وقت = 0.4 سکندس

جمدہ دیسٹول (Total Diastole) کے لئے جمذہ در کار وقت = 0.4 سکندس

ایک مکمل قلبی دور (Cardiac Cycle) کے لئے در کار وقت = 0.8 سکندس

ایک مکمل قلبی دور کو ایک قلبی حرکت یا قلبی دھڑکن (Heart Beat) کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک قلبی حرکت یا قلبی دھڑکن ایک مرتبہ انقباض اور ایک مرتبہ انبساط پر مشتمل ہوتی ہے۔ انسان کے دل کی قلبی حرکت ایک منٹ میں 72 مرتبہ واقع ہوتی ہے اور ایک دن میں 100,000 مرتبہ اور ایک سال میں 40,000,000 مرتبہ اور 70 سال کی عمر تک تقریباً 2,800,000,000 مرتبہ ہوتی ہے۔ نومولود بچہ کی قلبی حرکت ایک منٹ میں 120 مرتبہ اور ضعیف اشخاص میں ایک منٹ میں 60 مرتبہ ہوتی ہے۔

ایک دل کی دھڑکن میں تین مراحل واقع ہوتے ہیں۔

- (1) دونوں اذین میں بیک وقت انقباض شروع ہوتا ہے اور خون طہین میں داخل ہو جاتا ہے۔
 - (2) دونوں طہین میں بیک وقت انقباض شروع ہوتا ہے اور خون دموی وعاءوں (Blood Vessels) میں پمپ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران اذین حالت سکون میں رہتے ہیں یعنی انبساط کو ظاہر کرتے ہیں۔
 - (3) اذین اور طہین دونوں حالت انبساط پر آ جاتے ہیں۔
- خون دل سے جسم کے تمام اعضاء کو دموی وعاءوں کے ذریعہ پہنچتا ہے اور دل کو لوٹ جاتا ہے۔ خون کے بہاؤ کے راستہ کو دور (Circuit) یا دوران (Circulation) کہا جاتا ہے۔ انسان میں خون کا دور یا دوران دو قسم کا ہوتا ہے جن کو
- (1) ششی دور یا دوران (Pulmonary Circuit or Circulation) اور (2) نظامی دور یا دوران (Systemic Circuit or Circulation) کہتے ہیں۔ ایسا دل جو خون کو ان دونوں دور میں پمپ کرتا ہے تو دوہرا دوری دل (Double Circuit Heart) کہلاتا ہے۔


(1) ششی دور یا دوران (Pulmonary Circuit or Circulation)

ششی دور میں غیر آکسیجنی خون سوائے پیچہروں کے جسم کے تمام اعضاء سے ورید کلاں اعلیٰ (Superior Vena Cava) اور وریدی کلاں اسفل (Inferior Vena Cava) میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے دائیں اذین (Right Auricle) میں داخل ہو جاتا ہے۔ دائیں اذین سے خون دائیں بطن میں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں سے یہ ششی شریاں (Pulmonary Arteries) کے ذریعہ پیچہروں کو پمپ کر دیا جاتا ہے۔ پیچہروں میں خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ علیحدہ ہو جاتی ہے اور آکسیجن خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ اس طرح پیچہروں میں خون کی آکسیجین اہم پاتی ہے۔ آکسیجنی خون ششی وریدوں (Pulmonary Veins) کے ذریعہ بائیں اذین (Left Auricle) میں بھیج دیا جاتا ہے۔



(2) نظامی دور یا دوران (Systemic Circuit or Circulation)

نظامی دور میں بائیں اذین (Left Auricle) میں پیچہروں سے ششی ورید (Pulmonary Vein) کے ذریعہ جمع کیا ہوا آکسیجنی خون بائیں بطن میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بائیں بطن سے آکسیجنی خون نظامی اورطہ (Systemic Aorta) میں پمپ کر دیا جاتا ہے جہاں سے یہ آکسیجنی خون مختلف شریاں (Arteries) کے ذریعہ جسم کے مختلف اعضاء کو سوائے پیچہروں کے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ جسم کے اعضاء (سوائے پیچہروں کے) سے غیر آکسیجنی خون اعلیٰ اور اسفل ورید کلاں (Superior and Inferior Vena Cava) کو پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے خون دائیں اذین (Right Auricle) میں جمع کر لیا جاتا ہے۔

ششی دوران (Pulmonary Circulation)



نظامی دوران (Systemic Circulation)



شکل 6.17 انسان میں دوران خون

- ☆ انسانی دل ایک کھوکھلی عضلاتی ساخت ہے جو دسویں دہائی کی تبدیل شدہ شکل ہے۔
- ☆ دل ایک قاعدہ، ایک راس تین سطوح اور تین کناروں پر مشتمل ہوتا ہے۔
- ☆ راس کا رخ نیچے کی جانب اور قاعدہ کا رخ اوپر کی جانب ہوتا ہے۔
- ☆ دل کی سطح پر پائے جانے والے کھانچوں کے ذریعہ دل کے چار خانوں یعنی دائیں اذین، بائیں اذین، دائیں بطن اور بائیں بطن کا تعین ہوتا ہے۔
- ☆ انسانی دل چار خانوں یعنی دو اذین اور دو بطن پر مشتمل ہوتا ہے۔
- ☆ دونوں اذین ایک عضلاتی بین اذینی فاصلہ (Interauricular Septum) اور دونوں بطن ایک عضلاتی بین بطنی فاصلہ (Interventricular Septum) کے ذریعہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں۔
- ☆ اذین اور بطن ایک عضلاتی بین اذینی بطنی فاصلہ (Interauricular Ventricular Septum) کے ذریعہ علیحدہ رہتے ہیں۔
- ☆ بائیں اذین اور دائیں اذین کی اندرونی سطح پر عضلات مٹھیہ (Musculi Pectinati) پائے جاتے ہیں جو ستونی ریشے (Columnar Comae) کی شکل میں ہوتے ہیں۔
- ☆ بطن کی اندرونی سطح پر ستونی ریشے پائے جاتے ہیں جن میں سے بڑے عضلات بھنٹی عضلات (Papillary Muscles) کہلاتے ہیں۔
- ☆ بطن میں اتھالی بافتوں کی ڈوریاں، جہاں وتریہ (Chordae Tendinae) پائی جاتی ہیں جن کے ذریعہ مسام قابو میں رہتے ہیں۔
- ☆ اذین اور بطن میں مختلف وزن ہوتے ہیں جن میں مسام پائے جاتے ہیں۔
- ☆ دل میں سیسٹول اور دیسٹول مسلسل دور کی شکل میں رہتا ہے جس کو قلبی دور (Cardiac Cycle) کہتے ہیں۔
- ☆ دل کے اذین اور بطن میں ایک مرتبہ سیسٹول اور ایک مرتبہ دیسٹول کا واقع ہونا ایک قلبی دور کہلاتا ہے جس کے

لئے 0.8 سکنڈس درکار ہوتے ہیں۔

- ☆ ایک مکمل قلبی دور کو ایک قلبی دھڑکن (Heart Beat) کہتے ہیں۔
- ☆ انسان کے دل کی قلبی دھڑکن ایک منٹ میں 72 مرتبہ ہوتی ہے۔ نومولود بچہ میں ایک منٹ میں 120 مرتبہ اور ضعیف اشخاص میں ایک منٹ میں 60 مرتبہ ہوتی ہے۔
- ☆ ششی دور یا دوران (Pulmonary Circuit or Circulation) میں دائیں طین سے غیر آکسیجنی خون ششی شریانوں (Pulmonary Arteries) کے ذریعہ پیچھڑوں کو پمپ کر دیا جاتا ہے جہاں سے آکسیجنی خون ششی وریدوں (Pulmonary Veins) کے ذریعہ بائیں اذین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔
- ☆ نظامی دوران (Systemic Circulation) میں بائیں طین سے آکسیجنی خون نظامی اورط (Systemic Aorta) میں پمپ کر دیا جاتا ہے جہاں سے یہ مختلف شریانوں کے ذریعہ جسم کے مختلف حصوں کو سوائے پیچھڑوں کے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان حصوں سے غیر آکسیجنی خون وریدوں کے ذریعہ دل کے دائیں اذین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔
- ☆ مختلف حیوانات کے دل میں خانوں کی تعداد ارتقائی رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ مچھلی کے دل میں دو خانے، مینڈک کے دل میں تین خانے، ہوامیوں کے دل میں تین خانے اور ایک نصف خانہ، پرندوں اور پستانوں کے دل میں چار مکمل خانے پائے جاتے ہیں۔
- ☆ مگر مچھ اور بعض ہوامیوں جیسے الیگٹر (Alligator) کے دل میں مکمل چار خانے موجود ہوتے ہیں جو ارتقائی سلسلہ کو ظاہر کرتے ہیں کہ پستانوں میں دل کا ارتقاء ہوامیوں کے دل سے واقع ہوا ہے۔
- ☆ ہوامیوں میں موجود تین اور ایک نصف خانوں والا دل یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح تین خانوں والا دل چار خانوں والے دل میں ارتقاء پایا ہے۔


5 زائد معلومات

پیس میکر (Pacemaker)

دیگر کئی حیوانات کی طرح انسانی دل بھی اعصاب (Nerves) پر منحصر نہیں ہوتا اگرچہ کہ عصبی پیمائش (Nerve)

(Impulses) دل کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دائیں اذین میں ایک چھوٹا عضلاتی قطعہ ہوتا ہے جس کو جونی اذینی عقدہ (Sinoauricular Node) (SA Node) کہا جاتا ہے جو پین میکر (Pacemaker) کے طور پر فعل انجام دیتا ہے۔ اس SA Node کے عضلات میں تقریباً ایک ہی ثانیہ کے اندر برقی پہچان (Electric Impulse) از خود پیدا ہوتا ہے جو پورے دل میں مخصوص تبدیل شدہ (Modified) عضلاتی راستہ کے ذریعہ کافی تیزی سے پھیل جاتا ہے جس کے باعث دل کے مختلف خانوں میں انقباض واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون دل سے پمپ کر دیا جاتا ہے۔ لہذا پین میکر دل سے خون کو موثر طور پر پمپ کرنے کے لئے دل کے خانوں یعنی اذین اور بطن میں ہم ارتباطی انقباض (Coordinated Contraction) کو یقینی بناتا ہے۔

بعض اشخاص میں بسا اوقات پین میکر اپنے فعل کو بہتر طور پر انجام دینے میں اتفاقی طور پر ناکام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قلبی دھڑکن یا حرکت غیر طبعی (Abnormal) ہو جاتی ہے اور وہ مختلف قسم کے قلبی عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شدید نقصان رساں کیفیت جس میں SA Node کافی کمزور ہو جاتا ہے یا کافی آہستہ فعل انجام دیتا ہے۔ قلبی مسائل پیدا کرتی ہے۔ نارمل پین میکر جو اگرچہ ایک فعل کو انجام دینے میں ناکام ہو جائے یا رک جائے تو سینہ پر فوراً دھاؤ ڈالتے ہوئے دوبارہ اس کو متحرک بنایا جاسکتا ہے۔ قلبی مریضوں میں ناقص پین میکر کو تبدیل کرنے کے لئے صدری کبفہ کے اوپر جلد کے نیچے ایک برقی تحریک کار (Electrical Stimulator) مشین کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ اس برقی تحریک کار مشین کے باریک چھوٹے تار کو دل سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس مشین کے ذریعہ دل میں برقی پہچان پیدا ہوتا ہے۔ اس مشین سے برقی پہچان پیدا کرنے کے لئے مشین میں بیٹری (Batteries) کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی کارکردگی کی مدت کا انحصار بیٹری کی قسم پر ہوتا ہے۔ بیٹری کی مدت کارکردگی 2 تا 3 سال ہوتی ہے جب کہ پولوٹینیم 238 (Polutinium 238) تابکار توانائی پر کام کرنے والی بیٹری کی مدت کارکردگی 12 سال تک ہوتی ہے۔ اس طرح اس بیرونی برقی تحریک کار مشین یعنی مصنوعی پین میکر کے ذریعہ دل میں برقی پہچان پیدا کرتے ہوئے دل کی کارکردگی کو باقاعدہ بنایا جاسکتا ہے۔



شکل 6.18

پستانوی دل مع چیس میکر (Pacemaker)

فرہنگ

6



انگریزی اصطلاح	لفظ	اردو اصطلاح	توضیح
Atrium or Auricle	ایثریم یا اوریکل	اذین	دل کا اگلا خانہ جس میں خون وریدوں کے ذریعہ داخل ہوتا ہے۔
Columnar Cornae	کالمر کارنے	ستونی ریٹے	دائیں اور بائیں اذین کی اندرونی سطح پر واقع عضلاتی ریٹے۔

Chordae Tendinae	کارڈے ٹینڈینے	جبال و تریہ	بطین میں اتصالی بانٹوں کی ڈوریاں جو سممام (Valves) کو قابو میں رکھتی ہیں۔
Coronary Vein	کوزوئری وین	ورید اکلئو	دل کے عضلات میں پائی جانے والی وریدیں
Diastole	ڈیاسٹول	دیسطول	انبساط۔ دل کے اذین اور بطین کا پھیلاؤ
Evolution	ایوالیوشن	ارتقاء	بتدریج تبدیلیوں کے باعث سادہ شکلوں کا پیچیدہ ترقی یافتہ شکلوں میں تبدیل ہوتا ہے۔
Heart Beat	ہارٹ بیٹ	قلبی دھڑکن	ایک مکمل قلبی دور کو ایک قلبی دھڑکن کہا جاتا ہے۔
Mitral Orifice	مائٹریل اوریفیس	منفذ مٹریل	اذینی بطینی روزن جو بائیں اذین اور بائیں بطین کے درمیانی فاصل پر موجود ہوتا ہے۔
Papillary Muscle	پاپیلاری ماسلس	بھٹنی عضلات	بطین کی اندرونی سطح پر پائے جانے والے بڑے ستونی ریشے۔
Systole	سیسٹول	سیسٹول	انقباض۔ دل کے اذین اور بطین کے انقباض یعنی سکڑنے کو سیسٹول کہا جاتا ہے۔
Streaming Movement	اسٹریمنگ موومنٹ	سیل حرکت	خلیہ میں خلیہ مایہ کا آہستہ اور مسلسل بہاؤ۔
Trabeculae Cornae	ٹرابیکولے کارنے	کڑیاں ریشے	دائیں بطین کی اندرونی سطح پر پائے جانے والے عضلاتی ستونی ریشے۔
Valve	وال	مصرعہ یا صمام	کسی روزن پر پائی جانے والی عضلاتی ساخت جو خون کو پچھلی جانب لوٹنے سے روکتی ہے۔
Vena Cava	وینا کیوا	ورید کلاں	بڑی ورید جو دل کے خانہ میں گھلتی ہے۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) انسانی دل میں کتنے خانے پائے جاتے ہیں؟ ان کے نام لکھیے۔
- (2) بائیں اذین اور دائیں اذین کی اندرونی سطح پر کونسے عضلات پائے جاتے ہیں؟
- (3) دل میں پائے جانے والے صمام کو نسی بانٹوں کے ذریعہ اپنے مقامات پر قائم رہتے ہیں؟
- (4) دائیں اذین میں کونسے روزن پائے جاتے ہیں؟ ان کے نام لکھیے۔
- (5) بائیں اذین میں پائے جانے والے روزنوں کے نام بتائیے۔

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) قلبی دور کسے کہتے ہیں؟ قلبی دور کے مراحل پر نوٹ لکھیے۔
- (2) ششی دور ان (Pulmonary Circulation) اور نظامی دور ان (Systemic Circulation) کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟ وضاحت کیجئے۔
- (3) انسانی دل کے خانوں میں پائے جانے والے صمام (Valves)، ان کے مقامات اور خون کے بہنے کی سمت پر نوٹ لکھیے۔

- (4) انسانی دل کی ہیردنی ساخت کو بیان کیجئے۔
- (5) انسانی دل کی اندرونی ساخت کو بیان کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

- (1) دل دراصل _____ کی تبدیل شدہ شکل ہے۔
- (2) مرد کے قلب کا وزن اس کے جسمی وزن کا _____ فی صد ہوتا ہے۔
- (3) دائیں بطن کی اندرونی سطح پر _____ نامی عضلات پائے جاتے ہیں۔

(4) مفلد مترانی (Mitral Orifice) ————— میں پایا جاتا ہے۔

(5) مفلد ورید اکللی (Orifice of Coronary Vein) ————— میں کھلتی ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) انسان کے دل میں بطن کا جوف کس قاصل کے ذریعہ منقسم رہتا ہے؟

(a) اذینی بطنی قاصل (b) بین اذینی قاصل

(c) بین بطنی قاصل (d) منقسم نہیں ہوتا

(2) دایاں اذین کس روزن کے ذریعہ دائیں بطن میں کھلتا ہے؟

(a) دائیں اذینی بطنی روزن (b) بائیں اذینی بطنی روزن

(c) مفلد ورید کلاں اعلیٰ (d) مفلد ورید کلاں اسفل

(3) دائیں اذین کے بالائی حصہ میں کونسا روزن پایا جاتا ہے؟

(a) مفلد ورید کلاں اسفل (b) مفلد ورید کلاں اعلیٰ

(c) مفلد ششی اورطہ (d) مفلد ورید اکللی

(4) دائیں بطن کے بالائی بائیں زاویہ پر کونسا روزن موجود ہوتا ہے؟

(a) مفلد ورید کلاں اعلیٰ (b) اذینی بطنی روزن

(c) مفلد ششی اورطہ (d) مفلد ورید اکللی

(5) مفلبات ورید ات قلبیہ دل کے کونے خانہ میں کھلتے ہیں؟

(a) دایاں اذین (b) دایاں بطن

(c) بائیں اذین (d) بائیں بطن

7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

B

A

(1) لائینی سمپٹول کے لئے درکار وقت 0.7 سکڑس ()

()	0.4 سکٹس	مکمل قلبی دور کے لئے درکار وقت	(2)
()	0.3 سکٹس	افنی دیمپول کے لئے درکار وقت	(3)
()	0.5 سکٹس	جملہ سیمپول کے لئے درکار وقت	(4)
()	0.8 سکٹس	جملہ دیمپول کے لئے درکار وقت	(5)
()	0.1 سکٹس	بطنی سیمپول کے لئے درکار وقت	(6)
		بطنی دیمپول کے لئے درکار وقت	(7)

سبق 7 خون (Blood)

- 1 سبق کا خاکہ
- 2 تشہید
- 3 سبق کا متن
- 3.1 پستانوی خون۔
 - 3.1.1 خون کے اجزائے ترکیبی
- 3.2 خون کے گروہس
- 3.3 منتقلی خون
- 3.4 خون کا دباؤ
- 3.5 پیش تناؤ
- 4 سبق کا خلاصہ
- 5 زائد معلومات
- 6 فرہنگ
- 7 نمونہ امتحانی سوالات
 - 7.1 مختصر جوابی سوالات
 - 7.2 طویل جوابی سوالات
 - 7.3 معروضی سوالات
 - 7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے
 - 7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

سبق کا خاکہ



اس سبق میں آپ کو درج ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

☆ خون کی اجزاء ترکیبی

☆ خون کے گروہیں

☆ منتقلی خون

☆ بیش تناؤ

تمہید

2



پچھلے سبق میں آپ انسانی دل کی ساخت اور افعال سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ خون (Blood) سے متعلق معلومات حاصل کریں گے چونکہ یہ ایک سیال اتصالی بافت ہے جس کو آپ جاندار عضویوں کے جسم میں ایک اہم واسطہ تصور کرتے ہیں جس کے ذریعہ آکسیجن، مقویات، ہارمونس، حیاتین، معدنیات، پانی اور دیگر درکار مرکبات جسم کی تمام بافتوں (Tissues) کو منتقل کئے جاتے ہیں اور جسم کی تمام بافتوں سے اخراجی مادے اور دیگر مہلک مرکبات اخراجی اعضاء کو پہنچائے جاتے ہیں جہاں سے یہ جسم کے باہر خارج کر دیئے جاتے ہیں۔ خون کے اجزاء ترکیبی کے مطالعہ کے ذریعہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کس طرح خون کے یہ اجزاء یعنی دماہ (Plasma) 'احمر' جیسے (Erythrocytes)، 'ابینس' جیسے (Leucocytes) اور دسویں جیسے (Blood Platelets) جاندار کے جسی اعضاء کی عمدہ کارکردگی کو انجام دینے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ نیز آپ خون کے گروہیں اور منتقلی خون میں ان کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ اس سبق میں اس کے علاوہ خون کے دباؤ کی اہمیت اور میر شدہ فحشی ترشوں کا بطور غذا استعمال کس طرح بیش تناؤ (Hypertension) کا باعث بنتا ہے اور بیش تناؤ سے بچنے کے لئے کس طرح کی انسدادی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے پیش کیا گیا ہے۔

سبق کا متن

3



3.1 پستانوی خون (Mammalian Blood)

خون ایک سیال اتصالی بافت (Fluid Connective Tissue) ہے جو میان اودہ (Mesoderm) مبدے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ

قالب (Matrix) اور خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ قالب سیال حالت میں پایا جاتا ہے جس کو دما ب (Plasma) کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کو سیال اتصالی بافت کہا جاتا ہے۔ قالب کا افزا خلیوں سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں ریٹے نہیں پائے جاتے خلیوں کو جیسے (Corpuscle) کہا جاتا ہے۔ خون دسوی و عاؤں (Blood Vesicles) میں گردش کرتا ہے۔ انسان کے جسمی وزن کا 8 تا 7 فیصد حصہ خون پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کے جسم میں تقریباً 6 لیٹر خون موجود ہوتا ہے۔

3.1.1 خون کی اجزائے ترکیبی

خون (a) دما ب (Plasma) اور (b) تشکیل شدہ عناصر (Formed Elements) پر مشتمل ہوتا ہے۔

(A) دما ب (Plasma)

دما ب (Plasma) ہلکے زرد رنگ کا بے جان سیال ہے۔ اس میں تقریباً 90 تا 92 فیصد پانی پایا جاتا ہے۔ یہ قلوئی نوعیت کا ہوتا ہے۔ مکمل خون کا 55 تا 60 فی صد حصہ دما ب پر مشتمل ہوتا ہے جب کہ یہ جسم کے وزن کا 5 فی صد حصہ ہوتا ہے۔ اس میں 8 فی صد نامیاتی مادے اور 1 فی صد غیر نامیاتی مادے پائے جاتے ہیں۔

(i) نامیاتی مادے

نامیاتی مادوں میں (a) پروٹین (b) ہضم شدہ غذائی مادے (c) اخراجی مادے (d) ہارمون اور

(e) مدافعتی مرکبات پائے جاتے ہیں۔

(a) پروٹینس (Proteins)

انسان کے خون میں تقریباً 300 gms پروٹینس پائے جاتے ہیں۔ ان میں البومین (Albumin)، پروٹھرومبین (Prothrombin)، فائبرینوجن (Fibrinogen) اور گلوبولین (Globulin) شامل ہیں۔ اول الذکر تینوں قسم کے پروٹین جگر میں تیار ہوتے ہیں۔ گلوبولین کی تیاری لمفی خلیوں (Lymphocytes) میں انجام پاتی ہے۔ البومین سادہ قسم کا پروٹین ہے۔ یہ خون کو کثرت (Viscous) (چپچپا) بناتا ہے اور ولوجی دباؤ (Osmotic Pressure) کی قدر 7.5 برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پروٹھرومبین اور فائبرینوجن انجماد خون میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ گلوبولین ضبط ولوج (Osmoregulation) اور اشیاء کے حمل و نقل میں مدد کرتے ہیں۔ مامونی گلوبولین (Immunoglobulin) کو ضد اجسام (Antibodies) بھی کہا جاتا ہے۔

(b) ہضم شدہ غذائی مادے
ان میں گلوکوز، فرکٹوز (Fructose) شکر، فاسفولیپڈس (Phospholipids)، کولیسٹرل، نیوکلئوٹائیڈس (Nucleotides) اور امائنو ترشے (Amino Acids) شامل ہیں۔

(c) اخراجی مادے
ان میں یوریا، یورک، ٹریشامین اور کراتین (Creatin) شامل ہیں۔

(d) ہارمونس (Hormone)
ہارمونس میں دروں افزای غدود (Endocrine Gland) سے افراز کئے ہوئے مختلف ہارمونس (Hormones) اور ہپارین (Heparin) شامل کیئے جاتے ہیں۔ ہپارین کو قدرتی ضد ترویب (Anti Coagulant) کہا جاتا ہے جو دھوکے دغاؤں میں خون کو ٹھہر جانے سے روکتا ہے۔

(e) مدافعتی مرکبات
مامونی گلوبولینس (Immunoglobulins) 'پاش خاں' (لائسوزائمس Lysozymes) اور پروٹیناز (Properdine) کو مدافعتی مرکبات کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو جراثیم سے مدافعت پیدا کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

(ii) غیر ترمیمی مرکبات
پلازما میں سوڈیم کلورائیڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم، لوہا، تانبہ اور آئیوڈین کے نمکیات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سوڈیم کلورائیڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ غالب رہتے ہیں۔

(iii) گیسائیس
100 ملی لیٹر پلازما میں 0.29 ملی لیٹر آکسیجن، 5 ملی لیٹر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور 0.5 ملی لیٹر ہائڈروجن حل شدہ حالت میں پائی جاتی ہیں۔

(B) خون کے تشکیل شدہ عناصر (Formed Elements of Blood)

خون میں تین اقسام کے خلوی عناصر پائے جاتے ہیں۔

(a) احمر جیسے (Erythrocytes) یا سرخ دھوکے جیسے (RBCs) (Red Blood Corpuscles)


(b) ایشیہ (Leucocytes) یا سفید دھوی جیسے (WBCs) (White Blood Corpuscles)

(c) دھوی پتلیجے (Blood Platelets)

(a) احمر جیسے (Erythrocytes)

خون میں پائے جانے والے سرخ دھوی جسموں (Red Blood Corpuscles) کو احمر جیسے (Erythrocytes) کہا جاتا ہے (ایریٹروس - Erythros = سرخ، سائکان - Cyton = خلیہ Cell) جن میں ہیموگلوبین نامی سرخ تنفسی صبغہ موجود ہوتا ہے۔ تمام پستانوں (Mammals) میں موئے اونٹ اور لاما کے پتہ احمر جیسے کی شکل دائری، مقعر الطرفین (Biconcave) 'غیر مرکزے دار' (Non-nucleated) اور قمر کی طرح ہوتی ہے۔ وسطی حصہ کی بہ نسبت حاشیہ دائری اور دبیز ہوتا ہے۔ جانب سے دیکھنے پر کدور نما (Dumple Shaped) دکھائی دیتا ہے۔ یہ پگھلاؤ اور ملائم ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ستون کی شکل میں چسپاں رہتے ہیں جس کو چمچہ یا انبار جسمات خون (Rouleaux) کہا جاتا ہے۔ اونٹ اور لاما اور تمام غیر پستانوی حیوانات میں احمر جیسے مرکزہ دار (Nucleated) 'محدبہ الطرفین' (Biconvex) اور بیضوی (Oval) شکل کے ہوتے ہیں۔ لیکن نو مولود کی پیدائش سے پہلے مضیفہ (Foetus) میں سرخ دھوی جیسے مرکزہ دار (Nucleated) ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد نو مولود کے خون میں مرکزہ دار سرخ دھوی جیسے غائب ہو جاتے ہیں اور غیر مرکزہ دار سرخ دھوی جیسے ظاہر ہو جاتے ہیں۔

انسان میں جائیداد سرخ دھوی جیسہ کا قطر 8.5 مائکرون ہوتا ہے لیکن سلائڈ پر خشک کی ہوئی پرت (Smear) میں اس کا قطر 7.6 مائکرون ہوتا ہے۔ مختلف مریضیاتی (Pathological) حالت میں اس کے قطر میں کمی و بیشی پائی جاتی ہے۔ مختلف پستانوی حیوانات میں اس کا قطر انسان میں پائے جانے والے سرخ جیسہ کے قطر کی بہ نسبت کسی قدر کم ہوتا ہے۔ ہاتھی کے خون میں موجود سرخ دھوی جیسہ کا قطر 9.4 مائکرون ہوتا ہے جو اعظم ترین قطر ہے جب کہ اقل ترین قطر کے سرخ دھوی جیسے مشک ہرن (Musk Deer) میں موجود ہوتے ہیں۔



مرد اشخاص کے خون میں سرخ دموی جیسوں کی تعداد 5500000 فی مکعب ملی میٹر اور عورتوں میں 5000000 فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔ آیف اوسط جسامت کے انسان میں سرخ جیسوں کی جملہ تعداد 25 ملین ہوتی ہے۔ مہلک فقر الدم (Pernicious Anaemia) کی حالت میں سرخ دموی جیسوں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوتی ہے۔ طویل عرصہ تک بلند ارتفاع (High Altitude) پر رہنے یا کاربن مانو آکسائیڈ (Carbon Monoxides) کے جسم میں داخل ہونے کی صورت میں سرخ دموی جیسوں کی تعداد میں قابل لحاظ اضافہ ہوتا ہے۔ سرخ دموی جیسے ملائم لچکدار ہوتے ہیں۔ شعریانوں (Capillaries) میں سے گزرنے کے دوران عموماً شق یا بے وضع ہو جاتے ہیں۔ اگر دما ب (Plasma) تبخیر (Evaporation) کے باعث مرکب ہو جائے تو سرخ دموی جیسوں سے پانی خارج ہو جاتا ہے یعنی پانی کم ارتکاز والے حصہ سے زیادہ ارتکاز والے حصہ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سرخ دموی جیسے سکڑ جاتے ہیں اور ان میں جھریاں دکھائی دیتی ہیں جن کو کنکریٹ (Crenation) کہا جاتا ہے۔ دما ب اگر ہلکا یا (Dilute) جائے تو پانی سرخ دموی جیسوں میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ پھول جاتے ہیں۔ ان صورتوں میں ہیموگلوبین نامی تنفسی صدفہ سرخ دموی جیسوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہیموگلوبین کا سرخ جیسوں سے خارج ہونا احمر پاشیدگی (Haemolysis) کہلاتا ہے۔ ان بے رنگ احمر جیسوں کو دموی گھوسٹ (Blood Ghost) یا خون کا سایہ (Blood Shadow) کہا جاتا ہے۔

انسانی احمر جیسہ (Erythrocyte) کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ جسم میں ہر ایک ثانیہ میں تقریباً 2500000 نئے احمر جیسے خون میں داخل ہوتے ہیں اور اتنی ہی تعداد نئی ثانیہ ضائع ہوتی ہے۔ ایک سرخ جیسہ اپنی مدت حیات میں تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔

افعال (Functions)

سرخ دموی جیسوں میں ہیموگلوبین (Hemoglobin) نامی تنفسی صدفہ پایا جاتا ہے۔ پیچیدہوں میں یہ آکسیجن کے ساتھ متحد ہو کر آکسی ہیموگلوبین (Oxyhemoglobin) میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس طرح سرخ دموی جیسے آکسیجن کو آکسی ہیموگلوبین کی شکل میں پیچیدہوں سے جسم کی مختلف ہاتھوں تک پہنچاتے ہیں۔ آکسیجن ہاتھوں میں نفوذ ہو جاتی ہے۔ ہیموگلوبین کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbondioxide) کے ساتھ متحد ہو کر کاربو آکسی ہیموگلوبین (Carboxyhemoglobin) بناتا ہے۔ ہیموگلوبین ایک پیچیدہ پروٹین ہے جس میں لوہا موجود ہوتا ہے۔ ہیموگلوبین کی آب پاشیدگی سے ہیماتین (Hematin) اور گلوبین (Globin) حاصل ہوتے ہیں۔ ہیماتین میں لوہا پایا جاتا ہے۔ گلوبین ایک گلوب نما پروٹین ہے۔


(b) ایض جیسے (Leucocytes) یا سفید دُموی جیسے (WBCs) (White Blood Corpuscles)

(c) دُموی تختے (Blood Platelets)

(a) احمر جیسے (Erythrocytes)

خون میں پائے جانے والے سرخ دُموی جسموں (Red Blood Corpuscles) کو احمر جیسے (Erythrocytes) کہا جاتا ہے (ایریٹروس - Erythros = سرخ، سائیکان - Cyton = خلیہ Cell) جن میں ہیموگلوبن نامی سرخ تنفسی صبغہ موجود ہوتا ہے۔ تمام پستانوں (Mammals) میں سوائے اونٹ اور لاما کے پختہ احمر جیسے کی شکل دائری، مقعر الطرفین (Biconcave) 'غیر مرکزے دار' (Non-nucleated) اور قرص کی طرح ہوتی ہے۔ وسطی حصہ کی بہ نسبت حاشیہ دائری اور دبیز ہوتا ہے۔ جانب سے دیکھنے پر کندر نما (Dumple Shaped) دکھائی دیتا ہے۔ یہ چکدار اور ملائم ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ستون کی شکل میں چسپاں رہتے ہیں جس کو چھلہ یا ابار جسمات خون (Rouleaux) کہا جاتا ہے۔ اونٹ اور لاما اور تمام غیر پستانوی حیوانات میں احمر جیسے مرکزہ دار (Nucleated) 'محدبہ الطرفین' (Biconvex) اور بیضوی (Oval) شکل کے ہوتے ہیں۔ لیکن نو مولود کی پیدائش سے پہلے مضیغہ (Foetus) میں سرخ دُموی جیسے مرکزہ دار (Nucleated) ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد نو مولود کے خون میں مرکزہ دار سرخ دُموی جیسے غائب ہو جاتے ہیں اور غیر مرکزہ دار سرخ دُموی جیسے ظاہر ہو جاتے ہیں۔

انسان میں جامعہ سرخ دُموی جسم کا قطر 8.5 مائکرون ہوتا ہے لیکن سلائڈ پر خشک کی ہوئی پرت (Smear) میں اس کا قطر 7.6 مائکرون ہوتا ہے۔ مختلف مریضیاتی (Pathological) حالت میں اس کے قطر میں کمی و بیشی پائی جاتی ہے۔ مختلف پستانوی حیوانات میں اس کا قطر انسان میں پائے جانے والے سرخ جسم کے قطر کی بہ نسبت کسی قدر کم ہوتا ہے۔ ہاتھی کے خون میں موجودہ سرخ دُموی جسم کا قطر 9.4 مائکرون ہوتا ہے جو اعظم ترین قطر ہے جب کہ اقل ترین قطر کے سرخ دُموی جیسے مشک ہرن (Musk Deer) میں موجود ہوتے ہیں۔



مرداشناس کے خون میں سرخ دموں جیسوں کی تعداد 5500000 فی مکعب ملی میٹر اور عورتوں میں 5000000 فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔ ایک اوسط جسامت کے انسان میں سرخ دموں کی جملہ تعداد 25 ملین ہوتی ہے۔ مہلک فقر الدم (Pernicious Anaemia) کی حالت میں سرخ دموں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوتی ہے۔ طویل عرصہ تک بلند ارتفاع (High Altitude) پر رہنے یا کاربن مانو آکسائیڈ (Carbon Monoxides) کے جسم میں داخل ہونے کی صورت میں سرخ دموں کی تعداد میں قابل ملاحظہ اضافہ ہوتا ہے۔ سرخ دموں جیسے ملائم کچھدار ہوتے ہیں۔ شعریانوں (Capillaries) میں سے گزرنے کے دوران عموماً شش یا بے وضع ہو جاتے ہیں۔ اگر دما ب (Plasma) تبخیر (Evaporation) کے باعث مر نکڑ ہو جائے تو سرخ دموں جیسوں سے پانی خارج ہو جاتا ہے یعنی پانی کم ارتکاز والے حصہ سے زیادہ ارتکاز والے حصہ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سرخ دموں جیسے سکڑ جاتے ہیں اور ان میں جھریاں دکھائی دیتی ہیں جن کو کنکریٹ (Crenation) کہا جاتا ہے۔ دما ب اگر ہلکا یا (Dilute) جائے تو پانی سرخ دموں جیسوں میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ پھول جاتے ہیں۔ ان صورتوں میں ہیموگلوبین نامی تنفسی صنف سرخ دموں جیسوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہیموگلوبین کا سرخ دموں جیسوں سے خارج ہونا احمر پاشیدگی (Haemolysis) کہلاتا ہے۔ ان بے رنگ احمر جیسوں کو دموں گھوسٹ (Blood Ghost) یا خون کا سایہ (Blood Shadow) کہا جاتا ہے۔

انسانی احمر جیسہ (Erythrocyte) کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ جسم میں ہر ایک ٹائیٹ میں تقریباً 2500000 نئے احمر جیسے خون میں داخل ہوتے ہیں اور اتنی ہی تعدادنی ٹائیٹ ضائع ہوتی ہے۔ ایک سرخ جیسہ اپنی مدت حیات میں تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔

افعال (Functions)

سرخ دموں جیسوں میں ہیموگلوبین (Hemoglobin) نامی تنفسی صنف پایا جاتا ہے۔ پیچیدہوں میں یہ آکسیجن کے ساتھ متحد ہو کر آکسی ہیموگلوبین (Oxyhemoglobin) میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس طرح سرخ دموں جیسے آکسیجن کو آکسی ہیموگلوبین کی شکل میں پیچیدہوں سے جسم کی مختلف بافتوں تک پہنچاتے ہیں۔ آکسیجن بافتوں میں نفوذ ہو جاتی ہے۔ ہیموگلوبین کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbondioxide) کے ساتھ متحد ہو کر کاربو آکسی ہیموگلوبین (Carboxyhemoglobin) بناتا ہے۔ ہیموگلوبین ایک پیچیدہ پروٹین ہے جس میں لوہا موجود ہوتا ہے۔ ہیموگلوبین کی آب پاشیدگی سے ہیماتین (Hematin) اور گلوبین (Globin) حاصل ہوتے ہیں۔ ہیماتین میں لوہا پایا جاتا ہے۔ گلوبین ایک گلوب نما پروٹین ہے۔


(b) اینٹریس جسے (Leucocytes) یا سفید دھوئی جسے (WBCs) (White Blood Corpuscles)

(c) دھوئی پتھچے (Blood Platelets)

(a) احمر جسے (Erythrocytes)

خون میں پائے جانے والے سرخ دھوئی جسموں (Red Blood Corpuscles) کو احمر جسے (Erythrocytes) کہا جاتا ہے (ایریٹھروس۔ Erythros = سرخ، سائٹان = Cyton = خلیہ Cell) جن میں جو کلوگوبین نامی سرخ تنفسی صبغہ موجود ہوتا ہے۔ تمام پستانوں (Mammals) میں سوائے اونٹ اور لاما کے پتھ احمر جسے کی شکل دائری، مقعر الطرفین (Biconcave) 'غیر مرکز دار' (Non-nucleated) اور قمر کی طرح ہوتی ہے۔ وسطی حصہ کی بہ نسبت حاشیہ دائری اور دبیز ہوتا ہے۔ جانب سے دیکھنے پر مکدر نما (Dumple Shaped) دکھائی دیتا ہے۔ یہ لگدار اور ملائم ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ستون کی شکل میں چپاں رہتے ہیں جس کو چھلہ یا انبار جسمات خون (Rouleaux) کہا جاتا ہے۔ اونٹ اور لاما اور تمام غیر پستانوی حیوانات میں احمر جسے مرکز دار (Nucleated) 'محدب، الطرفین (Biconvex) اور بیضوی (Oval) شکل کے ہوتے ہیں۔ لیکن نومولود کی پیدائش سے پہلے مضیغہ (Foetus) میں سرخ دھوئی جسے مرکز دار (Nucleated) ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد نومولود کے خون میں مرکز دار سرخ دھوئی جسے غائب ہو جاتے ہیں اور غیر مرکز دار سرخ دھوئی جسے ظاہر ہو جاتے ہیں۔

انسان میں جامعہ سرخ دھوئی جسمہ کا قطر 8.5 مائکرون ہوتا ہے لیکن سلائڈ پر خشک کی ہوئی پت (Smear) میں اس کا قطر 7.6 مائکرون ہوتا ہے۔ مختلف مرضیاتی (Pathological) حالت میں اس کے قطر میں کمی و بیشی پائی جاتی ہے۔ مختلف پستانوی حیوانات میں اس کا قطر انسان میں پائے جانے والے سرخ جسمہ کے قطر کی بہ نسبت کمی قدر کم ہوتا ہے۔ ہاتھی کے خون میں موجودہ سرخ دھوئی جسمہ کا قطر 9.4 مائکرون ہوتا ہے جو اعظم ترین قطر ہے جب کہ اقل ترین قطر کے سرخ دھوئی جسے مٹک ہرن (Musk Deer) میں موجود ہوتے ہیں۔



(b) ایبض جیسے (Leucocyts)

خون میں پائے جانے والے سفید دموں جیسے (White Blood Carpuscles) حقیقی خلیے ہوتے ہیں کیوں کہ ان میں مرکزہ (Nucleus) موجود ہوتا ہے۔ یہ ایمباکی (Ameboid) نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تمام نقری حیوانات میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایبض جیسوں کی درجہ بندی

ایبض جیسوں کی درجہ بندی ان میں دانوں کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بنیاد پر دو گروپس میں کی جاتی ہے جن کو مزید ذیلی گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(a) غیر دانے دار ایبض جیسے (Non Granular Leucocytes)

(1) لمفی جیسے (Lymphocytes) $25\% \pm$

(2) یک نوائی جیسے (Monocytes) $50\% \pm$

(b) دانے دار ایبض جیسے (Granular Leucocytes)

(1) تعدیل پسند جیسے (Neutrophils) $65\% \pm$

(2) ایوسن پسند جیسے (Eosinophils) یا ترش پسند جیسے (Acidophils) $3\% \pm$

(3) اساس پسند جیسے (Basophil) $0.5\% \pm$

بالغوں میں ایبض جیسوں کی اوسط تعداد 5000 اور 9000 فی مکعب ملی لیٹر خون ہوتی ہے۔ ایبض جیسوں اور احمر جیسوں کا تناسب تقریباً 1:700 ہوتا ہے یعنی ہر 700 احمر جیسوں میں صرف ایک ایبض جیسہ ہوتا ہے۔ ایبض جیسوں کی تعداد بالغوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ نومولود میں پیدائش کے وقت ان کی نارمل تعداد تقریباً 16000 فی مکعب ملی لیٹر خون ہوتی ہے۔ مختلف امراض میں ان کی تعداد قابل لحاظ تغیرات کو ظاہر کرتی ہے۔ بالغ اشخاص میں ایبض جیسوں کی 12000 سے زائد تعداد بیماری کو ظاہر کرتی ہے۔ مختلف امراض میں مختلف اقسام کے ایبض جیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کالی کھانسی (Whooping Cough) میں لمفی جیسوں (Lymphocytes)، دق (Tuberculosis) میں یک نوائی جیسوں (Monocytes)، الرجی (Allergies) اور طفیلیوں کے باعث واقع ہونے والے امراض میں ترش پسند جیسوں (Eosinophils)، چھوٹی چچک (Chicken Pox) میں اساس پسند جیسوں (Basophils) اور پیپ (Pus) تیار کرنے والے تعدیوں میں تعدیل پسند جیسوں (Neutrophils) کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔

ایہیں جسموں کی تعداد 5000 سے کم واقع ہوتو مرض قلت ایض (Leucopenia) کہلاتا ہے۔ جیسے ٹائفائیڈ بخار (Typhoid Fever) میں ہوتی ہے۔ ایض جیسے کی شکل غیر معین ہوتی ہے یعنی ان میں تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ ان کی شکل کسی قدر امیا (یک خلوی پرڈوزوا) کے مماثل ہوتی ہے جس میں مرکزہ (Nucleus)، مرکزینے (Centrioles)، قوا یے (Mitochondria) اور گالگی اجسام (Golgi Bodies) وغیرہ عضوئے (Organelles) موجود ہوتے ہیں۔

(a) غیر دانے دار ایض جیسے (Non-granular Leucocytes)

ان ایض جسموں کے خلیہ مایہ (Cytoplasm) میں دانے غیر موجود ہوتے ہیں۔ یہ دو اقسام کے ہوتے ہیں۔

(1) لمفی جیسے (Lymphocytes) اور (2) یک نواتی جیسے (Monocytes)۔

(1) لمفی جیسے (Lymphocytes)

انسان کے جسم میں لمفی جیسے (Lymphocytes) جسامت کے لحاظ سے تین اقسام کے ہوتے ہیں۔


(i) صغیر لمفی جیسے (Small Lymphocytes)

(ii) اوسط جسامت کے لمفی جیسے (Medium Sized Lymphocytes) اور

(iii) کبیر لمفی جیسے (Large Lymphocytes)

(i) صغیر لمفی جیسے (Small Lymphocytes)


یہ انسان کے خون میں پائے جانے والے عام جیسے ہیں۔ ان کی جسامت احمر جسموں (Erythrocytes) کی جسامت کی بہ نسبت کسی قدر بڑی ہوتی ہے۔ ان میں مرکزہ (Nucleus) بڑا ہوتا ہے جو خلیہ مایہ (Cytoplasm) کی پتلی پرت سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ مرکزہ کی شکل کر دی ہوتی ہے جس پر کسی قدر کنگرہ موجود ہوتا ہے جو عموماً دکھائی نہیں دیتا۔ ان میں لونی جال (Chromatin) بکثرت موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کثیف اور گہرے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔ خلیہ مایہ اس پر پسند ہوتا ہے جو نیلے رنگ سے رنگے جاتا ہے۔



شکل 7.2
اقل ترین جسامت کا لمفی جسم

(ii) اوسط جسامت کے لمبی جیسے (Medium Sized Lymphocytes)

ان کی جسامت اقل ترین لمبی جیسوں کی بہ نسبت کسی قدر بڑی ہوتی ہے اور ان میں غلیہ مایہ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ خون میں اس قسم کے لمبی جیسوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ ان کو قدیم جیسے کہا جاتا ہے۔



شکل 7.3

اوسط جسامت کا لمبی جیسہ

(iii) کبیر لمبی جیسے (Large Lymphocytes)

ان کی جسامت صغیر لمبی جیسہ کی جسامت کی بہ نسبت تین گنا بڑی ہوتی ہے۔ یہ لمبی جیسے صرف لمبی عقدوں (Lymph Nodes) میں موجود ہوتے ہیں لیکن مرضیاتی حالت میں ہی یہ خون میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی قسم کے جیسے ہوتے ہیں جو دیگر لمبی جیسوں کو پیدا کرتے ہیں۔




شکل 7.4

اعظم ترین جسامت کا لمبی جیسہ

(2) یک لوائی جیسے (Monocytes)

یہ ایسے غیر دماغی دار لمبی جیسے ہیں جن میں ایک بڑا مرکزہ ہوتا ہے۔ ان کی جسامت مختلف ہوتی ہے لیکن اگر جیسہ کی بہ نسبت دوگنی ہوتی ہے۔ ان میں مرکزہ (Nucleus) بیضوی گردہ کی شکل کا یا اس سے تنہا ہوتا ہے جو مختلف عمر کے جیسوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ مرکزہ خارج

المرکز (Eccentric) ہوتا ہے۔ ان میں لوئی جال (Chromatin) لمفی جیسوں کی بہ نسبت زیادہ نازک اور بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی جسامت اوسط جسامت کے لمفی جیسوں کی بہ نسبت بڑی ہوتی ہے۔



شکل 7.5

ایک نوائی جسیمہ

(B) دانے دار اہیض جیسے (Granular Lymphocytes)

ان اہیض جیسوں کے خلیہ مایہ میں دانے پائے جاتے ہیں۔ ان کی جسامت امر جسیمہ کی جسامت کی بہ نسبت تقریباً دو گنی ہوتی ہے۔ اس قسم کے اہیض جیسے مختلف واسطہ میں رنگنے کی خاصیت کی بنیاد پر تین اقسام کے ہوتے ہیں۔


(a) ترشہ پسند (Acidophils) یا ایون پسند (Eosinophil)

(b) اساس پسند (Basophils) اور

(c) تعدیل پسند (Neutrophils)

(a) ترشہ پسند (Acidophils) یا ایون پسند (Eosinophils)

ایسے دانے دار اہیض، جیسے جو ترشی واسطہ ایون (Eosin) میں رنگے جاتے ہیں ترشہ پسند (Acidophils) یا ایون پسند (Eosinophils) کہلاتے ہیں۔ ان میں مرکزہ عموماً دو فصی (Bilobed) ہوتا ہے۔ دونوں فصیں (Lobes) ایک مہین ڈور سے جڑی رہتی ہیں جن کو سٹکناے (Isthmus) کہتے ہیں۔ اس جسیمہ میں خلیہ مایہ کی مقدار تقریباً نصف حجم سے زیادہ ہوتی ہے جس میں یکساں جسامت کے کرووی دانے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ ترشہ خضاب (Acid Dyes) میں سرخ سے نارنجی رنگ تک رنگے جاتے ہیں۔



شکل 7.6

ترشہ پسند جسمہ

(b) اساس پسند (Basophils)

یہ دانے دار ابھیں جیسے ہوتے ہیں جو اساسی واسطہ میتھائلین بلو (Methylene Blue) میں گہرے نیلے رنگ سے جامونی رنگ تک رنگے جاتے ہیں۔ ان میں مرکزہ عموماً لادبا اور کسی قدر خم دار یا 'S' نما ہوتا ہے۔ مرکزہ عموماً دو یا تین فصوص پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرکزہ میں لونی جال (Chromatin) بکھری حالت میں ترتیب پایا ہوا ہوتا ہے۔ مرکزہ جسمہ کے دو تہائی یا نصف حصہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ خلیہ مایہ میں دانے کوئی بے وضع اور تعداد اور شکل میں مختلف ہوتے ہیں۔



شکل 7.7

اساس پسند جسمہ

(c) تعدیل پسند (Neutrophils)

اس قسم کے دانے دار ابھیں جیسے تعدیلی (Neutral) واسطہ ایوسن۔ از یور۔ میتھائلین بلو (Eosin-Azure-Methylene Blue) سے لیلک (Lilac) سے لیلک گلابی (Lilac Pink) رنگ تک رنگے جاتے ہیں۔ ان کا قطر احمر جسمہ کے قطر کی بہ نسبت دو گنا

ہوتا ہے۔ ان میں مرکزہ کئی فصوص (Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرکزہ میں عموماً تین یا زیادہ سے زیادہ پانچ انجفصیں پائی جاتی ہیں۔ تمام فصوص پتلے دھاکہ کے ذریعہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ بے قاعدہ دکھائی دیتی ہیں۔ عورتوں کے خون میں پائے جانے والے تقریباً 3% تعدیل پسند جیسوں میں مرکزہ کے ساتھ ایک ذائکہ ہوتا ہے جس کی شکل ٹھارے کے چوب (Drum Stick) کے مانند ہوتی ہے جس میں ہار جسم (Bar Body) یا جنسی لوئی جسم (X-Chromosome) موجود ہوتا ہے۔ تعدیل پسند جیسوں کے خلیہ مایہ میں پائے جانے والے دانے کافی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹے، بچان اور غیر واضح حالت میں پائے جاتے ہیں۔



شکل 7.8

تعدیل پسند جیسہ

ایض جیسوں کے افعال

ایض جیسے (Leucocytes) جب خون کی نالیوں میں رہتے ہیں تو یہ عموماً غیر عامل ہوتے ہیں چوں کہ یہ صرف دموئی دھواؤں کے باہر یعنی اتصالی ہالتوں (Connective Tissue) میں ہی اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں۔ ان کے اگلے سرے پر کاذب پیر (Pseudopodia) نمودار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایمائی حرکت کو انجام دیتے ہیں۔ تعدیل پسند جیسے کافی عامل (Active) ہوتے ہیں جو ایک منٹ میں 33 ماٹرون فاصلہ تک حرکت کرتے ہیں۔ یہ نواتی جیسے توسط عامل ہوتے ہیں جب کہ اساس پسند جیسے ست رفتار ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے غیر متحرک ہوتے ہیں لیکن ان میں کافی عامل بننے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ یہ مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔ جیسے

(a) ہجرتی سرگرمیاں (Migratory Activities) (b) اکالیت (Phagocytosis) (c) دیگر سرگرمیاں (Other

-Activities)

(a) ہجرتی سرگرمیاں (Migratory Activities)

ایہیں جیسے ہجرتی سرگرمیاں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دموئی شعریانوں (Blood Capillaries) سے باہر ہجرت کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض جیسے دوبارہ خون اور لطف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عموماً سوزش (Inflammation) کے دوران ان جسموں کی ہجرتی سرگرمیاں کافی بڑھ جاتی ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں جہاں خراش پذیر (Irritation) یا سوزش واقع ہوتی ہے سب سے پہلے تعدیل پسند جیسے (Neutrophils) کاٹیج جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نوائی جیسے (Monocytes) پہنچتے ہیں اور اکالی (Phagocytic) افعال کو انجام دیتے ہیں۔ الرجی کے دوران ایون پسند جیسے (Eosinophils) غذائی نالی اور تنفسی نالی کے راستہ کی دیوار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لمبی جیسے (Lymphocytes) کہہ سوزش (Chronic Inflammation) کے مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔

(b) اکالیت (Phagocytosis)

تمام ایہیں جیسے اکالی افعال کو انجام دیتے ہیں۔ بیرونی اشیاء جراثیم اور خلیوں وغیرہ کو نگلنے کی خاصیت اکالیت (Phagocytosis) کہلاتی ہے۔ جسم میں جب بیرونی ذرات یا جراثیم داخل ہوتے ہیں تو ایہیں جیسے انہیں نگل لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم ان ذرات یا جراثیم سے ہونے والے نقصانات یا تعدیہ (Infection) سے محفوظ ہو جاتا ہے۔


تعدیل پسند (Neutrophils) جیسے خاص کر چھوٹے ذرات جیسے کاربن کے ذرات اور جراثیم (Bacteria) کو نگل لیتے ہیں جس کے بعد یہ جیسے مردہ بن جاتے ہیں۔ ان مردہ تعدیل پسند جسموں کو پیپ خلیے (Pus Cells) کہا جاتا ہے۔ تعدیل پسند جسموں اور ایون پسند جسموں (Eosinophils) کے خلیہ مایہ میں پاش اجسام (Lysosomes) کے دانے پائے جاتے ہیں جو آب پاشی خامرے (Hydrolytic Enzymes) خارج کرتے ہیں جو ان جسموں میں لگے ہوئے جراثیم کو ہضم کر لیتے ہیں۔ ایک نوائی جیسے (Monocytes) خاص کر زہابی مادوں کو نگل لیتے ہیں ان کو خصوصی طور پر خاک روپ (Scavengers) کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ خلیوں اور ہاتھوں کے ناکارہ حصوں کو نگل لیتے ہیں۔ ایک نوائی خلیے خون سے باہر نکل کر اکالی جسموں (Macrophages) میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

لمبی جیسے (Lymphocytes) مایون پسند جیسے (Eosinophils) اور اساس پسند جیسے (Basophils) بھی مخصوص حد تک اکالی خاصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔

(c) دیگر سرگرمیاں (Other Activities)

لمبی جیسے، ایون پسند جیسے اور ایک نوائی جیسے ہمارے جسم میں مامونیت (Immunity) کو قائم رکھنے میں اہم رول ادا کرتے

ہیں۔ جسم میں واقع ہونے والے مکرر تعدیہ (Infection) کے خلاف مدافعتی صلاحیت کو مامونیت (Immunity) کہا جاتا ہے۔ تعدیل پسند جیسوں میں فاسفائیڈز (Phosphatases) کی خامرے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لکھیہ پاش خامرے (Proteolytic Enzymes) افزا کرتے ہیں جو پروٹین کو ہضم کرتے ہیں۔ مدافعتی سرگرمیوں میں اکالیت (Phagocytosis)، لکھیہ پاشیدگی (Proteolysis) اور ضد اجسام (Antibodies) کی تیاری وغیرہ شامل کئے جاتے ہیں۔ تعدیل پسند جیسے حملہ آور اجسام یا جراثیم کے خلاف مدافعت کی پہلی صف سہیا کرتے ہیں۔



شکل 7.9

ایٹیز جیسہ جو اکالیت کو ظاہر کرتے ہوئے مامونیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔

دموی تختچے (Blood Platelets)

دموی تختچے (Blood Platelets) ظلیہ مالی جیسے (Cytoplasmic Corpuscles) ہیں جو صرف پستانی حیوانات بشمول انسان کے خون میں پائے جاتے ہیں۔ ادنیٰ فقری حیوانات (Lower Vertebrates) میں دموی تختچے غیر موجود ہوتے ہیں لیکن ان کے بجائے تھکے نما ظلیے پائے جاتے ہیں جن کو دلی جیسے (Thrombocytes) کہا جاتا ہے۔ دموی تختچے اور دلی جیسے دونوں ایک جیسے افعال انجام دیتے ہیں۔

دموی تختچے چھوٹے، قرص نما، چپٹے، بیضوی یا گردی شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کا قطر 3 مائکروں ہوتا ہے۔ خون میں ان کی نارمل تعداد 200000 ± 400000 فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہ کافی پھونک (Fragile) قسم کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے چسپاں ہو کر جھنڈ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً نو دن ہوتی ہے۔ ان کی تیاری عظمیٰ گوہ (Bone Marrow) میں پائے جانے والے کلاں نواتی خیموں (Megakaryocytes) کے ٹوٹنے ہوئے ٹکڑوں سے عمل میں آتی ہے۔ ان میں مرکزہ غیر موجود ہوتا ہے۔



شکل 7.10

دموی تختچے

افعال (Functions)

- (1) پستانوں میں دموی تختچے (Blood Platelets) اور دیگر تقری حیوانات میں دلی جیسے (Thrombocytes) دموی دھاؤں (Blood Vessels) کے کٹے ہوئے حصوں پر انجماد خون (Blood Clotting) میں اہم رول ادا کرتے ہیں کیوں کہ یہ انجماد خون کے لئے درکار ضروری عوامل کا افزا کرتے ہیں۔
- (2) دموی تختچے سیرٹونین (Serotonin) نامی کیمیائی مرکب کا افزا کرتے ہیں جو چھوٹی دموی دھاؤں میں سکڑاؤ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔
- (3) دموی تختچے دموی دھاؤں کی اندرونی سطح پر پائے جانے والے کمزور مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ دموی دھاؤں میں سمٹ کے مانند فعل انجام دیتے ہیں اور کمزور مقامات سے خون کے اخراج کو روکتے ہیں۔
- (4) اگر خون میں دموی تختچوں کی تعداد قابل لحاظ حد تک کم ہو جائے تو دلی جیسہ قلت (Thrombocytopenia) نامی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جو انتہائی مہلک ہوتا ہے۔ اس عارضہ میں ذریعہ جلدی ہفتوں میں پائی جانے والی دموی دھاؤں سے خون کا خارج


ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کی سطح پر سرخ دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ ان مقامات پر جہاں سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں انتہائی سوزش، جلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اندرونی اعضاء سے بھی خون خارج ہونا شروع ہوتا ہے جو پیشاب میں بھی نظر آتا ہے۔ ان اعضاء کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے خاص کر اگر دماغ کی شعریالوں سے خون خارج ہونا شروع ہو جائے تو یہ خون دماغ کے مختلف حصوں پر جمع ہو جاتا ہے اور دماغ کے دموئی شعریالوں کو بند بھی کر دیتا ہے جس کے باعث دماغ کو خون کی سربراہی مسدود ہو جاتی ہے۔ خون کے ذریعہ دماغ کو پہنچائی جانے والی آکسیجن دماغ کو مہیا نہ ہونے کی وجہ سے مریض 'کوما' (Coma) کی حالت میں آ جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دماغ کو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے تمام حولی افعال متاثر ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں موت واقع ہو جاتی ہے۔

جسم کے اندرونی اعضاء کے شدید متاثر ہونے اور دماغ کے متاثر ہونے سے قبل ہی اس عارضہ کا علاج کیا جاسکتا ہے ورنہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے جو موت کا سبب بنتا ہے۔ اس عارضہ کا علاج خاص کر دموئی خچوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے جسم میں خون داخل کیا جاتا ہے۔

اس زخم سے خارج ہونے والا خون 2 تا 3 منٹ میں ٹھمد ہو جاتا ہے اور جسم سے مزید خون کے اخراج کو روک دیتا ہے خون کے ٹھمد ہونے کو انجماد خون (Blood Clotting) یا ترویب یا بنگل (Coagulation) کہا جاتا ہے۔

انجماد خون کی میکائیت

انجماد خون کی ابتداء پستانیوں میں دموئی خچوں (Blood Platelets) اور دیگر فقریوں میں دلی جسموں (Thrombocytes) سے ہوتی ہے۔ جسم کی زخمی سطح پر یہ جمع ہو جاتے ہیں اور تحلیل ہو جاتے ہیں جس کے باعث ان سے فاسفولیپڈس (Phospholipids) آزاد ہوتا ہے۔ فاسفولیپڈس اور باقی عوامل بعض پلازما گلوبولین (Globulins) کے ساتھ مل کر تھرومبو پلاستین (Thromboplastin) نامی خامرہ تیار کرتے ہیں۔ تھرومبو پلاستین کیلشیم رواں کی موجودگی میں غیر عامل پروتھرومبین (Prothrombin) کو عامل خامرہ تھرومبین (Thrombin) میں تبدیل کرتا ہے۔ تھرومبین خامرہ حل پذیر پروٹین فائبرینوجن (Fibrinogen) کو ناقص حل پذیر پروٹین فائبرین (Fibrin) میں تبدیل کرتا ہے۔ فائبرین کے سالمات کثیر سالمات (Polymerisation) عمل کے ذریعہ لائے ریشے بناتے ہیں جو جال تیار کرتے ہیں۔ فائبرین کے جال میں خون میں پائے جانے والے تمام جسم کے غلیے اور پلازما جکڑے جاتے ہیں جس کے باعث خون کا ٹکڑا (Clot) تیار ہوتا ہے۔ بعد ازاں ٹکڑا سکڑتا ہے جس کے نتیجہ میں ہلکا زردی مائل رنگ کا سیال ٹکڑے سے علاحدہ ہو جاتا ہے اس سیال کو مصل (Serum) کہا جاتا ہے۔



شکل 7.11

انجماد خون کی میکانیت کا خلاصہ

3.2 خون کے گروہس (Blood Groups)

انسان کے خون میں چھ مخصوص کیمیائی اشیاء پائی جاتی ہیں جن کو تریاق زہا (Antigen) اور ضد اجسام (Antibodies) کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیائی اشیاء مختلف اشخاص میں مختلف ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کی موجودگی کی بنیاد پر انسانی خون کو کئی گروہس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان گروہس میں دریافت کئے گئے اے بی او (ABO) گروہس، آرائیج (Rh) گروہس اور ایم این (MN) گروہس اہم خون کے گروہس کہلاتے ہیں۔

اے بی او گروہس (ABO Groups)

خون کے گروہس اے بی او (ABO) کو لائڈ اسٹینر (Landsteiner) نے 1900ء میں دریافت کیا۔ اس کے مطابق خون کے امراض جیسوں (RBC) پر دھم کے تریاق زہا (Antigens) پائے جاتے ہیں جن کو تریاق زہا اے (Antigen A) اور تریاق زہا بی

(Antigen B) کہا جاتا ہے۔ یہ تریاق زا خون کے دماہ (Plasma) میں نا حل پذیر ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ خون کے احمر جسموں (RBC) کی سطح پر ذرات کی شکل میں چسپاں رہتے ہیں۔ اس لئے اس قسم کے تریاق زا کو ذراتی تریاق زا (Particulate Antigen) کہا جاتا ہے۔ RBC کی سطح پر تریاق زا کی قسم کی بنیاد پر خون کے گروہس کو نامزد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خون کے دماہ (Plasma) میں ضد اجسام (Antibodies) حل شدہ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی دو اقسام کے ہوتے ہیں جن کو ضد اجسام اے (Antibody A) اور ضد اجسام بی (Antibody B) کہا جاتا ہے۔ اگر شخص کے خون کے RBC کی سطح پر تریاق زا اے (Antigen A) چسپاں حالت میں ہو تو خون کے گروہس کو گروپ اے (Group A) کہا جاتا ہے۔ اس شخص کے دماہ (Plasma) میں ضد اجسام بی (Antibody B) حل شدہ حالت میں رہتا ہے۔ اگر شخص کے خون کے (RBC) کی سطح پر تریاق زا بی (Antigen B) چسپاں ہو تو اس شخص کے خون کے گروہس کو گروپ بی (Group B) کہا جاتا ہے۔ اس شخص کے دماہ (Plasma) میں ضد اجسام اے (Antibody A) حل شدہ حالت میں موجود ہوتا ہے۔

اگر شخص کے خون کے RBC کی سطح پر تریاق زا (Antigen A) اور تریاق زا بی (Antigen B) دونوں چسپاں حالت میں ہو تو اس شخص کے خون کے گروہس کو گروپ اے بی (Group AB) کہا جاتا ہے۔ اس شخص کے دماہ میں ضد اجسام اے (Antibody A) اور ضد اجسام بی (Antibody B) دونوں غیر موجود ہوتے ہیں۔ اگر شخص کے خون کے RBC کی سطح پر تریاق زا اے (Antigen A) اور تریاق زا بی (Antigen B) دونوں غیر موجود ہوں تو اس شخص کے خون کے گروہس کو گروپ او (Group O) کہا جاتا ہے۔ اس کے دماہ میں ضد اجسام اے (Antibody A) اور ضد اجسام بی (Antibody B) دونوں موجود ہوتے ہیں۔

جدول 1 خون کا گروپ ان کے متعلقہ تریاق زائے (Antigen) اور ضد اجسام (Antibodies)

سلسلہ نمبر	خون کا گروپ (Blood Group)	تریاق زا (Antigen)	ضد اجسام (Antibodies)
1	اے (A)	اے (A)	بی (B)
2	بی (B)	بی (B)	اے (A)
3	اے بی (AB)	اے (A) اور بی (B)	غیر موجود
4	او (O)	غیر موجود	اے (A) اور بی (B) دونوں موجود ہوتے ہیں۔

جسم میں تریاق زائے (Antigen) کی پیدائش کثیر متبادل جنس (Multiple Alleles) کے قابو میں ہوتی ہے۔

3.3 منتقلی خون (Blood Transfusion)

ایک شخص سے دوسرے شخص کے خون میں ورید (Vein) کے ذریعہ خون کی منتقلی کو منتقلی خون (Blood Transfusion) کہتے ہیں۔ مختلف اشخاص کے درمیان خون کی منتقلی (Blood Transfusion) میں ان کے خون کے گروہس کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تریاق زائے (Antigens) اور ضد اجسام (Antibodies) کے درمیان مخصوص باہمی تعامل واقع ہوتا ہے۔ تعامل کے نتیجے میں خون کے احمر جیسے (RBC) تو دے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس تعامل کو چسپیدگی (Agglutination) کہا جاتا ہے۔ اگر دوسری دواؤں میں اس قسم کا تعامل واقع ہو تو احمر جیسوں کے تو دے دوسری دواؤں کو بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خون کے گردش رک جاتی ہے جو موت کا سبب بنتی ہے۔ تریاق زائے (Antigen A) کا ضد اجسام بی (Antibody B) کے ساتھ اور تریاق زائے بی (Antigen B) کا ضد اجسام اے (Antibody A) کے ساتھ چسپیدگی تعامل واقع نہیں ہوتا بلکہ تریاق زائے اے (Antigen A) اور ضد اجسام اے (Antibodies A) کے درمیان چسپیدگی تعامل واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح تریاق زائے بی (Antigen B) اور ضد اجسام بی (Antibodies B) کے درمیان چسپیدگی تعامل انجام پاتا ہے اور احمر جیسے تو دوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایک جیسے خون کے گروہس والے خون کے نمونوں کو ایک دوسرے میں ملانے پر چسپیدگی تعامل واقع نہیں ہوتا بلکہ مختلف خون کے گروہس والے خون کے نمونوں کو آپس میں ملانے پر چسپیدگی تعامل واقع ہوتا ہے۔ ایک فرد سے دوسرے فرد میں خون کی منتقلی سے قبل ان کے خون کے گروہس کی جانچ ضروری ہوتی ہے۔ خون دینے والے کو دہندہ (Donor) اور خون حاصل کرنے والے فرد کو وصول کنندہ (Recipient) کہا جاتا ہے۔ جب دہندہ کسی وصول کنندہ کو غیر موزوں خون کے گروہ کے حامل خون کا عطیہ دیتا ہے تو وصول کنندہ کے جسم میں خون کی چسپیدگی (Agglutination) واقع ہوتی ہے جو موت کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر دہندہ (Donor) کے خون کا گروہ اے (Group A) ہے یعنی اس کے خون میں تریاق زائے اے (Antigen A) اور ضد اجسام بی (Antibody B) ہے اور وصول کنندہ (Recipient) کے خون کا گروہ بی (Group B) ہے یعنی اس کے خون میں تریاق زائے بی (Antigen B) اور ضد اجسام اے (Antibody A) ہے۔ دہندہ کا خون وصول کنندہ کے جسم میں منتقل کیا جائے تو وصول کنندہ کے دما ب (Plasma) میں پائے جانے والے ضد جسم اے (Antibody A) دہندہ کے خون کے احمر جیسوں پر پائے جانے والے تریاق زائے اے (Antigen A) کے درمیان چسپیدگی تعامل واقع ہوگا جس کے نتیجے میں وصول کنندہ دوسری دواؤں میں احمر جیسے چسپیدگی کے باعث تو دوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور دوسری دواؤں کو بند کر دیں گے جس کی وجہ سے وصول کنندہ کی موت واقع

ہو جائے گی۔


جدول 2 وصول کنندہ کے دماپ (Plasma) میں پائے جانے والے ضد جسم اے (Antibody A) دہندہ کے خون

کے احمر جسموں پر پائے جانے والے تریاق زا اے (Antigen A) کے درمیان چسپیدگی تعامل


دماپ میں ضد جسم (Antibody)	RBC پر تریاق زا (Antigen)	خون کا گروپ (Blood Group)	
a	B	B	وصول کنندہ
b	A	A	دہندہ

گروپ بی (Group B) کے فرد کو گروپ اے (Group A) اور گروپ اے بی (Group AB) رکھنے والے افراد بھی اپنا خون کا عطیہ نہیں دے سکتے اسی طرح گروپ اے (Group A) کے افراد کو گروپ بی (Group B) اور گروپ اے بی (Group AB) کے حامل افراد اپنا خون کا عطیہ نہیں دے سکتے کیوں کہ ان کے خون کے گروپس کے درمیان مطابقت نہیں پائی جاتی لیکن گروپ اے بی (Group AB) کے فرد کو تمام خون کے گروپس والے افراد اپنے خون کے عطیات دے سکتے ہیں۔ اس لئے گروپ اے بی کے فرد کو ہمہ وصول کنندہ (Universal Recipient) کہا جاتا ہے کیوں کہ تمام گروپس کے خون کے ساتھ گروپ اے بی کا خون مطابقت رکھتا ہے۔ گروپ اے بی (Group AB) کے خون میں ضد اجسام نہیں پائے جاتے اس لئے دوسرے خون کے RBC پر پائے جانے والے گروپ او (Group O) کے فرد کو کسی بھی دوسرے قسم کے گروپس کے حامل افراد اپنے خون کے عطیات نہیں دے سکتے صرف گروپ او (Group O) کے حامل افراد ہی اپنا خون کا عطیہ دے سکتے ہیں لیکن گروپ او (Group O) کا فرد اپنے خون کا عطیہ تمام قسم کے گروپس کے حامل افراد کو دے سکتا ہے اس لئے گروپ او (Group O) کے فرد کو عالم گیر یا ہمہ گیر دہندہ (Universal Donor) کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر گروپ او کے فرد کا خون تمام گروپس کے خون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ چوں کہ گروپ او کے خون کے RBC پر تریاق زا (Antigens) نہیں پائے جاتے اس لئے گروپ او کے خون کے RBC دیگر تمام گروپس کے خون میں پائے جانے والے ضد اجسام کے ساتھ چسپیدگی تعامل کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وصول کنندہ کے خون میں پائے جانے والے ضد اجسام کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جو مخصوص تریاق زا کے ساتھ چسپیدگی تعامل کو ظاہر کرتے ہیں لیکن دہندہ کے خون میں پائے جانے والے ضد اجسام کوئی اثر ظاہر نہیں کرتے کیوں کہ منتقلی سے پہلے انہیں ہلکا یا بنا دیا جاتا ہے یا ان کا ارتقاء کافی کمزور ہوتا ہے جو اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہذا اگر گروپ اے بی (Group AB) کے حامل وصول کنندہ فرد کے خون کے RBC پر پائے جانے والے تریاق زا اے (Antigen A) اور تریاق زا

بی (Antigen B) دہندہ کے خون میں پائے جانے والے ہائرتیب ضد اجسام اے (Antibodies a) اور ضد اجسام بی (Antibodies b) کے ساتھ چسپیدگی تعامل کو ظاہر نہیں کرتے اسی طرح ہمہ گیر دہندہ گروپ او (Group O) کے فرد کے خون میں پائے جانے والے ضد اجسام اے (Antibodies a) اور ضد اجسام بی (Antibodies b) ہائرتیب وصول کنندہ کے تریاق زائے (Antigen A) اور تریاق زابی (Antigen B) کے ساتھ تعامل ظاہر نہیں کرتے۔



فصل 7.12 منتقلی کے لئے خون کا حصول



فصل 7.13 خون کی منتقلی










مختلف گروہس کے حامل وصول کنندہ افراد (Recipient) اور دہندہ افراد (Donor) کے خون کے گروہس کے درمیان مطابقت اور عدم مطابقت کو جدول میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مطابقت کی صورت میں ہی منتقلی خون کو انجام دیا جاسکتا ہے جب کہ عدم مطابقت کی صورت میں منتقلی خون کو انجام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ چسپیدگی تعامل عدم مطابقت کو ظاہر کرتا ہے اور چسپیدگی تعامل کی غیر موجودگی مطابقت کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا مطابقت کو ظاہر کرنے والے خون کے گروہس کے حامل افراد کے درمیان ہی منتقلی خون (Blood Transfusion) کو انجام دیا جاسکتا ہے۔ اگر عدم مطابقت کو ظاہر کرنے والے خون کے گروہس کے حامل افراد کے درمیان منتقلی خون کو انجام دیا جائے تو وصول کنندہ کی موت واقع ہوتی ہے۔

جدول 3 وصول کنندہ اور دہندہ افراد کے خون کے گروہس مطابقت اور عدم مطابقت کو ظاہر کرتے ہوئے

وصول کنندہ (Recipient)					دہندہ (Donor)
خون کے گروہس	A	B	AB	O	
A	مطابقت -	عدم مطابقت +	مطابقت -	عدم مطابقت +	
B	عدم مطابقت +	مطابقت -	مطابقت -	عدم مطابقت +	
AB	عدم مطابقت +	عدم مطابقت +	مطابقت -	عدم مطابقت +	
O	مطابقت -	مطابقت -	مطابقت -	مطابقت -	

+ چسپیدگی تعامل (Agglutination Reaction) = عدم مطابقت


- چسپیدگی تعامل کی موجودگی (No Agglutination Reaction) = مطابقت

دہندہ افراد کے خون کے گروہیں	وصول کنندہ افراد کے خون کے گروہیں			
	A	B	AB	O
A				
B				
AB				
O				

 نمونہ نہیں ہوتا۔ مطابقت رکھتا
 نمونہ ہوتا۔ مطابقت نہیں رکھتا

شکل 7.14

خون کے گروہیں کی مطابقت



شکل 7.15


خون کی منتقلی۔ وصول کنندہ اور دہندہ خون کے گروہیں

آراج گروہس (Rh Groups)

خون کے اے بی او (ABO) گروہس کے علاوہ آراج گروہس (Rh Groups) بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ لینڈ اسٹینیر (Lendsteiner) اور وائر (Wiener) نے 1940ء میں رتھس (Rhesus) نامی بندر کے خون کے احمر جیسوں (RBC) میں ایک مخصوص قسم کے عامل (Factors) یا تریاق ز (Antigen) کی موجودگی کو دریافت کیا۔ اس عامل کو چوں کہ سب سے پہلے رتھس (Rhesus) نامی بندر میں دریافت کیا گیا

آراج عامل (Rh Factor) یا آراج تریاق ز (Rh Antigen) کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آراج عامل (Rh Factor) بعض انسانوں کے احمر جیسوں (RBC) میں بھی پایا جاتا ہے جب کہ بعض افراد میں یہ غیر موجود ہوتا ہے۔ ایسا فرد جس کے خون کے RBC میں آراج عامل (Rh Factor) موجود ہوتا ہے آراج مثبت (Rh Positive) (Rh+) اور جن افراد کے RBC میں یہ عامل غیر موجود ہوتا ہے آراج منفی (Rh Negative) (Rh-) افراد کہلاتے ہیں۔ تریاق ز آراج (Rh Antigen) کے لئے کوئی قدرتی یا فطری ضد اجسام نہیں پائے جاتے لیکن جب آراج منفی (Rh Negative) فرد کے جسم میں آراج مثبت (Rh positive) فرد کے خون کو داخل کیا جاتا ہے تو آراج منفی (Rh Negative) فرد کے جسم میں آراج ضد اجسام (Rh Antibodies) تیار ہو جاتے ہیں۔ آراج ضد اجسام جب ایک مرتبہ جسم میں تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ضد اجسام عمر تمام جسم میں قائم رہتے ہیں۔


اگر آراج ضد اجسام (Rh Antibodies) نو مولود کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو خون میں موجود احمر جیسوں (RBC) پر پائے جانے والے آراج تریاق ز (Rh Antigen) کے ساتھ تعامل کرتے ہیں جس کے باعث احمر جیسے (RBC) پھٹ جاتے ہیں اور نو مولود کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو جنین احمر نہوضیہ پاش (Erythroblastosis Foetalis) کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دسوی پاش (Haemolytic) بیماری ہے جو آراج منفی (Rh Negative) ماں اور آراج مثبت (Rh Positive) والد کے آراج مثبت (Rh+) اولاد میں واقع ہوتی ہے۔



شکل 7.16
پہلا حمل

شکل 7.17
ماں میں آراج ضد اجسام

شکل 7.18
دوسرا حمل



شکل 7.19
Rh عامل اور بچہ کی پیدائش

خون کی منتقلی کب اور کس طرح انجام دی جاتی ہے

مختلف صورتوں میں خون کی منتقلی کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ خاص کر شدید فقر الدم (Anaemia) خون کے کینسر

(Blood Cancer) 'دسوی ٹھنچوں' (Blood Platelets) کی کمی، جنین امر نہونیہ پاش (Erythroblastosis Foetalis) مرض، حادثہ میں بیرونی زخموں سے مختصر مدت میں خون کی بڑی مقدار کے ضائع ہونے، اندرونی اعضا کے پھٹ جانے یا آپریشن کے دوران خون کے ضائع ہو جانے کی صورتوں میں خون کی منتقلی ضروری ہو جاتی ہے۔ خون کی منتقلی کو انجام دینے کے لئے حصول کنندہ مریضوں اور دہندہ اشخاص دونوں کے خون کے گروہوں کی جانچ کو پوری احتیاط کے ساتھ لیبارٹری میں انجام دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ حصول کنندہ مریضوں کے خون سے مطابقت رکھنے والے خون کو احتیاط کے ساتھ جراثیم سے پاک بوتل میں جمع کیا جاتا ہے۔ اس خون کو مریض کے جسم میں عموماً ہاتھ کی بڑی ورید میں داخل کیا جاتا ہے۔

خون کا عطیہ کون دے سکتا ہے

حسب ذیل خصوصیات کے حامل افراد مرد یا عورت ہی خون کا عطیہ دے سکتے ہیں۔

- (1) عموماً خون دہندگان کی عمر 16 تا 60 سال ہونا چاہئے۔
- (2) خون دہندگان کو بیمار یوں سے پاک ہونا چاہئے۔ خصوصاً تعدیلی بیماریوں، خون کا کینسر (Leukaemia) التهاب جگر (Hepatitis)، بخار اور ایڈس (Aids) جیسی مہلک بیماریوں سے پاک ہونا چاہئے۔
- (3) ایک ہی خون دہندہ کے لئے ایک مرتبہ خون کا عطیہ دینے کے بعد دوسری مرتبہ دینے سے قبل 3 تا 4 مہینے کا وقفہ ضروری ہوتا ہے۔

ہے۔

خون کو کس طرح ذخیرہ کیا جاتا ہے

خون کو جراثیم سے پاک بوتلوں میں جمع کیا جاتا ہے اور انہیں مخصوص مقامات میں ذخیرہ کیا جاتا ہے جنہیں خون کے بینک (Blood Banks) کہا جاتا ہے خون میں سوڈیم سٹرٹ یا ہپارن (Heparin) کو شامل کیا جاتا ہے جو خون کو ٹھمدہ ہونے سے روکتا ہے۔ ذخیرہ کیا ہوا خون اگر تین ہفتوں تک استعمال نہ کیا جائے تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ خون کا عطیہ دینے کے بعد جسم سے خارج کئے گئے خون کی مقدار کا قائل لحاظ حصہ جسم میں دوبارہ تیار ہو جاتا ہے۔ کئی پیشہ سرولیس تنظیمیں جیسے لائسنس کلب، روڈی کلب، ریڈ کراس، خانگی دواخانے وغیرہ خون کا ذخیرہ کرنے کے مقصد سے خون کے عطیات حاصل کرنے کے لئے کمپس کا اہتمام کرتی ہیں۔ بعض اشخاص مستقل

خون دہندہ کے طور پر دوا خانوں میں اپنے نام درج رجسٹر کرواتے ہیں۔

خون کا دباؤ (Blood Pressure)

خون کے دباؤ سے مراد خون کا وہ جانبی دباؤ ہے جو دھڑکی دھڑکی (Blood Vessels) کی دیواروں پر پڑتا ہے۔ ذیل کے دو

اہم عوامل خون کے دباؤ کا سبب بنتے ہیں۔

(1) بطن کا انقباض (Contraction of Ventricles) اور

(2) شریانوں (Arteries) اور شعریانوں (Capillaries) میں خون کے بہاؤ کے لئے مزاحمت جس کو سطحی مزاحمت

(Peripheral Resistance) کہا جاتا ہے۔

شریانوں (Arteries) اور وریدوں (Veins) میں خون کے دباؤ کو بالترتیب شریانی خون کا دباؤ (Arterial Blood

Pressure) اور وریدی خون کا دباؤ (Venous Blood Pressure) کہتے ہیں۔ دل کے انقباض یعنی سیسٹول (Systole) کے

دوران خون کا دباؤ سیسٹولی خون کا دباؤ (Systolic Blood Pressure) اور دل کے انقباض یعنی دیسٹول (Diastole) کے دوران

خون کا دباؤ دیسٹولی خون کا دباؤ (Diastolic blood Pressure) کہلاتا ہے۔ دل کے بطن میں جب انقباض واقع ہوتا ہے تو خون

شریانوں میں قوت کے ساتھ پمپ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شریانوں میں خون کے دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شریانوں کی دیواریں

لچکدار عضلاتی ریشوں سے بنی ہوئی لچکدار ہوتی ہیں جس کے باعث قوت کے ساتھ ان شریانوں میں خون کے داخل ہونے سے یہ پھل جاتی

ہیں اور اس اضافی دباؤ کو برداشت کرتی ہیں۔ شریانوں میں خون کے اس اضافی دباؤ کو سیسٹولی دباؤ کہا جاتا ہے اور ان دونوں دباؤ کے

درمیان فرق کو شرح نبض (Pulse Rate) کہتے ہیں۔ ہائیم بطن کے انقباض کی وجہ سے خون قوت کے ساتھ سب سے پہلے اور ط

(Aorta) میں داخل ہوتا ہے اس لئے اور ط میں خون کا دباؤ اعظم ترین ہوتا ہے۔ یہ دباؤ شریانوں (Arteries) میں ان کے دل سے فاصلہ

کی دوری کے لحاظ سے بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ خون کا دباؤ شعریانوں (Capillaries) میں کم ہو جاتا ہے تاہم وریدوں (Veins) میں


خون کا دباؤ اقل ترین ہوتا ہے۔

طبی مقاصد کے لئے انسان میں خون کا دباؤ ہاتھ کی بڑی شریان سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ایک صحت مند انسان میں نارمل سیسٹولی

خون کا دباؤ 120 mmHg اور نارمل دیسٹولی خون کا دباؤ 80 mm Hg ہوتا ہے جس کو 120/80 کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ سیسٹولی خون

کے دباؤ میں تغیر 110 mm Hg t 135 mm Hg اور دیسٹولی خون کے دباؤ میں تغیر 70 mm Hg t 90 mm Hg ہو سکتا ہے جو نارمل سمجھا

جاتا ہے۔ خون کے دباؤ کو معلوم کرنے کے لئے ڈاکٹر جس آلہ کو استعمال کرتے ہیں اس کو سفلگمو مانیٹر (Sphygmomanometer) کہا جاتا ہے۔




فکل 7.20

سفلگمو مانیٹر (Sphygmomanometer)

3.5 بیش تناؤ (Hypertension)

اس سے قبل آپ یہ جان چکے ہیں کہ ایک صحت مند انسان میں نارمل سیسٹولی دباؤ (Systolic Pressure) 120mm Hg یا 110mm Hg تا 135 mm Hg ہوتا ہے اور نارمل دیسٹولی دباؤ (Diastolic Pressure) 80mmHg یا 70mm Hg ہوتا ہے لیکن بعض اشخاص میں چند وجوہات کی وجہ سے خون کے دباؤ میں نارمل دباؤ کی یہ نسبت قابل لحاظ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو بیش تناؤ (Hypertension) کہا جاتا ہے۔ بیش تناؤ کو عموماً اضافہ دسوی دباؤ (High blood pressure) کہا جاتا ہے۔



فکل 7.21 خون شریان کی دیوار پر دباؤ ڈالتا ہے۔

بیش تناؤ (Hypertension) کی وجوہات

(1) سیر شدہ چمچی ترشوں (Saturated Fatty Acids) کا بطور غذا استعمال

سیر شدہ چمچی ترشے عموماً عام چمچوں (Fats) اور تینوں (Oils) میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کھجی، مکھن وغیرہ میں بھی بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ ان غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے خون میں کولیسٹرال (Cholesterol) کی مقدار میں قابل لحاظ اضافہ ہو جاتا ہے۔ شریانوں کی دیواروں پر کولیسٹرال جمنے لگتی ہے جس کے باعث شریانوں کے قطر میں نہ صرف کمی واقع ہوتی ہے بلکہ یہ سخت اور غیر لچکدار بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ خون کے دباؤ کو متوازن رکھنے کی خاصیت کھودیتی ہے۔ خون جب ان شریانوں میں سے گزرتا ہے تو شریانوں کی دیوار پر عمودی دباؤ ڈالتا ہے جس کے باعث خون کے دباؤ میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو بیش تناؤ کہا جاتا ہے۔

(2) مسلسل ڈہنی دباؤ، تناؤ اور خوف کی وجہ سے صہبی نظام دل کے عضلات کو غیر معمولی طور پر متحرک رکھتا ہے جس کی وجہ سے دل کے عضلات زیادہ قوت کے ساتھ سکرتے ہیں اور خون کو کافی دباؤ کے تحت پمپ کرتے ہیں جو بیش تناؤ کا سبب بنتا ہے۔

(3) سکرےٹ نوشی، مئے نوشی یا تمباکو کا استعمال بھی بیش تناؤ کا سبب بنتا ہے۔

(4) گردوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے خون میں نمک کی مقدار کا اضافہ ہو جاتا ہے جو بیش تناؤ کا سبب بنتا ہے۔

انسدادی تدابیر

بیش تناؤ صحت کے لئے کافی مضر ہوتا ہے جو بروقت علاج نہ کئے جانے پر موت کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ اس

سے بچنے کے لئے انسدادی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔

(1) چمچوں کو بطور غذا استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔

(2) کولیسٹرال کے استعمال کو ترک کیا جائے ایسی غذائیں جس میں کولیسٹرال موجود ہو جیسے انڈے کی زردی، کھجی، مکھن اور مرغی غذاؤں وغیرہ کے استعمال کو کم کیا جائے۔

(3) سکرےٹ نوشی، مئے نوشی اور تمباکو کے استعمال سے گریز کیا جائے۔

(4) علاج کے لئے مناسب ادویات کا استعمال کیا جائے۔

سبق کا خلاصہ

☆ خون ایک اتھالی سیالی بافت ہے جو ماب (Plasma)، دھوی مسموں (Blood Corpuscles) اور دھوی مسموں (Blood Platelets) پر مشتمل ہوتا ہے۔

☆ دما ب میں پانی % 91 تا % 92، مٹیائی مرکبات % 8 غیر مٹیائی مرکبات % 1 پائے جاتے ہیں۔

☆ امیاتی مرکبات میں پروٹینس 70% جس میں البومین (Albumin) پروٹھروربین (Prothrombin) فائبرینوجن

(Fibrinogen) اور گلوبولینس (Globulins) شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گلوکوز، شکر، نمکی ترشے (Fatty Acids) فاسفولیپڈس

(Phospholipids) کو لیسترال (Cholesterol) یوریا (Urea) ہپارین (Heparin) اور ہارمونس (Hormones) وغیرہ

قابل ذکر ہیں۔

☆ غیر نامیاتی مرکبات میں سوڈیم کلورائیڈ اور سوڈیم ہائی کاربونیٹ کے علاوہ پائشیئم، میگنیشیم، پیمیشیم، لوہا، تانبہ اور آئرن کے نمکیات

بھی پائے جاتے ہیں۔

☆ کیسیس میں آکسیجن، کاربن ڈی آکسائیڈ اور نائٹروجن موجود ہوتی ہیں۔

☆ دہمی جسموں (Blood Corpuscles) میں احمر جسمے (Erythrocytes) اور سفید جسمے (Leucocytes) شامل ہیں۔

☆ پستانوں میں احر جسے دائری فیبر مرکزہ دار (Enucleated) ہوتے ہیں۔ ان میں بیوٹھوین نامی تنفسی صنف پایا جاتا ہے۔

☆ ایفیس جسے دو اقسام کے ہوتے ہیں (i) دانہ دار (Granular) اور (ii) غیر دانہ دار (Agranular)۔

☆ دائہ دارابہض جسموں میں (۱) ایوسین پنڈ جیسے (Eosinophils) جو ترشی واسطہ میں رکھے جاتے ہیں جس میں مرکزہ دو فسی

(Bilobed) ہے۔ ii) اساس پسند جسے (Basophils) جو اساسی واسطہ میں رنگے جاتے ہیں اور iii) تعدیل پسند جسے

(Neutrophils) جو تعدیلی واسطہ میں رکھے جاتے ہیں جن میں مرکزہ 2 تا 5 فصول (Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے۔

☆ غیر داندہ راہیض جیسوں میں (i) لمفی جیسے (Lymphocytes) اور (ii) یک نوانی جیسے (Monocyte) شامل ہیں۔

☆ **دموی تختے (Blood Platelets)** صرف پستانوں میں پائے جاتے ہیں جو انجماد خون میں مدد دیتے ہیں۔

☆ انسان میں دو پائے کئے گئے خون کے گروہیں ہیں اسے بی او (ABO) گروہیں اور آر ایچ (Rh) گروہیں اور ایم این (MN)

گروہیں شامل ہیں۔

☆ خون کے گروپ اے (Blood Group A) میں RBC کی سطح پر تریاق زہا (Antigen A) اور دماپ (Plasma) میں ضد اجسام بی (Antibody b) خون کے گروپ بی (Blood Group B) میں RBC کی سطح پر تریاق زہا بی (Antigen B) اور دماپ میں ضد اجسام اے (Antibody A) خون کے گروپ اے بی (Blood Group AB) میں RBC کی سطح پر تریاق زہا اے (Antigen A) اور تریاق زہا بی (Antibody B) دونوں موجود ہوتے ہیں لیکن دماپ میں کوئی بھی ضد اجسام نہیں پائے جاتے ہیں خون کے گروپ او (Blood Group -O) میں RBC کی سطح پر کوئی بھی تریاق زہا (Antigens) نہیں پایا جاتا ہے لیکن دماپ میں ضد اجسام اے اور بی (Antibodies A and B) دونوں موجود ہوتے ہیں۔

☆ خون کے گروپ AB کے فرد کو ہمہ گیر وصول کنندہ (Universal Recipient) اور خون کے گروپ O کے فرد کو ہمہ گیر دہندہ (Universal Donor) کہا جاتا ہے۔

☆ ایسا فرد جس کے خون کے RBC کی سطح پر آرچ عامل (Rh Factor) موجود ہو تو آرچ مثبت (Rh Positive) کہا جاتا ہے۔ ایسا فرد جس کے RBC کی سطح پر آرچ عامل غیر موجود ہو تو آرچ منفی (Rh Negative) کہا جاتا ہے۔

☆ نومولود میں دھوی پاش بیماری کو جنسی امر نہونیہ پاش (Erythroblastosis Foetalis) کہا جاتا ہے جو آرچ منفی (Rh Negative) والدہ اور آرچ مثبت (Rh Positive) والد کے آرچ مثبت (Rh Positive) ولاد میں واقع ہوتی ہے۔

☆ وصول کنندہ افراد اور دہندہ افراد کے خون کے گروہیں کے درمیان مطابقت کی موجودگی کی صورت میں ہی منتقلی خون کو انجام دیا جاسکتا ہے۔

☆ خون کا دہ جانی دباؤ جرمی دماؤ کی دیواروں پر پڑتا ہے خون کا دباؤ (Blood Pressure) کہلاتا ہے۔


☆ خون کے دباؤ میں مائل دباؤ کی بہ نسبت قابل ملاحظہ اضافہ (Hypertension) کہلاتا ہے۔

5 زائد معلومات

خون سازی (Haemopoiesis)

خون سازی (Haemopoiesis) سے مراد ایسا عمل ہے جس کے دوران خون کے مختلف جیسوں (Corpuscles) کی

تیاری عمل میں آتی ہے۔ احمر جیسوں (Erythrocytes) کی تیاری کے عمل کو احمر جیسہ سازی (Erythropoiesis) اور ایض جیسوں (Leucocytes) کی تیاری کے عمل کو ایض جیسہ سازی (Leucopoiesis) کہا جاتا ہے۔ خون کے جیسوں کی تیاری بالغ انسان میں عظمی گودے (Bone Marrow) اور نومولود کی پیدائش سے قبل جنین میں زردی کیسہ (Yolksac) 'جگر' (Liver) 'گردے' (Kidney) اور طحال (Spleen) میں واقع ہوتی ہے۔ ان اعضاء کو جن میں جیسوں کی تیاری واقع ہوتی ہے خون سازی اعضاء (Haemopoietic Organs) کہا جاتا ہے۔ خون کے مختلف جیسے خون سازی اعضاء کے ابتدائی خلیوں (Stem Cells) سے تیار ہوتے ہیں۔ ان ابتدائی خلیوں کو دموئی جسنی نہویہ (Haemocytoblasts) کہتے ہیں۔ دموئی جسنی نہویوں سے پہلے پیش احمر جیسے تیار ہوتے ہیں جن سے احمر جیسے (Erythrocytes) حاصل ہوتے ہیں۔ ایض جیسہ سازی کا عمل بھی دموئی خلوئی نہویہ (Haemocytoblast) سے ہی انجام پاتا ہے۔



شکل 7.22

خون سازی۔ دموئی خلوئی نہویہ (Haemocytoblast) سے مختلف جیسوں کی تیاری



Agglutination اگلوتینیشن

چسپیدگی

ایسا عمل جو عدم مطابقت کے حامل کیمیائی مرکبات کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے تریاق زہا (Antigen) اور ضد جسم (Antibody) کے درمیان تعامل جس میں عدم مطابقت کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چسپیدہ ہو جاتا ہیں۔

Ameboid

امیبائیڈ

امیبائی

خون کے ابیض جسموں (Leucocytes) کی حرکت جوامیبا (Amoeba) کے مانند ہوتی ہے۔

Antibodies

انٹی باڈیز

ضد اجسام

خون کے داب (Plasma) میں پائے جانے والے مخصوص پروٹینس (Proteins) جو تعدیہ (Infection) کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں۔

Antigens

انٹی جنس

تریاق زہا

خون میں پائے جانے والے حر جسموں (Erythrocytes) کی سطح پر موجود مخصوص کیمیائی مرکبات جو مخصوص ضد اجسام کے ساتھ تعامل کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا کوئی بیرونی شے جو جسم میں داخل ہونے کے بعد ابیض جسموں کے ذریعہ ضد اجسام (Antibodies) پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔

Chromatin	کرومٹین	لونی جال	خلیہ کے مرکزہ میں قابل رنگ ساز جال کے مانند نحرمانی مادہ جو خلوی تقسیم کے وقت واضح دھماکہ نما لونی اجسام میں شناخت ہوتا ہے۔
Clotting	کلائٹنگ	انجماد	زخم پر خون کا جمننا۔
Coagulation	کواگولیشن	ترویج یا بکشی	مائع کی تبدیلی کا عمل جس میں مائع حالت ایک دیگر نمونہ حالت میں تبدیل ہوتی ہے۔
Corpuscles	کارپسلس	جیسے	خون میں پائے جانے والے سفید اور سرخ خلیے۔
Crenation	کرنیشن	ککڑیت	جھریاں
Eccentric	یسیمٹرک	خارج المرکز	مرکز سے دور
Erythroblastosis Foetalis	ایریٹرو بلاسٹوسیس فیٹالس	جینی اہرنیوٹیس	شدید فقر الدم (Anaemia) جو آر ایچ مثبت (Rh+) نو مولود میں واقع ہوتا ہے جس کے جیسے (Rh-) آر ایچ منفی (Rh-) ماں کے جسم میں تیار ہونے والے ضد اجسام (Antibodies) کے ذریعہ شدید متاثر ہو جاتے ہیں جو نو مولود کی موت کا سبب بنتا ہے۔
Erythropoiesis	ایریٹرو پوائیسس	تکوین اہرنیوٹیس	اہرنیوٹیس سازی یا فتوں جیسے عظمی گودے (Bone Marrow) وغیرہ میں اہرنیوٹیس کی تیاری کا عمل میں آتی ہے۔
Fragility	فرا جلیٹی	تقصیف	پھونک پن۔
Haemocytoblast	ہیموسائٹوبلاست	دموی خلوی زہوش	غیر پختہ خون کے جیسے۔

ہیموپوسیس	ہمکون الدم	خون کے جیسوں کی تیاری کا عمل جو ہمکون جیسہ (جیسہ سازی) ہافتوں میں انجام پاتا ہے۔	Haemopoiesis
ہائپرٹینشن	پیش تناؤ	خون کا دھاؤ۔ خون کے دھاؤ میں غیر نارمل اور مستعد اضافہ	Hypertension
امیونٹی	مامونیت	مدافعت۔	Immunity
		ہار ہار واقع ہونے والے تعدیہ (Infection) کے خلاف مدافعت کی صلاحیت۔	
لیوکوسائٹ	ایہض جیسے	خون کے سفید جیسے۔	Leucocytes
لیوکوپوسیس	ہمکون ایہض	ہمکون جیسہ ہافتوں (جیسہ سازی ہافتوں) میں ایہض جیسہ	Leucopoiesis
		جیسوں (WBC) کی تیاری کا عمل۔	
میکاکیروسائٹ	کواں لوائی جیسہ	ہمکون الدم ہافتوں میں پایا جانے والا بڑا خلیہ (جیسہ) جس کے ٹوٹنے سے حاصل ہونے والے کلورے دموی خچچوں (Blood Platelets) میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔	Megakaryocyte
مونوسائٹ	یک لوائی جیسہ	خون میں پائے جانے والے ایہض جیسوں میں غیر دانے دار بڑا ایہض جیسہ جو ہافتوں میں پہنچ کر کلاں اکال خلیہ (Macrophage) میں تبدیل ہوتا ہے۔	Monocyte
آرگانیلس	عضوچے	خلیہ کے خلیہ مایہ (Cytoplasm) میں پائی جانے والی ساختیں۔	Organelles
پاتھالوجیکل	مرضیاتی	امراض سے متعلق۔	Pathological

Phagocytosis	فیکوسائٹوسیس	اکالیت	خلیہ (یا اینٹن خلیہ) کے ذریعہ بیرونی ٹھوس شے کو نگلنے کا عمل جو پلازما غشائی کیسر کے ذریعہ عمل میں آتا ہے۔
Plasma	پلازما	دماب	خون میں پایا جانے والا سیال مادہ (قالب)۔
Platelets	پلیٹ لیٹس	تختچے	پستانوں کے خون میں پائے جانے والے غیر مرکزہ دار خلوی کٹڑے جو زخم پر انجماد خون میں مدد کرتے ہیں۔
Polymerisation	پولیمرائزیشن	کیڑا سالماؤ	چھوٹے چھوٹے سالمات کا کیسائی بند کے ذریعہ بڑے سالمہ میں تبدیل ہونے کا اضافی عمل۔
Serum	سیرم	امصل	انجماد خون واقع ہونے کے بعد تکہ (Clot) سے علیحدہ ہونے والا سنہری زرد سیال جس میں فائبرینوجن (Fibrinogen) نامی پروٹین غیر موجود ہوتا ہے یعنی دماپ (Plasma) منفی فائبرینوجن۔
Serum=Plasma-Fibrinogen			
Thromobocyte	تھروموبوسائٹ	دلی جسیمہ	سوائے پستانوں کے دیگر حیوانات کے خون میں پائے جانے والے جیسے جو انجماد خون میں مدد کرتے ہیں۔
Thrombocytopenia	تھروموسائٹوپینیا	دلی جسیمہ قلت	خون میں دلی جسیموں یا دسوی تختچوں کی قلت یا بیماری جس میں خون زیر آدی بافتوں کی شعریانوں سے خارج ہوتا ہے۔
Yolksac	یوک سیک	زردی کیسر	جنین (Embryo) کے اطراف پائی جانے والی ہروں جنہی غشاء (Extra Embryonic Membrane) جو زردی کو گھیرے ہوئے جھلی کے مانند پائی جاتی ہے۔



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) خون کے دماہ (Plasma) میں پائے جانے والے نامیاتی مرکبات کیا ہیں؟ نام لکھئے۔
- (2) غیر دانہ دارائض جسموں کے نام لکھئے۔
- (3) دانہ دارائض جیسے کون سے ہیں نام لکھئے؟
- (4) دماہ (Plasma) اور مصل (Serum) کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟
- (5) ہپارین (Heparin) سے کیا مراد ہے؟
- (6) خون کے دماہ میں کونسا پروٹین موجود رہتا ہے جو دھوی دغا کے ذمے ہونے پر انجماد خون میں مدد دیتا ہے؟
- (7) ہیموگلوبین کیا ہے اس کا جزاء ترکیبی کیا ہیں؟
- (8) دھوی تختے (Blood Platelets) کون سے جانداروں کے خون میں موجود ہوتے ہیں؟ اس کا فعل لکھئے۔
- (9) خون کے احمر جسموں (RBC) کی سطح پر کون سے تریاق ز (Antigens) پائے جاتے ہیں؟
- (10) آر ایچ عامل (Rh Factor) سے کیا مراد ہے؟

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) خون کے کماائض جسموں کی اقسام کو بیان کیجئے۔
- (2) "خون ایک سیال اتصالی بافت ہے" بحث کیجئے۔
- (3) اے بی او (ABO) خون کے گروہوں پر ایک نوٹ لکھئے۔
- (4) جنینی احمر نہضہ پائش (Erythroblastosis Foetalis) پر ایک مضمون لکھئے۔
- (5) آر ایچ خون کے گروہ (Rh Blood Group) پر نوٹ لکھئے۔
- (6) خون کے دباؤ (Blood Pressure) سے کیا مراد ہے؟ اس کے دواہم عوامل کو بیان کیجئے۔
- (7) خون کی منتقلی سے قبل خون کے گروہوں کی جانچ کیوں ضروری ہے؟ بیان کیجئے۔

- (8) خون کا عطیہ کون دے سکتا ہے؟ وضاحت کیجئے۔
- (9) خون کو کس طرح ذخیرہ کیا جاتا ہے؟ بیان کیجئے۔
- (10) خون کی منتقلی کب اور کس طرح انجام دی جاتی ہے؟ تشریح کیجئے۔
- (11) نچا دھون (Blood Clotting) کی میکینیت بیان کیجئے۔
- (12) بیش تناؤ (Hypertension) سے کیا مراد ہے؟ اس کے وجوہات کو قلمبند کیجئے۔
- (13) بیش تناؤ سے بچنے کے لئے چند انسدادی تدابیر کو تجویز کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

- (1) خون کے گروپس کو _____ نے 1900ء میں دریافت کیا۔
- (2) خون کے (Plasma) میں پانی کی مقدار _____ فی صد پائی جاتی ہے۔
- (3) خون میں _____ موجود ہوتا ہے جو خون کو ٹھنڈ ہونے سے روکتا ہے۔
- (4) پستانوں کے خون میں احمر جیسے _____ ہوتے ہیں۔
- (5) غیر واندہ دار ایض جسموں میں _____ اور _____ شامل ہیں۔
- (6) واندہ دار ایض جسموں میں _____ (a) _____ (b) _____ (c) شامل ہیں۔
- (7) ضد اجسام _____ میں پائے جاتے ہیں۔
- (8) خون کے تریاق زہ اور ضد اجسام کے درمیان واقع ہونے والا تعامل _____ کہلاتا ہے۔
- (9) جسم میں تریاق زہ کی پیدائش _____ جین کے قابو میں ہوتی ہے۔
- (10) اگر عدم مطابقت کو ظاہر کرنے والے خون کے گروپس کے حامل افراد کے درمیان منتقلی خون کو انجام دیا جائے تو دھول کنندہ کی _____ واقع ہوتی ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) خون کے احمر جسموں کی سطح پر اگر A اور B دونوں تریاق زہ موجود ہوں تو خون کا کونسا گروپ ہوگا؟

(a) "A" گروپ (b) "B" گروپ (c) "O" گروپ (d) "AB" گروپ

(2) ہیوگلوبین نامی تنفسی صبغہ خون کے کس حصہ (Corpuscle) میں پایا جاتا ہے؟

(a) ایک لوائی حصہ (b) Monocyte (c) Erythrocyte (d) Monocyte

(c) ایوسین پسند حصہ (d) Eosinophil (a) اساس پسند حصہ (Basophil)

3 - "O" گروپ کے خون میں کون سے تریاق زائغیر موجود ہوتے ہیں؟

(a) A- تریاق زائغ (b) B- تریاق زائغ (c) A- اور B- دونوں تریاق زائغ (d) Rh- عامل

4 اگر وصول کنندہ فرد کے خون کے گروپ "B" ہو تو اس فرد کو کون سے خون کے گروپ کا خون دیا جاسکتا ہے؟

(a) بی گروپ اور اے بی گروپ (b) بی گروپ اور او گروپ (c) صرف بی گروپ

(d) صرف اے بی گروپ

5 وصول کنندہ فرد کے خون کا گروپ او ہو تو دہندہ فرد کے خون کا گروپ کونسا ہونا چاہئے؟

(a) اے بی گروپ (b) او گروپ (c) اے بی یا او دونوں گروپیں

(d) بی گروپ

6 جب Rh منفی فرد کے جسم میں Rh مثبت فرد کے خون کو داخل کیا جائے تو Rh منفی فرد کے جسم میں کون سے ضد اجسام تیار ہوتے ہیں؟

(a) اے ضد اجسام (b) بی ضد اجسام (c) Rh- ضد اجسام

(d) کسی بھی قسم کے ضد اجسام تیار نہیں ہوتے؟

7 Rh- Antibodies کو اگر Rh مثبت فرد کو مولود کے جسم میں داخل کر دیا جائے تو اس مولود کے خون کے کون سے جیسے پھٹ جاتے ہیں؟

(a) اتر جیسے (b) لمبی جیسے (c) ایک لوائی جیسے (d) دسوی تختی

8 ایک ہی خون دہندہ کے لئے ایک مرتبہ خون کا عطیہ دینے کے بعد دوسری مرتبہ عطیہ دینے سے قبل کتنے ماہ کا وقفہ ضروری ہوتا ہے؟

- (e) ایک ماہ (b) دو ماہ (c) تین تا چار ماہ (d) دوسری مرتبہ خون کا عطیہ نہیں دے سکتا
- 9 خون کا دباؤ کونسی دوسری دعامیں اعظم ترین ہوتا ہے؟
- (a) ورید (b) شریان (c) شعریان (d) اورطہ
- 10 انجماد خون کے لئے کونسا عنصر ضروری ہوتا ہے؟
- (a) سوڈیم (b) کیکسیم (c) لوہا (d) ہائیڈروجن

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

B	A
() حلقسی صہد	(1) دوسری پاش (Haemolytic) بیماری
() انجماد خون	(2) بیش تناؤ (Hypertension)
() 80 mmHg	(3) "AB" خون کے گروپ کا فرد
() بندر کے خون میں پہلی مرتبہ دریافت	(4) او "O" خون کے گروپ کا فرد
() 120 mmHg	(5) دیسطولی خون کا دباؤ
() ہمہ گیر وصول کنندہ	(6) سیسطولی خون کا دباؤ
() خون میں کولیسٹرال کا اضافہ	(7) Rh حامل
() ہمہ گیر دہندہ	(8) ہیپوگلو بین
() جنینی اہرنہ پیئیر پاش	(9) دوسری تختیچے
() (Erythroblastosis Foetalis)	
() x سیسطول	(10) قلب کا انقباض

سبق 8 تولید (Reproduction)

سبق کا خاکہ	1
تہیہ	2
سبق کا متن	3
3.1 تولید کی تعریف	
3.2 تولید کی اہمیت	
3.3 تولید کی اقسام	
3.3.1 غیر صنفی تولید	
3.3.1.1 غیر صنفی تولید کی اقسام	
3.3.2 صنفی تولید	
3.3.2.1 پیرامیشم میں صنفی تولید	
3.3.2.2 کچھڑے میں صنفی تولیدی نظام	
3.3.2.3 حشرات میں صنفی تولیدی نظام	
3.3.2.4 مینڈک میں صنفی تولیدی نظام	
سبق کا خلاصہ	4
زائد معلومات	5
فرہنگ اصطلاحات	6
نمونہ امتحانی سوالات	7

7.1 مختصر جوابی سوالات

7.2 معروضی سوالات

7.2.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

1 سبق کا خاکہ

اس سبق میں آپ کو حسب ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

- ☆ تولید کی تعریف
- ☆ تولید کی اہمیت
- ☆ تولید کی اقسام
- ☆ مختلف حیوانات میں غیر صنفی اور صنفی تولیدی نظام

2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ خون سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ تولید سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جس کو جاندار عضویوں کی سب سے اہم خصوصیت تصور کیا جاتا ہے جس کے بغیر ان کی آبادی کا تصور ناممکن ہے۔ اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح مختلف حیوانات غیر صنفی اور صنفی طریقہ تولید کے ذریعہ اپنی نسل برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ غیر صنفی اور صنفی تولید کے درمیان فرق کو بھی سمجھ سکیں گے۔

3 سبق کا متن

3.1 تولید کی تعریف

تولید سے مراد جاندار عضویہ کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے ہی جیسی نوع (Species) کے افراد کو پیدا کرتا ہے۔

3.2 تولید کی اہمیت

روئے زمین پر پائے جانے والے تمام جاندار عضویوں میں عمل تولید کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جس کے بغیر ان کی آبادی کا تصور ناممکن ہے تولید کے ذریعہ ہر ایک نوع کی نسل کا تسلسل جاری رہتا ہے اور اس کی آبادی قائم رہتی ہے۔ تولید کے ذریعہ نوع کی آبادی میں اضافہ کے علاوہ نوع کی مخصوص خصوصیات بھی محفوظ رہتی ہیں۔ تولید کے باعث کسی مخصوص مقام پر انواع کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جس کے باعث قدیم انواع نئی انواع میں تبدیل ہو جاتی ہیں جس کا انحصار اس مقام کی طبعی حالات پر ہوتا ہے۔ کسی ایک کیموئیٹی

(Community) میں مختلف انواع مسلسل اپنی اولاد پیدا کرتی ہیں جس کے نتیجہ میں انواع کی جملہ تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مخصوص مقام پر کسی مخصوص نوع کے افراد کو اگر مختلف طبعی ماحولی حالات کے تحت علیحدہ رکھا جائے اور ان کے درمیان باہمی تولید کو روکا جائے اور ایک ہی قسم کے ماحولی حالات میں رہنے والی نوع کے افراد کے درمیان تولید کا موقع فراہم کیا جائے تو اس مخصوص نوع سے دو مختلف ماحولی حالات کے تحت حاصل ہونے والی انواع ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی اور نئی انواع کہلائی جائیں گی۔ اس طرح مختلف ماحولی حالات کے تحت نوع کے افراد کے درمیان جنسی علیحدگی یا جنسی تفرید (Sexual Isolation) کے باعث نئی انواع وجود میں آتی ہیں۔

3.3 تولید کی اقسام

حیوانات میں تولید دو طریقوں کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔

1 غیر صنفی تولید (Asexual Reproduction)

2 صنفی تولید (Sexual Reproduction)

3.3.1 غیر صنفی تولید (Asexual reproduction)

ایسا طریقہ تولید جو صرف ایک ہی عضویہ میں انجام پاتا ہے غیر صنفی تولید کہلاتا ہے۔ اس میں دو علیحدہ جنس (Sexes) حصہ نہیں لیتے یعنی نر اور مادہ زواجوں (Gametes) کے درمیان ملاپ یا انضمام (Fusion) کا عمل واقع نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقہ تولید سے حاصل ہونے والے عضویوں کے درمیان کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی جاتی بلکہ وہ تمام عضویہ ایک دوسرے کے مشابہہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے والدینی عضویہ سے بھی مشابہت رکھتے ہیں۔ غیر صنفی تولید کے ذریعہ مخصوص خصوصیات نسل در نسل معین رہتی ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

3.3.1.1 غیر صنفی تولید کی اقسام

مختلف حیوانات میں غیر صنفی تولید کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔


(a) دو پارگی (Binary Fission)

(b) کثیر پارگی (Multiple Fission)

(c) کلیاؤ (Budding)


(a) دوپارگی (Binary Fission)

اس قسم کی تولید موافق حالات کے دوران واقع ہوتی ہے۔ ایسے ریفیو نویدس میں واحد والدینی عضویہ (خلیہ) دو دختر عضویوں (خلیوں) میں مساوی طور پر تقسیم ہوتا ہے دوپارگی (Binary Fission) کہلاتا ہے۔ اس قسم کی تقسیم کے دوران سب سے پہلے مرکزہ (Nucleus) خطی تقسیم (Mitotic Division) کے ذریعہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عضویہ کا جسم عرضی طور پر لانا ہوجاتا ہے اور دروں مایہ (Endoplasm) میں سکڑاؤ کا عمل دو دختر مرکزوں کے درمیانی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سکڑاؤ مزید گہرا ہوتا ہے اور بالآخر عضویہ کا جسم دو دختر عضویوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ اس قسم کی غیر صنفی تولید یک خلوی حیوانات جیسے امیبا (Amoeba) اور بیکٹیریا (Bacteria) اور پارامیسیا (Paramecium) میں انجام پاتی ہے۔




فصل 8.1

امیبا پروٹیس (Amoeba proteus) میں دوپارگی تقسیم




شکل 8.2
پیرامیسیئم (Paramecium) میں دوپارگی تقسیم



شکل 8.3
بیکٹریا (Bacteria) میں دوپارگی تقسیم

(b) کثیر پارگی (Multiple Fission)

کثیر پارگی (Multiple Fission) کے ذریعہ غیر منفی تولید ناموافق حالات کے دوران انجام پاتی ہے۔ کثیر پارگی ایک ایسا طریقہ تولید ہے جس میں واحد والدینی عضویہ بیکہ۔ وقت کئی دختر عضویوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی تقسیم کے دوران عضویہ کا مرکز کئی دختر مرکروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک دختر مرکزے کے اطراف خلیہ مایہ (Cytoplasm) جمع ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں کئی دختر عضویے تیار ہو جاتے ہیں جو آزادانہ زندگی گزارنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ ایسا میں غیر منفی تولید کثیر پارگی کے ذریعہ ناموافق حالات میں انجام پاتی ہے۔




شکل 8.4

ایسا میں کیرہ بندی اور کثیر پارگی

(c) کلیاڈ (Budding)


کلیاڈ (Budding) بھی غیر منفی تولید کا ایک طریقہ ہے جو موافق حالات کے دوران واقع ہوتا ہے۔ اس قسم کی تولید میں عضویہ کے جسم پر بیرونی طور پر انگلی نما کلی (Bud) نمودار ہوتی ہے جو بتدریج نمو و نما پاتی ہوئی عضویہ کی مکمل شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بعد عضویہ جسم سے علیحدہ ہو کر آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ کلیاڈ کے ذریعہ غیر منفی تولید کا مکمل ہائیڈرا (Hydra) میں انجام پاتا ہے۔ ہائیڈرا کی جسمی دیوار سے بیرونی طور پر پردوں بالیدگی نمودار ہوتی ہے جس کو کلی کہا جاتا جس کی جسامت میں بتدریج اضافہ ہوتا اور اس کے اگلے سرے پر وہیں (Mouth) تیار ہوتا ہے جس کے اطراف کیرے (Tentacles) نمودار ہوتے ہیں۔ اس طرح کلی ہائیڈرا کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بعد وہ والدینی ہائیڈرا کے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے جس کو دختر ہائیڈرا کہا جاتا ہے جو آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔



شکل 8.5

بانیزہ را میں بکلیاؤ کے مختلف مدارج


پیلے پانی کے اسفنج (Sponges) میں غیر منفی تولید جنمبولس (Gemmules) کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔ جنمبولس (Gemmules) آسفنج کے جسم میں اندرونی طور پر نمودار ہونے والی کلیاں (Buds) ہوتی ہیں۔



شکل 8.7

اسپانجیلا (Spongilla)

میں جنمبولس (Gemmules) کے ذریعہ غیر منفی تولید



شکل 8.6

ایپیڈاٹیا (Epydatia)


میں جنمبولس (Gemmules) کے ذریعہ غیر منفی تولید

3.3.2 صنفی تولید (Sexual Reproduction)


ایسا طریقہ تولید جس میں دو مختلف جنس کے عضویوں میں تیار ہونے والے نر اور مادہ زواجوں (Gametes) کے درمیان ملاپ کے نتیجہ میں عضویوں کی پیدائش واقع ہوتی ہے صنفی تولید کہلاتی ہے۔

عضویہ دو قسم کے ہوتے ہیں (1) ایک صنفی (Unisexual) اور (2) دو صنفی (Bisexual)۔ ایسا عضویہ جس میں صرف نر تولیدی اعضاء پائے جاتے ہیں جو نر ذرا ہے پیدا کرتے ہیں نر عضویہ کہلاتا ہے اور ایسا عضویہ جس میں مادہ تولیدی اعضاء موجود ہوتے ہیں جو مادہ ذرا ہے پیدا کرتے ہیں مادہ عضویہ کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایسا عضویہ جو ایک ہی جنس کے ذرا ہے پیدا کرتا ہے ایک صنفی عضویہ کہلاتا ہے۔ ایک صنفی حیوانات میں نر اور مادہ ان کی شکل کی بنیاد پر آسانی تمیز کیے جاسکتے ہیں۔ اس مظہر کو جنسی دو شکلیت (Sexual Dimorphism) کہا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے ایسا عضویہ جس کے جسم میں نر اور مادہ دونوں تولیدی اعضاء پائے جاتے ہیں جن میں بالترتیب نر اور مادہ ذرا ہے پیدا ہوتے ہیں دو صنفی (Bisexual) یا خنثی شکل (Hermaphrodite) کہلاتا ہے۔ اس مظہر کو خنثی شکلیت (Hermaphroditism) کہتے ہیں خنثی شکلیت بعض حیوانات جیسے قمر معانیہ (Coelentrata)، چپنے دودھے (Platyhelminthes)، مسکل میٹھنس (Asclementhes)، حلجھے (Annelids) اور رخوئے (Mollusca) کے بعض حیوانات میں دیکھا جاتا ہے۔ عموماً نر ذرا جسامت میں چھوٹا اور متحرک ہوتا ہے جب کہ مادہ ذرا جسامت بڑی ہوتی ہے اور وہ غیر متحرک ہوتا ہے۔ نر ذرا کو منویہ (Sperm) اور مادہ ذرا کو بیضہ (Ovum) کہتے ہیں۔ منویہ (Sperm) اور بیضہ (Ovum) کے ملنے کے عمل کو باروری (Fertilization) کہا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں جنس (Zygote) حاصل ہوتا ہے۔ اگر باروری کا عمل ایک ہی عضویہ میں پیدا ہونے والے منویہ اور بیضہ کے درمیان واقع ہو تو اس کو خود باروری (Self Fertilization) کہا جاتا ہے اور اگر باروری کا عمل دو مختلف جنس کے عضویوں میں پیدا ہونے والے نر اور مادہ زواجوں کے درمیان واقع ہو تو ایسی باروری کو پار باروری (Cross Fertilization) کہا جاتا ہے۔ بعض عضویوں میں اگرچہ نر اور مادہ دونوں قسم کے تولیدی اعضاء ایک ہی جسم میں پائے جاتے ہیں لیکن ان میں خود باروری کا عمل انجام نہیں پاتا کیوں کہ نر اور مادہ ذرا ہے بیک وقت پیدا نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان میں خود باروری انجام نہیں پاتی بلکہ پار باروری انجام پاتی ہے۔ پار باروری کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے عضویہ بہتر خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں چونکہ ان میں دو ملحدہ عضویوں کی خصوصیات نر اور مادہ زواجوں کے ملاپ کے ذریعہ شامل ہوتی ہیں۔ خود باروری کے باعث دوسرے عضویہ کی بہتر خصوصیات نئی نسل میں منتقل نہیں ہوتی چونکہ باروری کا عمل ایک ہی عضویہ میں پیدا ہونے والے نر اور مادہ زواجوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ لہذا خود باروری کی بہ

نسبت پار باروری کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔



شکل 8.8




شکل 8.9
عقب اقسام کے پنے

باروری کا عمل بعض عضویوں میں اندرونی اور بعض عضویوں میں بیرونی قسم کا ہوتا ہے۔ پھلتی اور مینڈک میں نر اور مادہ زواہی پانی میں خارج کئے جاتے ہیں جہاں باروری انجام پاتی ہے اس کو بیرونی باروری کہتے ہیں۔

کیڑوں، مکڑیوں اور پستانداریوں میں نر عضو یہ اپنے مخصوص عضو کے ذریعہ منویوں (Sperms) کو مادہ کے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ منویہ مادہ کے جسم میں پہنچ کر بیضہ سے مل جاتا ہے۔ اس طرح باروری کا عمل مادہ کے جسم کے اندر واقع ہوتا ہے جس کو اندرونی باروری کہتے ہیں۔

زواجوں کی پیدائش تولیدی اعضاء یعنی اٹھی (Testes) اور بیض دان (Ovary) میں تخفیفی تقسیم (Meiosis) کے باعث واقع ہوتی ہے۔ اس لئے ان میں لونی اجسام (Chromosomes) کی تعداد کل کی تعداد کی نصف ہوتی ہے۔ لہذا زواہی جن میں لونی اجسام کی تعداد نصف ہوتی ہے یک گنا (Haploid) کہلاتے ہیں۔ نریک گنا زواہی اور مادہ یک گنا زواہی کے درمیان ملاپ کے نتیجہ میں جھتہ (Zygote) حاصل ہوتا ہے۔ اس میں لونی اجسام کی تعداد دو گنی ہو جاتی ہے جس کو دو گنا (Diploid) کہتے ہیں دو گنا جھتہ میں نمو کے باعث مختلف تبدیلیاں سلسلہ وار واقع ہوتی ہیں جس کے نتیجہ میں ایک مکمل عضویہ حاصل ہوتا ہے۔ مکمل جسم کی بناوٹ کے لئے لونی اجسام کی دو گنا (Diploid) تعداد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔



شکل 8.10

صنعتی تولید۔ نر اور مادہ زواہی کے درمیان ملاپ جس کے نتیجہ میں جھتہ حاصل ہوتا ہے۔

ذیل میں مختلف حیوانات کے صنفی تولیدی نظام کو بیان کیا گیا ہے۔

3.3.2.1 پیرامیشیم میں صنفی تولید (Sexual Reproduction in Paramoecium)

پیرامیشیم (Paramoecium) ایک خلوی اولی حیوانیہ (پروٹوزوا) ہے۔ اس میں صنفی تولید (Sexual Reproduction) جنجوغ (Conjugation) کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔ پیرامیشیم میں عموماً موافق حالات کے دوران تولید کا عمل غیر صنفی طور پر دو پارگی (Binary Fission) کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ لیکن متعدد بار دو پارگی واقع ہونے کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی نسلیں بتدریج کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ ان کی جسامت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ان میں تمام فعلیاتی عمل تخفیف پاجاتے ہیں۔ توانائیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور پیرامیشیم اپنے شباب کو کھودیتا ہے اور بالآخر ان کی زندگی کے لئے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا پیرامیشیم اپنی کھوئی ہوئی توانائی اور شباب کو دوبارہ حاصل کرنے اور اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لئے جنجوغ (Conjugation) کے عمل کو انجام دیتا ہے۔ پیرامیشیم میں جنجوغ کے عمل کو سب سے پہلے ہرٹوگ (Hertwig) اور ماوپاس (Moupas) نے 1889ء میں دریافت کیا۔

جنجوغ (Conjugation) سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف کلون (Clone) سے تعلق رکھنے والے دو پیرامیشیم کے درمیان عارضی ملاپ واقع ہوتا ہے جس کے دوران مرکزی مادوں (Nuclear Material) کا تبادلہ عمل میں آتا ہے اور کثرت (Multiplication) کے باعث دختر پیرامیشیم حاصل ہوتے ہیں۔

جنجوغ کے دوران دو پیرامیشیم اپنی بطنی سطح کے ذریعہ باہم پیوست ہو جاتے ہیں۔ جنجوغ میں حصہ لینے والے پیرامیشیم کو جنجوغ کنندہ (Conjugant) کہتے ہیں۔ دونوں جنجوغ کنندوں کی پیلیمیکل (Pellicle) کی جسمی دیوار ایک دوسرے سے پیوست ہونے کے مقام پر تحلیل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر دونوں جنجوغ کنندوں کے درمیان خلیہ مائی پل (Cytoplasmic Bridge) تیار ہوتا ہے اور دونوں کے خلیہ مایہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں دونوں جنجوغ کنندوں کے کلاں مرکزے (Macronucleus) بتدریج تحلیل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے خرد مرکزوں (Micronucleus) کی تقسیم سے ہر ایک جنجوغ کنندہ میں چار ایک گنا (Haploid) مرکزے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر ایک جنجوغ کنندہ میں ان چار مرکزوں میں سے تین مرکزے تحلیل ہو جاتے ہیں اور صرف ایک ہی مرکزہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہر ایک جنجوغ کنندہ میں باقی رہنے والا مرکزہ غیر مساوی طور پر دو مرکزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے چھوٹا مرکزہ متحرک ہوتا ہے جس کو ہجرتی پیش مرکزہ (Migratory Pronucleus) کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرکزہ بڑا ہوتا ہے جو ساکن رہتا ہے جس کو ساکت پیش مرکزہ (Stationary Pronucleus) کہا جاتا ہے تب ایک جنجوغ کنندہ کا ہجرتی پیش مرکزہ دوسرے جنجوغ کنندہ میں داخل ہو کر ساکت پیش

مرکزہ میں ضم (Fuse) ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نچوگ مرکزہ (Conjugation Nucleus) یا طوں مرکزہ (Synkaryon) کہلاتا ہے تب دونوں نچوگ کنندے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور سابقہ نچوگی (Exconjugant) کہلاتے ہیں۔ ہر ایک سابقہ نچوگی میں طوں مرکزہ (Synkaryon) تین مرتبہ تقسیم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ مرکزے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے چار مرکزوں کی جسامت میں نمو کے باعث اضافہ ہوتا ہے اور یہ کلاں مرکزوں (Macronuclei) میں تبدیل ہو جاتے ہیں باقی چار مرکزے خود مرکزے (Micronuclei) کہلاتے ہیں۔ ان چار خود مرکزوں میں سے تین مرکزے تحلیل ہو جاتے ہیں لہذا ہر ایک سابقہ نچوگی (Exconjugant) میں ایک خود مرکزہ اور چار کلاں مرکزہ پائے جاتے ہیں۔

ہر ایک سابقہ نچوگی مع خود مرکزہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ حاصل ہونے والے دونوں افراد میں سے ہر ایک فرد میں دو کلاں مرکزے اور ایک خود مرکزہ موجود ہوتا ہے تب دونوں افراد میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے اور ساتھ ہی کلاں مرکزہ بھی تقسیم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ہر ایک دختر بیکٹیریم میں ایک کلاں مرکزہ اور ایک خود مرکزہ پایا جاتا ہے لہذا نچوگ کے اختتام پر جملہ آٹھ دختر بیکٹیریم (دونوں نچوگ کنندوں سے) حاصل ہوتے ہیں۔

نچوگ کی اہمیت

(1) دختر بیکٹیریم دو پارگی (Binary Fission) کے باعث اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور جوانی دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔

(2) نچوگ ایک ایسا عمل ہے جس میں مرکزہ دوبارہ منظم ہوتا ہے۔

(3) تمام اعلیٰاتی افعال بہتر طور پر انجام پانا شروع کرتے ہیں۔


(4) نچوگ کنندوں کے درمیان مرکزی مادوں (Nuclear Material) کا تبادلہ واقع ہوتا ہے جس کے باعث

وراثتی تغیرات (Hereditary Variation) ظاہر ہوتے ہیں۔

(5) نچوگ کے باعث تولید واقع ہوتی ہے جس کے باعث دختر بیکٹیریم کی نسل قائم رہتی ہے اور وہ معدوم ہونے سے بچ

جاتی ہے۔


(6) دختر بیکٹیریم میں دو عضویوں کے نچوگ سے 8 دختر بیکٹیریم پیدا ہوتے ہیں۔



شکل 8.11
ہیرا میٹیم میں ٹیوگ

3.3.2.2 کچھوے میں مستفی تولیدی نظام (Sexual Reproductive System in Earthworm)

جنوبی ہندوستان میں پایا جانے والا عام کچھوا میگاسکواگس (Megascolex) ہے۔ یہ دو مستفی (Bisexual) یا خنثی مشکل (Hermaphrodite) حیوان ہے یعنی نر اور مادہ دونوں تولیدی اعضاء ایک ہی حیوان کے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں خود باروری (Self Fertilization) کا عمل انجام نہیں پاتا کیوں کہ ان میں لنگھے (Testes) بیضدان (Ovary) سے قبل ہی پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو مقدم نرینہ (Protandry) کہتے ہیں۔ لہذا ان میں پار باروری (Cross Fertilization) کا عمل انجام پاتا ہے۔



فعل 8.12

کچھوا۔ نر اور مادہ تاسلی روزنوں کو دکھاتے ہوئے

نر تولیدی نظام (Male Reproductive System)

نچر۔ میں نر تولیدی اعضاء حسب ذیل حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

لنگے (Testes)

لنگے (Testes) کے دو جوڑ پائے جاتے ہیں۔ ایک جوڑ دسویں قطعہ میں اور دوسرا جوڑ گیارہویں قطعہ میں موجود ہوتا ہے۔ ہر ایک انجی نلکی نما ساختوں کے کچے پھٹے مشتمل ہوتا ہے ان میں منویہ مادہ خلیہ (Spermatogonia) تیار ہوتے ہیں۔

منوی کیسے (Seminal Vesicles)

منوی کیسوں (Seminal Vesicles) کے دو جوڑ پائے جاتے ہیں پہلا جوڑ نویں قطعہ میں اور دوسرا جوڑ بارہویں قطعہ میں موجود رہتا ہے انہی میں تیار ہونے والے منویہ مادہ خلیے منوی کیسوں میں داخل ہوتے ہیں جہاں یہ پختگی حاصل کرتے ہیں اور منویوں (Spermatozoa) میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

منوی قیفیں (Seminal Funnel) یا ہڈے دار گل بند (Ciliated Rosettes)

منوی قیفوں (Seminal Funnel) کے دو جوڑ ہوتے ہیں۔ ایک جوڑ دسویں قطعہ میں اور دوسرا جوڑ گیارہویں قطعہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہڈے دار ہوتے ہیں۔ ان کے حاشیے تہہ دار ہوتے ہیں۔ یہ منویوں کو منوی کیسوں سے حاصل کرتے ہیں اور قاتہ تا قلعہ (Vasa Deferentia) میں پہنچا دیتے ہیں۔

قاتہ تا قلعہ (Vasa Deferentia)

قاتہ تا قلعہ (Vasa Deferentia) کے دو جوڑ جانبی طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ نلی نما ہوتے ہیں۔ ان کا اگلا سرا منوی قیفیں تیار کرتا ہے۔ یہ بارہویں قطعہ تک پہنچتے ہیں۔ ہر جانب کی دونوں قاتیں باہم مل کر مشترک قاتہ تا قلعہ بناتی ہیں اور اٹھارہویں قطعہ تک پہنچ کر نر تولیدی روزن (Male Genital Opening) کے ذریعہ جسم کے باہر نکلتی ہیں۔

غدد ودی (Prostate Glands)

غدد ودی (Prostate glands) کا ایک جوڑ ہوتا ہے جو سترہویں قطعہ سے بیسویں قطعہ تک پایا جاتا ہے۔ اس کے راس پر قات ودی (Prostate Duct) پائی جاتی ہے۔ منویہ جب قاتہ تا قلعہ اور مشترک قاتہ تا قلعہ سے گذرتے ہوئے اٹھارہویں قطعہ تک پہنچتے ہیں تو غدد ودی کا افراز تمام منویوں کو باہم پیوست کر دیتا ہے اور ایک بڈل کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے جس کو منویہ بڑا سے

(Spermatophores) کہا جاتا ہے۔

نریتا کلی روزنیں (Male Genital Openings)


اٹھارویں قطعہ میں بطنی جانب نریتا کلی روزن کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے۔ اس روزن کے ذریعہ منویہ بردایے جسم سے باہر خارج

کردیے جاتے ہیں۔

نفسی ابرے (Penial Setae)

نفسی ابروں کے دو جوڑ نریتا کلی روزن کے حدود میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مباشرت کے دوران دوسرے جنسی ساتھی کو متحرک

بناتے ہیں۔



شکل 8.13


کچھے کا تولیدی نظام

مادہ تولیدی نظام (Female Reproductive System)

مادہ تولیدی نظام سب ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔


بیض دان (Ovaries)

بیض دان (Ovaries) کا ایک جوڑ تیرہویں قطعہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ انگلی نما ساختوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان میں بیضے (Ova) تیار ہوتے ہیں جو جسمی کہلہ یا قعر (Coelom) میں خارج کر دیئے جاتے ہیں۔



شکل 8.14

کچھ کے مادہ تولیدی نظام کو ظاہر کرتا ہوا جسم کا حصہ



شکل 8.15

کچھ کے کا بیض دان (مادہ تولیدی عضو)

بیض قنات (Oviduct)

بیض قناتوں (Oviducts) کا ایک جوڑ تیر ہویں اور چودھویں قطعوں میں موجود ہوتا ہے۔ ہر جانب میں ایک بیض قنات پائی جاتی ہے ان کے اندرونی سرے جہی کہہ یا قعر میں کھلتے ہیں جب کہ بیرونی طور پر چودھویں قطعہ میں مادہ تاسلی روزن کے ذریعہ جسم کے باہر کھلتے ہیں۔ بیضے (Ova) قعر سے بیض قنات میں داخل ہوتے ہیں اور مادہ تاسلی روزن کے ذریعہ باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔

مادہ تاسلی روزن (Female Genital Openings)


مادہ تاسلی روزن کا ایک جوڑ چودھویں قطعہ میں بطنی جانب پایا جاتا ہے جس کے ذریعہ بیضے باہر خارج کئے جاتے ہیں۔

منوی کیسے (Spermathecae)

منوی کیسے (Spermathecae) تھیلی نما ساختیں ہوتی ہیں جو ساتویں، آٹھویں اور نویں قطعوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہر قطعہ میں منوی کیسوں کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے۔ منوی کیسے چھٹے اور ساتویں، ساتویں اور آٹھویں اور آٹھویں اور نویں قطعہ کے درمیان بطنی جانب روزنوں کے ذریعہ باہر کھلتے ہیں۔ مباشرت کے دوران ایک کیچوے کے منویہ بردار بے (Spermatophores) دوسرے کیچوے کے منوی کیسوں میں حاصل کئے جاتے ہیں اور ذخیرہ کئے جاتے ہیں۔

مباشرت (Copulation)

کیچوہ اگر یکہ جنسی مشکل (Hermaphrodite) حیوان ہے لیکن اس میں خود باروری انجام نہیں پاتی کیوں کہ کیچوے میں اٹھے (Testes) بیضدان (Ovary) سے قبل پختہ (Mature) ہو جاتے ہیں جس کو مقدم نرینہ (Protandry) کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس میں پار باروری (Cross fertilization) کا عمل انجام پاتا ہے۔ اس لئے دو علیحدہ کیچوے کے درمیان مباشرت (Copulation) واقع ہوتی ہے۔ مباشرت کے دوران دو علیحدہ کیچوے مخالف سمت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایک کیچوے کا اگلا سرا دوسرے کیچوے کے پچھلے سرے کی جانب اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کیچوے کے نر تو لیدی روزن دوسرے کیچوے کے منوی کیسوں (Spermathecae) کے روزن کے مقابل ہوتے ہیں۔ اس دوران ایک کیچوے کے منویے (Spermatozoa) دوسرے کیچوے کے منوی کیسوں (Spermathecae) کے روزن کے ذریعہ منوی کیسوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں کیچوے کے درمیان منویوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے جس کے بعد دونوں کیچوے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔



شکل 8.16
دو کیچوں کے درمیان مباشرت

قوتون (Cocoon) کی تیاری

کیچے میں بیض دان (Ovaries) کے پختہ ہونے کے دوران زین (Clitellum) کے حصہ کے اطراف غشائی گھیرا (Girdle) تیار ہوتا ہے۔ یہ گھیرا سخت ہو کر قوتون (Cocoon) میں تبدیل ہوتا ہے جو زین کے اطراف پایا جاتا ہے۔ کیچہ اہل کھاتا ہوا جب اس قوتون سے باہر نکلنے کے لئے حرکت کرتا ہے تو قوتون اگلی جانب حرکت کرتا ہے اور کیچہ اگلی جانب حرکت کرتا ہے اور جب قوتون مادہ تولیدی روزن کے اوپر پہنچتا ہے تو مادہ تولیدی روزن سے انڈے (Ova) اس قوتون میں خارج کر دیے جاتے ہیں جب قوتون منوی کیسوں کے روزن پر سے گذرتا ہے تو ان روزنوں سے منویے (Spermatozoa) قوتون میں خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح قوتون جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے دونوں سرے مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں۔

باروری (Fertilization) اور نشوونما (Development)

باروری کا عمل قوتون کے اندر واقع ہوتا ہے جس کے دوران منویے بیضوں کو بارور کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اگرچہ کئی ہفتے (Zygote) تیار ہوتے ہیں لیکن صرف ایک ہی جنم نشوونما (Development) پا کر تقریباً 10 تا 8 ہفتوں میں نوزید کیچے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو قوتون سے باہر برآمد ہوتا ہے۔



شکل 8.17 قوتون (Cocoon) سے نوزید کیچے برآمد ہوتے ہیں

3.3.2.3 حشرات میں صنفی تولیدی نظام (Sexual Reproductive System in Insects)

مگس یا مکھی کا سائنسی نام مسکا ڈومیسٹیکا (*Musca domestica*) اور مسکا نیبولو (*Musca nebulosa*) ہے۔ یہ ایک صنفی (Unisexual) حشر ہے۔ مادہ مکھی زخمی کے بہ نسبت کسی قدر بڑی ہوتی ہے۔


نر تولیدی اعضاء (Male Reproductive Organs)

زخمی کے پانچویں ٹکڑے میں ایک جوڑا شفتی نما ٹیچے (Testes) پائے جاتے ہیں۔ ان میں منویہ (Sperms) پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک ٹیچے سے ایک قات نکلتی ہے جس کو قات قاتہ (Vasa Deferential) کہا جاتا ہے۔ دونوں قات قات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک درمیانی نالی بناتے ہیں جس کو انزالی قات (Ejaculatory Duct) کہا جاتا ہے۔ بعدی حصہ کے قریب یہ نالی کشادہ ہو کر حقیقی نما ساخت بناتی ہے جس کو انزالی کیسہ (Ejaculatory Sac) کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی اعضاء تاسل (External Genitalia) اور مباشرتی عضو قنیب (Penis) موجود ہوتا ہے۔ قنیب کے سرے پر تاسلی روزن پایا جاتا ہے۔

مادہ تولیدی اعضاء (Female Reproductive Organs)

مادہ مکھی کے شکم میں ایک جوڑا سفید رنگ کے قرص نما بیض دان پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک بیض دان میں تقریباً ستر (70) انڈا لیاں (Egg Tubes) یا بیض نالیاں (ovarioles) پائی جاتی ہیں۔ ہر ایک بیض نالی میں ایک بیضہ (Ovum) موجود رہتا ہے۔ تمام بیض نالیاں ایک چھوٹی نالی میں کھلتی ہیں جس کو بیض قات (Oviduct) کہا جاتا ہے۔ دونوں بیض قاتیں آپس میں ملکر مشترک بیض قات (Common Oviduct) بناتے ہیں جو سہل (Vagina) کے ذریعہ بیض گزار (Ovipositor) میں کھلتی ہے سہل باہر کی جانب مادہ تاسلی روزن کے ذریعہ نکلتا ہے۔ تین منویہ کیسے (Spermathecae) سہل کے قریب تاسلی نالی میں کھلتے ہیں۔ مباشرت کے دوران زخمی مادہ کے جسم میں منویہ داخل کرتی ہے جو ان منویہ کیسوں میں جمع کئے جاتے ہیں۔ جب بیض دان سے بیضہ چھوڑا جاتا ہے تب یہ منویہ بیضہ کو بارور کرتے ہیں۔ اس طرح باروری کا عمل مادہ کے جسم کے اندر واقع ہوتا ہے یعنی باروری اندرونی ہوتی ہے۔ مباشرت کے تقریباً 8 تا 6 ہفتے بعد مادہ مکھی عموماً تاسیاتی مادوں، فضلہ، کھاد، سڑی ہوئی ترکاریوں، سڑے ہوئے گوشت پر بارور شدہ انڈے دیتی ہے۔ ایک مادہ مکھی ایک وقت میں تقریباً 120 تا 150 انڈے دیتی ہے ہر موسم میں تقریباً 500 تا 600 انڈے 5 تا 6 جھون میں دیتی ہے انڈوں سے 8 تا 24 گھنٹوں میں سروے (Larvae) برآمد ہوتے ہیں جن کو مگس (Maggot) کہا جاتا ہے۔ مگس سروا 6 تا 8 دن کے بعد پیوپا (Pupa) میں تبدیل ہوتا ہے جو 4 تا 5 دن میں بالغ مکھی میں تبدیل ہوتا ہے جس کو اناگو (Imago) کہتے ہیں۔ اناگو تیزی سے نشوونما پاتا

ہے اور تقریباً 2 ہفتوں میں پھر سے مکھی اڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔



شکل 8.18

گھریلو مکھی کی سوانح حیات

گھریلو مکھیوں سے پھیلنے والے امراض

گھریلو مکھی ایک انتہائی نقصان دہ حشرہ ہے۔ یہ مہلک امراض پیدا کرنے والے طفیلی خوردبینی عضویوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام کو لے جاتی ہیں خاص کر فضلہ اور بلغم وغیرہ سے ان خوردبینی عضویوں کو غذائی اشیاء یا استعمال کئے جانے والے برتنوں پر منتقل کرتی ہے جن کے

ذریعہ یہ طفیلی انسان کے جسم میں داخل ہو کر مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں۔ کھیاں انسان میں دق، ہیضہ، جذام، ٹائیفائیڈ، ایتھراکس (Anthrax) اسہال، پیچش، آشوب چشم وغیرہ امراض پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھیاں مختلف طفیلی حیوانات جیسے ٹیٹاسولیم (Taenia solium) اسکرس (Ascaris) وغیرہ کے انڈے اور سرواوں (Larvae) کو بھی ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس لئے امراض سے بچنے کے لئے مکھیوں سے بچنا یا سوزوں انسدادی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔

3.3.2.4 مینڈک میں صنفی تولیدی نظام (Sexual Reproductive System in Frog)

مینڈک یک صنفی حیوان ہے یعنی ان میں نر اور مادہ صنفیں علیحدہ رہتی ہیں۔ یہ جنسی درشکلیت (Sexual Dimorphism) کو ظاہر کرتا ہے۔ نر اور مادہ باسانی پہنچانے جاتے ہیں۔ نر مینڈک میں ایک جڑ صوتی کیسے (Vocal Sacs) پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک صوتی کیسہ بلعوم کی جانب پر موجود رہتا ہے جو زیرین جڑے کے زاویہ کے سامنے دہن کے کھد میں فرش پر کھلتا ہے۔ یہ آواز پیدا کرنے کے اعضاء کہلاتے ہیں جو مادہ مینڈک میں غیر موجود ہوتے ہیں۔ نر مینڈک کے اگلے جوارح کی اشاریہ انگشت پر گدے پائے جاتے ہیں جن کو مباشرتی گدے (Copulatory Pads) یا جفتی گدے (Amplexusary Pads) کہا جاتا ہے۔ یہ گدے تولیدی موسم میں کافی نمو یافتہ ہوتے ہیں مادہ مینڈک میں مباشرتی گدے نہیں پائے جاتے ہیں۔




شکل 8.19

نر مینڈک کے اگلے اور پچھلے جوارح

نر تولیدی نظام (Male Reproductive System)


زمینڈک میں تولیدی نظام اور اخراجی نظام ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہتے ہیں۔ اس لئے ان دونوں نظام کو عموماً بولی نالی نظام (Urinogenital System) کہا جاتا ہے۔ زمینڈک کا تولیدی نظام ایک جڑ رانگیوں (Testes)، براآئندہ قاتیں (Vasa Efferentia)، ایک جڑ بولی نالی قاتیں (Urinogenital Ducts)، موری (Cloaca) اور فحشی اجسام (Corpora Adiposa) پر مشتمل ہوتا ہے۔



عمل 8.26

نزمینڈک میں بولی تناسلی نظام

نرینڈک کے غمکی کھد میں انگوں (Testes) کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے۔ ہر ایک انگیہ دوہرے صفاق (Peritoneum) سے گھرا رہتا ہے اور بطنی جانب گردے سے بھی اسی صفاق کے ذریعہ جڑا رہتا ہے۔ اس صفاق کو مسار پتہ انگیہ (Mesorchium) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک انگیہ کئی مرغولہ نما منویہ بردار نالیچوں (Seminiferous Tubules) پر مشتمل رہتا ہے جس کی اندرونی سطح ناتی سرحدہ (Germinal Epithelium) سے ستر کی ہوئی ہوتی ہے جنمویے (Sperms) پیدا کرتی ہے۔ انگیہ کے اندرونی حاشیے سے کئی نازک نالیاں نکلتی ہیں جن کو برآرندہ قاتیں (Vasa Efferentia) کہا جاتا ہے۔ یہ برآرندہ قاتیں گردے میں پائی جانے والی بڈر کی نالی



مینڈک کے لکڑے کی عرضی تراش

8.22 **حل**


میںڈک کا منویہ

288

مادہ تولیدی نظام (Female Reproductive System)

مادہ مینڈک کا تولیدی نظام ایک جوڑ بیض دان (Ovaries)، ایک جوڑ بیض قاتیں (Oviducts)، ایک جوڑ حالب (Ureters)، موری (Cloaca) اور شحمی اجسام (Corpora Adiposa) پر مشتمل ہوتا ہے۔


مادہ مینڈک کے شحمی کہف میں سیاہ یا بھورے رنگ کے بیض دان (Ovaries) کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے۔ ہر ایک بیض دان گردے کے اگلی بطنی جانب سے دہرے صفاق (Peritoneum) سے جڑا رہتا ہے۔ اس صفاق کو ماسار بقاء بیض دان (Mesovarium) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک بیض دان افزائش نسل کے موسم میں کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ بیض دان کئی جرابوں (Follicles) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ایک جراب میں ایک بیضہ (Ovum) پایا جاتا ہے۔ جراب کی اندرونی سطرتاتی مرحلہ (Germinal Epithelium) کی ہوتی ہے جو بیضے (Ova) تیار کرتی ہے۔



فکل 8.23

مادہ مینڈک کا بولی تاسلی نظام


جیسی کہفہ میں ایک جوڑ بیض تانوں (Oviducts) کا پایا جاتا ہے۔ جیسی کہفہ کی ہر جانب میں ایک بیض تان پائی جاتی ہے جو پیچہ ار لانی نالی ہوتی ہے جس کا اگلا سراسش (Lungs) کے قریب تک رہتا ہے۔ اگلا سراقیف نمادہچ (Ostium) کے ذریعہ جیسی کہفہ میں کھلتا ہے۔ پچھلی جانب بیض تان کشادہ ہو کر قحیل نما ساخت بناتی ہے جس کو بیض کیسہ (Ovisac) یا رحم (Uterus) کہا جاتا ہے جس میں بیضے ذخیرہ کئے جاتے ہیں۔ بیض کیسہ پچھلی جانب موری میں کھلتا ہے۔ بیض دان سے پختہ بیض جیسی کہفہ میں خارج کیا جاتا ہے جہاں سے یہ بیض تان میں قیف نمادہچ (Ostium) کے ذریعہ داخل ہوتا ہے۔ بیض تان سے بیضہ گزرتے ہوئے موری میں داخل ہوتا ہے اور روزن موری کے ذریعہ جسم سے باہر پانی میں خارج کر دیا جاتا ہے۔ کئی انڈے تو دے کی شکل میں پانی میں خارج کئے جاتے ہیں۔ انڈوں کے تو دے کو جھول (اسپان Spawn) کہا جاتا ہے۔ مادہ مینڈک میں گردے سے نکلنے والی حالب (Ureter) صرف اخراجی نالی کا فعل انجام دیتی ہے جس میں سے صرف پیشاب گذرتا ہے۔




شکل 8.24

مادہ مینڈک کے پیچہ ان کی عرضی تراش

نر اور مادہ مینڈک کے درمیان مباشرت (Couplation) کے دوران منویہ (Sperms) اور بیضے (Ova) اسپان (Spawn) کی شکل میں پانی میں خارج کئے جاتے ہیں۔ اس لئے پانی میں باروری کا عمل واقع ہوتا ہے۔ باروری کے نتیجہ میں جفتہ (Zygote) حاصل ہوتا ہے۔ جفتہ میں فوری نشوونما کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔




شکل 8.25
مادہ مینڈک میں بیضہ زائی



شکل 8.27 مینڈک کا بیضہ


شکل 8.26 مینڈک کا بیضہ جمول (Spawn)



شکل 8.28

مینڈک کے ابتدائی نشوونما کے مراحل A تا H1

جھٹ میں نشوونما کے باعث بالآخر ایک مچھلی کے مانند سروا (Larva) حاصل ہوتا ہے جس کو غوکچہ سروا (Tadpole Larva) کہا جاتا ہے۔ غوکچہ سروے میں تدریجی تغلب (Progressive Metamorphosis) واقع ہوتا ہے جس کے باعث غوکچہ سروا ایک بالغ (Adult) مینڈک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سروے میں واقع ہونے والی وہ تمام تبدیلیاں جس کے باعث سروا ایک بالغ میں تبدیل ہو جاتا ہے انھیں تبدیلیاں کہلاتی ہے اور اس مظہر کو تغلب (Metamorphosis) کہا جاتا۔



شکل 8.29

مینڈک کا دور حیات

4 سبق کا خلاصہ

تولید جاندار عضویوں کی سب سے اہم خصوصیت ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے ہی جیسی نوع کے افراد کو پیدا کرتے ہیں جس کے باعث ان کی آبادی میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی آبادی قائم بھی رہتی ہے۔

حیوانات میں تولید غیر منفی اور منفی طریقوں کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔ تولید کا ایسا طریقہ جس میں نر اور مادہ زواجوں کا ملاپ واقع

نہیں ہوتا اور جو ایک نئی منسوبہ میں انجام پاتا ہے غیر صنفی تولید کہلاتا ہے۔ غیر صنفی تولید دو پارگی، کثیر پارگی اور کلیاؤ کے ذریعہ انجام پاتی ہے
 ایکڑ یا اور یک خلوی حیوانات جیسے ایما، پیرامیٹیم اور یوگلینا میں دو پارگی کا عمل انجام پاتا ہے۔ ایما میں کثیر پارگی واقع ہوتی ہے۔ ہائیڈرا میں
 کلیاؤ کے ذریعہ غیر صنفی تولید واقع ہوتی ہے۔ اسٹیف میں جیمیولس (Gemmules) یعنی اندرونی طور پر نمونے والی کلیوں (Buds) کے
 ذریعہ غیر صنفی تولید انجام پاتی ہے۔

صنفی تولید ایسا طریقہ ہے جس میں مختلف جنسوں کے عضویوں میں تیار ہونے والے نر اور مادہ زواجوں کے درمیان ملاپ
 واقع ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں عضویوں کی پیدائش واقع ہوتی ہے۔ مچھلی اور میڈوک میں نر اور مادہ زواجے پانی میں خارج کئے جاتے ہیں۔
 جہاں باروری کا عمل انجام پاتا ہے جس کو بیرونی باروری کہا جاتا ہے۔ کیڑوں، مکڑیوں اور پستانوں کے جسم کے اندر باروری کا عمل واقع ہوتا
 ہے جس کو اندرونی باروری کہا جاتا ہے۔ نر اور مادہ یک گنا (Haploid) زواجوں کے ملاپ کے نتیجہ میں دو گنا جنتہ (Diploid)
 (Zygote) حاصل ہوتا ہے۔

پیرامیٹیم میں صنفی تولید خجک کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔ خجک کے دوران دو پیرامیٹیم کے درمیان عارضی ملاپ واقع ہوتا ہے
 جس کے دوران مرکزی مادوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے اور کثرت (Multiplication) کے باعث دختر پیرامیٹیم حاصل ہوتے ہیں۔
 پیرامیٹیم متعدد بار دو پارگی عمل کے باعث کمزور ہو جاتے ہیں اور شباب کو کھودیتے ہیں جس کو وہ عمل خجک کے ذریعہ دوبارہ حاصل کر لیتے
 ہیں۔

کچھ اخنسی مشکل حیوان ہے لیکن ان میں خود باروری کا عمل انجام نہیں پاتا بلکہ ان میں مقدم نرینہ (Protandry) کی وجہ سے
 بار باروری واقع ہوتی ہے۔ کچھ سے میں باروری کا عمل قوتون کے اندر واقع ہوتا ہے۔ قوتون سے 8 تا 10 ہفتوں میں نو خیز کچھ ابراہم ہوتا
 ہے۔

گھریلو کبھی مسکا ڈومیل کا بھی ایک صنفی (Unisexual) حشرہ ہے۔ مادہ کبھی کے انڈوں سے 8 تا 24 مردے
 (Larvae) برآمد ہوتے ہیں جن کو مکس (Maggot) کہتے ہیں جو 6 تا 8 دنوں کے بعد پوپا (Pupa) میں تبدیل ہوتا ہے جو 4 تا 5
 دنوں میں بالغ کبھی میں تبدیل ہوتا ہے جس کو اناگو (Imago) کہا جاتا ہے۔

کھیاں مختلف امراض جیسے دق، جذام، ہیٹائیز بخار، ایتھراکس، اسہال، مچھش، آشوب چشم وغیرہ کے پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔
 میڈوک جنسی دو شکلیت (Sexual Dimorphism) کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک صنفی حیوان ہے۔ نرینہ میڈوک میں آواز پیدا

کرنے کے اعضاء، صوتی کیسے (Vocal Sacs) کا ایک جوڑ اور اگلے جوارح کی اشاریہ انگشت پر مباشرت گدے یا جھتی گدے پائے جاتے ہیں۔ مادہ مینڈک میں صوتی کیسے اور مباشرت گدے نہیں پائے جاتے ہیں۔ بیرونی ہاروری پانی میں انجام پاتی ہے۔ جنت سے غوکچہ سردا برآمد ہوتا ہے جس میں تدریجی قلب واقع ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں سردا بالغ مینڈک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

5 زائد معلومات

قلب (Metamorphosis)

قلب سے مراد سردے (Larva) میں واقع ہونے والی سلسلہ وار تبدیلیاں ہیں جس کے باعث سردا بالغ حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مینڈک کے سردے کو غوکچہ (Tadpole) کہا جاتا ہے۔ غوکچہ میں قلب کا عمل تھائراکسن (Thyroxin) کی ہارمون کے زیر اثر شروع ہوتا ہے جو در قیہ غدود (Thyroid Gland) سے افزا ہوتا ہے۔ قلب کے عمل کے دوران پھلی نما آبی غوکچہ سردا جو گھمڑوں سے سانس لینے والا، ہنزی خور (Herbivorous) اور دما ہوتا ہے سلسلہ وار تبدیلیوں کے باعث بری، ہش (Lungs) سے سانس لینے والے، بغیر دم والے اور گوشت خور (Carnivorous) بالغ حیوان (مینڈک) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

قلب کے دوران غوکچہ سردے کے عصمی نظام (Nervous System) میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی لیکن غوکچہ سردے میں وہ نظام جس میں تبدیلیاں اعظم ترین واقع ہوتی ہیں وہ دوران خون کا نظام (Circulatory System) ہے۔

اگر غوکچہ سردے کے جسم سے در قیہ غدود کو نکال دیا جائے تو سردے میں قلب کا عمل رک جاتا ہے اور وہ سردے کی حالت میں ہی زندگی گزارتا ہے۔

اگر پانی میں جس میں غوکچہ سردا موجود رہتا ہے آئوڈین (Iodine) کی کچھ مقدار ملا دی جائے تو غوکچہ سردے میں قلب کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔



Aestivation	ایسٹیویشن	گرما خوابی	موسم گرما کے دوران حالت نیند۔ مینڈک موسم گرما کے دوران بلوں میں داخل ہو کر حالت سکون میں زندگی گزارتا ہے جس کے دوران وہ غذا کو حاصل کرنا بھی ترک کر دیتا ہے۔ جسم میں تمام حولی سرگرمیاں تخفیف پا جاتی ہیں۔ اس لئے کم توانائی درکار ہوتی ہے اور مینڈک موسم گرما کے اختتام تک بآسانی حالت سکون یعنی حالت نیند میں زندگی گزارتا ہے۔ اس حالت کو گرما خوابی کہا جاتا ہے۔
Bidder's Cannel	بڈرس کنال	بڈر کی نالی	زمینڈک کے گردے میں پائی جانے والی نالی ہے جو منوہوں کے گزرنے میں مدد دیتی ہے۔
Coelom	سیلوم	قعر	جسمی کہلہ۔ حیوان کی جسمی دیوار اور ہاشمی نالی کے درمیان پائے جانے والے کہلہ کو قعر (Coelom) کہا جاتا ہے۔
Follicle	فالیکل	جراب	بیض دان میں کیسہ نما ساخت جس میں بیضہ موجود رہتا ہے۔
Germinal Epithelium	جرمینل اپیٹھلیئم	تابعی مرحلہ	مولودوں (Gonads) یعنی لکھیہ (Testis) اور بیض دان (Ovary) کی اندرونی بافتنی پرت جس سے زواجے (Gametes) تیار کئے جاتے ہیں۔

Hibernation	باہر نیشن	سہ ماخوانی	موسم سرما کے دوران نیند۔ جس طرح موسم گرما کے دوران مینڈک سرما خوابی کرتا ہے اسی طرح موسم سرما کے دوران بھی مینڈک بلوں میں حالت سکون میں زندگی گزارتا ہے۔
Macronucleus	میکرونوکلئیس	کلاں مرکزہ	بڑا مرکزہ۔ پیرامیشیم کے جسم میں پایا جانے والا بڑا بڑا مرکزی جو نباتاتی افعال کو قابو میں رکھتا ہے۔
Micronucleus	مائکرونوکلئیس	خرد مرکزہ	چھوٹا مرکزہ۔ پیرامیشیم کے جسم میں پایا جانے والا چھوٹا مرکزہ جو تولیدی افعال کو انجام دینے کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے۔
Mesovarium	میزووریم	ماساریقہ بیض دان	دوہری صفاق (Peritoneum) جس کے ذریعہ بیض دان گردے سے جڑے رہتے ہیں۔
Mesorchium	میسارکیم	ماساریقہ مائید	دوہری صفاق جس کے ذریعہ اٹھپے گردے سے جڑے رہتے ہیں۔
Multiplication	ملٹی پلیکیشن	کثرت	تقسیم۔ ادنیٰ عضویوں میں تولید کا طریقہ جس میں عضوئے کا جسم (یعنی خلیہ) تقسیم ہوتا ہے اور نئے خلیے یعنی دختر عضویے حاصل ہوتے ہیں۔
Metamorphosis	میٹامورفوسس	تغلب	تبدیلیاں۔ بعد شکلیت۔ سردے (لاروے) میں واقع ہونے والی سلسلہ وار تبدیلیاں جس کے باعث سردا بالغ حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

Penral Setae پنیل سیے نصیبی ہرے کچھوے کے زنتا کلی روزن کے قریب پانی جانے والی بال نما ساختیں جو مباشرت کے دوران جنسی ساتھی کو متحرک کرتی ہیں۔

Peritoneum پیرونیوم صفاق سرطی بافت
Progressive Metamorphosis پروگریسیو میٹامورفوسس تدریجی قلب ترقی یافتہ تبدیلیاں یا قلب۔ سروے (Larva) میں واقع ہونے والی ترقی یافتہ تبدیلیاں جس کے باعث ادنیٰ خصوصیات ضائع ہو جاتی ہیں اور اعلیٰ خصوصیات نمودار ہو جاتی ہیں یعنی سروا ادنیٰ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اور بالغ اعلیٰ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) تولید سے کیا مراد ہے؟
- (2) نئی انواع کس طرح وجود میں آتی ہیں؟
- (3) غیر صنفی تولید سے کیا مراد ہے؟
- (4) صنفی تولید سے کیا مراد ہے؟
- (5) ہائیز رامیں غیر صنفی تولید کس طریقہ کے ذریعہ انجام پاتی ہے؟
- (6) دو پارگی اور کثیر پارگی کن حالات کے تحت انجام پاتی ہیں؟
- (7) جیمولس (Gemmules) کیا ہیں؟

- (8) یک منقہ اور دو منقہ سے کیا مراد ہے؟
- (9) مقدمہ نرینہ (Protandry) سے کیا مراد ہے؟
- (10) کچھوں میں منویوں کی جنسی کا عمل کہاں واقع ہوتا ہے؟
- (11) کچھوں کے منویہ بردارے (Spermatophores) سے کیا مراد ہے؟
- (12) انقلاب سے کیا مراد ہے؟

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) کثیر پادگی پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- (2) نچوگ سے کیا مراد ہے؟ ہیرامیٹھم میں اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔
- (3) ہیرامیٹھم میں عمل نچوگ کو بیان کیجئے۔
- (4) کچھوں کے زوتولیدی نظام کو بیان کیجئے۔
- (5) کچھوں کے مادہ زوتولیدی نظام کو بیان کیجئے۔
- (6) کچھوں میں مباشرت، توتون کی تیاری اور باروری کے عمل کو مختصر بیان کیجئے۔
- (7) حشرات میں زوتولیدی نظام کو بیان کیجئے۔
- (8) حشرات میں مادہ زوتولیدی نظام کو بیان کیجئے۔
- (9) مینڈک کے زوتولیدی نظام کو بیان کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

- (1) انٹیکس میں غیر منقہ زوتولید _____ کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔
- (2) کچھوں میں _____ حالت کی وجہ سے پارہاروری انجام پاتی ہے۔
- (3) گھریلو مکھی کا سائنسی نام _____ ہے۔
- (4) ایک نچوگ کتندہ کا جہرتی پیش مرکزہ دوسرے نچوگ کتندہ میں داخل ہو کر ساکت پیش مرکزہ میں ضم ہو جاتا ہے جس

[illegible]

- (5) کچھ کے نزدیک روزانہ کی حدوں میں۔۔۔۔۔ پائے جاتے ہیں۔
- (6) کچھ سے اس مادہ کا سلی روزانہ ۔۔۔۔۔ قطعہ میں ملتی جانب پایا جاتا ہے۔
- (7) مباشرت سے دوران ایک کچھ کے منویہ پر مدار یہ دوسرے کچھ کے ۔۔۔۔۔ میں حاصل کئے جاتے ہیں۔
- (8) مادہ حشرہ میں مشترک بیض قنات مہل کے ذریعہ ۔۔۔۔۔ میں نکلتی ہے۔
- (9) نرمینڈک میں آواز پیدا کرنے کے اعضاء ۔۔۔۔۔ کہلاتے ہیں۔
- (10) میمنڈک میں اشیاء کے سامنے انگلی نما اجسام جو گرما خرابی اور سرد ماخوابی کے دوران میمنڈک کو غذا فراہم کرتے ہیں۔
کہلاتے ہیں۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) پیرا میٹھیم متعدد بار دو پارگی عمل کے باعث ضائع ہونے والی قوت اور شباب کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے کونسا طریقہ قولید اختیار کرتے ہیں؟

- (a) کلیاؤ (b) کثیر پارگی (c) نیوگ (d) کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے
- (2) ہائیزوایس غیر منفی تولید کس طریقہ سے انجام پاتی ہے؟
- (a) دو پارگی (b) کثیر پارگی (c) کلیاؤ (d) نیوگ
- (3) گھریلو مکھی کے انڈے سے برآمد ہونے والا سردا (Larva) کیا کہلاتا ہے؟
- (a) بیڑا (b) مکھی (c) لاروا (d) غولچہ
- (4) ہر ایک نیوگ کنندہ چیرا میٹیم میں خورد مرکزے کی تقسیم سے کتنے ایک گنا مرکزے حاصل ہوتے ہیں؟
- (a) 4 (b) 2 (c) 8 (d) 16
- (5) ہر ایک سابقہ نیوگی (Exconjugant) میں کتنے خورد مرکزے اور کتنا مرکزے پائے جاتے ہیں؟
- (a) چار خورد مرکزے اور ایک کٹاں مرکزہ (b) ایک خورد مرکزہ اور چار کٹاں مرکزے

- (c) دو فرہ مرکزے اور چار کلاں مرکزے (d) دو کلاں مرکزے اور چار فرہ مرکزے
- (6) کچھے کے کوئے قطعوں میں اٹھے (Testes) کے دو جوڑ پائے جاتے ہیں؟
 (a) 10 اور 11 (b) 11 اور 12 (c) 9 اور 10 (d) 10 اور 12
- 7 کچھے کے کوئے قطعہ میں بیض دان (Ovary) کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے؟
 (a) 10 (b) 13 (c) 11 (d) 12
- (8) زمینڈک میں ہر ایک لٹھ (Testis) بطنی جانب گردے سے دو ہری صفاق کے ذریعہ جڑا رہتا ہے۔ اس صفاق کو کیا کہا جاتا ہے؟
 (a) جانیہ (Pleura) (b) رباط (Ligament) (c) ماسار پیام لٹھ (Mesorchium) (d) ماسار پیام بیض دان (Mesovarium)
- (9) مینڈک کا ملت (Milk) کیا ہوتا ہے؟
 (a) پیسے (b) مینے اور منویے دونوں (c) منوی مادہ خلیے (d) منوی مادہ خلیے

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

A	B
(1) جنسی تفریہ	() خلی مشکل
(2) زواجے	() منویہ بردار یوں کا ذخیرہ
(3) شوگ کے عمل کی دریافت	() منویہ بردار تالیے
(4) فرہ مرکزہ	() جراب
(5) کلاں مرکزہ	() اسپان
(6) کچھا	() نئی انواع کا وجود
(7) منوی کیسے	() تقسیم ہوتا ہے
(8) لٹھ	() یک گنا

- (9) بیس دان بتدریج تحلیل ہو جائے ()
- (10) انڈوں کے قودے ہر ٹوگ اور مادہ پاس ()

سبق 9 انسانی تولیدی نظام

(Human Reproductive System)

- 1 سبق کا خاکہ
- 2 تمہید
- 3 سبق کا متن
 - 3.1 نزولی تولیدی نظام
 - 3.2 مادہ تولیدی نظام
 - 3.2.1 پیمنہ ریوی
 - 3.2.2 ماہواری دور یا حیضی دور
 - 3.2.3 باروری
 - 3.2.4 مثیمہ
 - 3.2.5 حمل
 - 3.2.6 ماں کی نگہداشت
 - 3.2.7 بچے کی پیدائش
 - 3.3 خانہ دانی منصوبہ بندی اور ضبط تولید
- 4 سبق کا خلاصہ
- 5 زائد معلومات

فرہنگ اصطلاحات	6
نمونہ امتحانی سوالات	7
7.1 مختصر جوابی سوالات	
7.2 طویل جوابی سوالات	
7.3 معروضی سوالات	
7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے	
7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے	
7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔	

1 سبق کا خاکہ



اس سبق میں آپ کو درج ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

- ☆ نر تولیدی نظام
- ☆ مادہ تولیدی نظام اور تولید سے متعلق ضروری موضوعات
- ☆ خاندانی منصوبہ بندی اور ضبط تولید

2 تمہید



پچھلے سبق میں آپ تولید کی تعریف تولید کی اہمیت و اقسام اور مختلف حیوانات میں تولیدی نظام سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ انسانی تولیدی نظام سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جسے کامیاب زندگی کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے کیوں کہ انسانوں میں تولیدی اعضاء پیچیدہ نظام کی شکل میں ہوتے ہیں جو ہارمونز کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ نیز اس سبق میں آپ خاندانی منصوبہ بندی اور ضبط تولید سے متعلق بھی معلومات حاصل کریں گے جو خاندان کی صحت اور انسانی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لئے ضروری ہیں۔

سبق کا متن



3.1 نر تولیدی نظام (Male Reproductive System)


نر تولیدی نظام حسب ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

(a) لنگھے (Testes)، (b) منوی کیسہ (Seminal Vesicle)، (c) امدادی غدود (Accessory Glands)، (d) قاتی

نظام (System of ducts)، (e) قنیب (Penis)۔

نر میں مولودوں (Gonads) کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے جو لنگھے (Testes) کہلاتے ہیں۔ لنگھے نر جنین (Male Embryo) کے جنسی کلمہ میں نمو پاتے ہیں لیکن مولود کی پیدائش سے قبل یہ صفن (Scrotum) میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صفن ایک جھلی نما ساخت ہے جو جنسی کلمہ کا بیرونی طور پر نمایاں حصہ ہے۔ صفن انگوں کو سرد حالت میں رکھنے کا کام انجام دیتا ہے کیوں کہ منوچے

(Sperms) حرارت کے لئے حساس ہوتے ہیں اور جسمانی تپش سے کچھ درجہ کم تپش پر ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔




شکل 9.1

انسان میں نر تولیدی نظام

ہر ایک لٹھیہ (Testes) کئی فصیحوں (Lobules) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ایک فصیحہ (Lobule) میں کئی منویہ بردار نالیچے (Seminiferous Tubules) پائے جاتے ہیں۔ ہر منویہ بردار نالیچہ کی اندرونی پرت ناتی سرطلمہ (Germinal Epithelium) کہلاتی ہے۔ ناتی سرطلمہ کے خلیوں میں کئی مرتبہ خیطی تقسیم (Mitotic Division) واقع ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں منویہ مادرخلیے (Sperm mother Cells) حاصل ہوتے ہیں جن میں لوئی اجسام (Chromosomes) کی تعداد دوگنی (Diploid) $(2n)$ ہوتی ہے یعنی 46 لوئی اجسام پائے جاتے ہیں۔ منویہ مادرخلیہ میں تخفیفی تقسیم (Meiotic Division) واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے حاصل ہونے والے خلیوں میں لوئی اجسام کی تعداد نصف یعنی 23 ہو جاتی ہے جس کو یک گنا (Haploid) کہا جاتا ہے۔ ان خلیوں سے منویے (Sperms) حاصل ہوتے ہیں جو یک گنا (Haploid) ہوتے ہیں۔ منویوں کی پیدائش کا عمل منویہ زائی (Spermatogenesis) کہلاتا ہے۔ منویے منویہ بردار نالیچوں کے کینے (Lumen) میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے سر (head) کے ذریعہ ناتی سرطلمہ میں پائے جانے والے چند مخصوص خلیوں سے چسپاں ہو جاتے ہیں اور تغذیہ حاصل کرتے ہیں۔ ان مخصوص خلیوں کو سرٹولی


خلیے (Sertoli Cells) کہا جاتا ہے جو منویوں کو تغذیہ فراہم کرتے ہیں۔ منویہ بردار تاپھوں۔ کردور میان اتصالی بافت (Connective tissue) میں بعض مخصوص خلیے موجود ہوتے ہیں جن کو بین درزی خلیے (Interstitial Cells) یا لائیڈگ خلیے (Lydig Cells) کہا جاتا ہے۔ یہ خلیے اینڈروجن (Androgen) ہارمون کا افراز کرتے ہیں جس کو ٹیسٹوسٹیرون (Testosterone) نامی نر جنسی ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون نر افراد میں نر جنسی خصوصیات کے علاوہ ثانوی جنسی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ منویوں کی پیدائش کے لئے بھی اس ہارمون کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نخاعی غدود (Pituitary Gland) سے خارج ہونے والا سولدرنی (Gonadotrophic) ہارمون اکیے (Testis) کے فعل کو باقاعدہ بناتا ہے اور منویہ زائی (Spermatogenesis) عمل کو قابو میں رکھتا ہے۔ مرد افراد میں بلوغت کے ساتھ ہی نر جنسی ہارمون زیادہ مقدار میں تیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے منویے زیادہ تعداد میں تیار ہوتے ہیں۔ منویہ زائی کا عمل زمانہ بلوغت سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں منویوں کی تیاری انجام نہیں پاتی



شکل 92
اکیے کی نسبیاتی ساخت

منویہ (Sperm) کی ساخت کا مشاہدہ خوردبین سے ہی کیا جاسکتا ہے ہر ایک منویہ سر (Head) گردن (Neck) درمیانی ٹکڑا (Middle Piece) اور دم (Tail) پر مشتمل ہوتا ہے۔ منویہ کا اگلا سرا بیضوی شکل کا ہوتا ہے جو سر (Head) کہلاتا ہے جس میں مرکزہ (Nucleus) موجود ہوتا ہے جو یک گنا (Haploid) ہوتا ہے۔ سر کے اگلے حصہ میں ایک ساخت موجود ہوتی ہے جس کو سر جسم (Acrosome) کہا جاتا ہے جو باروری (Fertilization) کے عمل میں مدد دیتا ہے۔ گردن کا حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے گردن کے پیچھے کا حصہ درمیانی ٹکڑا کہلاتا ہے جس میں تولیے (Mitochondria) پائے جاتے ہیں۔ تولیے منویوں کی حرکت کے لئے درکار توانائی فراہم

کرتے ہیں اس لئے درمیانی ٹکڑا کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دم لائی اور کوئلہ انہما بال کی طرح ہوتی ہے یہ منویہ کو حرکت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دم کی وجہ سے منویہ منوی سیال میں تیرتے رہتے ہیں۔



شکل 9.4
پختہ منویہ کی اندرونی ساخت

شکل 9.3
انسانی منویہ


ہر ایک لٹھی کی پشت پر مرغولہ لٹائی ہوتی ہے جس کو انڈیڈس (Epididymis) کہا جاتا ہے۔ انڈیڈس کو ذخیرہ ٹالی کہا جاتا ہے جس میں منویہ عارضی طور پر کچھ وقت کے لئے ذخیرہ کئے جاتے ہیں۔ اس ٹالی سے لٹائی ٹالی نکلتی ہے جس کو قاعدہ ٹالہ (Vasa Deferentia) کہتے ہیں۔ قاعدہ ٹالہ مہال (Urethra) سے مربوط ہو جاتی ہے جو جسم کے باہر نکلتی ہے۔ جوڑے دار قاعدہ ٹالہ اور مہال کے مقام اتصال پر غدد کے تین سیٹ پائے جاتے ہیں جن میں دو منوی کیسے (Seminal vesicles)، ایک قدامیہ غدد (Prostate Gland) اور دو کاکہر کے غدد (Cowpers Gland) یا صلیہ مہالی غدد (Bulbourethral Gland) شامل ہیں۔ یہ تمام غدد و قاعدہ ٹالیہ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان غدد سے مخاط (Mucus) بھی افزا ہوتا ہے جو منویوں کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ ان غدد سے افزا ہونے والا سیال (Fluid) یعنی مخاط اور منویہ (Sperms) دونوں مل کر منوی سیال (Seminal Fluid) یا منی (Semen) تیار کرتے ہیں

منی سیال عورت کے مہبل (Vagina) میں پائے جانے والے اندرونی ماحول سے منویوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کے علاوہ منویوں کو تغذیہ فراہم کرتا ہے اور منویوں کی حرکت کے لئے سیالی واسطہ مہیا کرتا ہے۔

منویہ بردار نالیچوں سے منویے منوی سیال میں تیرتے ہوئے انڈیدوس (Epididymis) میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ قناتہ ناقہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور مہال کے ذریعہ جسم سے باہر خارج کر دیئے جاتے ہیں منویہ میں بیضوں (Ova) کو بارور کرنے کی صلاحیت انڈیدوس (Epididymis) میں پہنچنے سے قبل نہیں پائی جاتی۔ منویہ جب انڈیدوس میں پہنچ جاتے ہیں تب ان میں قوت پیدا ہوتی ہے اور یہ بیضہ کو بارور کرنے کی صلاحیت کے حامل بن جاتے ہیں۔

3.2 مادہ تولیدی نظام (Female Reproductive System)

عورتوں میں تولیدی نظام بیض دان (Ovary) رحمی نالی (Uterine Tube) بیض قنات (Oviduct) اور فیلوپی نالیوں (Fallopian Tubes)، رحم (Uterus)، مہبل (Vagina) اور بیرونی تولیدی روزن پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیض دان مادہ میں اہم تولیدی اعضاء ہوتے ہیں جن کی تعداد دو ہوتی ہے۔ دونوں بیض دان عانی کھد (Pelvic Cavity) میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب ہوتا ہے۔




فصل 9.5

مادہ تولیدی نظام

ہر ایک بیض دان کی شکل بیضوی ہوتی ہے۔ بیض دان بروں افزائی (Exocrine) اور دروں افزائی (Endocrine) غدود ہے جس کی لائباکی 1.5" ہوتی ہے۔ اس کی سطح تخصصی خلیوں کی پرت سے تیار ہوتی ہے جس کو ناسی سرملہ (Germinal Epithelium) کہا جاتا ہے۔ بیض دان کے ایک حاشیہ پر ماسارچا مصلی (Mesovarium) پائی جاتی ہے جو ایک جوڑ رباط (Ligament) سے مربوط رہتی ہے۔

بیض دان کے اس مربوط شدہ حصہ کو ٹیچ (Hilus) کہتے ہیں۔ ٹیچ (Hilus) پر خون کی نالیاں پائی جاتی ہیں بیض دان کا بیرونی حصہ قشرہ (Cortex) اور اندرونی حصہ نخاع (Medulla) کہلاتا ہے۔ قشرہ ایک جامد (Compact) پرت ہے جو اساسی نسج (Stroma) کی اتصالی بافت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اساسی نسج (Stroma) میں جراب (Follicles) پائے جاتے ہیں جس میں بیض موجود رہتے ہیں۔ بیض دان میں بلوغیت سے قبل ابتدائی جراب (Primitive Follicles) دکھائی دیتے ہیں لیکن بلوغیت کے بعد پختہ جرابیں (Ripe Follicles) یا نمونہ جرابیں (Growing Follicles) دکھائی دیتے ہیں۔ ابتدائی جراب میں ابتدائی بیضہ (Primitive Ovum) موجود ہوتا ہے جن کے اطراف جرابی خلیوں (Follicle Cells) کی واحد پرت پائی جاتی ہے۔ ابتدائی جراب کا قطر 30 تا 40 ہوتا ہے۔ پختہ جرابیں (Ripe Follicles) کیسہ نما (Vesicular) ہوتے ہیں۔ ان کو گرانی جرابیں (Graafian Follicles) کہا جاتا ہے جو صرف پستانوں (Mammals) کے بیض دان میں پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک گرانی جراب ابتدا میں 0.2 ملی میٹر کا ہوتا ہے جس میں ایک کہلہ موجود ہوتا ہے جو مخارہ (Antrum) کہلاتا ہے۔ گرانی جراب میں سیال مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کو جرابی سیال (Liquor Folliculi) کہا جاتا ہے گرانی جراب کی جسامت جوں سی 0.5mm ہو جاتی ہے تو یہ بیض دان کے ٹھٹھلی حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جراب نمونہ کے شروع ہونے کے 10 تا 14 دنوں میں پختہ (Mature) ہوتا ہے۔ بیض دان میں گرانی جرابوں کی تیاری کا عمل جراب متحرک ہارمون (Follicular Stimulating Hormone) کے زیر اثر واقع ہوتا ہے۔ گرانی جراب میں پایا جانے والا بیضہ (Ovum) 28 دنوں میں پختہ ہوتا ہے اور بیض دان سے خارج ہوتا ہے۔ بیضہ کا بیض دان سے خارج ہونا بیضہ ریزی (Ovulation) کہلاتا ہے۔ اس لئے بیضہ ریزی (Ovulation) کا نسل ہر (28) دنوں کے وقفہ سے واقع ہوتا ہے جس کو دور (Cycle) کہا جاتا ہے۔ لہذا ہر ماہ (ہر دور) میں صرف ایک ہی بیضہ پختہ ہو کر بیض دان سے خارج ہوتا ہے



شکل 9.6

بیض دان کی نسیجی ساخت

انڈے لے جانے والی نالی رجمی نالی (Uterine Tube) کو بیض قنات (Oviduct) اور فیلوپی نالی (Fallopian Tube) بھی کہا جاتا ہے۔ رجمی نالی (Uterine Tube) کی لمبائی 4 تا 5 انچ ہوتی ہے۔ یہ نالی راست طور پر بیض دان سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ نالی چار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

(a) قیف (Infundibulum)

یہ رجمی نالی کا آزاد سرا ہوتا ہے جو قیف نما ہوتا ہے جس میں ہڈے دار انگلی نما بے شمار سائیس پائی جاتی ہیں۔ یہ ہڈے بیض دان

سے جسمی کلمہ میں خارج ہونے والے بیضہ کو فیلوپی ٹالی میں داخل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

(b) فراخہ (Ampulla)

یہ ایک کشادہ حصہ ہے جو ٹالی کے دو تہائی حصہ پر مشتمل ہوتا ہے۔

(c) تنگٹانے (Isthmus)

یہ ٹالی کا مہین اور تنگ حصہ ہے جو رحم سے مربوط رہتا ہے۔

(d) دروں جدار کی حصہ (Intramural Portion)

یہ رگی دیوار (Uterine Wall) میں سے گزرنے والے کنال (Canal) کا تسلسلی حصہ ہوتا ہے۔ رگی ٹالی (Uterine Tube) بیضہ (Ovum) کو حاصل کرتی ہے اور رحم (Uterus) کو پہنچاتی ہے۔ دلوں جانب کی فیلوپی ٹالیاں درمیان میں مل کر رحم (Uterus) بناتی ہیں۔ یہ مثانہ (Bladder) اور معاء مستقیم (Rectum) کے درمیان موجود رہتا ہے۔ یہ کھوکھلا اور ناشپاتی عضو ہے جس کی لمبائی 3" ہوتی ہے۔ اس کی دیوار دبیز اور عضلاتی ہوتی ہے۔ یہ مہبل (Vagina) میں کھلتا ہے۔ اس کی دیوار میں پائی جانے والی پرتمیں بیض قنات کی دیوار کی پرتوں کی مماثلت ہی ہوتی ہیں لیکن انھیں مخصوص نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان پرتوں کو دروں رحم (Endometrium) (غشاء مخاطی Mucosa)، عضلی رحم (Myometrium) (عضلاتی طشاء Muscularis)، صفق رحم (Perimetrium) (غشاء رحم Serosa) کہا جاتا ہے۔ دروں رحم (Endometrium) مخصوص پرت ہے جس میں دوری (Cyclic) تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جس کو ماہواری دور (Menstrual Cycle) کہا جاتا ہے۔ عموماً عمر رسیدہ عورتوں میں یہ پرت بکثرت تحلیل ہو کر ضائع ہو جاتی ہے جس کے باعث ماہواری دور اختتام پزیر ہو جاتا ہے یعنی بند ہو جاتا ہے۔


مہبل (Vagina) ایک ریٹھی عضلاتی غلاف (پوشش) ہے۔ اس کا اوپری سراعق رحم (Uterine Cervix) کے ساتھ تسلسل قائم رکھتا ہے۔ اس کا نچلا سرا ایک عرضی حلقہ نما ساخت، بکارہ (Hymen) کے ذریعہ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ مہبل ایک عضلاتی راستہ ہے۔ یہ نر کے قضیب (Penis) سے منویوں (Sperms) کو حاصل کرنے والا حصول کنندہ ہوتا ہے اور نومولود کے پیدائش کے وقت تولیدی کنال (Birth Canal) کا کام انجام دیتا ہے۔

مہبل (Vagina)، فرج (Vulva) کے ذریعہ باہر کھلتا ہے۔ فرج (Vulva) میں لب کبیر (Greater Lips) اور لب صغیر (Lesser Lips) جانی طور پر پائے جاتے ہیں۔ لب کبیر (Greater Lips) کو فختین کبرا (Labia Majora) اور لب

صغیر (Lesser Lips) کو شحمین صغریٰ (Labia Minora) کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک اٹھل بولی تاسلی جوف ہوتا ہے جس کو دلیز (Vestibule) کہا جاتا ہے جس میں دلیزی غدود (Vestibular Glands) پائے جاتے ہیں جن کو بارتھولن (Bartholin) کے غدود کہا جاتا ہے۔ دلیز (Vestibule) میں مبال (Urethra) اور مبل (Vagina) کھلتے ہیں۔

3.2.1 بیضہ ریزی (Ovulation)

مورتوں میں مادہ تولیدی عضو کو بیض دان (Ovary) کہا جاتا ہے۔ بیض دان میں بیض خلیہ (Oocyte) نمو پاتا ہے۔ بیض خلیہ خلیوں کے قودے کے ذریعہ گہرا ہوا ہوتا ہے۔ ان خلیوں کو جرابی خلیے (Follicle Cells) کہا جاتا ہے۔ بیض خلیہ اور اس کو گھیرے ہوئے جرابی خلیے ایک ساخت بناتے ہیں جس کو گرابی جراب (Graffian Follicle) کہتے ہیں۔ بیض خلیہ کو ابتدائی بیض خلیہ (Primary Oocyte) کہتے ہیں جو بیضہ (Ovum) یا انڈے (Egg) میں تبدیل ہوتا ہے۔ بیض دان میں جراب کئی مراحل میں پائے جاتے ہیں یعنی ان میں غیر پختہ، پختہ اور درمیانی حالت کے جراب دکھائی دیتے ہیں۔ ہر دفعہ صرف ایک ہی جراب پختہ حالت میں ہوتا ہے جب بیضہ پختہ ہو جاتا ہے تو جراب پھٹ جاتا ہے اور بیضہ یا انڈا بیض دان سے جسمی کھلہ میں آزاد ہو جاتا ہے۔ جراب (Follicle) کا پھٹنا اور انڈے کا بیض دان سے آزاد ہونا بیضہ ریزی (Ovulation) کہلاتا ہے۔ انسان میں بیضہ ریزی کا عمل فطری طور پر بغیر ہر دنی تحریکات کے از خود واقع ہوتا ہے جس کو از خود بیضہ ریزی (Spontaneous Ovulation) کہا جاتا ہے۔



فصل 9.7

بیضہ ریزی

بیضہ ریزی کے دوران واقعات

- (1) گرابی جراب کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- (2) یہ بیض دان کی سطح کی جانب حرکت کرتے ہیں۔


- (3) بیضدان کی سطح پر وہ مقامات جس کے نیچے جراب پائے جاتے ہیں بھننی (Papilla) کی شکل میں ابھار کو ظاہر کرتے ہیں۔
- (4) یہ بھننی (Papilla) غیر وعادار (Avascular) بن جاتی ہے چوں کہ بھننی کو خون کی فراہمی مسدود ہو جاتی ہے۔
- (5) تب بھننی پھٹ جاتی ہے۔
- (6) انڈا معد جرابی سیال اور خون کی کچھ مقدار باہر خارج ہو جاتی ہے۔
- (7) پینٹا ہوا جراب ایک دروں افزائی غدود میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو جسم اصفر (Corpus Luteum) کہتے ہیں۔
- (8) جسم اصفر کا رنگ زرد ہوتا ہے زرد رنگ جرابی غلیوں میں کیرائٹینوئڈ (Carotenoid) مادے کے ذخیرہ ہونے سے ہوتا ہے۔
- (9) اگر انڈا بارور نہ کیا گیا ہو تب جسم اصفر تحلیل ہو جاتا ہے اور اتسالی بابت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو جسم

9.8 شکل

- (c) بیضہ کے باردور نہ ہونے پر جسم اصغر کا تحلیل ہو کر جسم ایض میں تبدیل ہوتا
- (10) جسم اصغر (Corpus Luteum) سے دو قسم کے ہارمونس ایسٹروجن (Oestrogen) اور پروگیسٹرون (Progesteron) افراز ہوتے ہیں جو مادہ جنسی ہارمونس کہلاتے ہیں۔


بیضہ ریزی پر ہارمونی کنٹرول (Hormonal Control of Ovulation)

بیضہ ریزی (Ovulation) کے دوران انڈے کا پختہ ہونا اور اس کا بیض دان (Ovary) سے خارج ہونا نغای غدد (Pituitary Gland) سے افراز ہونے والے ہارمونس (Hormones) کے زیر کنٹرول ہوتا ہے۔ ان ہارمونس میں جراب متحرک ہارمون (Follicle Stimulating Hormone) (FSH) اور اصغری ہارمون (لیوٹینیزنگ ہارمون) (Leutinizizing Hormone) (LH) شامل ہیں۔ FSH کے باعث جراب اور انڈے کا نہود واقع ہوتا ہے۔ LH بیض دان کو ایسٹروجن (Oestrogen) نامی ہارمون افراز کرنے کے لئے متحرک بناتا ہے۔ اس کے علاوہ LH جراب کو پختہ بنانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ LH ایسٹروجن کے تعادان سے جراب کوشش کرتا ہے اور بیضہ ریزی (Ovulation) کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جراب کو جسم اصغر میں تبدیل کرنے کے لئے تحریک بھی پیدا کرتا ہے۔




فصل 9.9

انسان میں بیض دان اور نغای غدد اور زیر غرض کے ہارمون کا کنٹرول



شکل 9.10
بیضہ ریزی پر بارہمی کنٹرول



شکل 9.11
انسانی پختہ بیضہ

3.2.2 ماہواری دور یا حیضی دور (Menstrual Cycle)

تمام عورتوں میں تولیدی اعضاء معین و قنوں پر متواتر یا دوری تبدیلیوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کو ماہواری دور یا حیضی دور (Menstrual Cycle) کہا جاتا ہے۔ یہ دور ایک واضح عمل حیض (Menstruation) یا (Menses) یا خون جاری ہوتا Bleeding کے نام سے ماخوذ ہے۔ حیض (Menstruation) سے مراد رحم (Uterus) سے خون، مخاط (Mucus) اور ناکارہ غلیوں کا مہل (Vagina) کے راستہ سے ایک ماہ کے وقفہ پر دوری (Periodic) اخراج ہے۔ حمل (Pregnancy) کی غیر موجودگی میں ہر ایک ماہواری دور کے اختتام پر حیض یا خون جاری ہوتا واقع ہوتا ہے۔ 10 تا 15 نارمل عورتوں میں ماہواری دور کا طول 28 ایام کا ہوتا ہے باقی عورتوں میں حیضی دور کی مدت 21 تا 35 دن تک مختلف ہوتی۔ کسی بھی عورت میں ماہواری دور کی مدت بالکل یہ طور پر باقاعدہ نہیں ہوتی ہے۔ 35 ایام کی مدت کے ماہواری دور کے بعد 21 ایام کی مدت کا ماہواری دور واقع ہوتا ہے۔

ماہواری دور کے مراحل (Phases of Menstrual Cycle)

سہولت کی خاطر ماہواری دور کو تین مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

- (1) تکثیری مرحلہ (Proliferative Phase)۔
- (2) پیش حیضی مرحلہ (Premenstrual Phase) یا افرازی مرحلہ (Secretory Phase)۔
- (3) تخریبی مرحلہ (Destructive Phase) یا حیض (Menses)۔

(1) تکثیری مرحلہ (Proliferative Phase)

یہ مرحلہ حیض (Menstruation) کے چھوٹے دن سے شروع ہوتا ہے اور نو دن تک جاری رہتا ہے۔ چھوٹے دن پر رحم کی دیوار کی جس کو حیض کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے مکمل طور پر مرمت ہوتی ہے۔ اس مرمت کے بعد تکثیری مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں رحم کی دیوار اچھائی پتی ہوتی ہے۔ تکثیری مرحلہ کے دوران حسب ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔

- (i) رحم کی سطح (Epithelium) کو خون کی فراہمی وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ سر مرحلہ کے غلیوں کی تعداد میں اضافہ خطی تقسیم کے باعث ہوتا ہے جس کی وجہ سے سر مرحلہ کی دبازت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
- (ii) بیض دان میں گرانی جراب (Graafian Follicle) مہیا ہوتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے۔
- (iii) چودھویں دن پر بیضہ ریزی (Ovulation) واقع ہوتی ہے۔ گرانی جراب پختہ ہے اور اوپر آزاد ہو جاتا ہے۔

بعض عورتوں میں اس دوران کسی قدر خون جاری ہو جاتا ہے جس کو مین حیضی خون کا جاری ہونا (Intermenstrual Bleeding) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تکثیری مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔

(2) پیش حیضی مرحلہ (Premenstrual Phase) یا افرازی مرحلہ (Secretory Phase)


یہ مرحلہ پندرہویں دن سے اٹھارویں دن تک واقع ہوتا ہے اور 14 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس مرحلہ کے دوران حسب ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔

- (i) رحم کی دیوار بتدریج دبیز ہو جاتی ہے اور کافی وعاء دار (Vascular) بن جاتی ہے۔
- (ii) رحمی غدود (Uterine Glands) لائے اور کافی مرغولہ نما ہو جاتے ہیں۔ یہ غدود زیادہ سے زیادہ مخاط (Mucus) کا فراز کرتے ہیں جس کو رحمی دودھ (Uterine Milk) کہا جاتا ہے۔ یہ رحمی دودھ رحم میں پائے جانے والے نشیب میں جمع ہو جاتا ہے اور نشوونما کے ابتدائی مرحلہ میں جنین (Embryo) کو تغذیہ فراہم کرنے کا فعل انجام دیتا ہے۔
- (iii) پچھلے ہوئے جراب (Follicle) میں زرد رنگ کے کیراٹینائڈ (Carotenoid) مادے ذخیرہ ہو جاتے ہیں اور جراب زرد رنگ کے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو جسم اصفر (Corpus Luteum) کہا جاتا ہے۔ اگر حمل واقع ہوتا ہے تو جسم اصفر قائم ہو جاتا ہے اور اگر حمل واقع نہیں ہوتا ہے تو جسم اصفر حیض سے چار دن قبل تحلیل ہو جاتا ہے اور اتصالی ہافت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو جسم ابیض (Corpus Albicans) کہا جاتا ہے۔

(3) تخریبی مرحلہ (Destructive Phase) یا حیض (Menses)

یہ مرحلہ حمل کی غیر موجودگی میں واقع ہوتا ہے اور پہلے دن سے پانچویں دن تک جاری رہتا ہے یعنی 5 تا 4 دن تک جاری ہے رہتا ہے۔ حیض کا جاری ہونا اس مرحلہ کی خاصیت ہے۔ رحم کی دیوار سے خارج ہونے والے حیض کے خون کے ساتھ مخاط اور تارہ عظیم شامل رہتے ہیں۔

ایک نارمل عورت میں ایک ماہواری دور میں تقریباً جملہ 50 تا 400 ملی لیٹر خون ضائع ہوتا ہے۔ حیض کے خون کا بہنا 4 دن تک جاری رہتا ہے لیکن یہ ایک ہفتہ تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔




شکل 9.12

ماہواری دور

3.2.3 باروری (Fertilization)

بیضہ (Ovum) فیلولپی ٹی (Fallopian Tube) کے درمیانی حصہ میں منویہ (Sperm) کے ذریعہ بارور ہوتا ہے۔ لہذا باروری اندرونی ہوتی ہے۔ مباشرت کے دوران منویہ مرد کے ذریعہ مہبل میں داخل کئے جاتے ہیں۔ منویہ دم کے ذریعہ حرکت کرتے ہوئے فیلولپی ٹی میں بیضہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ منویہ کا ایک گنا (Haploid) مرکزہ بیضہ (Ovum) میں داخل ہو کر بیضہ کے ایک گنا مرکزے سے مل جاتا ہے جس کے نتیجہ میں جنینہ (Zygote) حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو باروری کہتے ہیں۔ بیضہ کے بارور ہونے کے ساتھ ہی حمل (Pregnancy) کا دور شروع ہو جاتا ہے جس کو زمانہ حمل (Gestation Period) بھی کہا جاتا ہے۔ بارور شدہ بیضہ کی دیوار دیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے منویہ کے ذریعہ اس بیضہ کی دہری باروری انجام نہیں پاتی۔



شکل 9.16
منوبہ کا اڑے تک پہنچنا

جستہ میں شقائیت (Cleavage) باروری کے فوری بعد ہی شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں نہیض کیرہ
(Blastocyst) تشکیل پاتا ہے۔ نہیض کیرہ کے خلیوں کو نہیض پارے (Blastomeres) کہا جاتا ہے۔ نہیض کیرہ میں ایک درمیانی
کھلہ پایا جاتا ہے جس کو نہیض قعر (Blastocoel) کہا جاتا ہے۔ نہیض کیرہ فیلولی نالی سے گزرتے ہوئے رحم (Uterus) میں پہنچ جاتا




شکل 9.18

شکل 9.17

باروای۔ منوبہ اڑے کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں ان میں سے صرف بارواری کے بعد اڑے کی جھلی میں تبدیلیاں جس کے
ایک ہی منوبہ اڑے اٹھارہ میں سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوتا ہے۔ باعث حریر منوبہ اڑے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اڑے
میں داخل ہونے والا منوبہ مرکزہ کے ساتھ ضم ہو

نبہض کیسہ رحم کی دیوار میں دھنس جاتا ہے جس کو تنصیب (Implantation) کہا جاتا ہے۔ رحم کی دیواریں دبیز ہو جاتی ہیں جو نمو پانے والے جنین (Embryo) کے وزن کو برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ جنین کی جسامت میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے اور جنین کا نشوونما رحم میں ہی تکمیل پاتا ہے۔ زیرمو جنین کے اطراف دو اہم غشائیں تیار ہوتی ہیں جن کو سلتی (Chorion) اور آئیس (Amnion) کہا جاتا ہے۔ ان غشاؤں کو زائید جنسی غشائیں (Extra Embryonic Membranes) کہا جاتا ہے۔ سلتی (Chorion) کا تعلق رحم کی دیواروں سے قائم ہو جاتا ہے اور جنین کو مناسب مقدار میں مقویات فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سلتی جنین سے فاضل مادوں کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے۔ آئیس (Amnion) جنین کو گھیرے ہوئے رہتی ہے۔ جنین اور آئیس کے درمیان جگہ پائی جاتی ہے جس میں ایک سیال موجود رہتا ہے جس کو آئسی سیال (Amnionic Fluid) کہا جاتا ہے۔ آئیس اور آئسی سیال دونوں حفاظتی افعال انجام دیتے ہیں۔ یہ جنین کی میکاکی صدسوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ نمو کے دوران جنین کی جسامت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ آئیس کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیس اور آئسی سیال جنین کے اطراف بچے کے پیدا ہونے تک برقرار رہتے ہیں۔




شکل 9.16 فیلولی نالی اور رحم کی تراش جس میں باروری سے تنصیب تک تسلسلی مراحل دیکھے جاسکتے ہیں۔

جنین کے خلیے تین پرتوں یعنی برون ادمہ (Ectoderm)، میان ادمہ (Mesoderm) اور دروں ادمہ (Endoderm) میں ترتیب پاتے ہیں۔ ان پرتوں کو نابتی پرتیں (Germinal Layers) کہا جاتا ہے۔ ان ہی تینوں پرتوں سے جسم کے مختلف اعضاء نمونپاتے ہیں۔ حمل کے 12 دنوں کے بعد جنین کو مضغیہ (Foetus) کہا جاتا ہے اور 12 دنوں کے بعد سے ہی جسم کے اہم اعضاء کا نمون شروع ہوتا ہے لیکن حمل کے 6 ہفتوں بعد جنین کی جنس کی شناخت کی جاسکتی ہے۔

3.2.4 مشیمہ (Placenta)

حمل کے 12 ہفتوں بعد مضغیہ (Foetus) اور رحم کی دیوار کے درمیان ایک ساخت نمونپاتی ہے جس کو مشیمہ (Placenta) کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ مضغیہ (Foetus) ماں کے رحم کی دیوار سے جڑ جاتا ہے۔ مضغیہ اور رحم کی دیوار دونوں کے خلیوں سے تیار ہوتا ہے۔ جنین سے ایک سخت ڈور تیار ہوتی ہے جس کو نابتی ڈور (Umbilical Cord) کہا جاتا ہے جو رحم کی دیوار سے جڑی رہتی ہے۔ مشیمہ میں دموی دنائیں نمونپاتی ہیں جو رحم اور جنین کی دموی دناؤں سے مربوط ہو جاتی ہیں۔ ماں کے خون میں پائے جانے والے مقویات اور آکسیجن خون کے ساتھ مشیمہ کی دموی دناؤں میں سے گذرتے ہوئے مضغیہ (Foetus) کی دموی دناؤں میں داخل ہو جاتے ہیں اور مضغیہ کے تمام خلیوں میں خون کے ذریعہ پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں یہ تحولی تعاملات میں استعمال کر لئے جاتے ہیں۔




شکل 9.17
مشیمہ کی ساخت

3.2.5 حمل (Pregnancy)

جب ماں کے رحم میں جنین (Embryo) زیر نشوونما رہتا ہے تو اس حالت کو حمل کہا جاتا ہے اور ماں کو حاملہ کہتے ہیں۔ حمل کے


دوران ماں کے جسم میں کئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو حسب ذیل ہیں

- (i) رحم کی جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
- (ii) ماں کے جسم میں خون کا حجم 30 فی صد تک بڑھ جاتا ہے۔
- (iii) ماں کے قلب کی جسامت بڑھ جاتی ہے اور قلبی ماحصل (Cardiac Output) میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
- (iv) آکسیجن زیادہ مقدار میں صرف ہوتی ہے تاکہ زیر نشوونما جنین کی ضروریات کی تکمیل توفیقی بخش ہو سکے۔
- (v) پستانی غدود (Mammary Glands) نشوونما پاتے ہیں اور پستان کے جسم میں اضافہ ہوتا ہے۔
- (vi) حمل کی مدت انسانوں میں تقریباً 280 دن کی ہوتی ہے جب کہ اس کا حساب آخری حیضی دور کے پہلے دن سے لگایا جاتا ہے۔ اگر بیضہ بڑی (Ovulation) کے وقت سے حساب کیا جائے تو حمل کی مدت 266 تا 270 دن کی ہوتی ہے۔



حمل 9.18

رحم میں مغیہ



شکل 9.19


مضغیہ کی سلسلہ وار مراحل

حمل کی شناخت (Diagnosis of Pregnancy)

حمل کی شناخت ذیل کی خصوصیات یا علامتوں کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

- (i) میض کا بند ہونا۔
- (ii) پیٹ کی جسامت میں اضافہ۔
- (iii) متلی یا متلی کے بغیر قے کا آنا۔ عموماً چھنویں ہفتہ اور بارہویں ہفتہ کے درمیان قے کا آتا۔
- (iv) مضغیہ (Foetus) کی قلبی دھڑکن کی آواز کا مشاہدہ کرنا عموماً حمل کے سولہویں ہفتہ سے اٹھارویں ہفتہ تک مضغیہ کی قلبی دھڑکن قابل سماعت ہوتی ہے۔
- (v) سولہویں ہفتہ پر اشعاعی طریقہ (X-Ray Method) کے ذریعہ حمل کو پہچانا جاسکتا ہے۔
- (vi) ماں میں مضغیہ (Foetus) کی حرکت بآسانی محسوس کی جاسکتی ہے۔
- (vii) پیشاب کی جانچ کے ذریعہ پہلے ہفتہ میں حمل کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ حمل کے پہلے ہفتہ میں جین کے سلی (Chorion) سے ہارمونز افزا ہوتے ہیں جن کو گوریا نی گونیڈوٹروپینس (Chorionic Gonadotropins)

کہا جاتا ہے۔ ان ہارمونز کی تھوڑی مقدار حاملہ عورت کے پیشاب میں موجود رہتی ہے۔ پیشاب میں ان ہارمونز کی موجودگی کی جانچ تجربہ خانہ میں انجام دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر حمل کی شناخت کی جاسکتی ہے۔



حمل کا واقع ہونا اور ہارمون کے ذریعہ حمل کا برقرار رہنا

3.2.6 ماں کی نگہداشت (Mother Care)

حمل کے دوران حاملہ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ماں کی صحت پر بچہ کی صحت کا دارومدار رہتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بہتر غذا استعمال کرے۔ غذا جس میں پروٹینس، ویتامین (Vitamins) اور معدنیات (Minerals) کی وافر مقداریں پائی جاتی ہے بطور غذا نوش کرنا چاہیے۔ ماں کی غذاؤں میں ان غذائی اجزاء کی قلت بچہ کے نشوونما کو نہ صرف متاثر کرتی ہے بلکہ ان اجزاء کی قلعی بیماریوں

کا باعث بھی بنتی ہے۔ پروٹینس کے لئے دودھ، انڈے اور گوشت کو استعمال کرنا چاہیے جن کے پروٹینس زیر نشوونما بچہ کے لئے جسمانی تعمیراتی اجزاء مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیزترکاربوں کا بھی استعمال کثرت سے کرنا چاہیے کیوں کہ ان میں حیاتیات اور معدنیات بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران زنک (Zinc)، کیلشیم (Calcium) اور لوہے (Iron) کی گولیوں کو خصوصی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ دہائی پریشانیوں اور الجھنوں سے گریز کرنا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اکثر سے اپنی جانچ کرانی چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کرنا چاہیے۔


3.2.7 بچہ کی پیدائش (Child Birth)

حمل کی مدت کے اختتام پر تاسلی روزن کے ذریعہ رحم سے مفعیہ (Fetus) کو خارج کرنے کا عمل بچہ کی پیدائش (Birth) بچہ زانی یا زچگی (Parturition) کہلاتا ہے۔ پیدائش ایک پیچیدہ عمل ہے جو میکائیکل اور کیمیائی دونوں اقسام کے عوامل کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔ حمل کی مدت تقریباً 40 ہفتے ہوتی ہے جس کے دوران بچہ کی نشوونما مکمل ہو جاتی ہے۔

پیدائش کا عمل بچہ کی پیدائش سے چند گھنٹوں قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتداء درد (Labour Pain) سے ہوتی ہے جو رحم کی دیوار کے عضلاتی انقباض کے متواتر واقع ہونے کے سبب ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عضلاتی انقباض غیر ارادی فعل ہوتا ہے جو نخاعی غدد (Pituitary Gland) سے افراز ہونے والے آکسیٹوسن (Oxytocin) نامی ہارمون کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلیکسین (Relaxin) نامی مولدی ہارمون (Gonadal Hormone) نخاعی غدد اور مٹھے (Placenta) سے افراز ہوتا ہے۔ اس ہارمون کے زیر اثر عانی رباط (Pubic Ligament) کشادہ ہو جاتے ہیں اور پیدائش کے وقت راستہ میا کرتے ہیں جس کے باعث بچہ کی پیدائش میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ پیدائش سے کچھ دیر قبل افس (Amnion) پھٹ جاتی ہے اور افسی سیال جسم سے باہر خارج ہوتا ہے۔ مہبل (Vagina) اور صحن رحم (Uterine Cervix) کافی کشادہ ہو جاتے ہیں اور اس راستے کے ذریعہ بچہ کی ولادت بتدریج واقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچہ کا سر ظاہر ہوتا ہے۔ جب بچہ کا سر مہبل سے باہر نکل آتا ہے تو مٹھے (Placenta) کو کاٹ دیا جاتا ہے تاہم بچہ ماں کے رحم سے ثانی ذور (Umbilical Cord) کے ذریعہ جڑا رہتا ہے جس کو بعد میں کاٹ دیا جاتا ہے اور فوراً بچہ کو چند منٹوں میں باہر نکال لیا جاتا ہے۔ بچہ کو نکالنے میں تاخیر ہو جائے تو بچہ کی موت واقع ہو جاتی ہے کیوں کہ بچہ ماں سے مٹھے کے ذریعہ آکسیجن حاصل کرتا ہے اور مٹھے کو کاٹنے کے ساتھ ہی آکسیجن کی فراہمی رک جاتی ہے جو بچہ کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اس لئے مٹھے کو کاٹنے کے فوراً بعد بچہ کو باہر لے لیا جاتا ہے تا کہ بچہ ماحول سے آکسیجن کو حاصل کر سکے جو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے۔

مٹھے کو جب کاٹا جاتا ہے تو خون اور خون کے خمد مادے کافی مقدار میں خارج ہوتے ہیں بچہ کی پیدائش کے فوری بعد غلہ کیا گیا

مقیمہ نوروز انڈیا جینیٹکس کو خارج کر دیا جاتا ہے جس کو بعد پیدائشی بافت (After Birth Tissue) کہا جاتا ہے۔



9.25 عمل

بچہ کی پیدائش کے مراحل

حاصل کے دوران پروگیسٹیرون (Progesterone) اور ایسٹروجن (Oestrogen) نامی ہارمونز کی وجہ سے ماں میں پستانوں کی غدود (Mammary Glands) نمودار ہوتے ہیں۔ یہ غدود دودھ کو افرار کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن بچہ کی پیدائش کے بعد غذائی غدود سے افرار ہونے والے پرولکٹن (Prolactin) ہارمون کے زیر اثر پستانوں کی غدود سے دودھ افرار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے قبل پستانوں کی غدود سے دودھ افرار نہیں ہوتا کیونکہ پروگیسٹیرون اور ایسٹروجن ہارمونز کے ذریعہ پرولکٹن ہارمون کا افرار رک جاتا ہے۔ حمل کے اختتام پر پروگیسٹیرون اور ایسٹروجن ہارمونز کی مقدار میں کافی کمی واقع ہو جاتی ہے جو دودھ کے افرار کا باعث بنتی ہے۔

3.3 خاندانی منصوبہ بندی اور ضبط تولید (Family Planning and Birth Control)

عمومی نظریہ کے مطابق انسان کی خوشحال زندگی کے لئے خاندانی منصوبہ بندی (Family Planning) کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی سے مراد ایک خاندان کے افراد کی صحت اور فلاح و بہبود کو فروغ دینے کی خاطر سوچے یا غور و فکر کرنے اور زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے۔

دور حاضر کی بڑھتی ہوئی انسانی آبادی انسانی فلاح و بہبود کے لئے عظیم چیلنج ہے۔ آج دنیا کی آبادی تقریباً 400 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ اگر آبادی میں اضافہ کی شرح اسی طرح برقرار رہی تو اس صدی کے آخری چوتھائی حصہ میں دنیا کی آبادی 1500 تا 1800 کروڑ تک ہو جائے گی۔ اگر آبادی میں اسی شرح پر اضافہ کا موقع فراہم کیا جائے تو مستقبل میں انسانی نسل فائقہ کشی کے باعث معدومیت کے پتھرے میں قید ہو جائے گی۔ انسانی نسل کو قائم و دائم رکھنے کے لئے آبادی کی جسامت کو قابو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آبادی کی جسامت شرح اموات میں اضافہ یا شرح پیدائش میں کمی کے ذریعہ قابو میں رہتی ہے۔ ترقی پذیر طبی سائنسی اور انسانی قانون (Human Law) کی وجہ سے شرح اموات میں قابل لحاظ کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا آبادی کو قابو میں رکھنے کا واحد حل شرح پیدائش کو کم کرنا ہے۔ شرح پیدائش میں کمی ضبط تولید (Birth Control) کے ذریعہ ہی پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بچہ کا نشوونما بارور شدہ انڈے (Fertilized Egg) سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے منویہ کے ذریعہ انڈے کی باروری کو روکنا ہی ضبط تولید کا بہتر طریقہ ہے۔ بالفاظ دیگر حمل کو روکنا ہی ضبط تولید ہے۔

ضبط تولید کے لئے وجوہات

- (1) کیوبینی میں معیشت کے معیار کو برقرار رکھنا۔
- (2) رہائش کی عدم دستیابی۔
- (3) غذا کی قلت۔
- (4) بعض صورتوں میں حمل کا ماں کی صحت کے لئے مضرت ثابت ہوتا۔
- (5) جبکہ آپریشن کے بعد یا کمزوری کو دور کرنے کے لئے حمل میں عارضی تاخیر ضروری ہو۔
- (6) توافقیت ریسس (Rhesus Incompatibility) کی صورت میں جب حمل کی تعداد کو محدود کرنا ضروری ہو۔
- (7) اولاد کی بہتر نگہداشت۔

(8) قدرتی ذرائعوں کا بہتر طور پر استعمال۔

(9) ضبط تولید کے ہی ذریعہ ایک جوڑا اپنی محدود آمدنی اور رہائشی مقام کے تحت اولاد کی بہتر طور پر پرورش کے لئے اولاد کی مطلوبہ تعداد پیدا کر سکتا ہے۔

ضبط تولید کے طریقے (Mehtods of Birth Control)

دو طریقوں کے ذریعہ قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔

(a) اسقاطِ حمل (Abortion)


اس طریقہ میں حمل قائم ہونے کے بعد ادویات کے استعمال کے ذریعہ حمل کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کو اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ طریقہ ماں کی صحت کے لئے مضرت ثابت ہو سکتا ہے۔

(b) مانع بیضہ ریزی طریقہ (Contraceptive Method)

اس طریقہ کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں ماں کی صحت بھی محفوظ رہتی ہے۔ منویہ (Sperm) کے ذریعہ بیضہ (Ovum) کی باروری کو روکنا مانع بیضہ ریزی طریقہ (Contraceptive Method) کہلاتا ہے۔ باروری کو روکنے کے لئے کئی طریقے استعمال کئے جاتے ہیں جو ذیل میں مختصر بیان کئے گئے ہیں۔

(1) ہارمونی گولیوں کا استعمال جو بیضہ ریزی کو روکتا ہے۔


(2) مہمل میں منویہ کش ادویات (Spermicidal Drugs) رکھا جاتا ہے جو منویوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے جس کے باعث باروری انجام نہیں پاتی۔




شکل 9.22

مانع بیضہ ریزی ادویات


(3) دروں رگی آلات (Intrauterine Devices) کو رحم میں رکھا جاتا ہے جو منویوں کو پیئرنگ پہنچنے سے روکتے ہیں۔




فکل 9.31




فکل 9.30



فکل 9.34



فکل 9.33



فکل 9.32



فکل 9.35




فکل 9.34




فکل 9.35


فکل خبث تولید میں استعمال ہونے والے مختلف دروں رگی آلات:




9.40 شکل



9.39 شکل




9.36 شکل




9.44 شکل




9.45 شکل



9.41 شکل



9.44 شکل



9.44 شکل

شکل ضبط تولید میں استعمال ہونے والے مختلف درجہ آلات

4) بیضہ یزی (Ovulation) کے دنوں میں (یعنی باروری کے وقت Fertility Period) عورت اور مرد کا مباشرتی عمل سے گریز کرتا۔

5) مباشرتی عمل سے مکمل طور پر گریز کرتا۔


6) رنالہ کنڈوم (Condom) کو استعمال کرتا۔



شکل 9.45

کنڈوم کا استعمال

- 7) جراحی کے ذریعہ بیض دان کو نکال دینا۔
- 8) بستی ڈائفرام (Oclusive Diaphragms) کا استعمال کرتا۔
- 9) مردوں میں ادویات کے استعمال کے ذریعہ منویوں کی تیاری کو روکنا۔
- 10) آج کل بیضہ یزی کو روکنے کے لئے ٹیکوں (Vaccines) کی دریافت پر تحقیقات جاری ہیں۔
- 11) مانع حمل گولیوں کا استعمال جیسے Mala - D وغیرہ۔
- 12) جراحی کے طریقہ کے ذریعہ فیلوپی ٹی کو بند کرنا (Tubectomy)۔



فصل 9.46

عورت میں بیض قات کو جراحی کے ذریعہ بند کرنا (Tubectomy)


(13) صغی رحم پر کیپ کو ثبت کرنا جس کے باعث منویہ رحم میں داخل نہیں ہو سکتے۔



فصل 9.48

عورت کے صغی رحم پر کیپ کا استعمال

(14) مردوں میں قات ناقہ (Vasadeferentia) کو جراحی کے ذریعہ بند کرنا (Vasectomy)



مرد میں قات ناقہ کو جراحی کے ذریعہ بند کرنا (Vasectomy)

شکل 9.42

4 سبق کا خلاصہ

نر تولیدی نظام ایچے، منوی کیسہ، امدادی غدود، قاتی نظام اور قنیب پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسم کے باہر صفحہ (Scrotum) میں ایچے پائے جاتے ہیں جو منویہ بردار نالیچوں پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں زجنسی بارسن ہشواستیران (Testosterone) کی موجودگی میں منویے (Sperms) تیار ہوتے ہیں۔ ہر ایک منویہ سر، گردن، درمیانی ٹکڑا اور دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ منویے ایچے سے نکل کر برآرندہ قات سے گزرتے ہوئے برٹج (Epididymis) میں عارضی طور پر ذخیرہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے منویے قات ناقہ سے گزرتے ہوئے جسم سے باہر خارج کر دیئے جاتے ہیں۔ قداسیہ غدود، منوی کیسے، اور کادپرس کے غدود سے خارج ہونے والا سیال منی (Semen) کہلاتا ہے۔

مادہ تولیدی نظام ایک جوڑ بیض دان، فیلولی نالیوں، رحم اور مہبل پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیض دان میں بیض خلیہ نموپاتا ہے۔ ہر بیض دان کئی فیلولی نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر 28 or 30 دنوں میں ایک ہی جراب پختہ ہوتا ہے جس سے بیضہ جسی کہلہ میں خارج کیا جاتا ہے بیضہ فیلولی نالی میں داخل ہوتا ہے جہاں یہ منویہ کے ذریعہ بارور کیا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں جڈہ (Zygote) حاصل ہوتا ہے۔

۔ جراب کا پھٹنا اور انڈے کا بیض دان سے آزاد ہونا بیضہ ریزی (Ovulation) کہلاتا ہے۔

پہلا ہوا جراب ایک دروں افزائی غدود میں تبدیل ہوتا ہے جو جسم اصغر (Corpus Luteum) کہلاتا ہے۔ اگر انڈا بارور نہ کیا گیا ہو تو جسم اصغر تحلیل ہو کر جسم ابیض (Corpus Albicans) نامی اتصالی بافت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

جسم اصغر سے ایسٹروجن (Oestrogen) اور پروگیسٹیرون (Progesterone) نامی جنسی ہارمونز افزائے جاتے ہیں۔

بیضہ کے بارور ہونے کے ساتھ ہی حمل کا دور شروع ہو جاتا ہے جس کو (Gestation Period) کہا جاتا ہے۔

جست میں شکایت (Cleavage) کے نتیجے میں نہونی کیسہ (Blastocyst) تشکیل پاتا ہے جو رحم میں پہنچ جاتا ہے۔ نہونی کیسہ کا رحم کی دیوار میں دھنسا تعصب (Implantation) کہلاتا ہے۔ رحم میں نہونی کیسہ جنین (Embryo) کہلاتا ہے۔ رحم میں زیر نمونین کے اطراف زائد جنسی عظامیں (Extra Embryonic Membranes) نمودار ہوتی ہیں جن میں سلتی (Chorion) اور انفس (Amnion) شامل ہیں۔ حمل کے 12 ہفتوں کے بعد جنین کو مضغیہ (Foetus) کہا جاتا ہے۔ تب فیہ رحم کی دیوار سے متہ (Placenta) کے ذریعہ جڑ جاتا ہے۔ انسانوں میں حمل کی مدت 280 دنوں کی ہوتی ہے۔

حمل کے دوران حاملہ کو پروٹین، حیاتین، معدنیات کی وافر مقدار نوش کرانی چاہیے۔ زنگ، لوہے اور کیشیم کی گولیوں کا بھی استعمال ضروری ہوتا ہے۔ بچہ کی نشو و نما تقریباً حمل کے 40 ہفتے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔ بچہ کی پیدائش میں آکسی ٹوسن (Oxytocin) اور ریلیکزین (Relaxin) نامی ہارمونز اہم رول ادا کرتے ہیں۔ حمل کے دوران پروگیسٹیرون اور ایسٹروجن نامی ہارمونز کی وجہ سے ماں میں پستانوںی غدود نمودار ہوتے ہیں۔

بچہ کی پیدائش کے بعد خدائی غدود سے افزائے ہونے والے پرولکٹن (Prolactin) ہارمون کے زیر اثر پستانوںی غدود سے دودھ افزائے ہونا شروع ہوتا ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی سے مراد ایک خاندان کے افراد کی صحت اور فلاح و بہبود کو فروغ دینے کی خاطر سوچنے یا غور و فکر کرنے اور زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے۔ آبادی کو قابو میں رکھنے کا بہتر طریقہ ضبط تولید کے ذریعہ شرح پیدائش میں کمی کرنا ہے۔ حمل کو روکنا ہی ضبط تولید ہے ضبط تولید کو سادہ حمل اور مانع بیضہ ریزی طریقوں کے ذریعہ قابو میں رکھا جاتا ہے۔

انقطاع حیض (Menopause)

انقطاع حیض (Menopause) عورت کی زندگی کا ایسا دور ہے جس میں ماہواری دور اختتام پذیر ہو جاتا ہے بالفاظ دیگر انقطاع حیض (Menopause) عورت کی وہ مدت زندگی ہے جس میں ماہواری دور واقع نہیں ہوتا یعنی حیض کا خون جاری نہیں ہوتا اور نہ ہی بیضہ زائی کا عمل انجام پاتا ہے۔ عموماً 45 تا 50 سال کی عمر کے دوران انقطاع حیض کا مرحلہ فطری طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ بعض عورتوں میں یہ مرحلہ اس عمر سے قبل یا بعد میں بھی واقع ہوتا ہے۔ انقطاع حیض (Menopause) کے دوران بیض دان (Ovaries) میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں خاص کر اس کی جسامت میں کمی واقع ہوتی ہے اور گرانی جراثیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ بیضہ تیار نہیں ہوتا۔ لہذا اس مدت کے دوران حمل واقع نہیں ہوتا۔ انقطاع حیض میں جسمانی، فعلیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو بسا اوقات باعث تکلیف ہوتی ہیں۔

فرہنگ 6

Acrosome	اکروزوم	سرجم	منویہ (Sperm) کا سب سے اگلا حصہ
Amnion	امنیان	الہس	جنین (Embryo) کو گھیرے ہوئی سب سے اندرونی پرت۔
Ampulla	امپولا	فراخہ	ایک کنال یا تالی کا کیسہ نما حصہ۔
Blastocoel	بلاستوکیل	نبوضی قعر	نبوضیہ (Blastula) میں پایا جانے والا کھلہ۔
Blastomere	بلاستومیر	نبوضی پارے	شکایت (Cleavage) کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے خلیے۔ ہارور شدہ انڈے میں جنمیلی تقسیم کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے دختر خلیے نبوضی پارے کہلاتے ہیں۔

Chorion	کوریان	سللی	جنین (Embryo) کو گھیرے ہوئی بیرونی غشاء۔
Corpus Albicans	کارپس البیکانس	جسم ابیض	بیض دان میں سفید رنگ کا جسم۔ جراب (Follicle) جس سے بیضہ خارج ہو جانے کے بعد سفید رنگ کے تودہ (جسم) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
Corpus Luteum	کارپس لوتیم	جسم اصفر	بیض دان میں زرد رنگ کا جسم۔ جراب جس سے بیضہ خارج ہونے کے بعد زرد رنگ کے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
Diploid	ڈیپلائڈ	دو گنا	لونی اجسام کے دو سیٹس (Sets) یعنی بارور شدہ بیضہ اور تمام خلیوں میں سوائے ناتقی خلیوں (Germ Cells) کے لونی اجسام کی مکمل تعداد۔
Endometrium	اینڈومیٹریم	دروں رحم	رحم (Uterus) کی اندرونی پرت۔
Epididymis	اپیڈائیڈیمس	اغدیڈوس	مخاطی غشاء۔ قات کا اگلا مرغولہ نما حصہ جس میں منویہ ذخیرہ کئے جاتے ہیں۔
Fertilization	فرٹلائزیشن	باروری	نر اور مادہ زواجوں کا ملاپ یعنی منویہ اور بیضہ کا ملاپ۔
Foetus	فوئٹس	مضغیہ	رحم میں نمو پانے والا جنین (Embryo)۔
Haploid	ہیپلائڈ	یک گنا	لونی اجسام کا ایک سیٹ جو ناتقی خلیوں یعنی منویہ اور بیضہ میں موجود ہوتا ہے۔

Hilus	ہیلس	ہالچہ	
Hymen	ہائمن	پردہ بکارت	ایک پتلی جھلی جو مہبل کے روزن پر پائی جاتی ہے۔ یہ عورت کے اندرونی اور بیرونی جنسی اعضاء کو جزوی طور پر علیحدہ کرتی ہے۔
Implantation	ایمپلائنٹیشن	تخصیب	دہ عمل جس کے ذریعہ رحمی دروں رحم (Uterine Endometrium) میں ابتدائی نوخیز جنین (Young Embryo) دھنسی ہوئی حالت میں رہتا ہے۔
infundibulum	انفرنڈیبولم	قیف	قیف نما ساخت یا راستہ۔
Interstitial	انٹراستیشیل	بین درزی	کسی حصہ یا جگہ سے متعلق۔
Interstitial Cells	انٹراستیشیل سیلر	بین درزی خلیے	کسی جگہ میں پائے جانے والے خلیے۔
Isthmus	اسٹمس	ٹنگٹائے	کسی عضو کے دو بڑے حصوں یا تشریحاتی حصوں کو جوڑنے والی ٹنگ پٹی۔
Ligament	لیگمنٹ	رہاٹ	دو ہڈیوں کو جوڑنے والی سخت ریشمی ہافٹ کی پٹی یا پرت۔
Menstruation		ماہواری یا حیض	رحم سے دوری اخراج (Periodic Discharge)۔
Mesometrium	میزومیٹریئم	عصلی رحم	رحم کی درمیانی عضلاتی پرت۔
Mesovarium	میزووریئم	ماساریٹا میٹن	بیض دان کو ظہری شکمی دیوار یا کسی عضو سے جوڑنے والی درمیانی طہاء۔

Oviduct	اوڈیکٹ	بیض قنات	قنات یا نالی جس میں سے بیضہ نزلتا ہے یا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔
Ovulation	اولیشن	بیضہ زائے	بیض دان سے بیضہ کا خارج ہونا۔
Pelvic	پیلویک	عانی	کمر سے متعلق۔
Perimetrium	پیریمیٹریئم	دفاق رحم	رحم کے اطراف کا غلاف۔
Placenta	پلازینٹا	مشیمہ	رحمی (Uterine) دیوار سے مضغیہ (Foetus) کو مربوط کرنے والا چپنا مضغیہ ماں اور مضغیہ کے درمیانی فعلیاتی ربط۔
Pubic Bone	پوبیک ہون	عانی ہڈی	عانی گھیرے کی ہڈی۔
Pubic Ligament	پوبیک لیگامینٹ	عانی رباط	عانی ہڈیوں کو جوڑنے والی سخت ریشمی بافت۔
Prostate gland	پروٹسٹیٹ گلائنڈ	قد امیہ غدہ	نر تولیدی اعضاء سے متعلق غدہ۔ نرمبال (Male Urethra) کے ابتدائی حصہ کو گھیرا ہوا غدہ دی جسم۔
Scrotum	اسکروٹم	صفن	نر میں اٹیوں (Testes) کو گھیری ہوئی جھلی
Seminal Vesicle	سیمیئل و سیگل	منوی کیسہ	پشانیوں میں منوی سیال کو تیار کرنے والا غدہ۔ ادنی حیوانات میں منویوں کو ذخیرہ کرنے والا مضغیہ۔

منویہ بردار تالیے	نر لگیہ (Testis) میں مرغولہ نرقا قاقم جس	Seminiferous	
	میں منویہ (Sperms) قیار هوتے ہیں۔	Tubules	
اسپر میٹو جنسیس	منویہ زائی	Spermatogenesis	لقیہ میں منویہ کی قیاری کا عمل۔
اسٹروما ٹیسٹس	اساسی نسج لگیہ	Stroma Testis	نر تولیدی غدود (مولودہ) جس میں منویہ (Sperms) قیار هوتے ہیں۔
امبیلیکل کارڈ	ثانی ذور	Umbilical Cord	پستانوں میں ذور کے مانند ربط یا جوڑ جو جنین اور رحم کی دیوار کے درمیان موجود هوتا ہے جس میں دموی وعائیں اور اتصالی باذت موجود هوتے ہیں۔
یوریتھرا	مہال	Urethra	پستانوں میں پائی جانے والی نالی جو مثانہ سے پیشاب کو باہر لاتی ہے۔
یوٹیرس	رحم	Uterus	عضوہ جس میں جنین نشوونما پاتا ہے۔
یوٹیرائن سرویکس	عسق رحم	Uterine Cervix	رحم کا گردن نما روزن۔
وجائنا	مہبل	Vagina	مادہ پستانوں میں نالی جو رحم کو باہر کھولتی ہے۔
ویسٹیبول	دلہیز	Vestibule	کسی عضوہ کے روزن کا اگلا حصہ۔

نمونہ امتحانی سوالات 7

7.1 مختصر جوابی سوالات

(1) لگیہ (Testis) میں منویہ (Sperms) کس طرح قیار هوتے ہیں؟

- (2) منویہ کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟
- (3) لہجہ کے کن غلیوں سے ٹسٹوسٹیرون (Testosterone) نامی نر جنسی ہارمون کا افراز عمل میں آتا ہے؟
- (4) منویہ کی حرکت کے لئے درکار توانائی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟
- (5) منی سیال (Seminal fluid) یا منی (Semen) کو نئے عدد سے افراز ہوتا ہے اور اس کے افعال کیا ہیں؟
- (6) بیضہ ریزی (Ovulation) سے کیا مراد ہے؟
- (7) جسم اصغر (Corpus Luteum) کیا ہے؟ اس سے کون سے ہارمون افراز دیتے ہیں؟
- (8) خٹائی عدد (Pituitary Gland) سے افراز ہونے والے وہ کون سے ہارمون ہیں جو بیضہ ریزی کو کنٹرول کرتے ہیں؟
- (9) زائد جنسی خشاکیں (Extra Embryonic Membranes) سے کیا مراد ہے؟ ان خشاکیں کے نام لکھئے۔
- (10) پستانوی عدد (Mammary Glands) کسی طرح نمونپاتے ہیں اور دودھ کو افراز کرتے ہیں۔

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) نر تولیدی نظام کو بیان کیجئے۔
- (2) مادہ تولیدی نظام کو بیان کیجئے۔
- (3) بیضہ ریزی (Ovulation) کس طرح واقع ہوتی ہے؟ بیضہ ریزی کے دوران واقع ہونے والے واقعات کی فہرست مرتب کیجئے۔
- (4) ماہوانی دور سے کیا مراد ہے؟ اس دور کے مختلف مراحل کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (5) باروری (Fertilization) سے کیا مراد ہے؟ باروری کے بعد جنین کا نشوونما کس طرح واقع ہوتا ہے؟
- (6) مٹمہ (Placenta) سے کیا مراد ہے؟ یہ مٹمہ (Foetus) کے نمون کس طرح مدد کرتا ہے؟
- (7) حمل کی شناخت کن علامتوں کے ذریعہ کی جاتی ہے؟ بیان کیجئے۔
- (8) بچہ کی پیدائش پر ایک نوٹ لکھئے۔
- (9) خاندانی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت کو واضح کیجئے۔
- (10) ضبط تولید کے لئے وجوہات اور ضبط تولید کے مختلف طریقے بیان کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

- (1) منویہ کی تیاری کا عمل _____ کہلاتا ہے۔
- (2) منویہ کا _____ حصہ باروری کے عمل میں مدد کرتا ہے۔
- (3) منویہ میں بیضہ کو بارور کرنے کی قوت میں _____ پہنچنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔
- (4) باروری کا عمل _____ میں انجام پاتا ہے۔
- (5) بیض خلیہ اور اس کو گھیرے ہوئے خلیے ایک ساخت بناتے ہیں جس کو _____ کہتے ہیں۔
- (6) بیض خلیہ کو _____ کہا جاتا ہے جو بیضہ یا اڈے میں تبدیل ہوتا ہے۔
- (7) اڈا بارور نے کیا گیا ہو تو جسم امنر تحلیل ہو کر _____ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- (8) جفتہ میں شناخت (Cleavage) کے نتیجہ میں _____ تشکیل پاتا ہے۔
- (9) حمل کے بارہ ہفتوں کے بعد جنین کو _____ کہا جاتا ہے۔
- (10) حمل کے _____ ہفتوں بعد جنین کی جنس (Sex) کی شناخت کی جاسکتی ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) منویہ میں لونی اجسام کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟
 (a) 23 (b) 46 (c) 22 (d) 44
- (2) لٹھیہ میں پائے جانے والے کو نے مخصوص خلیے منویوں کو تغذیہ فراہم کرتے ہیں؟
 (a) لائیڈیگ خلیے (Lydig Cells) (b) سرٹولی خلیے (Sertoli Cells)
 (c) ناتی خلیے (d) امدادی غدودی خلیے
- (3) زجنسی ہارمونز کو نے خلیے افزا کرتے ہیں؟
 (a) لائیڈیگ خلیے (b) سرٹولی خلیے (c) ناتی خلیے (d) قدامیہ غدود
- (4) لٹھیہ کی پشت پر پائی جانے والی سرغول نما تالی کیا کہلاتی ہے؟

(a) قاتل قتلہ (b) منوی کیسے (c) مہال (d) اندید دس
(5) رحم کا مچلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟

(a) بیض تالی (b) فیلولی تالی
(c) سرویکس (Cervix) (d) مہیل (Vagina)
(6) بیض خلیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟

(a) بیضہ (b) ابتدائی بیض خلیہ (c) جرابی خلیہ (d) جھڑ
(7) بیضہ بڑی حیض کے کونسے دن واقع ہوتی ہے؟

(a) چھٹویں دن (b) چودھویں دن (c) نویں دن (d) پہلے دن
(8) رچی دودھ کیا ہے؟

(a) رچی غدود سے افراز ہونے والا مخاط (b) پستانوی غدود سے افراز ہونے والا دودھ
(c) انفسی سیال

(9) جنین سے تیار ہونے والی سخت ڈور جو رحم کی دیوار سے جڑی رہتی ہے کیا کہلاتی ہے؟

(a) تانی ڈور (Umbilical Cord) (b) انس (Amnion)
(c) تانی پرت (d) بیض تالی (Oviduct)

(10) جسم اصفر ماہواری دور کے کس مرحلہ میں ظاہر ہوتا ہے؟

(a) تخزیمی مرحلہ (b) پیش حیضی مرحلہ
(c) بکھیری مرحلہ

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

B

A

() نہوضی پارے

(1) جسم اصفر

() جراب کو جسم اصفر میں تبدیل کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے

(2) بکھیری مرحلہ

- (3) بیضہ کی باروری () رحم کی دیوار کا عضلاتی انقباض
- (4) نہپوشی کیسے کے غلیے () گرمائی جراب نمو پانے کا مرحلہ
- (5) FSH () کوریانی گوناڈوٹروپس
- (6) LH () کیرائٹائیز
- (7) حمل کی شناخت () جراب اور انڈے کا نمو پانا
- (8) آکسی ٹوسن ہارمون () فیلوپی نالی
- (9) ریلیکزیوین ہارمون () مانع بیضہ ریزی طریقہ
- (10) منویہ کے ذریعہ بیضہ کی باروری کو روکنا () عانی رباط (Pubic Ligament) کی کشادگی

سبق 10 انسانی عصبی نظام (Human Nervous System)

سبق کا خاکہ	1
تمہید	2
سبق کا متن	3
3.1 عصبی نظام کا تعارف	
3.2 عصبی نظام کا ظہور	
3.2.1 عصبیہ	
3.2.2 اعصاب	
3.2.3 عصبی ہافت سے متعلقہ خلیے	
3.3 مرکزی عصبی نظام	
3.4 محیطی عصبی نظام	
3.5 معکوسی عمل اور معکوسی کمان	
3.5.1 معکوسی عمل کی درجہ بندی	
سبق کا خلاصہ	4
زائد معلومات	5
فرہنگ اصطلاحات	6
نمونہ امتحانی سوالات	7
7.1 مختصر جوابی سوالات	

7.2 طویل جوابی سوالات

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

سبق کا خاکہ 1

اس سبق میں آپ درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ عصبی نظام کا تعارف
- ☆ عصبی نظام کے اجزائے ترکیبی
- ☆ مرکزی اور محیطی عصبی نظام
- ☆ سکوسی عمل اور سکوسی کمان

2 تمہید


پچھلے سبق میں آپ انسانی تولیدی نظام کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ انسانی عصبی نظام سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جس کو آپ انسان کے ارد گرد ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے علاوہ جسم کے اندر واقع ہونے والی تبدیلیوں کے لئے رد عمل کو ظاہر کرنے کے لئے ضروری سمجھتے ہیں اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ عصبی نظام کی تنظیم کس طرح واقع ہوتی ہے۔ یہ کس طرح اطلاعات کو حاصل کرتا ہے اور دماغ کو پہنچاتا ہے اور کس طرح یہ جسم کے مختلف اعضاء کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھنے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔

سبق کا متن 3

3.1 عصبی نظام کا تعارف

جاندار خلیے مختلف اقسام کے تحریکات کے لئے نہ صرف رد عمل کو ظاہر کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں بلکہ ان تحریکات کو ایک خلیہ سے دوسرے خلیوں تک پہنچانے میں کلیدی رول ادا کرتے ہیں جس کے بغیر مختلف اعضاء کے درمیان ہم آہنگی ہم ارتباط قائم رکھنا ناممکن ہے۔ کثیر خلوی حیوانات بشمول انسان میں بعض تخصیصی خلیے ارتقاء کے نتیجہ میں نمودار پائے جاتے ہیں جو ان تحریکات (Stimuli) کو حاصل کرتے ہیں اور رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان ہی خلیوں اور بانٹوں سے ایک نظام تشکیل پاتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں کی کارکردگی کو باقاعدہ بناتا ہے اور ان کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھتا ہے اور

انہیں قابو میں رکھتا ہے۔ اسی نظام کو عصبی نظام کہا جاتا ہے جو دماغ (Brain) 'نخاعی ڈور (Spinal Cord)' عصبی اعصاب (Peripheral Nerves) اور خود کار اعصاب (Autonomic Nerves) جو مختلف جسمی اعضاء کو مصیبت فراہم کرتے ہیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ عصبی نظام جسمی وزن کے تقریباً 2.4% حصے پر مشتمل ہوتا ہے۔



شکل 10.1

انسانی عصبی نظام

عصبی نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(1) مرکزی عصبی نظام (Central Nervous System) جو دماغ (Brain) اور نخاعی ڈور (Spinal Cord) پر مشتمل


ہوتا ہے۔

(2) محیطی عصبی نظام (Peripheral Nervous System) دماغی اعصاب (Cranial Nerves) اور نخاعی اعصاب

(Spinal Nerves) پر مشتمل ہوتا ہے۔


(3) خود کار عصبی نظام (Autonomic Nervous System) جو زمشار کی اعصاب (Parasympathetic

Nerves) اور زمشار کی اعصاب (Sympathetic Nerves) پر مشتمل ہوتا ہے۔




شکل 10.2

عصبی نظام کے حصے



شکل 10.3

مرکزی عصبی نظام



شکل 10.4

خود کار عصبی نظام

عصبی نظام مخصوص عصبی بافتوں (Nervous Tissues) سے تشکیل پاتا ہے جو جنینی بروں اور Embryonic

(Ectoderm) سے سو پاتی ہیں۔ عصبی بافتیں حسی اور غیر حسی خلیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ حسی عصبی بافتوں میں مصلیے


(Neurons) اور اعصاب (Nerves) شامل کیے جاتے ہیں جو مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ غیر حسی عصبی بافتوں میں عصبی

افرازی خلیے (Neurosecretory Cells) بر غلیفہ خلیے (Ependymal Cells) اور سریش خلیے (Neuroglia) شامل کئے

جاتے ہیں۔ عصبی بافتوں کو اس سبق میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

عصبی نظام تین حصوں یعنی دماغ (Brain)، نخاعی ڈور (Spinal Cord) اور اعصاب (Nerves) پر مشتمل ہوتا ہے۔

دماغ عصبی نظام کا ایک اہم مرکز ہے جو اطلاعات کو حاصل کرتا، تجزیہ کرتا ہے اور رد عمل کو پیدا کرتا ہے۔




شکل 10.5

بیرونی پیمائش کا حصلہ عضو کے ذریعہ حاصل کرنا اور دماغ تک پہنچانا جہاں سے رد عمل کے لئے آثر عضو کو ارسال کرنا

نفاذی ڈور ٹیلیفون اس کیجی یار لیے سنٹر (Relay Centre) کی طرح کام کرتی ہے کیونکہ یہ دماغ سے اطلاعات کو حاصل کرتی ہے اور انھیں متعلقہ اعضاء کو پہنچا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ معکوس عمل (Reflex Action) کو انجام دینے کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے۔

اعصاب ٹیلیفون کے تاروں کی مانند کام انجام دیتے ہیں جو اطلاعات کو مختلف اعضاء سے دماغ اور نغماہی ڈور کو پہنچاتے ہیں اور دماغ اور نغماہی ڈور سے اطلاعات کو حاصل کر کے جسم کے مختلف اعضاء کو پہنچا دیتے ہیں۔



10.6 فصل

ہیجان کا دماغ سے دو عصبانوں کے ذریعہ عضلہ کو ارسال

3.2 عصبی نظام کا ظہور


آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ عضویوں میں زندگی کی سرگرمیوں کو بہتر طور پر انجام دینے اور زندہ رہنے کے لئے جسم کے مختلف اعضاء کے درمیان ضبط اور ہم ارتباط ضروری ہے جس کو دو طریقوں کے ذریعہ پیدا کیا جاتا ہے (1) کییمیائی ہم ارتباط اور (2) عصبی ہم ارتباط (Nervous Coordination)۔ کییمیائی ہم ارتباط دروں افزائی خود سے

افراز ہونے والے ہارمونس کے ذریعہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کثیر خلوی حیوانات (Multicellular Animals) میں دروں افزائی غدود (Endocrine Glands) جسم کے اندر گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ جسم کے باہر ماحول میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ ان تبدیلیوں کے لئے رد عمل کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس لئے کثیر خلوی حیوانات میں بیرونی ماحول میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرنے اور اس کے رد عمل کو ظاہر کرنے کے لئے مختلف اعضاء کے درمیان ہم ارتباط (Co-Ordination) کو پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرا نظام ظہور میں آیا جس کو عصبی نظام (Nervous System) کہا جاتا ہے۔ عصبی نظام جسم کے بیرونی اور اندرونی دونوں ماحول میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرنے کے قابل ہوتا ہے اور بہتر طور پر جسم کے تمام افعال کو قابو میں رکھتا ہے اور ان تمام قسم کی تبدیلیوں کے لئے رد عمل کو ظاہر کر سکتا ہے۔ عصبی نظام ان تبدیلیوں کو مخصوص قسم کے خلیوں کے ذریعہ محسوس کرتا ہے جن کو مصلی خلیے (Receptor Cells) کہا جاتا ہے۔ عصبی نظام ان اطلاعات کو برقی رو کی شکل میں عضلات اور غدود تک کافی تیز رفتاری سے پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ عصبی نظام ان اطلاعات کو محفوظ بھی رکھتا ہے جو مستقل میں استعمال کی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جسم میں پن جھنسی ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا آگ میں جلنے کی خاموش پائی جاتی ہے جس کو معلوم کرنے کے لئے ہر دفعہ جسم میں پن جھونے یا آگ کو چھونے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی مرتبہ پن کا چھوٹا یا آگ کا چھوٹا کافی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اطلاعات عصبی نظام میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔

3.2.1 عصبانیہ (Neurons)

عصبی خلیہ کو عصبانیہ (Neuron) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک عصبانیہ (Neuron) ایک بڑے خلوی جسم اور زائندوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خلوی جسم کو خلویہ (Cyton) یا گردنات (Perikaryon) یا جسم (Soma) کہا جاتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے خلیہ مایہ (Cytoplasm) کو عصبی مایہ (نوروپلازم Neuroplasm) کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی دھاکہ نما عصبی ریشمیں (Neurofibrils)، توڑے (Mitochondria)، گلی اقسام (Golgi Bodies)، رائبوزومس (Ribosomes)، لائسوزومس (Lysosomes)، غیر ہموار یا دانے دار دروں مائی جال (Rough or Granular Endoplasmic Reticulum)، کئی چھوٹے دانے نسل کے دانے (Nissle's Granules) اور درمیانی بڑا مرکزہ پائے جاتے ہیں۔ خلوی جسم، خلویہ (Cyton) سے دو قسم کے نخرائی (Protoplasmic) زائندے نکلتے ہیں۔ کافی لائے اسطوانہ نما

زانکے کو محوریہ (Axon) اور چھوٹے شاخدار زانکوں کو شجرینے (Dendrites) کہا جاتا ہے۔ محوریہ اور شجرینے کے اختتامی سرے پر شاخوں کا کچھا پایا جاتا ہے جس کو اختتامی شجرینے (Telodendrites) یا راسی شجرینے (Terminal Arborizations) کہا جاتا ہے۔ ان کے چھوٹے ہوئے سرے کو معافاتی گانٹھ (Synaptic Knob) کہا جاتا ہے۔




فصل 10.7

مصہانیہ کی ساخت


ایک مصہانیہ (Neuron) کے محوریہ (Axon) کا سر اور دوسرے مصہانیہ کے شجرینے (Dendrite) سے راست جڑا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس کے درمیان خالی جگہ پائی جاتی ہے جس کو معافہ (Synapse) کہا جاتا ہے۔ معافہ فعلیاتی طور پر ایک مصہانیہ کا دوسرے مصہانیہ کے ساتھ کیمیائی اشیاء کے ذریعہ ربط قائم رکھتا ہے۔ محوریہ کے سرے کے معافاتی گانٹھ میں پائے جانے والے معافاتی کیسوں (Synaptic Vesicles) سے ایسٹائل کولین (Acetylcholine) نامی کیمیائی پیام رساں

(Chemical Messenger) معاقتہ (Synapse) میں خارج ہوتا ہے اور دوسرے عصبانیہ کے سرے کو متحرک کرتا ہے جس کے باعث پہچان (Impulse) ایک عصبانیہ سے دوسرے عصبانیہ میں منتقل ہوتا ہے۔



شکل 10.8

معاقتہ (Synaps)



شکل 10.9

معاقتہ کی ترسیل


محوریہ کے اطراف شحمی مادوں سے بنا ہوا غلاف پایا جاتا ہے جس کو نخاعی غلاف (Myelin Sheath) کہا جاتا ہے۔ اس غلاف کے اطراف ایک پتلی پرت پائی جاتی ہے جس کو عصبی غشاء (Neurilemma) کہا جاتا ہے۔ نخاعی غشاء شوان خلیہ (Schwann Cell) کے اطراف پائی جاتی ہے۔ یہ خلیے ایک دوسرے کے سروں سے جڑے رہتے ہیں۔ محوریہ کے بعض نقاط پر نخاعی غلاف غیر موجود ہوتا ہے۔ ان نقاط کو رانویئر کے کراںب (Nodes of Ranvier) کہا جاتا ہے۔

نخاعی غلاف کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بنیاد پر عصبی ریشے (Nerve Fibres) دو اقسام کے ہوتے ہیں۔

i نخاعی غلاف دار ریشے (Myelinated Fibres)


ii غیر نخاعی غلاف دار ریشے (Non-Myelinated Fibres)

نخاعی غلاف دار ریشے دماغ، نخاعی ڈور اور نخاعی اعصاب میں پائے جاتے ہیں جب کہ غیر نخاعی غلاف دار ریشے مشاعر کی (Sympathetic) عصبی نظام میں پائے جاتے ہیں۔




شکل 10.12

غیر نخاعی غلاف دار عصبی ریشہ



شکل 10.11

نخاعی غلاف دار عصبی ریشہ
ساخت کو ظاہر کرتا ہوا۔



شکل 10.10

نخاعی غلاف دار عصبی ریشہ

عصبی زائندوں کی اساس پر عصبانیوں کی اقسام

عصبانیہ پر پائے جانے والے نژدائی زائندوں (Protoplasmic Processes) کی اساس پر عصبانیہ چار اقسام کے ہوتے ہیں۔

(1) غیر قطبی (Non-Polar) یا غیر مقطب (Unpolarised) عصبانیہ

(2) یک قطبی (Unipolar) عصبانیہ


(3) دو قطبی (Bipolar) عصبانیہ

(4) کثیر قطبی (Multipolar) عصبانیہ

(1) غیر قطبی (Non-Polar) یا غیر مقطب (Unpolarised) عصبانیہ

ایسے عصبانیہ (Neurons) جن میں کئی زائندے پائے جاتے ہیں لیکن ان میں فعلیاتی طور پر تفریق نہیں کی جاسکتی غیر

قطبی (Non-Polar) یا غیر مقطب (Unpolarised) عصبانیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً ہائیڈرا (Hydra) میں پائے جانے والے عصبانیہ



شکل 10.13

غیر قطبی عصبانیہ

(2) یک قطبی (Unipolar) عصبانیہ

اس قسم کے عصبانیہ میں صرف واحد زائندہ پایا جاتا ہے جو دو شاخوں میں تقسیم ہو کر محوریہ (Axon) اور شجرینہ

(Dendrite) بناتا ہے۔ اس قسم کا عصبانیہ نخاعی اعصاب کے ظہری جڑ عقدے (Dorsal Root Ganglia) 'غیر جلیوں

(Non Chordates) اور جلیوں (Chordates) کے جنین (Embryoes) میں پایا جاتا ہے۔



فکل 10.14

یک قطبی عصبانہ

(3) دو قطبی (Bipolar) عصبانہ

ایسا عصبانہ جس میں ایک محورہ (Axon) اور ایک شجرہ (Dendrite) عصبی غلوہ (Cyton) پر مخالف جانب پائے

جاتے ہیں دو قطبی عصبیہ (Bipolar Neurons) کہلاتے ہیں آنکھ کی اندرونی پرت شبکیہ (Retina) شمی سر علمہ

(Olfactory Epithelium) اور قوقی عقدہ (Cochlear Ganglia) میں دو قطبی عصبیہ پائے جاتے ہیں۔




فکل 10.15

دو قطبی عصبانہ

(4) کثیر قطبی (Multipolar) عصبانہ

اس قسم کے عصبانہ میں ایک محور یہ (Axon) اور کئی شجرینے (Dendrites) پائے جاتے ہیں۔ حرکی اعصاب (Motor Nerves) اور بین عصبانوں (Interneurons) میں اس قسم کے عصبیے پائے جاتے ہیں۔



شکل 10.16

کثیر قطبی عصبانہ

انفعال کے لحاظ سے عصبانوں کی اقسام

انفعال کے لحاظ سے عصبیے تین اقسام کے ہوتے ہیں۔

(i) حسی عصبیے (Sensory Neurons)

(ii) حرکی عصبیے (Motor Neurons)

(iii) بین عصبیے (Interneurons) یا متصل عصبیے (Adjustor Neurons)


(i) حسی عصبیے (Sensory Neurons)

یہ عصبیے حسی ہیجانات (Sensory Impulses) کو حسی اعضاء سے مرکزی عصبی نظام کو ارسال کرتے ہیں۔

(ii) حرکی عصبیے (Motor Neurons)

یہ عصبیے حرکی ہیجانات (Motor Impulses) کو مرکزی عصبی نظام سے موثر اعضاء (Effector Organs) بھیجتے ہیں۔

غدد اور عضلات کو ارسال کرتے ہیں۔




شکل 10.17

حرکی عصبانیہ کی تشریحات پیام کا حوصلہ یاد گیر عصبانیہ سے شجرینہ کو ارسال

(III) بین عصبانیہ (Interneurons) یا متصل عصبانیہ (Adjustor Neurons)

اس قسم کے عصبانیہ دو یا دو سے زائد عصبانیوں کے درمیان پائے جاتے ہیں اور پیچائات کو متصل عصبانیوں میں منتقل

کرتے ہیں۔ مرکزی عصبی نظام میں اس قسم کے عصبانیہ پائے جاتے ہیں۔




شکل 10.19

سریش خلیے

شکل 10.18

پرجینج کا خلیہ (Perkinje's Cell)



شکل 10.20 ترکی دو قامت ظلیہ (Motor Giant Cell)

3.2.2 اعصاب (Nerves)

مرکزی عصبی نظام کے باہر پائے جانے والے عصبی ریموں (Fibres) کا بندل عصب (Nerve) کہلاتا ہے۔ ہر ایک عصبی ریشے کے اطراف پائی جانے والی پرت کو دروں عصبیہ (ینڈونیوریم Endoneurium) کہا جاتا ہے۔ کئی عصبی ریشے اتصالی بافت کے ذریعہ باہم مل کر ایک بندل بناتے ہیں جس کو حزمہ (Fasciculus) کہا جاتا ہے۔ حزمہ کے اطراف پائی جانے والی پرت گرد عصبیہ (پیرینیوریم Perineurium) کہلاتی ہے۔ کئی حزمے باہم مل کر ایک عصب بناتے ہیں جس کے اطراف پائی جانے والی پرت کو بر عصبیہ (Epineurium) کہتے ہیں۔

اعصاب کی درجہ بندی

اعصاب کو افعال کے لحاظ سے تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

- (1) حسی اعصاب (Sensory Nerves) (2) ترکی اعصاب (Motor Nerves) (3) مخلوط اعصاب (Mixed Nerves)

(1) حسی اعصاب (Sensory Nerve)

ان کو در آورندہ اعصاب (Afferent Nerves) بھی کہا جاتا ہے یہ۔ اعصاب حسی پچاات (Sensory)

(Impulses) کو حس اعضاء سے مرکزی عصبی نظام (دماغ اور نخاعی ڈور) تک پہنچاتے ہیں اور حس عصبانوں (Sensory Neurons) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی دوسری اور آٹھویں قحی اعصاب (Cranial Nerves) حس اعصاب ہوتے ہیں۔

(2) حرکی اعصاب (Motor Nerve)

یہ اعصاب حرکی بیانات (Motor Impulses) کو مرکزی عصبی نظام سے حرکی اعضاء (عضلات اور غدودوں) تک پہنچاتے ہیں اور حرکی عصبانوں (Motor Neurons) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تیسری، چوتھی اور چھٹی قحی اعصاب (Cranial Nerves) حرکی اعصاب ہوتے ہیں۔

(3) مخلوط اعصاب (Mixed Nerves)

یہ اعصاب حس اور حرکی دونوں قسم کے عصبانوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پانچویں، ساتویں، نویں اور دسویں قحی اعصاب اور نخاعی ڈور کے اعصاب مخلوط اعصاب ہوتے ہیں۔
عصبی بافت سے متعلقہ خلیے


عصبی بافت سے متعلقہ غیر حس خلیوں میں i سریش خلیے (Neuroglia) ii برخلیہ خلیے (Ependymal cells) اور iii عصبی افرازی خلیے (Neurosecretory Cells) شامل ہیں۔

(i) سریش خلیے (Neuroglia)

یہ خلیے دماغ، نخاعی ڈور اور عقدوں میں سہارا فراہم کرنے اور پینگ والی بافت بناتے ہیں جس کو سریش خلیے (Neuroglia) کہا جاتا ہے۔ سریش خلیے متصل عصبانوں کے لئے حاجز (Insulator) کا فعل انجام دیتے ہیں۔ سریش خلیے چار اقسام کے ہوتے ہیں۔

(1) ریشی تارہ خلیے (Fibrous Astrocytes)

یہ ایمنس (White Matter) میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس میں ڈانڈے دبیز اور شاخدار ہوتے ہیں۔ یہ مردوں اور عورتوں کے ہوتے ہیں۔




شکل 10.21

ریشی تارہ خلیہ

(2) **نخز مائی تارہ خلیے (Protoplasmic Astrocytes)**

یہ بھورے مادہ (Gray Matter) میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس میں زائکے دہیز ہوتے ہیں اور کافی شاخدار ہوتے ہیں۔ اس کا مبداءوں ادمہ ہوتا ہے۔




شکل 10.22

نخز مائی تارہ خلیے

(3) **خلیل شجری سریش خلیے (Oligodendroglia)**

یہ اینیٹل مادہ اور بھورے مادہ دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں زائکے کافی کم تعداد میں ہوتے ہیں اور غیر شاخدار ہوتے ہیں۔ اس کا مبداءوں ادمہ ہوتا ہے۔



شکل 10.23
خلیل شجری سریش خلیے

(4) خرد سریش خلیے (Microglia)

یہ بھورے مادے میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان خلیوں میں دو زائکے پائے جاتے ہیں۔ یہ خلیے اکالی (Phagocytic) خاصیت کے ہوتے ہیں اس کا مبد امیاں اومہ ہوتا ہے۔



شکل 10.24

خرد سریش خلیے

(ii) برخلیفہ (Ependymal Cells)

اس قسم کے خلیے دماغ اور نخاعی ڈور کے کہنوں کی اندرونی سرطی (Epithelial) سطر بناتے ہیں۔

(iii) عصبی افرازی خلیے (Neurosecretory Cells)

یہ مخصوص قسم کے خلیے ہوتے ہیں۔ یہ دروں افرازی (Endocrine) خلیوں کے مماثل فعل انجام دیتے ہیں۔ یہ

زیر مرثیہ (Hypothalamus) میں پائے جاتے ہیں۔

3.3 مرکزی عصبی نظام (Central Nervous System) (CNS)

تمام فکری حیوانات بشمول انسان میں مرکزی عصبی نظام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں دماغ (Brain) اور نخاعی ڈور (Spinal Cord) کہتے ہیں۔

دماغ (Brain)

پستانوں (Mammals) میں دماغ مرکزی عصبی نظام کا عظیم ترین ہم ارجاعی (Coordinating) اور سائنسی (Integrating) مرکز ہے۔ دماغ کھوپڑی (Skull) کے سطحی صندوق (Bony Box) میں محفوظ رہتا ہے جس کو قحف (Cranium) کہا جاتا ہے۔ دماغ کا وزن بالغ مرد میں تقریباً 1400 گرام اور بالغ عورت میں 1350 گرام ہوتا ہے۔ مردوں میں زیادہ سے زیادہ 1840 گرام اور کم سے کم 964 گرام ہوتا ہے اور عورتوں میں زیادہ سے زیادہ 1585 گرام اور کم سے کم 879 گرام ہوتا ہے۔ دماغ کا عظیم ترین وزن عمر کے بیسویں سال میں تکمیل پاتا ہے اور بڑھاپے میں یہ بتدریج گھٹتا شروع ہو جاتا ہے۔

دماغ کی ساخت


دماغ تین اہم حصوں پر مشتمل ہوتا ہے

- (1) دماغ مقدم (Prosencephalon) یا اگلا دماغ (Fore Brain)
 - (2) دماغ متوسط (Mesencephalon) یا وسطی دماغ (Mid Brain)
 - (3) دماغ سوخر (Rhombencephalon) یا پچھلا دماغ (Hind Brain)
- (1) دماغ مقدم (Prosencephalon) یا اگلا دماغ (Fore Brain)


یہ بھی مزید تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

(ii) شمی فصیں (Olfactory Lobes)


دماغ کا سب سے اگلا حصہ ایک جوڑ شمی فصوں (Olfactory Lobes) سے تشکیل پاتا ہے۔ ان میں جگ کہلہ (Cavity) پایا جاتا ہے جس کو شمی طین (Olfactory Ventricle) یا رنوقر (Rhino-coel) کہا جاتا ہے۔ شمی فصیں سو گھنے کے احساس کو قابو میں رکھتے ہیں۔



شکل 10.25
انسانی دماغ کا بیرونی منظر



شکل 10.26
انسانی دماغ کی تراش



شکل 10.27


انسانی دماغ کے مختلف حصوں کا کھوپری میں منظر

(b) ع (سیری برم Cerebrum)

یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے جو جملہ دماغ کے تقریباً دو تہائی حصہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دو مساوی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کو دائیں اور بائیں مئی نیم کرے (Cerebral Hemispheres) کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان گہرا طویل شکاف پایا جاتا ہے جس کو مئی طویل شکاف (Cerebral Longitudinal Fissure) کہتے ہیں۔ دونوں نصف کرے اندرونی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مہمی ریشوں سے بنی ہوئی پٹی یا ڈور سے مربوط رہتے ہیں جس کو جسم صلیبی (Corpus Collosum) اور جسم مقطع (Corpora Striata) کہتے ہیں۔ دونوں نصف کرے کی سطحوں پر متحدہ دھاریں پائی جاتی ہیں جن کو چکر (Gyri) کہا جاتا ہے۔ ان کے درمیان شکافیں پائی جاتی ہیں جن کو میزاب (Sulci) کہا جاتا ہے۔ ع چار حصوں (Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے جن کو جہمی (Frontal)، ہداری (Parietal)، صدفی (Temporal) اور قرن آمونی (Hippocampal) فصیں کہتے ہیں۔ دونوں مئی نیم کرے میں پائے جانے والے کھلے جانبی طین (Lateral Ventricle) یا نزقہ (Paracoel) کہلاتے ہیں۔ ع کی سطح دبیز ہوتی ہے جو بھورے مادے (Grey Mater) سے تیار ہوتی ہے۔ اس کو مئی قشرہ (Cerebral Cortex) کہتے ہیں۔ اندرونی طور پر ع کے اساس پر ایک بڑا وزن موجود ہوتا ہے جو

کو (Foramen of Monro) کہلاتا ہے۔

ع (Cerebrum) کے پیچھے بین دماغ (Diencephalon) پایا جاتا ہے۔



شکل 10.28

انسانی دماغ کی بطنی ساخت

(c) بین دماغ (Diencephalon)

بین دماغ کا سمت غیر عصبی سرطی ہافت سے تیار ہوتا ہے جس کو بر عرشہ (Epithalamus) کہتے ہیں جس سے اوپر کی جانب صنوبری جسم (Pineal Body) تیار ہوتا ہے۔ اس کے اندرونی کھلے میں دونوں جانب انگلی نما ابھاریں پائی جاتیں ہیں جن کو اگلا مشیمی صفیرہ (Anterior Choroid Plexus) کہا جاتا ہے جو حقی نخاعی سیال (Cerebrospinal Fluid) کا افزاز کرتا ہے۔ بین دماغ کے فرش کو زیر عرشہ (Hypothalamus) کہتے ہیں۔ اس کی چلی جانب یہ نخاعی غدود (Pituitary Gland) تیار کرتا ہے جو دروں افزای غدود ہے۔ بین دماغ میں پائے جانے والے کھلے کو تیسرا بطن (Third Ventricle) یا بین قعر (Diacoel) کہتے ہیں۔

(2) دماغ متوسط (Mesencephalon) یا وسطی دماغ (Mid Brain)

وسطی دماغ صرف چشمی فصوص (Optic Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے جو چار حصوں پر مشتمل رہتا ہے جن کو چو

جوڑ (Quadrigenina) کہتے ہیں چٹھی فصول کی بطنی جانب عصبی ریشوں کی ایک جوڑ دہیز طولی پٹیاں پائی جاتی ہیں جو نخاع مستطیل (Medulla Oblongata) کو عقی نیم کر دوں (Cerebral Hemispheres) سے جوڑتی ہیں۔ پستانوں میں چٹھی فصول ٹھوس ہوتے ہیں جب کے دیگر حیوانات کے چٹھی فصول میں کہل پایا جاتا ہے جس کو چٹھی قمر (Optocoel) کہتے ہیں۔

(3) دماغ موخر (Rhombencephalon) یا پچھلا دماغ (Hind Brain)

یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

(a) دماغ (Cerebellum)

(a) دماغ (Cerebellum)

یہ پستانوں میں دیگر حیوانات کے بہ نسبت کافی نمایاں ہوتا ہے۔ یہ درمیانی فص (Central Lobe)، دو جانبی فصول (Lateral Lobes) اور دو پٹھی فصول (Floccular Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے درمیانی فص میں چوٹا بطن (Fourth Ventricle) موجود ہوتا ہے۔ اس کی اندر دنی جانبی دیواروں سے انگلی نما ابھاریں نکلتی ہیں جن کو پچھلا مشیمی ضمیر (Posterior Choroid Plexus) کہتے ہیں۔ یہ عقی نخاعی سیال (Cerebrospinal Fluid) کو افزا کرتی ہیں۔

(b) دماغی تنہ (Brain Stem)

دماغی تنہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

(1) واردولی پل (Pons Varoli) اور (2) نخاع مستطیل۔

1 واردولی پل (Pons Varoli)

یہ عصبی پل کے طور پر پایا جاتا ہے جو نخاع مستطیل کے اوپری جانب نمو پاتا ہے۔ یہ دماغ (Cerebellum) کے جانبی فصول کو وسطی دماغ (Mid Brain) اور نخاع مستطیل (Medulla Oblongata) سے مربوط کرتا ہے۔ اس کے اوپری حصہ سے سابقین دماغ شروع ہوتے ہیں۔

نخاع مستطیل (Medulla Oblongata)

یہ دماغ کا سب سے پچھلا حصہ ہے۔ اس کا اندر دنی کہل چوٹا بطن (Fourth Ventricle) یا بعد قمر (Metacoel) کہلاتا ہے یہ غیر ارادی افعال (Involuntary Actions) کا مرکز ہوتا ہے۔ بیشتر دماغی افعال (Cranial

(Nerves) اسی حصہ سے نکلتے ہیں۔ نخاع مستطیل کا تسلسل نخاعی ڈور (Spinal Cord) کی شکل میں پایا جاتا ہے۔

سایا یا دماغی غشائیں (Meninges)

نخاعی ڈور اور دماغ کے اطراف پائی جانے والی غشائیں سایا (Meninges) کہلاتی ہیں۔ دماغ کی سب سے بیرونی غشاء ام جانہ (Dura Mater) اور سب سے اندرونی غشاء جو نخاعی ڈور اور دماغ کو گھیری ہوئی ہوتی ہے ام رقیقہ (Pia Mater) کہلاتی ہیں۔ ان دونوں غشاؤں کے درمیان پائی جانے والی غشاء عنکبوتیہ غشاء (Arachnoid Membrane) کہلاتی ہے۔ بیرونی اور درمیانی غشاؤں کے درمیان جی نخاعی سیال (Cerebrospinal Fluid) موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی بطن (Ventricles) میں بھی جی نخاعی سیال پایا جاتا ہے۔ دماغی غشائیں اور جی نخاعی سیال دماغ کو بیرونی ضربات سے محفوظ رکھتا ہے اور تغذیہ بھی فراہم کرتا ہے۔

دماغی بافتیں (Brain Tissues)

دماغ اور نخاع ڈور میں عصی خلیے (Neurons) اور سریش خلیے (Neuroglia) پائے جاتے ہیں۔ دماغ کے بیرونی حصے میں بھور مادہ (Grey Matter) اور اندرونی حصہ میں سفید مادہ (White Matter) پایا جاتا ہے جب کہ نخاعی ڈور میں بھورا مادہ اندرونی طور پر اور سفید مادہ بیرونی طور پر پایا جاتا ہے۔


دماغی حصوں کے افعال

دماغی حصوں اور ان کے افعال کو جدول کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 1 دماغی حصے اور ان کے افعال

دماغی حصے	افعال
مگادماغ (Fore Brain)	یہ خمی مرکز ہے جو سمجھنے کے احساس کو قابو میں رکھتے ہیں۔
شمی فصیں (Olfactory Lobes)	مخ (Cerebrum) یادداشت ذہانت، غور و فکر اور فیصلہ سازی اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مرکز ہے
بین دماغ (Diencephalon)	ریلے اسٹیشن (Relay Station) کا فعل انجام دیتا ہے۔
زیر عرشہ (Hypothalamus)	جسمانی حرارت، بھوک، پیاس اور جذبات کا مرکز ہے۔

بصارت کامر کر ہے۔	وسطی دماغ (Mid Brain)
	چشمی فصیں (Optic Lobes)
جسم کے توازن اور وضع کو قائم رکھنے، ارادی افعال کو قابو میں رکھنے کامر کر ہے۔	پچھلا دماغ (Hind Brain)
تمام غیر ارادی افعال جیسے تنفس، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، حرارت، گلابی غدود کے افرازات کو قابو میں رکھنے کامر کر ہے۔	دماغ (Cerebellum)
اس کے علاوہ گلٹا، کھانسی، چھینک، تھکے کو قابو میں رکھنا بھی ہے۔	نخاع مستطیل (Medulla Oblongata)



فصل 10.29


انسانی دماغ کے مختلف حصوں کے افعال

نخاعی ڈور (Spinal Cord)

نخاع مستطیل (Medulla Oblengata) کا تسلسل نخاعی ڈور کہلاتی ہے جو لائمی اور استوانہ نما ہوتی ہے یہ فقری ستون (Vertebral Column) کے مرکزی کنال میں سے گزرتی ہوئی پشت کے آخری سرے تک پہنچتی ہے۔ فقری ستون کے فقرے (Vertebrae) نخاعی ڈور کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے کئی اعصاب (Nerves) نکلتے ہیں جو نخاعی اعصاب (Spinal Nerves) کہلاتے ہیں۔

نخاعی ڈور کی عرضی تراش

نخاعی ڈور خاکی مادہ (Grey Matter) اور اینٹیش مادہ (White Matter) سے بنتی ہے۔ بھورہ مادہ اندرونی حصہ میں اینٹیش مادہ بیرونی حصہ میں موجود ہوتا ہے۔ بھورے مادہ کے وسط میں نالی پائی جاتی ہے جس کو نخاع نالی (Spinal Canal) کہتے ہیں۔ اس نالی میں جلی نخاعی سیال (Cerebrospinal Fluid) موجود ہوتا ہے۔ خاکی مادہ حرف "H" کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ہر قطعہ کو قرن (Horn) کہا جاتا ہے۔ ٹھہری جانب کے قرون کو ٹھہری قرنیں (Dorsal Horns) اور بطنی جانب کے قرون کو بطنی قرنیں (Ventral Horns) کہا جاتا ہے۔ نخاعی ڈور کے اطراف تین ضخائیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے بیرونی ام جانیہ (Dura Mater) وسطی جھکبوتہ جلی (Arachnoid Membrane) اور سب سے اندرونی یعنی نخاعی ڈور کو گھیرنے والی شہادہ ام رقیقہ (Pia Mater) کہلاتی ہیں۔



شکل 10.30 نخاعی ڈور کی عرضی تراش

نخاعی ڈور کے ذریعہ معکوس حرکات انجام دئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سر کے نیچے جسم کے مختلف حصوں سے پیامات کو حاصل کرتی اور انہیں دماغ کو پہنچاتی ہے۔ اسی طرح یہ پیامات کو دماغ سے حاصل کرتی اور جسم کے مختلف حصوں کو پہنچانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔


3.4 محیطی عصبی نظام (Peripheral Nervous System)

مرکزی عصبی نظام یعنی دماغ اور نخاعی ڈور سے کئی اعصاب نکلتے ہیں جو جسم کے محیطی (سطحی) حصوں تک پہنچتے ہیں یہ پیامات کو دماغ سے محیطی حصوں تک اور محیطی حصوں سے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اعصاب محیطی نظام کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس نظام میں اعصاب کے جملہ 43 جوڑ پائے جاتے ہیں جن میں 12 جوڑ قحشی اعصاب (Cranial Nerves) اور باقی 31 جوڑ نخاعی اعصاب (Spinal Nerves) کے ہوتے ہیں۔

قحشی اعصاب (Cranial Nerves)

دماغ کے مختلف حصوں سے نکلنے والے اعصاب کو قحشی اعصاب کہتے ہیں۔ انسان میں ان اعصاب کی تعداد 12 جوڑ ہوتی ہے دسویں عصب کو تائیہ (Vagus) کہا جاتا ہے۔ تائیہ عصب اہم افعال کو انجام دیتی ہے۔ یہ دل کی دھڑکن اور لبلبہ (Pancreas) کے افراز کو قابو میں رکھتی ہے۔

قحشی اعصاب کی درجہ بندی افعال کے لحاظ سے تین اقسام میں کی جاتی ہے (1) حسی (Sensory) (2) حرکی (Motor) اور (3) مخلوط (Mixed)۔ ان اعصاب سے نکلنے والی شاخیں آنکھ کے عضلات، شبکیہ (Retina)، کان، ناک، زبان، چہرہ، گردن اور بلعوم کو عصبیت فراہم کرتی ہیں۔





شکل 10.31

قحشی اعصاب

نخاعی اعصاب (Spinal Nerves)

نخاعی ڈور (Spinal Cord) سے نکلنے والے اعصاب کو نخاعی اعصاب کہا جاتا ہے۔ یہ تمام اعصاب مخلوط اعصاب (Mixed Nerves) کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ حسی اور حرکتی دونوں قسم کے ریشوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نخاعی ڈور کے ظہری حصہ میں حسی ریشے اور بطنی حصہ میں حرکتی ریشے پائے جاتے ہیں حسی ریشوں کے ذریعہ تحریکات حصول کنندہ عضلات سے نخاعی ڈور کو لے جائے جاتے ہیں جب کہ حرکتی ریشوں کے ذریعہ تحریکات نخاعی ڈور سے ہدف اعضاء (Target Organs) کو افعال (حرکت) انجام دینے کے لئے لے جاتے ہیں۔



نخاعی اعصاب کا ایک مکمل حصہ جس میں دو اعصاب کے نکلنے کے مقامات کو ظاہر کیا گیا۔


3.5 معکوسی عمل اور معکوسی کمان (Reflex Action and Reflex Arc)

معکوسی عمل (Reflex Action)

انسانی جسم روزمرہ زندگی میں مختلف تحریکات (Stimulations) کے رد عمل میں ایسے حرکات کو انجام دیتا ہے جو دماغ کے قابو میں نہیں ہوتے بلکہ نخاعی ڈور (Spinal Cord) کے قابو میں ہوتے ہیں۔ معکوسی عمل (Reflex)

(Action) کہلاتے ہیں۔ یہ حرکات یعنی معکوسی عمل غیر ارادی (Involuntary) ہوتے ہیں یعنی بغیر دماغی فیصلوں کے انجام دیئے جاتے ہیں جو ہمارے قابو یا ارادے میں نہیں ہوتے۔ یہ عمل کافی تیزی سے تکمیل پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان دہ یا خطرناک اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں واقع ہونے والے چند معکوسی عمل کو ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔

- (1) جب کوئی شے ہاتھ میں چبھ جاتی ہے یا گرم شے ہاتھ کو چھو جاتی ہے تو ہاتھ فوری کھینچ لیا جاتا ہے۔ ہاتھ کا فوری کھینچ لینا معکوسی عمل ہے۔
- (2) جب کوئی قشرہ (Insects) یا کوئی شے آنکھ میں داخل ہونے کے لئے آنکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے تو آنکھیں فوری بند ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کو بند کرنے کے لئے پونوں کی حرکت معکوسی عمل ہے۔
- (3) جب ہمارا پیر پھسل جاتا ہے تو ہم فوری اپنا توازن قائم کر لیتے ہیں۔ توازن کا قائم کرنا معکوسی عمل ہے۔
- (4) فوراً کھانسا (Coughing) یا چھینکا (Sneezing) معکوسی عمل ہے۔
- (5) غذا یا مٹھائی کو سامنے رکھنے پر دہن میں لعاب کا انفراس معکوسی عمل ہے۔



شکل 10.34

معکوسی عمل

مکوسی کمان (Reflex Arc)

مکوسی عمل کو انجام دینے میں شامل ہونے والے اجزاء ترکیب مکوسی کمان (Reflex Arc) کو تشکیل دیتی ہیں
مکوسی کمان میں پانچ اجزاء ترکیبی پائے جاتے ہیں۔

(1) محصلہ عضومہ (Receptor Organ)

یہ ایک حسی غلیہ یا حسی عضومہ ہے جو کسی تحریک (Stimulus) کو قبول کرتا ہے۔

(2) حسی عصبانہ (Sensory Neuron)

یہ ایک عصب (Nerve) ہے جو نخاعی عصب (Spinal Nerve) کے ظہری جڑ (Dorsal Root) میں پائی جاتی ہے۔

یہ پہچان (Impulse) کو محصلہ عضومہ سے مرکزی عصبی نظام جیسے نخاعی ڈور (Spinal Cord) کو ایصال کرتی ہے۔

(3) درمیانی عصبانہ (Intermediate Neuron)

یہ عصبانہ (Neuron) مرکزی عصبی نظام (نخاعی ڈور) میں موجود ہوتا ہے جس کے ذریعہ پہچان (Impulse) حرکی

عصبانہ (Motor Neuron) کو ایصال کیا جاتا ہے۔


(4) حرکی عصبانہ (Motor Neuron)

یہ عصبانہ نخاعی عصب (Spinal Nerve) کے بطنی جڑ (Ventral Root) میں موجود ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ

پہچان موثر عضومہ (Effector Organ) کو منتقل کیا جاتا ہے۔

(5) موثر عضومہ (Effector Organ)

یہ عضلہ (Muscle) یا عضومہ (Organ) ہے جو پہچان کے مطابق رد عمل کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل 10.35

مکوسی کمان (Reflex Arc) میں شامل اجزاء ترکیب

مکوسی عمل کی درجہ بندی

مکوسی عمل (Reflex Actions) دو اقسام کے ہوتے ہیں۔

(1) غیر مشروط مکوسات (Unconditioned Reflexes)

ایسے مکوسات (Reflexes) جو پیدا نشی ہوتے ہیں غیر مشروط مکوسات کہلاتے ہیں۔ یہ پیدائش سے ہی ظاہر ہوتے ہیں ان کا انحصار سیکھنے پر نہیں ہوتا یعنی یہ سکھے نہیں جاتے بلکہ یہ تواریثی ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مکوسات کے لئے مکوسی کمان کا مصبی راستہ پیدائش سے معین حالت میں قائم رہتا ہے۔

غیر مشروط مکوسات کی مثالیں


ہنسی مکوسات، گھٹنے کی حرکت (Knee Jerk)، ٹوند کی حرکت (Ankle Jerk)، جڑوں کی حرکت (Jaw Jerk)، تنگی مکوسات، ہاضمی مکوسات، جنسی مکوسات، گرم شے کو چھونے پر ہاتھ کا ہٹالینا، ہاتھ یا پیر میں کسی نو کیلی شے کے چبھنے پر ہاتھ اور پیر کو ہٹالینا، آنکھ کے قریب کسی شے کے قریب آتے ہی آنکھوں کو بند ہونا یعنی پپٹوں کی حرکت وغیرہ یہ ایسے مکوسات ہوتے ہیں جو پیدائش سے ہی ظاہر ہوتے ہیں یعنی یہ سکھائے نہیں جاتے۔

(2) مشروط مکوسات (Conditioned Reflexes)

ایسے مکوسات (Reflexes) جو زندگی کے دوران سکھے جاتے یعنی حاصل کئے جاتے ہیں، مشروط مکوسات کہلاتے ہیں۔ اس لئے انہیں اکتسابی مکوسات (Acquired Reflexes) بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے مکوسات کو قابو میں رکھنے کا مرکز دماغ کے میریریم (Cerebrum) میں پایا جاتا ہے۔ یہ مکوسات جاندار کے جسم میں تمام قسم کی خصوصیات کو سیکھنے کے لئے بنیاد قائم کرتے ہیں۔



روسی سائنسدان، آیوان پاوولوف (Ivon Pavlov) نے سب سے پہلے حیوانات پر تجربات کو انجام دیتے ہوئے مشروط مکوسات کو دریافت کیا اس لئے اس کو مشروط مکوسات کا دادا آدم (Father of Reflexes) کہا جاتا ہے۔ اس نے کتے پر تجربہ کیا۔ اس تجربہ کے دوران اس نے سب سے پہلے کتے کو غذا دکھلایا جس سے کتے کے منہ سے لعاب جاری ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کتے کو صرف گھنٹی کی آواز سنائی تو اس کے منہ سے لعاب خارج نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس نے غذا دکھلانے کے ساتھ گھنٹی کی آواز کو بھی سنایا تب اس کے منہ سے لعاب خارج ہونا شروع ہو گیا۔ کتے کو غذا دکھلانے کے ساتھ گھنٹی کی

آواز کو بھی سنانے کے عمل کو کئی دنوں تک جاری رکھا گیا۔ اس کے بعد اس نے کتے کو بغیر غذا دیئے کھنٹی کی آواز کو سنایا جس کے نتیجہ میں کتے کے منہ سے لعاب کا خارج ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل اس تجربہ میں کتے نے کھنٹی کی آواز کو غذا کے دیئے جانے سے مربوط کر لیا اور جب بھی کھنٹی کی آواز سنائی دیتی وہ یہ سمجھتا کہ اس کو غذا دی جا رہی ہے۔ اس لئے بغیر غذا کے بھی کھنٹی کی آواز پر لعاب کا جاری ہونا مشروط معکوسی عمل ہے۔



شکل 10.36

ایوان پاولو کتے پر تجربہ۔ مشروط معکوسات کی دریافت

	A. کتے کو غذا د کھلانے پر لعاب جاری ہو گیا ۱
	B. کتے کو صرف گھنٹی کی آواز سنانے پر لعاب جاری نہیں ہوا۔
	C. کتے کو غذا د کھلانے کے ساتھ ہی گھنٹی کی آواز سنا ی گئی ۲ لعاب جاری ہوا۔
	D. جب بھی گھنٹی کی آواز سنا ی گئی ۳ تو لعاب جاری ہوا۔

	اس کے بعد جب بھی گھنٹی کی آواز سنا ی گئی تو لعاب جاری ہوا۔

شکل 10.37

آیون پاؤلو کاکتے پر کیا گیا تجربہ جس میں شروط معکوسات

کی دریافت کے مراحل دکھائے گئے۔

اسی طرح اگر بچہ غذا کی بو کو محسوس کرتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں لعاب جاری نہیں ہوتا لیکن جب

بچہ نشوونما پا کر بڑا ہو جاتا ہے جب اگر وہ غذا کو دیکھتا ہے یا اس کی بو محسوس کرتا ہے تو اس کے منہ میں لعاب کا خارج ہونا

شرح ہو جاتا ہے جو مشروط معکوس عمل کہلاتا ہے۔

4 سبق کا خلاصہ

کثیر خلوی حیوانات بشمول انسان میں جسم کے ہر ذرہ اور اندرونی ماحول میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرنے اور رد عمل کو ظاہر کرنے، جسم کے تمام اعضاء کی کارکردگی کو باقاعدہ بنانے اور ان کو قابو میں رکھنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے ایک منظم نظام تشکیل پاتا ہے جس کو عصبی نظام کہا جاتا ہے۔ انسان میں عصبی نظام کافی پیچیدہ ہوتا ہے جو دماغ، نغائی ڈور اور اعصاب پر مشتمل ہوتا ہے۔

عصبی نظام میں حسی اور غیر حسی خلیے پائے جاتے ہیں۔ عصبیہ (Neurons) حسی خلیے ہوتے ہیں جو عصبی نظام کی بنیادی، مفصلاتی اور فعلیاتی اکائی کہلاتے ہیں۔ ہر ایک عصبانیہ ایک بڑے خلوی جسم، خلویہ (Cyton) اور زائندوں پر مشتمل ہوتا ہے کافی لائسنے اسطوانہ نما زائند کو محوریہ (Axon) اور چھوٹے شاخدار زائندوں کو شجرینے (Dendrites) کہا جاتا ہے۔ ایک عصبانیہ کے محوریہ سرے اور دوسرے عصبانیہ کے شجرینے کے سرے کے درمیان پائی جانے والی خالی جگہ کو معانقہ (Synapse) کہا جاتا ہے معانقہ کے ذریعہ ہجان (Impulse) استیصال کو لین (Acetylcholine) نای کیمیائی پیام رساں کے ذریعہ ایک عصبانیہ سے دوسرے عصبانیہ کو منتقل ہوتا ہے۔

عصبیہ نغائی غلاف کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بنیاد پر نغائی غلاف دار (Myelinated or Medullated) اور غیر نغائی غلاف دار (Non-Medullated یا Non Myelinated) اور عصبی زائندوں کی بنیاد پر غیر قطبی، یک قطبی، دو قطبی اور کثیر قطبی اور افعال کے لحاظ سے حسی (Sensory)، حرکی (Motor)، متصل یا بین عصبیہ (Interneuron) یا (Adjustor) اقسام کے ہوتے ہیں۔

مرکزی عصبی نظام کے باہر پائے جانے والے عصبی ریٹوں کا بنڈل عصب (Nerve) کہلاتا ہے۔ اعصاب کی درجہ بندی افعال کے لحاظ سے تین اقسام حسی (Sensory)، حرکی (Motor) اور مخلوط (Mixed) اعصاب میں کی جاتی ہے۔

عصبی نظام میں پائے جانے والے غیر حسی خلیوں میں سریش خلیے (Neuroglia)، برخلیفہ خلیے (Ependymal Cells) اور عصبی افزائی خلیے (Neurosecretory Cells) شامل ہیں۔

عصبی نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (1) مرکزی عصبی نظام (Central Nervous System) جو دماغ اور نخاعی ڈور پر مشتمل ہوتا ہے (2) محیطی عصبی نظام (Peripheral Nervous System) جو قحطی اعصاب (Cranial Nerves) اور نخاعی اعصاب (Spinal Nerves) پر مشتمل ہوتا ہے اور (3) خود کار عصبی نظام (Autonomic Nervous) جو زمشار کی اعصاب (Parasympathetic Nerves) اور مشار کی اعصاب (Sympathetic Nerves) پر مشتمل ہوتا ہے۔

دماغ کی حفاظت قحف (Cranium) نامی عظمی صندوق (Bony Box) میں کی جاتی ہے دماغ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے (1) دماغ مقدم (Prosencephalon) یا اگلا دماغ (Fore Brain) (2) دماغ متوسط (Mesencephalon) یا وسطی دماغ (Mid brain) اور (3) دماغ مؤخر (Rhombencephalon) یا پچھلا دماغ (Hind Brain)۔

دماغ مقدم تین حصوں یعنی قحطی فصوص (Olfactory Lobes) 'خ' (سیری برم Cerebrum) اور بین دماغ (Diencephalon) پر مشتمل ہوتا ہے۔ دماغ متوسط صرف قحطی فصوص (Optic Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے جو چار حصوں میں منقسم ہوتا ہے جس کو چوچو (Quadrigenina) کہتے ہیں۔ دماغ مؤخر دو حصوں یعنی دماغ (Cerebellum) اور دماغی تہ (Brain Stem) پر مشتمل ہوتا ہے۔ دماغی تہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے (a) پانس وروولی (Pons Varolii) اور (b) نخاع مستطیل (Medulla Oblongata)۔ نخاع مستطیل کا پچھلی جانب تسلسل نخاعی ڈور کو تشکیل دیتا ہے۔

نخاعی ڈور اور دماغ کے اطراف پائی جانے والی غشائیں سما یا (Meninges) کہلاتی ہیں۔ سب سے بیرونی غشاء ام جانیہ (Dura Mater) اور اندرونی غشاء ام رقیقہ (Pia Mater) اور ان دونوں کے درمیانی غشاء عنکبوتیہ غشاء (Arachnoid Membrane) کہلاتی ہیں۔ یہ دماغ کو بیرونی ضربات سے محفوظ رکھتی ہیں۔

دماغی بافتیں دماغ اور نخاعی ڈور میں پائی جاتی ہیں جو عصبیہ اور سریش خلیے ہوتے ہیں۔ دماغ کے بیرونی حصہ میں بھورا مادہ (Grey Matter) اور اندرونی حصہ میں ابیض مادہ (White Matter) پایا جاتا ہے جب کہ نخاعی ڈور کے بیرونی حصہ میں ابیض مادہ اور اندرونی حصہ میں بھورا مادہ پایا جاتا ہے

دماغ کے مختلف حصہ مختلف افعال کو قابو میں رکھتے ہیں (a) قحطی فصوص سوچنے کے احساس کو (b) 'خ' یادداشت ذہانت، غور و فکر اور فیصلہ ساز کامرکز ہے (c) بین دماغ ریلے اسٹیشن کہلاتا ہے (d) زیر عرشہ جسمانی حرارت، بھوک، پیاس

اور جذبات کا مرکز ہے (c) چشمی فصیں بصارت کا مرکز (d) دماغ جسم کے توازن اور وضع کو قائم رکھنے اور ارادی افعال کو قابو میں رکھنے کا مرکز ہے (g) نغاع مستطیل تمام غیر ارادی افعال جیسے تنفس، دل کی دھڑکن، بلغم پریش، حرارت، لعابی غدود کے افرازات، نگلنا، کھانسی، چھینک، تھکے کو قابو میں رکھنے کا مرکز ہے۔


نغاعی دور کے ذریعہ معکوسی عمل (Reflex Actions) انجام دئے جاتے ہیں جو غیر ارادی ہوتے ہیں اور دماغی فیصلوں کے بغیر کافی تیزی سے انجام پاتے ہیں معکوسی عمل دو اقسام کے ہوتے ہیں (1) غیر مشروط معکوسات (Unconditioned Reflexes) جو پیدا نشی ہوتے ہیں اور (2) مشروط معکوسات (Conditioned Reflexes) جو زندگی کے دوران سیکھے جاتے ہیں۔

معکوس عمل کو انجام دینے میں شامل ہونے والے اجزاء معکوس کمان کو تشکیل دیتی ہیں۔ ان میں مصلبہ، عضو، حسی عصبانیہ، درمیانی عصبانیہ، حر کی عصبانیہ اور اثر عضوہ شامل ہیں۔


5 زائد معلومات

عصبی عضلاتی اتصال (Neuromuscular Junction)

عصبی عضلاتی اتصال سے مراد وہ مقام اتصال ہے جہاں ایک عصبانیہ (Neuron) اور ایک عضلہ (Muscle) کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس کو عضلاتی عصبی اتصال (Myoneural Junction) بھی کہا جاتا ہے عصبانیہ کا محور کا آخری حصہ عضلہ میں داخل ہونے سے قبل کئی ریشوں (Fibres) میں تقسیم ہو جاتا ہے تقسیم سے قبل اس حصہ کے اطراف پائی جانے والا نغاعی غلاف (Myelin Sheath) غیر موجود ہو جاتا ہے ہر ایک ریشہ کا سراپھول کر کف پا (Sole Foot) کہلاتا ہے جس میں تلیے (Mitochondria) اور معائناتی کیے (Synaptic Vesicles) پائے جاتے ہیں عضلہ کی غشاء جو کف پا (Sole Foot) سے قریب ترین متصل رہتی ہے حر کی اختتامی تختی (Motor End Plate) کہلاتی ہے۔ کف پا (Sole Foot) اور حر کی اختتامی تختی کے درمیان خالی جگہ پائی جاتی ہے جو معائناتی درز (Synaptic Cleft) کہلاتی ہے۔



شکل 10.38
عصبی عضلاتی اتصال



شکل 10.39
عصبی عضلاتی اتصال (مکمل ساخت)

عضلہ میں ہیجان (Impulse) کی منتقلی عصبی عضلاتی اتصال کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ ہیجان (Impulse) محوریہ (Axon) سے گزرتے ہوئے جب کف پا (Sole Foot) پہنچ جاتا ہے تو معائناتی کیسہ (Synaptic Vesicle) شق ہو جاتا ہے اور معائناتی کیسہ میں موجود اسیٹائل کولین (Acetylcholine) معائناتی درز میں خارج ہو جاتا ہے اور عضلہ کی حرکی اختیاری حتمی کو متحرک کرتا ہے اور ہیجان پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ہیجان عضلہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ہیجان کی منتقلی یک رخنی ہوتی ہے یعنی یہ محوریہ سے عضلہ میں ہی منتقل ہوتا ہے لیکن عضلہ سے محوریہ میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔

6 فرہنگ

Arachnoid Membrane	ار کنائڈ ممبرین	عکبوتیہ غشاء	دماغ اور نخاعی ڈور کے اطراف پائی جانے والی غشاء۔
Astrocyte	ایسٹرو سائٹ	تارہ خلیہ	تارہ نما سریش خلیہ جو عضویہ مادہ میں پایا جاتا ہے
Autonomic Nerves	اولو لوک نروز	خود کار آعم	آزاد اندہ یا خود قابو میں رکھنے والے اعصاب۔
Axolemma	اکزولما	محور غشاء	محوریہ کے اطراف پائی جانے والی غشاء۔
Axon	اکزان	محوریہ	عصبانیہ (Neuron) کے خلو یہ (Cyton) سے نکلنے والا لمبا زائکدہ جو ہیجان کو خلو یہ سے دور لیجاتا ہے۔
Axoplasma	اکزوپلازما	محور پلازما	محوریہ میں پایا جانے والا پلازما۔

Cerebellum	سیریلیم	دماغ	چھوٹا دماغ فقریوں میں دماغ کے چھت سے منو پانے والی بروں ہالید گی جس کے فعل کا تعلق حرکی ہم ارجا (Motor Co-ordination) سے ہوتا ہے۔
Cerebral Cortex	سیربرل کارٹیکس	دماغی قشرہ	ارتقائی لحاظ سے دماغ کا سب سے جدید نمویانہ حصہ جس میں کئی خلیے پائے جاتے ہیں جو برتاؤ میں تبدیلی کے فعل کو قابو میں رکھتے ہیں انسانی دماغ میں کافی نمویانہ ہوتا ہے۔
Cerebral	سیربرل	دماغی	دماغ سے متعلق۔
Cerebrum	سیربریم	ع	ارتقائی لحاظ سے دماغ کا کافی ترقی یافتہ حصہ جو اساسی عقدوں (Basal Ganglia) 'قدیم قشرہ (Olds Cortex) اور جدید قشرہ (Neo Cortex) (Cortex) پر مشتمل ہوتا ہے۔
Co-ordination Cortex	کو آرڈینیشن کورٹیکس	ہم ارجا قشرہ	جسم کے مختلف افعال کے درمیان مخصوص ربط کس بھی عضوہ جیسے دماغ، گردوی غدد (Adrenal Gland) اور گردے کا بیرونی حصہ۔
Cranial Nerve	کریئیل نرو	دماغی عصب	دماغ سے نکلنے والی عصب۔
Cranium	کریئم	لٹھ	دماغی کیسہ کھوپڑی کا اوپری عظمی غلاف جس میں دماغ محفوظ رہتا ہے۔
Cyton	سائٹان	خلویہ	عصبی خلیہ کا جسم یعنی عصبانہ کا خلوی جسم

Dendrites	ڈینڈرائٹس	شجرینے	عصبانیہ (مصبی خلیہ) کے خلو یہ سے نکلنے والے شاخدار مچھوٹے زائیدے جو پہچان کو حاصل کرتے اور خلو یہ کو پہنچا دیتے ہیں۔
Diaocoel	ڈیا سیل	بین دماغی قعر	بین دماغ (Diencephalon) میں پایا جانے والا کہشہ۔
Diancephalon	ڈیا سیفالان	بین دماغ	دماغ کا حصہ جو مخ (Cerebrum) کے پیچھے موجود ہوتا ہے۔
Durameter	ڈیورامیٹر	اجافیہ	دماغ اور نخاعی ڈور کی بیرونی غشاء۔
Endoneurium	اینڈونیوریم	دروں عصبیہ	اعصاب کی اندرونی غشاء۔
Epineurium	اپینیم	بر عصبیہ	اعصاب کی اوپری غشاء۔
Ependymal Cells	ایپیڈائمیل خلیے	بر غلیہ خلیے	عصبی ریشوں کا بنڈل۔
Fasciculus	فیسیکولن	حزمہ	ریشی پروٹوپلازمی بروں ادمہ مبداء کے عصبی سریش (Neuroglia) خلیے۔
Fibrous Astrocyte	فائبرس اسٹروسائٹ	ریشی تارہ خلیہ	دماغ کا حصہ جو اندرونی فعلیاتی حالت سے متعلق برتاؤ کو متوازن کرتا ہے اور جذبات کو قابو میں رکھنے کا مقام ہے۔
Hypothalamus	ہائپو تھیلامس	زیر عرشہ	برق کیسیائی تبدیلی ہے جو عصبی ریشہ کی غشاء میں واقع ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی عصبی ریشہ کے ایک سرے میں تحریک کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے اور دوسرے سرے تک منتقل ہوتی ہے۔
Impulse	ایمپلس	پہچان	

Insulator	انسولیٹر	ماجز	ایسا غلاف جو پہچان کو باہر خارج ہونے سے روکتا ہے۔
Interneuron	انٹرنیوران	بین عصبا	عصبانیوں (Neurons) کے درمیان۔
Internodes	انٹرنوڈس	بین کراؤب	دو کراؤب کے درمیان کا حصہ۔
Microglia	مائکرو گلیا	خردسریٹل خلیہ	میان ادی عصبی خلیے۔
Medullated	میڈولیٹڈ	نخاعی غلاف دار	عصبانیہ یا اعصاب جس کے اطراف نخاعی غلاف پایا جاتا ہے۔
Medulla Oblongata	میڈولا آبلانگیا	نخاع مستطیل	دماغ کا پچھلا حصہ جو غیر ارادی افعال کو قابو میں رکھنے کا مرکز ہوتا ہے۔
Meninges	منینجس	سحایا	دماغ اور نخاعی ڈور کے اطراف کی خشاکیں۔
Mesencephalon	میزنسفالان	دماغ متوسط	دماغ کا درمیانی حصہ۔
Myelin Sheath	مایکن شیٹھ	نخاعی غلاف	محوریہ (Axon) کے اطراف پایا جانے والا غلاف۔
Neurilemma	نیوریلما	عصبی غلاف	شوان خلیوں (Schwann Cells) سے بنا ہوا غلاف جو محوریہ کے اطراف رہتا ہے۔
Neurocoel	نیوروکیل	عصبی قعر	حلیوں (Chordates) کے عصبی ڈور (Nerve Cord) میں پایا جانے والا کھلہ۔
Neuroglia	نیورو گلیا	عصبی سریش	مرکزی عصبی نظام سے وابستہ پیکنگ خلیے جن کے ساتھ عصبیے پائے جاتے ہیں۔
Neuron	نیوران	عصبانیہ	عصبی خلیہ۔

Nissle Bodies نسل ہاڈیز نسل کے دانے عصبانہ کے خلوہ (Cyton) کے خلیہ مایہ میں پائے جانے والے پروٹینی دانے۔

Node of Ranvier نوڈ آف رانویئر رانویئر کے عقدے محوریہ میں پائے جانے والے عقدے (Nodes) جہاں پر نفاذی غلاف غیر موجود رہتی ہے۔

Neurofibrils نیورو فائبریلز عصبی رشک عصبانہ کے خلوی جسم یعنی خلوہ کے خلیہ مایہ میں پائے جانے والے ہار یک ریشے۔

Olfactory اولفیکٹوری ششی سو گھننے سے متعلق۔

Oligodendrite اولیگوڈینڈرائٹس قلیل شجرینہ عصبی سریش خلیے جو یروں ادمہ مبدے کے ہوتے ہیں۔

Oligodendraglia اولیگوڈینڈراگلیا قلیل شجرینہ سریش عصبی سریشے۔

Optic Lobe اولیک لوب چشمی فص دماغ کے وسطی حصہ میں پائے جانے والے فص (Lobes) جو بصارت کو قابو میں رکھنے کا فعل انجام دیتا ہے۔

Optocoel اپٹوسیل چشمی قعر چشمی فصوں میں پایا جانے والا کہفہ

Paracoel پاراکوسیل نزقعر جانبی بطین یعنی دونوں وماغی نصف کردوں

میں پایا جانے والا کہفہ۔

Parasympathetic Nerves پاراسیمپائٹیک نر وز نرشار کی اعصاب اعصاب کے دو سٹس میں سے ایک سیٹ جو اندرونی اعضاء کو عصبت فراہم کرتا ہے اور یہ اعصاب مشار کی اعصاب کے مخالف عمل کرتے

ہیں۔

Perinurin پیرینورین گرد عصبیہ عصبیہ کے اطراف۔

Peripheral Nerves	پیریفیرل نرووز	مخپلی اعصاب	وہ اعصاب جو مرکزی عصبی نظام سے دور جسی سطحی حصہ میں پائے جاتے ہیں۔
Prosencephalan	پروزنسیفالان	دماغ مقدم	دماغ کا اگلا حصہ۔
Piamater	پیامٹر	ام رقیقہ	دماغ اور نخاعی ڈور کی سب سے اندرونی عظامی غلاف۔
Receptor Cells	ریسپنڈر سیلس	مصلہ خلیے	بیرونی تحریک کو حصول کرنے والے مخصوص خلیے۔
Reflex Action	ریفلکس ایشن	مکوسی عمل	کسی تحریک کے لئے خود بخود غیر ارادی رد عمل جو اعلیٰ مرکزی نظام کے دماغ سے غیر مربوط رہتا ہے۔
Retina	ریشینا	شبکیہ	آنکھ کے ڈھیلے کی سب سے اندرونی پرت جس پر کسی شے کا عکس تیار ہوتا ہے۔
Schwann Cells	شوان سیلس	شوان کے خلیے	محوریہ کو گھیرے ہوئے عصبی خلیے جو محوریہ کے اطراف غلاف بناتے ہیں۔
Sympathetic Nerves	سیمپاٹھیک نرووز	مشاء کی اعصاب	اعصاب کے دو سیلس میں سے ایک سیٹ جو اندرونی اعضاء کو عصبیت فراہم کرتے ہیں اور یہ نز مشار کی اعصاب کے مخالف عمل کو انجام دیتے ہیں۔

Synapse سائناپس معانقہ ایک عصبی خلیہ اور دوسرے عصبی خلیہ کے درمیان کی جگہ جس کے ذریعہ دونوں عصبی خلیے تعلیاتی طور پر ایک دوسرے سے مربوط رہتے ہیں۔

Telodendrite ٹیلوڈینڈرائٹس اختتامی شجرینے عصبی خلیہ کے محور یہ کے شاخدار اختتامی سرے۔
Terminal Arborization ٹرمینل آربرائزیشن راسی شجرینے اختتامی شجرینے۔



نمونہ امتحانی سوالات

7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) عصبی نظام کیوں ظہور میں آیا؟
- (2) عصبی نظام کو کن تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟
- (3) عصبی بانٹوں میں حسی اور غیر حسی خلیے کون سے ہوتے ہیں؟
- (4) عصبی نظام کن تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟
- (5) عصبی سریش خلیوں (Neuroglia) کی اقسام اور ان کے افعال کیا ہیں؟
- (6) عصبانہ کے علقف سے کون سے ہیں؟
- (7) معانقہ (Synapse) سے کیا مراد ہے؟
- (8) اعصاب سے کیا مراد ہے؟ افعال کے لحاظ سے اس کی کونسی اقسام میں درجہ بندی کی جاتی ہے؟
- (9) دماغی تہ کیا ہے؟ اس کے حصوں کے نام لکھئے۔
- (10) دماغ اور نخاعی ڈور کے اطراف پائی جانے والی غشائیں کیا ہیں؟

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) ایک عصبانہ کی ساخت کو تفصیل سے بیان کیجئے۔

- (2) عصبانیہ کی اقسام کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (3) اعصاب کی مختلف اقسام کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (4) دماغ مقدم کے کونے حصے ہیں ان پر نوٹ لکھئے۔
- (5) دماغ متوسط پر نوٹ لکھئے۔
- (6) دماغی تہ کے حصوں کو بیان کیجئے۔
- (7) نخاعی ڈور کی ساخت کو بیان کیجئے اور اس کا نامزد خاکہ اتاریئے۔
- (8) دماغ کے مختلف حصوں کے نام اور ان کے افعال کو بیان کیجئے۔
- (9) معکوسی عمل (Reflex Action) اور معکوسی کمان (Reflex Arc) کی تعریف کیجئے۔ معکوسی عمل کی مثالیں دیجئے۔

(10) مخیطی عصبی نظام کو بیان کیجئے۔

(11) شروط اور غیر شروط معکوسات سے کیا مراد ہے؟ ایوان پاول (Ivon Pavlov) کے تجربہ کو بیان کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

- (1) عصبانیہ کے غلوہ (Cyton) میں پائے جانے والے دانے _____ کہلاتے ہیں۔
- (2) محور یہ اور شجرینہ کے اختتامی سرے پر شاخوں کا گچھا _____ کہلاتا ہے۔
- (3) معانقائی کیسہ سے خارج ہونے والا کیمیائی پیام رساں _____ ہے۔
- (4) محور یہ اور شجرینہ کے اطراف خمی مادوں سے بنا ہوا غلاف _____ کہلاتا ہے۔
- (5) نخاعی غشاء _____ نامی خلیہ کے اطراف پائی جاتی ہے۔
- (6) غیر نخاعی غلاف دار ریشے _____ عصبی نظام میں پائے جاتے ہیں۔
- (7) دماغی نخاعی سیال (Cerebrospinal Fluid) کا افراز _____ اور _____ سے ہوتا ہے۔
- (8) شمی فصوص (Olfactory Lobes) میں پایا جانے والا کھلہ _____ کہلاتا ہے۔

(9) دماغ کے دونوں نصف کرے اندرونی طور پر عصبی ریشوں کی پٹی یا ڈور سے مربوط رہتے ہیں جن کو _____ اور _____ کہا جاتا ہے۔

(10) خاکی مادے سے تیار ہونے والی ع (Cerebrum) کی سطح _____ کہلاتی ہے۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) محور یہ کے بعض نقاط پر نغائی غلاف غیر موجود ہوتا ہے ان نقاط کو کیا کہا جاتا ہے؟
 (a) رائنور کے کرائب (b) بین کرائب (c) معاند (d) حر کی اختفائی تختی
- (2) نغائی غلاف دار ریشے کن اعصاب میں پائے جاتے ہیں؟
 (a) قحی اعصاب (b) مشار کی اعصاب (c) مشار کی اور نغائی
 (d) مشا اور قحی
- (3) غیر قحی عصبیے کس حیوان میں پائے جاتے ہیں؟
 (a) حلبیہ کے جنین (b) غیر حلبیہ کے جنین
 (c) ہائیزرا (d) کسی میں بھی نہیں پائے جاتے
- (4) نغائی ڈور کے اعصاب میں کسی قسم کے اعصاب پائے جاتے ہیں؟
 (a) حسی اعصاب (b) حر کی اعصاب (c) مخلوط اعصاب
 (d) دماغ اور نغائی ڈور کے کہلوں کی اندرونی سر حلی سطر کن غلیوں سے تیار ہوتی ہے؟
- (5) خود سر لیش غلیے (b) عصبی افزای غلیے (c) بر غلیہ غلیے (d) ریشی تارہ غلیے
 (6) نغائی غدود (Pituitary Gland) کی تیاری دماغ کے کس حصہ سے ہوتی ہے؟
 (a) نغاع مستطیل (b) دماغ (c) چشی نصوص (d) دماغ قریب کے فرش
- (7) نغاع مستطیل کے اوپر عصبی ہل کے طور پر پلایا جانے والا دماغی حصہ کیا کہلاتا ہے؟
 (a) پائس درولی (Pons Varoli) (b) قرن آسونی (Hippocampal)
 (c) دماغ (Cerebellum) (d) وسطی دماغ

- (8) محیطی عصبی نظام میں کتنے جوڑ قحی اعصاب کے پائے جاتے ہیں
- (a) 31 جوڑ (b) 43 جوڑ (c) 12 جوڑ (d) 40 جوڑ
- (9) نخاعی اعصاب کس قسم کے ہوتے ہیں؟
- (a) تمام حسی (b) تمام حرکی (c) تمام مخلوط (d) بعض حسی اور بعض حرکی
- (10) نخاعی عصب کے بطنی جز میں کونے عصبیے پائے جاتے ہیں؟
- (a) حرکی عصبائے (b) درمیانی عصبیے (c) حسی عصبیے (d) حرکی اور حسی

7.3.3. جوڑیاں لگائیے

B	A
() رد عمل کو ظاہر کرنے والا عضو	(1) غیر مشروط معکوسی عمل
() چو جوڑ (Quadrigenina)	(2) مشروط معکوسی عمل
() نر مشاء کی اور مشاء کی عصبی نظام	(3) مصلہ عضو
() جڑوں کی حرکت	(4) موثر عضو
() آنکھ کی اندرونی پرت شبکیہ	(5) چشمی فصیں
() نخاعی اعصاب کی ظہری جز	(6) دماغی قریب
() اکتسابی معکوسی عمل	(7) ع
() نزقعر (Paracoel)	(8) دو قطبی عصبیے
() تحریک کو قبول کرنے والا عضو	(9) یک قطبی عصبانیہ
() دو قعر (Diacoe)	(10) خود کار عصبی نظام

سبق 11 ضبط اور ہم ارتباط

(Control and Co-Ordination)

-
- 1 سبق کا خاکہ
 - 2 تمہید
 - 3 سبق کا متن
 - 3.1 ضبط اور ہم ارتباط کی تعریف
 - 3.2 کیسائی ہم ارتباط
 - 3.2.1 دروں افزائی نمود
 - 4 خلاصہ
 - 5 زائد معلومات
 - 6 فرہنگ
 - 7 نمونہ امتحانی سوالات
 - 7.1 مختصر جوابی سوالات
 - 7.2 طویل جوابی سوالات
 - 7.3 معروضی سوالات
 - 7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجیے۔
 - 7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے
 - 7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

سبق کا خاکہ

1



اس سبق میں آپ کو درجہ ذیل معلومات فراہم کی جائیں گی۔

- ☆ ضبط اور ہم ارتباط کی تعریف
- ☆ کیمیائی ہم ارتباط
- ☆ دروں افزائی غدود۔۔۔۔۔۔ اقسام، افعال اور انسانی جسم میں ان کی اہمیت

تمہید

2



پچھلے سبق میں آپ انسانی عصبی نظام کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ کو ضبط اور ہم ارتباط کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گے کیوں کہ جاندار کے جسم میں مختلف اعضاء اور اعضائی نظام کے درمیان باہمی ربط اور ان پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے جس کو آپ ضبط اور ہم ارتباط (Control and Co-ordination) کہتے ہیں جس کے باعث جاندار اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح ہمارے جسم میں ضبط اور ہم ارتباط پایا جاتا ہے اور اس مخصوص عمل کی عمل آوری کن غدودوں سے ہوتی ہے۔

سبق کا متن

3



3.1 ضبط اور ہم ارتباط کی تعریف

ارتقاء (Evolution) کے دوران خلیوں (Cells)، بافتوں (Tissues) اور اعضاء (Organs) میں بتدریج خصوصی و جدید تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نیز ان پر ماحول کے مختلف سمجھوں کا اثر ہوتا ہے جس کو وہ قبول کر کے مجموعی رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے مختلف افعال کے درمیان رابطہ اور ان پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جاندار کے جسم میں مختلف اعضاء اور اعضائی نظام کے درمیان باہمی رابطہ اور ان پر قابو رکھنا ضبط اور ہم ارتباط (Control and Co-ordination) کہلاتا ہے۔ ایک خلوی جانداروں کے جسم میں واحد غلیہ ہی نہ صرف زندگی کے تمام اہم افعال کو انجام دیتا ہے بلکہ ان مختلف افعال پر ضبط (Control) اور ان کے درمیان ہم ارتباط (Co-ordination) کو قائم رکھتا ہے اور ماحول کے مختلف اقسام کی

تحریکات (Stimuli) کے زیر اثر منفی یا مثبت رد عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ کثیر خلوی حیوانات کے جسم کی بناوٹ پیچیدہ ہوتی ہے اور جسم میں مختلف افعال کو انجام دینے کے لئے مخصوص علیحدہ نظام پائے جاتے ہیں جن کے درمیان ہم ارتباط (Co-ordination) پایا جاتا ہے اور ان پر ضبط (Control) قائم رکھنے کے لئے مخصوص طریقہ عمل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نباتات میں مختلف افعال کے درمیان ہم ارتباط صرف کیمیائی نوعیت کا ہوتا ہے جبکہ حیوانات بشمول انسان میں ہم ارتباط دو قسم کا ہوتا ہے (1) کیمیائی ارتباط (Chemical Co-ordination) اور (2) عصبی ہم ارتباط (Neural Co-ordination)۔ اس سبق میں آپ کو کیمیائی ہم ارتباط کے متعلق تفصیل سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔



شکل 11.1
ہم ارتباط

3.2 کیمیائی ہم ارتباط (Chemical Coordination)

کیمیائی ارتباط مخصوص کیمیائی مادوں کے ذریعہ قائم ہوتا ہے۔ ان کیمیائی مادوں کو کیمیائی پیام رساں (Chemical Messengers) کہا جاتا ہے جو مخصوص ہارمونس (Hormones) ہوتے ہیں۔ ہارمونس کو افراز کرنے والے مخصوص غلیے باہم مل کر غدود (Glands) تیار کرتے ہیں جن کو دروں افرازی غدود (Endocrine Glands) کہا جاتا ہے۔ ان ہی غدود میں ہارمونس تیار بھی کئے جاتے ہیں جو راست خون میں افراز کئے جاتے ہیں اور خون میں گردش کرتے ہیں۔ مخصوص ہارمونس مخصوص غلیوں یا بافتوں پر ہی اثر کرتے ہیں۔ ہارمونس تمام حیوانات میں مختلف حیاتی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں قابو میں رکھتے ہیں۔ فقری حیوانات میں مختلف حیاتی عمل جیسے نشوونما، نمو، ہاضمہ، تولید اور استخوان (Skeleton) کی تیاری میں ہارمونس اہم رول ادا کرتے ہیں۔ غیر فقری حیوانات میں ہارمونس کے باعث کریزی (Moulting) یعنی جسم کی جلد کا جھڑنا، قلب (Metamorphosis) یعنی نشوونما کے دوران واقع ہونے والی تمام تبدیلیاں جس کے باعث سروا (Larva) بالغ حیوان میں تبدیل ہوتا ہے اور ہجرت (Migration) یعنی حیوانات کی خاص مقصد کے لئے ایک مقام سے دوسرے موزوں مقام کو منتقلی وغیرہ قابو میں رکھے جاتے ہیں۔ ہارمونس فقری اور غیر فقری حیوانات میں ان مختلف حیاتی عمل کو نہ صرف قابو میں رکھتے ہیں بلکہ ان کے درمیان ہم ارتباط کو بھی قائم رکھتے ہیں جس کے باعث یہ حیاتی عمل توازن میں رہ کر بہتر طور پر انجام پاتے ہیں جو کہ جاندار کی نامل زندگی کے لئے بے حد ضروری ہے۔ بعض ہارمونس حیاتی عمل کی رفتار کو تیز کرتے ہیں جب کہ بعض ہارمونس حیاتی عمل کی رفتار کو سست کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ورقہ غدود (Thyroid Gland) سے افراز ہونے والا ہارمون تھائراکسن (Thyroxine) نشوونما کو تیز کرتا ہے جب کہ گرادی غدود (Adrenal Gland) سے افراز ہونے والا ہارمون ایڈرینلین (Adrenaline) آنت کی دیوار کی حرکت کو کم کرتا ہے۔ اس طرح جسم کے مختلف افعال کی باقاعدگی کے لئے ہارمونس کا مقررہ مقدار میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی ہارمون کی مقررہ مقدار میں کوا یا بیشی نشوونما کے عمل کو متاثر کر دیتی ہے کیوں کہ ہارمونس کافی موثر (Potent) ہوتے ہیں اور کافی قلیل مقدار میں اثر پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس لئے ہارمونس اپنا اثر چند ثانیوں میں یا گھنٹوں میں یا دنوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا انحصار ہارمون کے ہدف عضو (Target Organ) پر عمل کرنے کی نوعیت پر ہوتا ہے۔

ہارمونس کیمیائی لحاظ سے دو گروہوں میں تقسیم کئے جاتے ہیں۔

1) چربی میں حل پذیر اسٹیرائیڈ ہارمونس (Steroid Hormones)۔

2) پروٹینی ہارمونس (Protein Hormones)۔ یہ پروٹینس (Proteins)، پالی پیپٹائیڈس (Polypeptides) اور اینزائمز (Enzymes) ہیں۔

(Amino Acids) کے محاصل (Derivatives) ہوتے ہیں۔


3.2.1 دروں افرازی غدود (Endocrine Glands)

حیوانات بشمول انسان میں بعض مخصوص افرازی خلیے منظم ہو کر غدود (Glands) بناتے ہیں۔ کیمیائی مادوں کی منتقلی کے لئے قاتوں (Ducts) کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بنیاد پر غدود کی دو اقسام پائی جاتی ہیں جو 1) دروں افرازی غدود (Exocrine Glands) اور 2) دروں افرازی غدود (Endocrine Glands) ہیں۔ ایسے غدود جن میں قاتیں (Ducts) پائی جاتی ہیں جن کے ذریعہ ان غدود سے افراز ہونے والے کیمیائی مادے ہدف بافتوں یا اعضاء کو منتقل کئے جاتے ہیں دروں افرازی غدود کہلاتے ہیں۔ ان غدود سے باہر میں مدد دینے والے خالص (Enzymes) اور دوسرے کیمیائی مادے خارج کئے جاتے ہیں۔ لیکن ان غدود سے ہارمونس خارج نہیں ہوتے۔ برخلاف اس کے دروں افرازی غدود ایسے غدود ہوتے ہیں جن میں قاتیں (Ducts) نہیں پائی جاتیں اور ان میں تیار ہونے والے کیمیائی مادے جو ہارمونس کہلاتے ہیں راست خون میں داخل کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے دروں افرازی غدود کو بے قات غدود (Ductless Glands) کہا جاتا ہے۔ تمام دروں افرازی غدود باہمی ربط اور تعاون کے ذریعہ اپنا فعل انجام دیتے ہیں اور ان کے اثرات باہم مربوط رہتے ہیں۔ تمام دروں افرازی غدود کے افعال عصبی نظام کے تعاون سے انجام دیئے جاتے ہیں۔ انسان میں پائے جانے والے دروں افرازی غدود (Endocrine Glands) حسب ذیل ہیں۔

- 1) نخاعی غدود (Pituitary Glands)
- 2) ورقہ غدود (تھائی رائیڈ غدود) (Thyroid Gland)
- 3) نزد ورقہ غدود (Parathyroid Glands)
- 4) برگرودی غدود (Adrenal Gland)
- 5) آیلینس آف لنگرہانس (Islets of Langerhans)
- 6) ٹیسٹس (Testes)

(7) بیض دان (Ovary)

(8) شہ (Placenta)




شکل 11.2

انسان میں افزائی غدود کے مقامات

(1) نخاعی غدود (Pituitary Gland)


نخاعی غدود تمام دروں افزائی غدود میں اقل ترین جسامت کا غدود ہوتا ہے۔ اس کی جسامت ایک مٹر کے چ کے مماثل ہوتی ہے۔ بالغ انسان میں اس غدود کا وزن 0.5 گرام ہوتا ہے۔ اس غدود کو دروں افزائی نظام کا استادی غدود (Master Gland of the Endocrine System) کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ دیگر تمام دروں افزائی غدود کے انحال پر کنٹرول رکھتا ہے۔




شکل 11.3

نظامی غدود کے اگلے فص اور پچھلے فص سے مختلف ہارمونز کا
اخراج اور مخصوص ہدف ہانتوں پر ان کا عمل

نظامی غدود دماغ کے وسطی حصہ کے پستانی جانب پر ایک ڈھلے کے ذریعہ جڑا رہتا ہے۔ نظامی غدود تین فصوں (Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلا فص غدہ زیر نمو (Adenohypophysis)، پچھلا فص عصی زیر نمو (Neurohypophysis) اور درمیانی فص جز وسطی (Pars Intermedia) کہلاتا ہے۔



شکل 11.5
نظامی حدود کے مختلف حصے



مثال 11.6

مخارجی ضمیمہ کی عرضی تراش۔ مختلف حصے مختلف ہارمونس کو فراہم کرتے ہوئے

نخاعی غدود سے خارج ہونے والے مختلف ہارمونز ان کے عمل کا مقام اور افعال کو جدول کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

ہارمون	عمل کا مقام	افعال
(1) نموئی ہارمون (Growth Hormone)	بانتیں	پروٹین (Protein) کی تالیف کو فروغ دیتا۔ عضویہ کی طبعی نمو، جوارح اور ہڈیوں کا نمو۔ برگردی غدود کا نمو، برگردی قشرہ
(2) ایڈرینو کارٹیکو ٹراک ہارمون (Adrenocortico Tropic Hormone)	برگردی غدود (Adrenal Gland)	ایڈرینل ہارمون کے افراز میں مدد دیتا۔ ورقہ غدود کو متحرک کرتا اور تھائراکسن (Thyroxine) نامی ہارمون کے افراز میں مدد دیتا۔
(3) ورقہ تحریک کار ہارمون (Thyroid Stimulating Hormone)	ورقہ غدود (Thyroid Gland)	عورتوں میں گرانی جراب (Graafian Follicle) کی جسامت اور تعداد میں اضافہ کرتا ہے اور ایسٹروجن (Oestrogen) ہارمون کے افراز میں مدد دیتا ہے۔
(4) جراب تحریک کار ہارمون (Follicle Stimulating Hormone)	مادہ کے بیض دان (Ovary) اور نر کے بیضے (Testes)	نر کے بیضے (Testis) میں منویہ زائی (Spermatogenesis) کے عمل کو متحرک کرتا اور ٹیسٹوسٹیرون (Testosterone) ہارمون کے افراز میں مدد دیتا۔
(5) لوٹینائزنگ ہارمون (Luteinizing Hormone)	بیض دان (Ovary)	مادہ کے بیض دان میں جسم اصغر (Carpus Luteum) کے نمو کو باقاعدہ بناتا اور پروگیسٹرون (Progesterone) ہارمون کے افراز میں مدد دیتا۔
(6) پرو لاکٹن (Prolactin)	پستانوی غدود (Mammary Gland)	نر میں بیضے کے بین خلائی خلیے (Interstitial Cell) کی عاملیت کو قابو میں رکھتا۔ بچہ کی پیدائش کے بعد عورتوں میں دودھ کے افراز کو شروع کرتا۔

- (7) واسوپرسن (Vasopressin) گردے (Kidney) یا اینٹی ذائیورٹک ہارمون (Antidiuratic Hormone) گردوں میں پانی کے دوبارہ انجذاب کو باقاعدہ بنانا۔ خارج ہونے والے پیشاب کے حجم کو کم کرنا اور خون کے دباؤ میں اضافہ کرنا۔
- (8) آکسی ٹوسن (Oxytocin) پستانوں کی غدود (Mammary Gland) دودھ کو خارج کرنے پستانوں کی غدود عضلات اور رحم (Uterus) اور بچے کی پیدائش کے دوران رحم کے ہموار عضلات میں سکڑاؤ پیدا کرنا۔ خون کے دباؤ میں کمی کرنا۔
- (9) میلانین خلیہ تحریک کار میلانین بردارے (Melanocytes) ہارمون (Melanophores) Stimulating Hormone) پر غدود اور پستانوں میں اس کا ردول غیر واضح ہے لیکن ادنیٰ فطری حیوانات اور مینڈک کی جلد میں رنگ کو نکھرنا اور نئے صبغوں (Pigments) کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔

نخاعی غدود کے عارضے (Disorders of Pituitary)

- (i) نموئی ہارمون (Growth Hormone) کے باعث واقع ہونے والے عارضے انسان میں نخاعی غدود کے افرازات میں اگر بے قاعدگی پیدا ہو جائے تو مختلف عارضے لاحق ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں نموئی ہارمون (Growth Hormone) کے افراز میں کمی واقع ہو تو جسم کا نمو متاثر ہو جاتا ہے جس کے باعث بچے کے قد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس حالت کو پست قدی (Dwarfism) کہا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے بچپن میں اگر نموئی ہارمون کا افراز کافی مقدار میں ہو جائے تو بچے کے قد میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے اس حالت کو دیو قاستی (Gigantism) کہا جاتا ہے۔ بالغوں میں اس ہارمون کے افراز میں کمی اگر وہمیگالی (Acromegaly) کا باعث بنتی ہے۔ اس عارضہ میں بالغوں کے جڑے، ہاتھ اور پیر کی ہڈیوں میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان کی شکل گوریلا (Gorilla) کے مانند دکھائی دیتی ہے۔ بالغوں میں اس ہارمون کی کمی کے باعث چہرہ، ہاتھ اور پیر کی ہڈیوں کے مومیں کمی واقع ہوتی ہے اور بال جھڑ جاتے ہیں اور جنسی افعال (Sexual Functions) ضائع ہو جاتے ہیں اس حالت کو اکرومیکریا (Acromicria) کہا جاتا ہے۔



شکل 11.9
دیہ قامت آدمی



شکل 11.8
پست قد آدمی



شکل 11.7
عام آدمی


(ii) واسوپرسن (Vasopressin) کے باعث واقع ہونے والے عارضے

اس ہارمون کو انتہی ڈائی یورٹک ہارمون (Antidiuretic Hormone) بھی کہا جاتا ہے چون کہ اس ہارمون کی موجودگی کی وجہ سے ایک عام انسان ایک دن میں تقریباً ایک لیٹر پانی کی مقدار کو پیشاب کی شکل میں خارج کرتا ہے یعنی ایک لیٹر پیشاب خارج ہوتا ہے لیکن اس ہارمون کے افراز میں کمی کی وجہ انسان ایک دن میں تقریباً 15 لیٹر خارج کرتا ہے۔ ہارمون کی کمی کے باعث پیشاب کا بکثرت خارج ہوتا ہے جسکی ذیابیطیس (Diabetic Insipidus) کہلاتا ہے۔

(2) ورقیہ غدود (Thyroid)

ورقیہ غدود کو تھوماس وہارٹن (Thomas Wharton) نے دریافت کیا۔ ورقیہ غدود گردن کے حصہ میں

قصیہ (Trachea) کی دونوں جانب حجرہ (Larynx) کے نیچے پایا جاتا ہے۔ انسان میں اس کا وزن 20 تا 30 گرام ہوتا ہے۔ یہ دو فصوں (Lobes) پر مشتمل ہوتا ہے۔ دونوں فصیں ایک تنگ پٹی کے ذریعہ جڑی رہتی ہیں جس کو تنگٹائے (Isthmus) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک فص کئی جرابوں (Follicles) پر مشتمل ہوتی ہے۔



شکل 11.10

درقیہ غدد

درقیہ غدد سے دو قسم کے ہارمونز افراز ہوتے ہیں جن کو تھائراکسن (Thyroxine) اور کیلسیٹونین (Calcitonin) کہتے ہیں۔ تھائراکسن میں آیوڈین (Iodin) موجود ہوتا ہے۔ جسم میں آیوڈین کی جملہ مقدار 12 گرام ہوتی ہے۔ جس کی اعظم ترین مقدار تھائراکسن کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے۔ تھائراکسن خون میں ایک پروٹین کے ساتھ جڑی ہوئی حالت میں رہتا ہے۔ اس پروٹین کو تھائرو گلوبولین (Thyroglobulin) کہا جاتا ہے۔ تھائراکسن جسم میں پروٹین کی تیاری کو متحرک بناتا ہے، نشوونما کو فروغ دیتا ہے اور اساسی تحولی شرح (Basal Metabolic Rate) میں اضافہ کرتا ہے جس کی وجہ سے توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ مائوسکرینیڈس شکر (Monosaccharide Sugar) کے انجذاب کو بہتر بناتا ہے اور جسمانی

تپش (Temperature) میں اضافہ کرتا ہے۔ کیلسیٹونین (Calcitonin) ٹائی ہارمون در قیہ غدود اور نزد در قیہ غدود (Parathyroid Gland) دونوں سے افراز ہوتا ہے۔ اس میں آیوڈین نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ہڈیوں میں کیلشیم کو ذخیرہ کرنے کا سبب بنتا ہے جس کے باعث خون میں کیلشیم کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے۔
در قیہ غدود کے عارضے

تھائراکسین ہارمون کی قلت کے باعث بچوں میں ایلیمی (Cretinism) اور بالغوں میں مختل درم (Myxoedema) ٹائی عارضے لاحق ہوتے ہیں۔ بچوں میں ایلیمی ٹائی عارضہ کے باعث نشوونما میں کمی، جسم کے مختلف اعضاء کی جسامت میں غیر متساوی تہذیبیاں، ڈھنی معذوری اور ثانوی جنسی خصوصیات کے نمو میں رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔ اس عارضہ سے متاثرہ شخص جس کی عمر 30 سال کی ہو وہ 4 تا 5 سال کی عمر کے لڑکے کے برابر دکھائی دیتا ہے۔



شکل 11.11

ایلیمی (Cretinism)

بالغوں میں مختل درم (Myxoedema) کی وجہ سے فقر الدم (Anaemia)، جلد کے بعض مقامات پر سوجن، اساسی تحولی شرح (BMR) میں کمی اور سردی کے لئے حساسیت پائی جاتی ہے۔



شکل 11.12

مخامی درم (Myxoedema)

در قیہ غدود کی فوق عاملیت (Over Activity) یا متاخر اکسن ہارمون کا غیر معمولی زائد افراز اشخاص میں بدوں چشمی کلہڑ (Exophthalmic Goiter) نامی عارضہ کا سبب بنتا ہے۔ اس عارضہ میں در قیہ غدود کی جسامت بڑھ جاتی ہے، شرح نبض (Pulse Rate) میں اضافہ اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آتے ہیں۔



شکل 11.13

بدوں چشمی کلہڑ (Exophthalmic Goiter)

نڈا میں آیوڈین کی کمی بھی سادہ گلہڑ (Simple Goitre) کی عارضہ کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے ورقہ غدود کی جسامت اور گردن کی جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔




فکل 11.13


سادہ گلہڑ (simple Goitre)

(3) نزدورقہ غدود (Parathyroid Gland)

انسان میں نزدورقہ غدود (Parathyroid Gland) کی تعداد چار ہوتی ہے جو ورقہ غدود (Thyroid Gland) کی پچھلی سطح پر پائے جاتے ہیں۔ اس غدود کی جسامت $3 \times 5 \times 5$ ملی میٹر اور وزن 0.023 ± 0.05 گرام ہوتا ہے۔ زندگی کے لئے اس غدود کی موجودگی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس غدود کو نکال دیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس غدود سے افراز ہونے والے ہارمون کو پیراتھارمون (Parathormone) کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون کیلشیم اور فاسفیٹ کے تحول (Metabolism) کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہارمون گردے اور ہڈیوں پر عمل کرتا ہے۔ اس ہارمون کی وجہ سے کیلشیم اور فاسفیٹ ہڈیوں سے علیحدہ ہو کر خون میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گردوں کے نالیچوں اور غذائی نالی میں کیلشیم اور فاسفیٹ کے انجذاب کی شرح میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس ہارمون کی وجہ سے پستانی غدود سے کیلشیم کے افراز میں تخفیف ہو جاتی ہے۔



شکل 11.13
زورقہ غدہ



شکل 11.14 زورقہ غدہ اور دورقہ غدہ کی کارکردگی۔ میٹیم کی فلی ہاتھ کی

نزدور قیہ غدود کے عارضے

انسان میں ہیراتھارمون کا معمول سے کم افراز (Hyposecretion) یا نزدور قیہ غدود کی جسم سے علیحدگی نیشانی (Tetany) نامی عارضہ کا باعث بنتی ہے۔ اس عارضہ میں حسب ذیل علامتیں پائی جاتی ہیں۔

- i دانت کیلی جس کے باعث عضلات کا سکڑنا۔
- ii خون میں کیلشیم کی 10 ملی گرام فی صد سے 6 ملی گرام فی صد تک کی اور فاسفورس کا اضافہ۔
- iii قلبی دھڑکن کی شرح میں اضافہ۔
- iv شرح تنفس میں اضافہ اور آواز کا پید اہوتا۔
- v لعاب کا بافراط خارج ہوتا۔
- vi جسمانی تپش میں اضافہ وغیرہ۔

مریض بالآخر اس عارضہ میں موت کا فکار ہو جاتا ہے۔

ہیراتھارمون کا معمول سے زیادہ افراز (Hypersecretion) عظمی مسامداری (Osteoporosis) نامی عارضہ کا باعث بنتا ہے۔ اس ہارمون کے زیادہ افراز کی وجہ سے ہڈیوں سے کیلشیم خارج ہوتی ہے اور خون میں کیلشیم کی مقدار کا اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور اسٹینج کی طرح ہو جاتی ہیں جو بامسانی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس حالت کو عظمی مسامداری کہا جاتا ہے۔

(4) برگردوی غدود (Adrenal Gland)

انسان میں گردے کی ظہری سطح پر دو چٹے ٹوپی کی مانند ساختیں پائی جاتی ہیں جن کو برگردوی غدود (Adrenal Gland) یا فوق گردوی غدود (Supraadrenal Gland) کہا جاتا ہے۔ ہر ایک غدود کی لمبائی 1 تا 2 انچ اور وزن 8 تا 9 گرام ہوتا ہے۔ ہر ایک غدود دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اوپری حصہ قشرہ (Cortex) اور اندرونی حصہ نفاع (Medulla) کہلاتا ہے۔ ان دونوں حصوں سے مختلف ہارمونز افراز کئے جاتے ہیں جن کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

غدد کا حصہ	ہارمونس	افعال
1 قشرہ (Cortex)	۸ جنسی ہارمونس (Sex Hormones)	یہ ثانوی جنسی خصوصیات اور اصل جنسی خصوصیات، جیسی ہالتوں کے مو، منویہ زائی
	1 اینڈروجن (Androgen)	1 اینڈروجن (Spermatogenesis) اور جننی برتاؤ کو ظاہر کرتے
	2 ائیٹروجن (Oestrogen)	2 ائیٹروجن (Oestrogen) ہیں۔
	3 پروجیسٹرون (Progesteron)	3 پروجیسٹرون (Progesteron)
	B گلو کو کارٹیکائڈس (Glucocorticoids)	یہ کاربوہائیڈریٹس، چربی اور پروٹینس کے تحول (Metabolism) کو باقاعدہ بناتے ہیں۔
	1 کارٹیسول (Cortisol)	1 کارٹیسول (Cortisol)
	2 کارٹیکو اسٹیرون (Corticosterone)	2 کارٹیکو اسٹیرون (Corticosterone)
	C معدنیاتی کارٹیکائڈس (Mineralocorticoids)	یہ معدنیات (Minerals) خاص کر سوڈیم (Na) پوٹاشیم (K) کے تحول (Metabolism)
	1 الڈوسٹیرون (Aldosterone)	1 الڈوسٹیرون (Aldosterone) کو باقاعدہ بناتے ہیں۔
	2 II ڈی آکسی کارٹیکو اسٹیرون (II-Deoxycorticosterone)	2 II ڈی آکسی کارٹیکو اسٹیرون (II-Deoxycorticosterone)
نخاع (Medulla)	ایڈرینالین (Adrenaline) یا اپنیٹفرین (Epinephrine)	قلبی دھڑکن (Heart Rate) کا بڑھ جانا، قلبی ماحول (Cardiac Output) کا اضافہ، خون کا دباؤ زیادہ ہونا، تنفس کا بڑھنا، وعادار ہموار عضلات کا سکڑاؤ، جلدی وعادوں کا سکڑنا، عضلاتی وعادوں کا پھیلاؤ مزاحمت کا کم ہونا ہے۔

جگر میں شکر پائیدگی کو انجام دینا، خیموم

نار ایڈری ملین

(Bronchi) کا پھیلاؤ، قلبی دھڑکن میں کمی

(Nor-adrenaline)

خون کے دباؤ میں کافی اضافہ، تنفس کا بڑھنا، جلدی

نار اپی مفرین


وعادوں اور عضلاتی وعادوں میں سکڑاؤ، تحول میں کمی

(Nor- Epinephrine)

قدر اضافہ، مجموعی سطحی مزاحمت میں اضافہ، قصبی نالیوں

(Bronchia) کا کمی قدر پھیلاؤ، کردوں میں دعائی

سکڑاؤ (Vasoconstriction)۔




شکل 11.15

انسانی بر گردوی غدود کا مقام

ایڈری ملین (Adrenalin) کے افراز کی وجہ سے انسان میں غصہ، لڑنے کے لئے اکسائے جاتا یا خوفزدہ ہو جاتا اور

خوف کے مقام سے دور ہو جاتا، وغیرہ جیسی ایمر جنسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے بر گردوی غدود اور اس ہارمون کو "جوش

و خروش" (Fight or Flight) یا ایمر جنسی (Emergency) غدود اور ہارمون کہا جاتا ہے۔



شکل 11.16

برگردہ کی عرضی تراش

(5) آیلےس آف لنگرہانس (Islets of Langerhans)

لبہ انسان میں آنت اور معدہ کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ملوہ غدود (Mixed Gland) ہے جو بروں افزائی (Exocrine) اور بروں افزائی (Endocrine) حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بروں افزائی حصہ سے لیبی رس (Pancreatic Juice) خارج ہوتا ہے جو مختلف ہاضمی خامروں (Digestive Enzymes) پر مشتمل ہوتا ہے۔ بروں افزائی حصہ کو لنگرہانس (Langerhans) نامی سائنسدان نے 1869ء میں دریافت کیا جو خلیوں کے تودوں کی شکل میں پایا گیا ہے۔ اس لئے اس حصہ کو آیلےس آف لنگرہانس (Islets of Langerhans) کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آیلےس آف لنگرہانس میں تین اقسام کے خلیے پائے جاتے ہیں جو ہارمونز کو افراز کرتے ہیں۔ ان خلیوں میں (1) الفا خلیے (Alfa Cells)، (2) بیٹا خلیے (Beta Cells) اور (3) ڈیلٹا خلیے (Delta Cells) شامل ہیں۔

(i) الفا خلیے (Alfa Cells)

الفا خلیے (Alfa Cells) گلو کاگان (Glucagon) نامی ہارمون افراز کرتے ہیں۔ یہ ہارمون جگر میں گلائیکوجن پاشیدگی (Glycogenolysis) کے ذریعہ گلائیکوجن (Glycogen) کو گلو کوڈ (Glucose) میں تبدیل کرتا ہے جس کی وجہ سے خون میں گلو کوڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ خون میں گلو کوڈ کی کمی الفا خلیوں کو متحرک بناتی ہے جو گلو کاگان


(Glucagon) ہارمون کا افراز کرتے ہیں۔

(ii) بیٹا خلیے (Beta Cells)

خون میں جب گلو کوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو بیٹا خلیے متحرک ہو جاتے ہیں جو انسولین (Insulin) نامی ہارمون کو افراز کرتے ہیں۔ انسولین جگر میں گلائیکوجن زائی (Glycogenesis) کے ذریعہ گلو کوز کو گلائیکوجن میں تبدیل کرتی ہے اور خون میں موجود گلو کوز کو خلیوں کے اندر منتقل کرنے میں حاصل بردار (Carrier) کا فعل انجام دیتی ہے جس کے باعث خون میں گلو کوز کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ گلائیکوجن اور انسولین دونوں افعال میں ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں۔

(iii) ڈیلٹا خلیے (Delta Cells)

یہ خلیے الفا خلیوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ یہ قلیل مقدار میں کیسٹرین (Gastrin) نامی ہارمون کا افراز کرتے ہیں جو معدہ کے ذریعہ خارج کیے جانے والے کیسٹرین ہارمون کے مماثل ہوتا ہے۔ یہ ہارمون معدہ کو ہاضمی خمرے افراز کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے۔



فصل 11.18

انسانی لبلہ کی ساخت

انسولین قلتی عارضہ


جسم میں انسولین (Insulin) کی قلت ذیابیطس شکاری (Diabetes Mellitus) نامی عارضہ کا باعث بنتی ہے اس عارضہ میں حسب ذیل علامتیں پائی جاتی ہیں۔

- (a) فوق شکاری (Hyperglycaemia): انسولین کی قلت خون میں شکر کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔
- (b) گلاٹکوسوریا (Glycosuria): پیشاب میں شکر موجود ہوتی ہے۔
- (c) کثیربول (پالی یوریا Polyuria): پیشاب کا حجم تقریباً 10 لیٹر فی یوم خارج ہوتا ہے۔ وقفہ وقفہ سے پیشاب بکثرت خارج ہوتا ہے۔
- (d) کیٹونوریا (Ketonuria): پیشاب میں کیٹون اجسام ظاہر ہوتے ہیں۔
- (e) کیٹونیمیا (Ketonemia): خون میں کیٹون اجسام ظاہر ہوتے ہیں۔
- (f) زخم کے مندمل میں تاخیر ہوتی ہے۔

ذیابیطس کے مریض کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ انسولین کا انجکشن پابندی سے لگوائے جس کے ذریعہ خون میں شکر کی مقدار حسب معمول رہ سکتی ہے۔

(6) اٹھے (Testes)

اٹھے (Testes) کا اصل کام زواجوں یعنی منویوں (Sperms) کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ثانوی طور پر دروں افزائی فعل بھی انجام دیتے ہیں۔ اٹھوں (Testes) کے منویہ بردار نالیچوں (Seminiferous Tubules) کے درمیان پائے جانے والے بین خلائی خلیے (Interstitial Cells) نر جنسی ہارمونس کا افراز کرتے ہیں جس کو اینڈروجن (Androgen) کہا جاتا ہے۔ اینڈروجن کو ٹیسٹوسٹیرون (Testosterone) کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمونس مرد اشخاص میں معاون نر جنسی اعضاء جیسے قنیب (Penis)، قدامیہ غدود (Prostate Gland) کا دہرس غدود (Cowpers Gland) اور منوی کیسوں (Seminal Vesicles) کے نمو کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نر ثانوی جنسی خصوصیات کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹس، چربی اور پروٹینس کے تعمیراتی تحول (Anabolic Metabolism) کو فروغ دیتے ہیں۔



شکل 11.18

انسانی انجیہ

(7) بیضہ ان (Ovary)

یہ مادہ تولیدی عضو ہے۔ اس میں بیضے (Ova) تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دروں افزائی فعل بھی انجام دیتے ہیں۔ ان سے خارج ہونے والے ہارمونس میں ایسٹروجن (Oestrogen) 'پروگسٹیرون' (Progesterone) 'ریلکسین' (Relaxin) شامل ہیں۔ ایسٹروجن جنسی اعضاء، چھاتی اور سرپتان (Nipple) کے نشوونما میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہارمونس عورتوں میں ثانوی جنسی خصوصیات جیسے بلند اوج والی آواز، ہالوں کا مخصوص نمو وغیرہ کو فروغ دیتا ہے۔ پروگسٹیرون (Progesterone) حمل کے دوران رحم کے نمو، جنین (Embryo) کی تنصیب اور مٹیہ (Placenta) کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ ریلکسین (Relaxin) پیدائش (Birth) کے وقت اہم رول ادا کرتا ہے۔




شکل 11.22

انسانی بیض دان

(8) مثمنہ (Placenta)

یہ ایک ہافت ہے جو عورتوں میں جنین کو رحم کی دیوار سے مربوط کرتی ہے۔ یہ دروں افزائی غدود کا فصل بھی انجام دیتی ہے۔ اس سے خارج ہونے والے ہارمونس میں ایسٹروجن، پروکسٹیرون، ریلیکسین (Relaxin) اور کوریونک گوناڈوٹروپن (CG) (Chorionic gonadotropin) اور کوریونک نمو ہارمون (Chorionic Growth Hormone) شامل ہیں۔ ہارمون نخاعی ہارمونس (Pituitary Hormones) کے ساتھ شامل ہو کر ایسٹروجن اور پروکسٹیرون کے افزاز کے لئے پیچہ ان (Ovary) کو فعال بناتا ہے۔



شمہ

نکل 11.23



4 سبق کا خلاصہ

جاندار کے جسم میں مختلف اعضاء اور اعضائی نظام کے درمیان باہمی رابطہ اور ان پر قابو رکھنا ضبط اور ہم ارتباط کہلاتا ہے۔ حیوانات میں ہم ارتباط دو اقسام کا ہوتا ہے (a) کیمیائی ہم ارتباط اور (b) عصبی ہم ارتباط۔ کیمیائی ہم ارتباط ہارمونز کے ذریعہ قائم ہوتا ہے۔ ہارمونز دروں افزائی غدود کے ذریعہ راست خون میں خارج کر دیئے جاتے ہیں جو مخصوص خلیوں اور ہانتوں پر ہی متقی یا مثبت اثر پیدا کرتے ہیں۔ ایسی ہانتیں جن پر ہارمونز اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں ہدف ہانتیں کہلاتی ہیں۔ ہارمونز جگر میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان میں پائے جانے والے دروں افزائی غدود میں نغائی غدود، درقیہ غدود، نزدورقیہ غدود، بر گردوی غدود، آہیلٹ آف لنگر ہانس، ایسے، بیچدان اور عیشہ شامل کئے جاتے ہیں۔ نغائی غدود کو دروں افزائی نظام کا استادی غدود کہا جاتا ہے چون کہ یہ دیگر تمام دروں افزائی غدود کے افعال پر کنٹرول رکھتا ہے۔ نغائی غدود سے خارج ہونے والے ہارمونز مختلف مقامات پر اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں جیسے ہانتوں پر موسمی ہارمون، بر گردوی غدود پر ایڈرینو کارٹیکو ٹراکٹ ہارمون، درقیہ

ہارمون 'در قہ غدود پر در قہ تحریک کار ہارمون 'مادہ کے بیض دان اور نر کے لٹھے پر جراب تحریک کار ہارمون 'بیضہ ان پر لوٹنا نرنگ ہارمون 'پستانوی غدود پر پرو لیکشن ہارمون 'گردے پر واسو پرن ہارمون 'پستانوی غدود اور رحم پر آکسی ٹوسن ہارمون 'میلانین برداریوں پر میلانین خلیہ تحریک کار ہارمون اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں۔ موسی ہارمون کی کمی کے باعث بچوں میں پست قدی (Dwarfism) اور بالغوں میں اکرومیکریا (Acromicria) اور اضافہ کے باعث بچوں میں دیو قاتی (Gigantism) عارضے لاحق ہوتے ہیں۔ واسو پرن ہارمون کی کمی کے باعث پھیکی ذیابیطس (Diabetic Insipidus) نامی عارضہ واقع ہوتا ہے جس میں پیشاب بکثرت خارج ہوتا ہے۔ گردن کے حصہ میں پائے جانے والے در قہ غدود سے تھاراکسن اور کیلیسٹوئین نامی ہارمونس افزا ہوتے ہیں۔ تھاراکسن ہارمون کی قلت بچوں میں الپئی (Cretinism) اور بالغوں میں مختالی (Myxoedema) نامی عارضوں کا باعث بنتی ہے۔ تھاراکسن کا زائد اضافہ بروں چٹھی گلہڑ نامی عارضہ کا سبب بنتا ہے۔

غذا میں آئیوڈین کی قلت در قہ غدود کی جسامت میں اور

گردن کی جسامت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ اس حالت کو سادہ گلہڑ (Simple Goitre) کہا جاتا ہے۔ نزد در قہ غدود سے افزا ہونے والا پیرا تھارمون جسم میں کیلشیم اور فاسفیٹ کے تحول کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ پیرا تھارمون کا زائد افزا عظمی مساماری (Osteoporosis) اور کم افزا ٹیٹانی (Tetany) نامی عارضوں کا باعث بنتا ہے۔ بر گردی غدود یا اس سے افزا ہونے والے ایڈری ملین (Adrenalin) ہارمون کو لاوا یا اڑاوا یا ایر جینیسی غدود ہارمون کہا جاتا ہے۔ آسمیلیٹ آف ٹنگر ہانس کے الغاء خلیوں سے گلو کاگان (Glucagen) جو خون میں گلو کوز کو بڑھاتا ہے اور بیٹا خلیوں سے انسولین (Insulin) جو خون میں گلو کوز کو کم کرتا ہے افزا کئے جاتے ہیں۔ جسم میں انسولین کی قلت ذیابیطس شکاری (Diabetes Mellitus) نامی عارضہ کا باعث بنتی ہے۔

لٹھیہ (Testis) سے ٹیسٹو اسٹیرون (Testosterone) نامی اینڈروجن (Androgen) ہارمون افزا ہوتا ہے جو معاون نر جنسی اعضاء کے نمو اور ثانوی نر جنسی خصوصیات کو فروغ دیتا ہے۔

بیضہ ان (Ovary) سے افزا ہونے والے ہارمونس میں ایسٹروجن (Oestrogen) پرو گیسٹرون (Progesterone) اور ریلیکس (Relaxin) شامل ہیں۔ ایسٹروجن مادہ جنسی اعضاء کے نمو اور مادہ ثانوی جنسی خصوصیات کو فروغ دیتا ہے۔ پرو گیسٹرون حمل کے دوران جنین (Embryo) کی تنصیب میں مدد دیتا ہے جب کے ریلیکوین پیدائش کے وقت اہم

رول ادا کرتا ہے۔

شہدہ (Placenta) سے ایسٹروجن، پروکسٹیرون، ریٹیکوین اور دیگر ہارمونز افزائے جاتے ہیں۔

5 زائد معلومات



- ☆ ہارمونز اپنے مخصوص ہدف خلیوں (Target Cells) پر مخصوص طریقہ کے ذریعہ اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔
- ☆ ہارمونز اسٹرائیڈس (Esteroids) یا پشتر پروٹینس اور پیپٹائیڈ (Peptide) قسم کے ہوتے ہیں۔
- ☆ ہارمونز کم سالمی وزن کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دموی شعریانوں کی دیوار سے باسانی باہر نفوذ ہو جاتے ہیں۔
- ☆ ہارمونز اپنے افعال کو انجام دینے کے بعد ضائع ہو جاتے ہیں یا غیر عامل بن جاتے ہیں۔
- ☆ ہارمونز غیر تریاق زائی (Non Antigenic) ہوتے ہیں۔

6 فرہنگ اصطلاحات



Adrenal Cortex	ایڈریٹل کارٹیکس	برگردی قشرہ	گردے (Kidney) پر پائے جانے والے دروں
Adrenal Gland	ایڈریٹل گلائینڈ	برگردی غدہ	افرازی غدود کی ہر دونی جانب کا حصہ۔ گردے کی سطح پر پایا جانے والا دروں افزائی
Adenohypophysis	ایڈینوہائپوفائیس	غده زیرہمو	نخاعی غدود (Pituitary Gland) کا ادیری
Bronchia	برانکیا	قصی نالیاں	قصی نالیاں جو قصیہ (Trachea) سے پھیپھڑوں (Lungs) کو جاتی ہیں۔

Corpus Luteum	کارپس لونیم	جسم اصغر	بیحد ان (Ovary) میں پائی جانے والی وہ ساخت جو شق ہونے والے جراب (Follicle) کا باقی ماندہ حصہ ہے یہ ایسٹروجن (Estrogen) اور پروگیسٹرون (Progesterone) نامی ہارمونز افراز کرتی ہے۔
Cardiac Output	کارڈیک اوپٹ	قلبی ماحصل	قلب (heart) سے پمپ کئے جانے والے خون کا حجم۔
Endocrine Glands	اینڈو کرائین گلائنڈس	دروں افرازی غدود	بے قات غدود جو ہارمونز کو خون میں راست افراز کرتے ہیں۔
Enzyme	ینزیم	خامرہ	جاندار کے جسم میں پایا جانے والا تھامی عامل (Catalyst) (کیمیائی مرکب) جو کیمیائی تعاملات کو باقاعدہ بناتا ہے۔
Exocrine Gland	اکزو کرائین گلائنڈ	دروں افرازی غدود	خامرے (Enzymes) کو افراز کرنے والا غدود۔
Graafian Follicle	گرافین فوائکل	گرائنی جراب	بیحد ان میں پائی جانے والی کیسہ نما ساخت جس میں بیضہ (Ovum) موجود ہوتا ہے۔
Hormone	ہارمون	ہارمون	کیمیائی پیچیدہ مادہ جو دروں افرازی غدود سے راست خون میں خارج کیا جاتا ہے۔
Interstitial Cells	انٹراسٹیشیل سیل	بین خلائی خلیے	خلیوں کے درمیان پائی جانے والی جگہوں میں موجود خلیے۔

Larva لاروا سردا جنین (embryo) سے حاصل ہونے والا ابتدائی

مرحلہ جو تغلب (Metamorphosis) کے

باعث بالغ حیوان میں تبدیل ہوتا ہے۔

Larynx لارینکس حمرہ پستانوں میں قصبہ (Trachea) کا اگلا حصہ جو آواز پیدا کرتا ہے۔

Metamorphosis میٹامورفوسس تغلب سردے (Larva) میں واقع ہونے والی تمام تبدیلیاں جس کے باعث سرد تبدیل ہو کر بالغ حیوان بن جاتا ہے۔

Migration ہجرت نامناسب حالات کے دوران حیوانات کا اپنے اصلی مقام سے مناسب مقام کو نقل مقام۔

Moulting مولٹنگ کرپڑی حیوانات میں ایسا عمل جس کے دوران جسم کی اوپری جلد مخصوص ہارمون کے زیر اثر جھڑ جاتی ہے۔

Neurohypophysis نیورو ہائپوفائیس عصبی زیر نمو نفاذی غدود کا پچھلا فص جہاں عصبی بافت (Nervous Tissue) کے مرکزوں (Nuclei) میں تیار ہونے والے عصبی ہارمون ذخیرہ کیئے جاتے ہیں۔

Osteoporosis اسٹیوپوروسس عقلی مساماری ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کے باعث ظاہر ہونے والے چھوٹے چھوٹے مسامات جس کی وجہ سے ہڈیاں مسامار (سوراخدار) اور کمزور ہو جاتی ہیں

Ova	اودا	بیضہ	مادہ عضویہ کے بیحدان (Ovary) میں پایا جانے والا زولجہ (Gameta)۔
Parathyroid Gland	پیراتھائرائیڈ گلائنڈ	نزدور قیہ غدودہ	دروں افزای غدود جو در قیہ غدود (Thyroid Gland) کی پھلی سطح پر پایا جاتا ہے یہ غدود پیراتھارمون (Parathormone) افزا کرتا ہے۔
Pars Intermedia	پارس انٹرمیڈیا	جز وسطی	نخای غدود کے پھلی فص یعنی عصی زیر نمو (Neurohypophysis) کا ایک درمیانی حصہ
Pituitary Gland	پیٹوئیٹری گلائنڈ	نخای غدودہ	دماغ کے وسطی حصہ کے بطنی جانب پر پایا جانے والا دروں افزای غدود جس کو استادی غدودہ کہا جاتا ہے۔
Placenta	پلا سینٹا	مشمہ	مادہ عضویہ میں حمل کے دوران رحم میں پایا جانے والا عضوہ جو رحمی دیوار اور جنینی دیوار دونوں سے تشکیل پاتا ہے اور زیر نمو جنین (Embryo) کو رحمی دیوار سے مربوط رکھتا ہے اور جنین کو تغذیہ فراہم کرتا ہے۔
Skeleton	اسکیلین	استخوان یا ڈھانچہ	ڈھانچہ جو جسم کو سہارا مہیا کرتا ہے جیسے ہڈیوں کا اندر دنی ڈھانچہ یا پردوں یا فکوس پر مشتمل ہر دنی ڈھانچہ۔

Seminal Vesicle سمیٹل وسیکل منوی کیسہ
 ادنی حیوانات میں نر تولیدی عضو جس میں
 منویہ ذخیرہ کئے جاتے ہیں۔ پستانوں میں نر
 تولیدی اعضاء سے متعلق غدود جو منوی سیال
 (Seminal Fluid) کی تالیف کو انجام دیتا ہے
 اور افراز کرتا ہے۔

Semiferous Tubules سمینی فیروس ٹیوبلس منویہ بردار ٹائیپے
 نر عضویہ کے اٹھیہ (Testis) میں کافی مرغولہ نما
 ٹائیپے جو منویوں (Sperm) کو تیار کرتے ہیں۔
Sperm اسپرم منویہ نر زودلجہ (Male Gamete)۔
Spermatogenesis اسپرمیٹوجینیسس منویہ زائی اٹھیہ میں منویوں (Sperm) کی تیاری کا عمل۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- 1 ضبط اور ہم ارتباط سے کیا مراد ہے؟
- 2 ہارمونس (Hormones) کیا ہوتے ہیں؟
- 3 دروں افرازی غدود (Endocrine Glands) سے کیا مراد ہے؟
- 4 حیاتی عمل کو تیز کرنے والے ہارمون اور سست کرنے والے ہارمون کے نام بتلائے۔
- 5 ہدف عضو یا ہدف بافت سے کیا مراد ہے؟
- 6 دوری ایڈینوسین مانو فاسفیٹ (Cyclic AMP) کیا ہے؟
- 7 ہارمونس کو کن دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے؟
- 8 نموئی ہارمون (Growth Hormone) کا کیا فعل ہے؟
- 9 واسوپریسن (Vasopressin) ٹای ہارمون کی کمی کس عارضہ کا سبب بنتی ہے؟

10 ایڈرینلین (Adrenelin) ہارمون کو "جوش و خروش" (Fight or Flight) ہارمون کیوں کہا جاتا ہے؟

7.2 طویل جوابی سوالات

(1) حیوانات میں کیسائی ہم ارتباط (Chemical Co-ordination) کس طرح واقع ہوتا ہے؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔

(2) دروں افرازی غدود (Endocrine Gland) اور بردوں افرازی غدود (Exocrine Gland) کے درمیان فرق پایا

جاتا ہے۔ دروں افرازی غدود کی فہرست مرتب کیجئے۔

(3) " دروں افرازی غدود (Pituitary Gland) کو دروں افرازی نظام کا استادی غدود کہا جاتا ہے " بحث کیجئے۔

(4) نخاعی غدود کی شکل و تاریخ اور اس کے مختلف حصوں سے افراز ہونے والے ہارمونوں، اس کے عمل کا مقام اور اس

کے افعال کا جدول تیار کیجئے۔

(5) نخاعی غدود کے عوارض پر ایک نوٹ لکھیے۔

(6) آیلینس آف لنگرہانس (Islets of Langerhans) کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔

(7) انسولین قنٹی عارضہ پر ایک مضمون لکھیے۔

(8) درقہ غدود سے افراز ہونے والے ہارمونوں کے افعال کو بیان کیجئے۔

(9) " پیچہ ان بھی ایک دروں افرازی غدود ہے " وضاحت کیجئے۔

(10) مشمدہ (Placenta) سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح دروں افرازی افعال انجام دیتا ہے؟ بیان کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

(1) ہارمونس ————— میں ضائع ہو جاتے ہیں۔

(2) خلیہ کے اندر پائے جانے والے ————— کے توسط سے ہارمون اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔

(3) ————— غدود سے خامرے (Enzymes) خارج کیے جاتے ہیں۔

(4) نخاعی غدود سے افراز ہونے والا ————— نامی ہارمون مرد اشخاص کے لنگیہ (Testis) میں منویہ

زائی (Spermatogenesis) کے عمل کو متحرک بناتا ہے۔

- (4) بچپن میں کون سے ہارمون کی کمی پست قدی (Dwarfism) کا سبب بنتی ہے؟
 (a) واسوپرن (b) نموئی ہارمون
 (c) آکسی ٹوسن (d) ایڈری ٹیلن
- (5) ہانفوں میں کون سے ہارمون کی کمی اکرومیگالی (Acromegaly) نامی عارضہ کا باعث بنتی ہے؟
 (a) نموئی ہارمون (b) ایڈری ٹیلن
 (c) لوئیٹائزنگ (d) پرو لکٹن
- (6) کس ہارمون کی کمی ہانفوں میں جنسی افعال کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے؟
 (a) پرو لکٹن (b) ایڈریو کارٹیکو ٹراکھ ہارمون
 (c) نموئی ہارمون (d) آکسی ٹوسن
- (7) آئیوڈین کون سے ہارمون کی تیاری کے لئے ضروری ہے؟
 (a) پرو لکٹن (b) تھائراکسن
 (c) ایڈری ٹیلن (d) انسولن
- (8) کونسا ہارمون ورقہ غدود اور نزدورقہ غدود دونوں سے افراز ہوتا ہے؟
 (a) تھائراکسن (b) کیلسیٹونین
 (c) نموئی ہارمون (d) آکسی ٹوسن
- (9) کس ہارمون کی قلت کے باعث ہانفوں میں مکروڈیڈیا (Myxoedema) نامی عارضہ لائن ہوتا ہے؟
 (a) نموئی ہارمون (b) لوئیٹائزنگ ہارمون
 (c) ورقہ تحریک کار ہارمون (d) تھائراکسن
- (10) مشیمہ سے کونسا ہارمون افراز ہوتا ہے؟
 (a) ایسٹروجن (b) اینڈروجن
 (c) تھائراکسن (d) ناراپی ٹیرین

7.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

B	A
() پروکسیٹرون	(1) الفاسیے
() ریلیکویں	(2) بیٹاٹپے
() ٹیسٹواسٹرون	(3) بیضدان
() ایڈریٹیلن	(4) ہڈائش
() انسولن	(5) لکھیے
() پیار تھارمون	(6) لمواں غدود
() تھائراکسن	(7) قلبی دھڑکن
() گلوکاکاگان	(8) نزدورقہ غدود
() آئیوڈین	(9) چشمی کلہر
() آئیلیس آف نگرہانس	(10) سادہ کلہر

سبق 12 خوردبینی عضویوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض (Diseases Caused By Micro-Organisms)

-
- 1 سبق کا خاکہ
 - 2 تمہید
 - 3 سبق کا متن
 - 3.1 انسان میں خوردبینی عضویوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض
 - 3.1.1 بیکٹریا کے باعث پیدا ہونے والے امراض
 - 3.1.2 وائرس کے باعث پیدا ہونے والے امراض
 - 3.1.3 اول حیوانوں (Protozoans) کے باعث پیدا ہونے والے امراض
 - 4 خلاصہ
 - 5 نمونہ امتحانی سوالات
 - 5.1 طویل جوابی سوالات
 - 5.2 مختصر جوابی سوالات
 - 5.3 معروضی سوالات
 - 5.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے
 - 5.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے
 - 5.3.3 جوڑیاں لگائیے

1 سبق کا خاکہ

اس سبق میں آپ درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ انسان میں بیکٹیریا کے باعث پیدا ہونے والے امراض، ان کی علامات اور انسداد کے طریقے
- ☆ انسان میں وائرس کے باعث پیدا ہونے والے امراض، ان کی علامات اور انسداد کے طریقے
- ☆ انسان میں اول حیوانیوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض، ان کی علامات اور انسداد کے طریقے

2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ ضبط اور ہم ارتباط کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ خوردبینی عضویوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض، ان کی علامتوں اور انسدادی اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ چونکہ روئے زمین پر بے شمار خوردبینی عضویے پائے جاتے ہیں جن میں سے بیشتر نہ صرف نباتات اور حیوانات میں بلکہ انسان میں بھی مختلف اقسام کے امراض پیدا کرتے ہیں جو مختلف اعضاء کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں اور ہلاکت کا سبب بھی بنتے ہیں۔

3 سبق کا متن

3.1 انسان میں خوردبینی عضویوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض

خوردبینی یا غیر خوردبینی عضویے جو جاندار کے جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں مرض زا (Pathogens) کہلاتے ہیں۔ بیماریوں کا مطالعہ مرفیات (Pathology) کہلاتا ہے۔ خوردبینی مرض زا (Microscopic Pathogens) میں وائرس (Virus)، بیکٹریا (Bacteria) اور اول حیا (Protozoans) شامل کئے جاتے ہیں۔ یہ مرض زا (Pathogens) طفیلی (Parasites) کہلاتے ہیں۔ طفیلی سے مراد ایسے جاندار عضویے ہیں جو غذا اور جائے وقوع کی خاطر دوسرے عضویوں میں زندگی گزارتے ہیں اور میزبان کو خاطر خواہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ طفیلی کا وہ مرحلہ جو میزبان (Host) کے جسم میں داخل ہوتا ہے تعدیہ مرحلہ (Infective Stage) کہلاتا ہے۔ طفیلی کا تعدیہ مرحلہ میزبان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد مختلف اعضاء سے گزرتے ہوئے ایک مناسب مقام کو اپنے جائے وقوع کے لئے


منتخب کر لیتا ہے جہاں وہ نشوونما حاصل کرتے ہوئے جنسی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ طفلی اپنے میزبان میں اصل جائے وقوع میں نشوونما پا کر اسی میزبان میں دوسرے موزوں مقامات (اعضاء) پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ ان کے نوسولود یا سروے (Larvae) کسی دوسرے موزوں وسطی میزبان (Intermediate Host) میں با آسانی منتقل ہو سکیں جہاں ان طفلیوں کے لئے مناسب حالات پائے جاتے ہیں۔ جب طفلی اپنی دور زندگی کی تکمیل کے لئے میزبان کے جسم کے مختلف اعضاء سے گزرتا ہے تو ان اعضاء کی کارکردگی کو متاثر کر دیتا ہے اور انہیں نقصان پہونچاتا ہے جس کے باعث بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

3.1.1 بیکٹریا کے باعث پیدا ہونے والے امراض

انسان میں بیکٹریا کے باعث پیدا ہونے والے امراض میں ہیضہ (Cholera)، ٹائفائیڈ (Typhoid)، خناق (ڈیفٹھریا Diphtheria)، نیونیا (Pneumonia)، کزاز (ٹیتانس Tetanu)، اسہال (Diarrhoea)، جذام (Leprosy) اور طاعون (Plague) شامل ہیں۔

(i) ہیضہ (Cholera)

یہ ایک متعدی اور مہلک مرض ہے جس میں انسان کی غذائی نالی متاثر ہوتی ہے۔ یہ مرض ویریکالیر (Vibrio cholera) نامی گرام منفی (Gram -ve) بیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طفلی کو سب سے پہلے رابرٹ کوچ (Robert Koch) نامی سائنسدان نے دریافت کیا۔ یہ مرض مقامی (Endemic) اور وبائی (Epidemic) دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ ویریکالیر بیکٹریا میزبان کی غذائی نالی میں آلودہ غذا اور پانی کے ذریعہ ذہنی راستے سے داخل ہوتے ہیں۔ کھیاں جب ہیضہ سے متاثرہ مریض کے فضلہ پر بیٹھتی ہیں تو فضلہ میں موجود بیکٹریا کھینچوں کے شوکہ دار پیروں اور جسم سے چسپاں ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کھیاں غذا اور پانی پر پہنچتی ہیں تو ان بیکٹریا کو وہاں چھوڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے غذا یا پانی ان بیکٹریا سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ جب صحت مند انسان (میزبان) اس آلودہ غذا کو استعمال کرتا ہے یا آلودہ پانی کو پیتا ہے تو اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے لئے انقباضی مدت (Incubation Period) چند گھنٹوں سے پانچ دن تک ہوتی ہے۔ اس مدت کے دوران بیکٹریا کے جسم سے معائی زہر (Enterotoxins) اور مخاط (Mucilage) خارج کئے جاتے ہیں۔ معائی زہر انسان میں تابدیگی (Dehydration) پیدا کرتے ہیں۔ غذائی نالی کی اندرونی پرت تحلیل ہو کر ککڑوں کی شکل میں معائی کہے میں داخل ہو جاتی ہے۔



فصل 12.1

-دیرپہ کالیرا (*Vibrio cholera*) نامی گرام منفی بکٹیریا

اس مرض کی علامتوں میں اسہال، قے، پیشاب کا کم خارج ہونا، ہشکی عضلات میں درد، زبان کا خشک ہونا، آنکھوں کا اندر دھسنا اور کمزوری کا ظاہر ہونا شامل ہیں۔ اس مرض میں عام طور پر ایک دن میں 30 تا 40 مرتبہ آبی دست آتے ہیں جس کے ساتھ برقیہ (Electrolytes) یعنی سوڈیم، پوٹاشیم، اور کلورائیڈ کے رداں ضائع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دست ہو جانے سے کابیدگی (Dehydration) واقع ہوتی ہے۔ اس بیماری کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

اس مرض کے علاج کے لئے خاص طور پر ضد حیاتیہ (Antibiotics) کے استعمال کے ساتھ برقیہ سیال (Electrolyte Fluid) کا جسم میں 750 ملی میٹر فی گھنٹہ کی شرح سے داخل کرنا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں ہازا بیدگی (Rehydration) قائم ہو جاتی ہے۔ برقیہ سیال کے ایک لیٹر محلول میں 3.5 گرام سوڈیم کلورائیڈ، 2.5 گرام سوڈیم کاربونیٹ، 1.5 گرام پوٹاشیم کلورائیڈ اور 21 گرام گلوکوز محلول شدہ حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیضہ سے متاثرہ مریض کو ایک گلاس پانی میں ایک چمکی نمک (سوڈیم کلورائیڈ) اور 10 گرام شکر حل کر کے پلایا جانا چاہیے۔ ناریل کا پانی یا پلکا یا دودھ بھی وقفہ وقفہ سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔


اس مرض کے پھیلنے کو روکنے کے لئے مریض کو صحت مند افراد سے علیحدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مرض سے انسانوں میں ہیضہ نیکہ لگوانے کے ذریعہ قوت مدافعت پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حفظان صحت کا خیال اور کھیتوں کا حشرات کش اور دواؤں کے ذریعہ خاتمہ اس مرض کے پھیلنے کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔

(ii) ٹائفائیڈ (Typhoid)

انسان میں یہ مرض سالمونیلہ ٹائفی (Salmonella typhi) نامی گرام منفی بیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک مرضِ حاد (Acute Disease) اور مقامی مرض ہے۔ سالمونیلہ ٹائفی بیکٹریا سے آلودہ غذا اور پانی اس مرض کے قعدہ (Infection) کا ذریعہ ہے۔ یہ بیکٹریا مریض کے پیشاب اور فضلہ میں پائے جاتے ہیں جو مریض کے ساتھ راست ربط، حامل طفیلی (Vector) حشرات، آلودہ غذا اور پانی اور دیگر اشیاء کے ذریعہ صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ٹائفائیڈ نامی مرض کا باعث بنتے ہیں۔ اس مرض کے لئے اختفائی مدت 10 تا 15 دن ہوتی ہے۔

اس بیماری کی علامتوں میں مستقل 102 تا 103 درجہ فارن ہیت تپش، بخار کا شام کے اوقات میں ظاہر ہونا، جسم میں اضطراب، اعضاء شکنی، سر کا درد، غدد میں سوجن، بد ہضمی، زبان پر سفید رنگ کے مادے کی پرت کا جمع ہونا، دھیمی نبض، آنت میں چھالے (Ulcers)، بعض اوقات اسہال کا واقع ہونا، مریض کا بے حس ہونا، آنت کی اوہری سطح پر دموئی سیلان (Hemorrhage) واقع ہونا، آنت کی دیوار میں بیکٹریا کے ذریعہ سوراخوں کا بننا اور ان سوراخوں کے ذریعہ بیکٹریا کا شکم میں خارج ہونا، شکم کی پرت پر درم ہاریطوں (Peritonitis) کا پایا جانا اور شکمی درد وغیرہ شامل ہیں۔ اس مرض کی شدت مریض کی موت کا باعث بنتی ہے۔

ٹائفائیڈ بخار سے متاثرہ مریض میں ابتدائی ایک ہفتہ یا 10 دن تک ادویات کا بخار پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ٹائفائیڈ بخار کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ جب کہ ٹائفائیڈ کی وائڈل جانچ (Vidal Test) کے ذریعہ واضح طور پر شناخت کی جاتی ہے۔



شکل 12.2


سالمونیلہ ٹائفی (Salmonella typhi)

اس مرض کے علاج کے لئے مریض کو مکمل آرام کا مشورہ دیا جاتا ہے اور کلوروفینیکال (Chloromfenicol) دوا دی جاتی ہے۔ مریض کو سیال غذا استعمال کرائی جاتی ہے۔

اس مرض کے پھیلنے کو روکنے کے لئے صحت مند انسانوں کو TAB ٹیکہ (ٹاکائیڈ ٹیکہ) لگوا دیا جاتا ہے جو اس مرض کے خلاف مامونیت پیدا کرتا ہے۔ ہر سال ٹیکہ دیا جانا ضروری ہوتا ہے کیوں کہ مامونیت صرف ایک سال کے لئے عارضی طور پر قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ حفظانِ صحت کا خیال بے حد ضروری ہے۔

(iii) دق (Tuberculosis)

یہ مرض مائیکو بیکٹیریم ٹیوبیکولاسس (*Mycobacterium tuberculosis*) نامی بیکٹریا کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ دق کا مرض پیداکرنے والے اس بیکٹریا کو کوچ (Koch) نے سب سے پہلے دریافت کیا۔ یہ ایک متعدی مرض ہے اس مرض سے متاثرہ مریض کے غلیم میں یہ بیکٹریا بکثرت پائے جاتے ہیں جب مریض کھانا کھاتا ہے تو بیکٹریا ہوا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کھیاں مریض کے غلیم سے ان بیکٹریا کو کھانے اور پینے کی چیزوں پر منتقل کرتی ہیں۔ صحت مند انسان ان بیکٹریا سے آلودہ غذا، پانی یا دودھ کو بطور غذا استعمال کرنے پر اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں پیچھڑے (Lungs) متاثر ہوتے ہیں۔



شکل 12.3


مائیکو بیکٹیریم ٹیوبیکولاسس (*Mycobacterium tuberculosis*)

اس مرض کی خاص علامتوں میں شام کے اوقات ہلکا بخار، سینہ میں درد، بھٹی کھاسی، تھکاوٹ، کمزوری، وزن میں کمی، بھوک کا

محسوس نہ ہونا، خونی بلغم وغیرہ شامل ہیں۔ اس بیماری کی شناخت ایکسرے (X-Rays) کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔ اس مرض کا علاج ریفاکسن (Rifampicin)، تھائیو اسیٹازون (Thioacetazone) اور اسٹریپٹومائسین (Streptomycin) کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ اس مرض کے پھیلنے کو روکنے کے لئے بی سی جی (B. C. G.) کے ٹیکے دئے جاتے ہیں۔ مریض کو صحت مند انسانوں سے دور رکھنا چاہئے حتیٰ کہ ان کے استعمال شدہ برتن اور گلاس وغیرہ کو بھی علیحدہ رکھنا چاہئے۔

(iv) جذام (Leprosy)

یہ مرض مائیکوبیکٹریم لپیر (Mycobacterium leprae) نامی بیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض میں مریض کی جلد اور ٹھنڈی اعصاب شدید متاثر ہوتے ہیں۔ یہ مرض صحت مند انسان میں طویل رہا کے ذریعہ راست منتقل ہوتا ہے۔ مریض کے متاثرہ حصوں، خاص کر انگلیوں اور جسم کے دوسرے حصوں سے حساسیت ضائع ہو جاتی ہے اور یہ بتدریج جسامت میں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور بالآخر جسم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔



شکل 12.4

مائیکوبیکٹریم لپیر

اس مرض کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔

(a) لپیر و مالٹس قسم (Lepromatus Type)

اس قسم کے جذام میں مریض کی جلد پر پھوڑے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جلد سے لونیٹ (Pigmentation) ضائع ہو جاتی ہے۔ عضلات میں تخفیف واقع ہوتی ہے، انگلیاں پیچدار ہو جاتی ہیں۔ شدید تعدیہ کی صورت میں مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

(b) غیر لپیر و مالٹس قسم (Non-Lepromatus Type)

مریض میں قوت مدافعت زیادہ ہونے کی وجہ سے صرف جلد پر کچھ پھوڑے نمودار ہو جاتے ہیں۔

(c) درمیانی مراحل (Intermediary Stages)

اس قسم کے مرض لپیر و ماس قسم اور غیر لپیر و ماس قسم کے درمیانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔
اس مرض کی انقباضی مدت 5 تا 2 برس کی ہوتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں متاثرہ جلد دبیز اور چمکدار سفید رنگ کی دکھائی دیتی ہے۔
اس مرض کی عام علامتوں میں پسینہ کا خارج نہ ہونا، بالوں کا جھڑنا، درد اور غیر حساسیت، جلدی اعصاب کی غیر کارکردگی، کان کے فصوں پر دبیز
ابھار کا ظاہر ہونا اور ان کا سخت اور غیر حساس بن جانا، زخموں کا مندمل نہ ہونا وغیرہ شامل ہیں۔
یہ مرض قابل علاج ہے۔ ابتدائی مراحل میں ادویات کے ذریعہ اس مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض غیر تواریثی ہوتا ہے۔

(v) خناق (ڈیفٹھیریا یا Diphtheria)

یہ مرض بچوں میں پایا جاتا ہے جو نہ صرف متعدی ہوتا ہے بلکہ مناسب اور فوری علاج نہ کئے جانے پر متاثرہ بچہ کی موت کا باعث
بھی ہوتا ہے۔ یہ مرض بچوں میں کوری بیکٹیریم ڈیفٹھیریا (*Corynebacterium diphtheriae*) نامی بیکٹریا کے باعث پیدا
ہوتا ہے۔ اس بیماری کی انقباضی مدت 5 تا 2 دن ہوتی ہے۔ اس بیکٹریا کی وجہ سے مریض کے حلق، ناک اور غدد و شدید متاثر ہوتے ہیں۔
اس مرض کی علامتوں میں حلق میں طس، ناک کا بہنا، بخار، حلق کی اندرونی سطح کا کھردرا ہونا اور کھانسی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر مرض شدید ہو تو
حلق میں شدید سوزش (Inflammation) پیدا ہوتی ہے اور حلق کی اندرونی سطح پر ایک کاذب جھلی تیار ہوتی ہے جس کے سبب مریض کو
سانس لینے میں کافی دشواری ہوتی ہے اور نتیجتاً مریض کی موت واقع ہوتی ہے۔

اس مرض کے علاج کے لئے مریض میں علامتوں کے ظاہر ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیفٹھیریا تریاق سم (Diphtheria
Antitoxins) کا انجکشن لگوا جاتا ہے۔ اس مرض کے پھیلنے کو روکنے کے لئے بچوں میں ڈی پی ٹی (DPT) کے ٹیکے (سہ تریاق
Triple Antigen) دئے جاتے ہیں جو بچوں میں خناق، کالی کھانسی اور کزاز (میانس) تینوں امراض پر قابو پانے کے لئے استعمال
کئے جاتے ہیں۔




شکل 12.5 کوری بیکٹیریم ڈیفٹھیریا

(vi) کالی کھانسی (Whooping Cough یا Pertusis)

یہ چھوٹے بچوں میں ہونے والا ایک عام مرض حاد (Acute Disease) ہے جو بیکٹیریا (*Bacillus pertusis*) کی ہیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرض متاثرہ مریض سے بذریعہ خلیہ یا بالواسطہ یا راستہ ربط کے ذریعہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی انقباضی مدت 7 تا 14 دن ہوتی ہے۔ اس مرض کی ابتدا بخار سے ہوتی ہے۔ مریض غذا کو نگل نہیں سکتا جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کے دوران دوسرے مرض (Pathogens) جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ثانوی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ مریض میں بخار، سردی، قے، سانس لینے میں دشواری، آنکھوں کے ڈھیلوں کا ہار کھانا اور درد آمیز کھانسی جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس بیماری کے پھیلنے کو روکنے کے لئے بچوں میں ڈی پی ٹی کے ٹیکے لگوائے جاتے ہیں۔

(vii) کزاز (Tetanus)

یہ مرض انتہائی مہلک ہوتا ہے جس میں 40 تا 80 فی صد اموات واقع ہوتی ہیں۔ یہ مرض مٹی میں پائے جانے والے کلاسٹریڈیم ٹیٹانی (*Clostridium tetani*) کی ہیکٹریا کے ذریعہ افزائے ہونے والے بروں سم (Exotoxins) کے کارثر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔



شکل 12.6

کلاسٹریڈیم ٹیٹانی ہیکٹریا (*Clostridium tetani bacteria*)

اس مرض کو پیدا کرنے والے ہیکٹریا جسم پر لگے ہوئے زخم یا کٹے ہوئے حصوں پر مٹی یا دھول کے جمع ہونے کی وجہ سے زخم کے ذریعہ جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اکثر یہ مرض غیر صاف سترے جراحی آلات کے استعمال، ناخن یا سوئیوں کے چھپے یا آپریشن کے دوران غیر جراثیم کش آلات کے استعمال کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اس مرض کی انقباضی مدت 3 دن تا 33 دن ہوتی ہے۔

اس مرض سے متاثرہ مریض میں گردن اور جیزوں کے عضلات میں سکڑاؤ اور سختی، اعضاء شکنی، ریڑھ کے ستون کے ٹوکرہ (Spine) کا خمیدہ ہونا، مرگی (Epilepsy)، تشنج (Convulsions) اور دانت کیل یا کب بنگی (Lock jaw) جیسی علامات پائی

جاتی ہیں۔ مرض کی شدت سے موت بھی واقع ہوتی ہے۔
اس مرض کے علاج میں مریض کو دفاع کزاز (Antitetanus) ٹیکے لگوائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زخم یا کٹے ہوئے حصوں کو جراثیم کش محلول سے صاف کرنا چاہئے اور زخم پر جراثیم کش سفوف کا استعمال کرنا چاہئے۔

3.1.2 وائرس کے باعث پیدا ہونے والے امراض

وائرس (Virus) کے ذریعہ انسان میں کئی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں خسرہ (Measles)، چچک (Small Pox)، چھوٹی چچک (Chicken Pox)، بگسو (Mumps)، انفلوینزا (Influenza)، پولیو مائیٹیس (Poliomyelitis)، رابیز (Rabies)، شعلہ (Measles) ہپائٹس (Infective Hepatitis) وغیرہ عام طور پر پائے جانے والے امراض ہیں۔

(i) خسرہ (Measles)

یہ ایک شعلہ مرض ہے جو 5 تا 10 سال کی عمر کے بچوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ بالخصوص سردی کے موسم میں واقع ہوتا ہے۔ یہ مرض روبیولا وائرس (Rubeola virus) سے پیدا ہوتا ہے جو انسان میں دہن، ناک اور حلق کے راستے سے قطرہ (Droplet) کے ذریعہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی انقباضی مدت 10 تا 12 دن ہوتی ہے۔ یہ مرض اگرچہ تھک مہلک نہیں ہے لیکن اس بیماری کے دوران انسان خبیثی نیومونیا (Branchio Pneumonia) اور دماغ (Encephalitis) جیسے امراض سے تالوی طور پر متاثر ہوتا ہے جس کے باعث اموات واقع ہوتی ہیں۔

اس مرض کی علامتوں میں اچانک بخار کا آنا جس کے ساتھ ہی جلد پر گلابی یا سرخ دھبوں کا ظاہر ہونا، نیک کھانسی، ناک کا بہنا، حلق اور پیچھے پھوڑوں کا متاثر ہونا مدوشی کو دیکھنے سے آنکھوں میں تکلیف، سردی اور سر کا درد وغیرہ شامل ہیں۔


اس مرض کے علاج کے لئے ضد حیا ہے (Antibiotics) اور سلفا ادویات (Sulpha Drugs) کو استعمال کیا جاتا ہے۔

اس مرض کے پھیلنے کو ٹیکہ سماعتی (Vaccination) کے ذریعہ روکا جاسکتا ہے۔

(ii) چچک (Small Pox)

یہ ایک شعلہ اور کافی مہلک مرض ہے اس مرض کا باعث بننے والے دیرپا وائرس (Variola virus) انسان کے جسم میں قطرہ (Droplet) کے ذریعہ، راست ربط یا اس وائرس سے آلودہ کپڑے، یا کوئی شے کے ساتھ تماس میں آنے پر منتقل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی انقباضی مدت 7 تا 17 دن ہوتی ہے۔ یہ وائرس انسان کے جسم میں نقاطی عطاء، تنفسی نالی، کے ذریعہ داخل ہوتے ہیں اور لمبی عقدوں

سے ہوتے ہوئے بالآخر خون میں پہنچ جاتے ہیں۔



شکل 12.7

دیر یو لاء وائرس (Variola virus)

اس مرض کی علامتوں میں اچانک بخار ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کا درد، چہرہ اور ہاتھ اور پیرو (جوارح) کا متثر ہونا اور پیٹ میں درد وغیرہ شامل ہیں۔ اس وائرس سے افزائش ہونے والے زہریلے مادہ سے ثانوی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے قے اور جڑا۔ وائرس جسم کے مختلف اعضاء جیسے جگر، اور طحال میں بھی داخل ہو کر ان اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔

دیر یو لاء - بجمہ (Variola major) نامی وائرس کے ذریعہ واقع ہونے والے مرض میں جسم پر آبلے اور نخرہ (Necrosis) پیدا ہوتے ہیں جو سیلان دم (Haemorrhagia) کا باعث بنتے ہیں۔ بیرونی سطح پر سرخ دھبے پائے جاتے ہیں جو پھٹنے اور پیر کے بچوں پر نہیں پائے جاتے۔ پھوڑے کثیر خانے دار ہوتے ہیں جس کے اساس پر سرخ دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ 10 تا 14 دن کے درمیان خشک جلدی چھلکے دکھائی دیتے ہیں جو 2 تا 4 ہفتوں کے درمیان جھڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مستقل گہرے داغ زخم (Scars) ظاہر ہوتے ہیں۔

شدید مرض موت کا باعث بنتا ہے۔ انسان میں ایک مرتبہ یہ مرض واقع ہونے پر کئی طویل مامونیت (Immunity) پیدا ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں اس مرض کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان کو 1977ء میں چچک سے آزاد ملک قرار دیا گیا ہے۔ چچک (Small Pox) سے متاثرہ آخری مریض 24th May, 1975 کو بنگلہ دیش میں پایا گیا تھا۔



شکل 12.8 چچک (Small Pox) سے متاثرہ آخری مریض 24th May, 1975 کو ہندویش میں پایا گیا تھا۔

iii مھوئی چچک (Chicken Pox)

یہ مرض بچوں اور بالغوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک متعدی، مقامی اور وبائی مرض ہے۔ اس مرض کے باعث اموات بہت کم واقع ہوتی ہیں۔ یہ مرض وائرس (Varicella zoster virus) کے باعث ہوتا ہے۔ یہ مرض قطیرہ (Droplets)، آلودہ اشیاء یا راستہ ربط کے ذریعہ پھیلتا ہے۔ اس مرض کا انقباضی دور 2 تا 7 دن کے درمیان ہوتا ہے۔

اس مرض سے متاثرہ مریض کے جسم پر ابتدائی طور پر سرخ جھکے (Rash) ظاہر ہوتے ہیں جو چار تا پانچ دن میں آبلوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو قابل علاج ہوتے ہیں۔ آبلوں پر داغ زخم (Scar) پیدا نہیں ہوتے۔ ہلکا یا اوسط بخار، پیٹ میں درد، ٹھنڈ اور اضطراب جیسی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ساتویں دن خشک جلدی چھلکے تیار ہوتے ہیں جو چودھویں دن جھڑ جاتے ہیں۔




شکل 12.9

مھوئی چچک سے متاثرہ مریض جس کے چہرے پر داغ دکھائی دیتے ہیں۔

اس مرض کے پھیلنے کو روکنے کے لئے ٹیکہ اندازی کے علاوہ حفظانِ صحت کا خیال رکھنا اور متاثرہ شخص کے کپڑوں کو گرم پانی میں دھونا اور انہیں سورج کی روشنی میں سکھانا چاہئے۔ صحت مند اشخاص کو ان کپڑوں کے استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔


(iv) گلسوئے (Mumps)

یہ پانچ تا پندرہ سال کی عمر کے بچوں میں واقع ہونے والا مرض ہے۔ اس مرض میں مریض کے لعابی غدود جیسے غدود تکلیف (Parotid Glands) میں سوجن پیدا ہوتی ہے۔ منہ کے کھلنے میں درد، بخار، سر کا درد وغیرہ اس مرض کی علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کے اٹھیے (Testes) یا بیض دان (Ovary)، لہبہ، دماغی غشاؤں (Meninges) اور آنت میں سوزش (Inflammation) اس مرض کے ساتھ واقع ہونے والی وجہ یہ علامتیں ہیں۔ یہ مرض مریض کے لعاب دہن، قطرہ (Droplet) اور آلودہ اشیاء کے ساتھ ربط پیدا کرنے پر پھیلتا ہے۔ اس مرض کی اخفائی مدت دو تا تین دنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ٹیکہ اندازی کے ذریعہ اس مرض سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔



شکل 12.10a

ممس وائرس (Mumps virus)



شکل 12.10

ممس کا مریض

(v) نفلوینزا (Influenza)

یہ مرض تمام عمر کے اشخاص میں واقع ہونے والا ایک متعدی اور مقامی مرض ہے۔ جو پارامیکزو وائرس (Paramyxovirus) کے ذریعہ واقع ہوتا ہے۔ یہ مرض نفلوینزا سے متاثرہ مریض کے قطرہ کے ذریعہ یا راستہ یا ربط کے ذریعہ منتقل ہوتا ہے۔ اس مرض کی اخفائی مدت 24 تا 72 گھنٹوں کے درمیان ہوتی ہے یہ تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ اس مرض کی علامتوں میں اچانک بخار، ٹھنڈ، بغیر بلغم کی کھانسی، سر کا درد، جسم کا درد، ناک کا بہنا، آنکھوں سے پانی نکلتا، جھپکنا، اضطراب اور چہرہ کا سوجنا وغیرہ شامل ہیں۔

(vi) پولیو مائیلیٹس (Poliomyelitis)

یہ بچوں میں واقع ہونے والا ایک عام مرض ہے جس کو فالج اطفال بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث بننے والے پولیو وائرس (Polio virus) غذا، پانی دودھ کے ساتھ یا ذہنی تنفسی راستہ یا راستہ ربط کے ذریعہ بچہ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی انفکائی مدت 3 تا 35 دن کے درمیان ہوتی ہے۔ وائرس بچہ کے جسم میں داخل ہو کر مرکزی عصبی نظام کے حرکی عصبانیہ (Motor Neurons) کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نفاذی ڈور (Spinal Cord) میں داخل ہوتے ہیں جس کے نتیجہ میں شدید قسم کا فالج ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی علامتوں میں بخار، سر کا درد، قے، اعضاء ٹکنی، گردن کے عضلات میں سختی، تشنج (Convulsions) شامل ہیں۔ پیروں اور تنفسی عضلات پر فالج کے اثر کے باعث موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس مرض کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ناممکن ہوتی ہے لیکن مریض میں اضطراب، بخار، گردن میں سختی اور اضطراب کی وجہ سے اس مرض کے ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ اس مرض کا علاج جراحی (Surgical) کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اس مرض سے بچاؤ کے لئے بچپن کے آغاز پر ہی پولیو وائرس کا ٹیکہ لگوا دیا جاتا ہے۔



شکل 12.11

پولیو وائرس (Polio virus)

(vii) رابیز (Rabies)

اس مرض کو عام طور پر آب گریزی (Hydrophobia) کہا جاتا ہے۔ یہ مرض رابیز وائرس (Rabies virus) کے باعث ہوتا ہے۔ یہ وائرس کتوں، بلیوں، بندروں وغیرہ کے لعابی غدد میں پائے جاتے ہیں۔ جب یہ جانور کسی انسان کو کاٹتے ہیں تو وائرس لعاب کے ساتھ جسم میں زخم کے ذریعہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کی انفکائی مدت تقریباً دس دن تا ایک سال ہوتی ہے۔ انسان میں اس مرض کا آغاز شدید بخار، سر کا درد اور اضطراب کے ذریعہ ہوتا ہے۔ دیگر علامتوں میں کانٹے کے مقام پر درد اور مرکزی عصبی نظام کا متحرک ہونا چمکتی ہوئی روشنی سے گریز، لعاب کا بافراط خارج ہونا شامل ہیں۔ مریض پانی سے گریز کرتا ہے حتیٰ کہ پانی کو دیکھنے سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کوہنہ (Chronic) مرحلہ کو آب گریزی (Hydrophobia) کہا جاتا ہے۔ رابیز سے متاثرہ مریض 3 تا 5 دنوں میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس مرض سے بچاؤ کے لئے تریاق رابیز (Antirabies) ٹیکہ لگوا دیا جاتا ہے۔

(viii) جگری ورم (Hepatitis)

یہ مرض ہیپائٹیس وائرس (Hepatitis Virus) کے ذریعہ بچوں اور بالغوں میں واقع ہوتا ہے۔ یہ مہلک مرض ہے جس میں جگر متاثر ہوتا ہے۔ ہیپائٹیس وائرس کی دو اقسام جنہیں ہیپائٹیس اے (Hepatitis - A) اور ہیپائٹیس بی (Hepatitis - B) کہا جاتا ہے طبی اور روپائی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں۔ جگری ورم کی دو اقسام کی شناخت کی گئی۔ جنہیں

(a) متعدی جگری ورم (Infectious Hepatitis) یا جگری ورم قسم اے (Type - A - Hepatitis)

(b) مصلی جگری ورم (Serum Hepatitis) یا جگری ورم قسم بی (Type - B Hepatitis) کہا جاتا ہے۔


(a) متعدی جگری ورم (Infectious Hepatitis) یا جگری ورم قسم اے (Type A Hepatitis)

یہ مرض ہیپائٹیس اے وائرس (ایچ اے وی HAV) کے باعث عموماً بچوں اور کسن بالغوں میں واقع ہوتا ہے۔ یہ وائرس غذا اور پانی کے ساتھ جسم میں داخل ہوتے ہیں اور آنت کی مرحلہ پر ت (Epithelial Layers) میں تکثیریت (Multiplication) کو انجام دیتے ہیں۔ جس کے بعد یہ جگر کو متاثر ہو جاتے ہیں اور یرقان (Jaundice) کا باعث بنتے ہیں۔ اس مرض کی انقباضی مدت 2 تا 6 ہفتے ہوتی ہے۔ اس مرض کی وجہ سے بخار، اضطراب، تھکی، قے، جگر میں سختی واقع ہوتی ہے ان علاماتوں کے ظاہر ہونے کے بعد یرقان (Jaundice) لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ مرض بچوں میں بالغوں کی بہ نسبت معتدل قسم کا ہوتا ہے۔ اس لئے اس مرض کی وجہ سے بالغوں کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ یہ وائرس مریض کے فضلے اور پیشاب میں پائے جاتے ہیں اس لئے ایک فرد سے دوسرے فرد میں راست ربط کے ذریعہ یا غذا اور پانی میں شامل ہو کر منتقل ہوتے ہیں۔ یہ مرض عموماً شدید بارش کے موسم میں پھیلتا ہے۔ یہ وائرس پانی کی کلورینیت (Chlorination) کے ذریعہ ہلاک کئے جاتے ہیں۔ اس مرض کے پھیلنے کو روکنے کے لئے انسدادی اقدامات میں پانی کی کلورینیت، حفظان صحت کا خیال، غذا اور پانی کو فضلہ سے آلودہ ہونے سے بچانا اور ہیپائٹیس اے وائرس (HAV) کا ٹیکہ لگوانا شامل ہیں۔

(b) مصلی جگری ورم (Serum Hepatitis) یا جگری ورم قسم بی (Type B Hepatitis)

یہ مرض ہیپائٹیس بی وائرس (Hepatitis B Virus) کی وجہ سے بچوں کی بہ نسبت بالغوں میں عام طور پر واقع ہوتا ہے۔ یہ وائرس مریض کے خون، مصل (Serum) اور بافتی سیال میں موجود رہتے ہیں۔ اس لئے ایسے مریض کے خون، مصل یا بافتی سیال کو اگر انجکشن کے ذریعہ کسی صحت مند بچہ یا بالغ فرد میں داخل کیا جاتا ہے تو تعدیہ واقع ہوتا ہے۔ اس مرض کی انقباضی مدت 2 تا 6 مہینے طویل ہوتی ہے۔ علامتیں متعدی جگری ورم کے مشابہہ ہوتی ہیں لیکن ان میں شدت پائی جاتی ہے اور اتفاقی طور پر ہوتی ہیں۔ مگر بخار واضح طور پر ظاہر نہیں

ہوتا۔ اس کے علاوہ اس مرض کے متاثرہ مریض میں سرخ چکے (Rash)، جوڑوں کا درد (Arthralgia) اور جوڑوں میں درد پایا جاتا ہے کہہ نہ مرض (Chronic Disease) میں شمع جگر (Cirrhosis) (جگر کا سکاڑا) ہو جاتا ہے۔




شکل 12.12

ہپائٹس بی وائرس (Hepatitis B virus)

انسدادی اقدامات میں تعلیم صحت، حفظان صحت، انسانی مصل ماسونی گلوبولین (Human Serum Globulin) کا انجکشن لگوانا، ہپائٹس بی وائرس ٹیکہ لگوانا، لفظی ادویات سے گریز، مرد و عورتوں کے درمیان مباشرت (Homosexuality) سے گریز کرنا چاہئے۔

(ix) ایڈس (AIDS)

اکتسابی قلت ماسونی عارضہ (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ایک نئی بیماری ہے۔ جس کا تخفیف ایڈس (AIDS) ہے۔ یہ بیماری سب سے پہلے 1981ء میں موسم گرما کے دوران نیویارک (New York) اور کیلیفورنیا (California) (USA) میں دریافت ہوئی۔ ممکن ہے کہ اس بیماری کو پیدا کرنے والے وائرس نے 1970ء کے وسط میں یو۔ ایس۔ اے (U.S.A) میں جنم لیا۔ تاہم اس وائرس کی ابتداء سے متعلق کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس وائرس کو انسانی قلت ماسونی وائرس (Human Immunodeficiency Virus) (HIV) کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس تقریباً ساری دنیا میں اور بالخصوص ترقی یافتہ ممالک میں پھیل چکا



فصل 12.13


ایچ آئی وی (HIV)

یہ مہلک بیماری سب سے پہلے یو ایس اے (USA) میں خاص کر مرد اشخاص کے درمیان مباشرت کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ مگر اب یہ بیماری یو۔ ایس۔ اے (USA) میں مرد اشخاص میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ بیماری آفریقہ اور ایشیاء میں مرد اور عورتوں دونوں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔

ایڈس (AIDS) نامی بیماری متاثرہ اشخاص سے صحت مند اشخاص میں مختلف طریقوں کے ذریعہ منتقل ہوتی ہے۔ جس کو ذیل میں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔


- جنسی مباشرت کے دوران ہبہ، مہمل یا ذہنی راستہ کے ذریعہ۔
- متاثرہ شخص کے خون یا خون کے اجزاء کی منتقلی کے ذریعہ۔
- ہافت یا اعضاء جیسے گردے، آنکھ یا قریہ (Cornea)، عظمیٰ کو دے (Bone Marrow) اور منی (Semen) وغیرہ کو عطیہ کے طور پر دینے کی وجہ سے۔
- ایڈس کے مریض کے لئے استعمال شدہ انجکشن کی سوئی کا صحت مند اشخاص کو انجکشن لگوانے کے لئے استعمال کرنے پر۔

- (e) مریض کے جسم پر واقع زخم پر لگی ہوئی کسی شے کے استعمال کرنے پر۔
 (f) پیدائش کے وقت یا بعد اس بیماری سے متاثرہ ماں سے بچے کو یہ بیماری منتقل ہوتی ہے۔



شکل 12.14

ایچ آئی وی (HIV) کی منتقلی۔ مباشرت کے ذریعہ




شکل 12.15

ایچ آئی وی (HIV) کی منتقلی۔ مباشرت کے ذریعہ




فصل 12.16

ایچ آئی وی (HIV) آلودہ سوئی کے ذریعہ



فصل 12.17

ایچ آئی وی (HIV) کی منتقلی آلودہ خون کے ذریعہ



فکل 12.18


ایس سے متاثرہ حاملہ عورت سے ایڈ کی جنین میں منتقلی

ایچ آئی وی (HIV) انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد تعدیہ (Infection) کا باعث بنتا ہے۔ تعدیہ واقع ہونے کے چند ہفتوں میں ابتدائی طبی علامتیں جیسے کم درجہ کا بخار، سر کا درد، جسم کی سطح پر چکلتے (Rash)، اضطراب، مسلسل دست کا آنا، جوڑوں کے امراض، لمبی غدد کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کے مرحلہ میں لمبی غدد کی جسامت میں مسئلہ اضافہ ہوتا ہے۔ تعدیہ کے وسطی مرحلہ میں مریض میں قابل لحاظ مامونی قلت پیدا ہوتی ہے جس کے باعث مریض میں دوسری بیماریاں لاحق ہیں۔ تعدیہ کا آخری مرحلہ ایڈس (AIDS) کہلاتا ہے جس کے دوران مریض میں قلت مامونی میکانیت (Immuno Deficiency Mechanism) مستقل طور پر ضائع ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں مریض بے شمار دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن میں خاص کر کینسر (Cancer) یا (Malignancy) قابل ذکر ہیں۔ مریض کے تنگی نظام، جلدی نظام، ہاضمی نظام، عصمی نظام وغیرہ پر مختلف مرض ذرا (Pathogens) حملہ کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں مریض بالآخر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔

ایچ آئی وی (HIV) کی خصوصی جانچ کے لئے مریض میں تریاق ذرا (Antigen) اور ضد اجسام (Antibodies) کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر ایچ آئی وی (HIV) کی جانچ کے لئے لیلیسا جانچ (ELISA Test) کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے لئے صحت مند اشخاص کو چاہئے کہ وہ اس بیماری سے متاثرہ مریضوں کو طمّحہ نہ رکھیں۔

3.1.3 اول حیوانیوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض

انسان میں بیشتر اول حیوانی (Protozoans) متعدی تعدیہ (Contagious Infection) کا باعث بنتے ہیں۔ یہ غذا، پانی، حشرات (مکھیوں، مچھروں، کھملوں) یا دیگر حامل طفیلی (Vectors) کے ذریعہ انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے امراض پیدا کرتے ہیں۔ ان میں اکثر امراض مہلک ہوتے ہیں۔



شکل 12.19


میزبان (انسان) میں مختلف پروٹوزونس (Protozoans) کے منتخب شدہ مخصوص جائے وقوع۔

اول حیوانیوں کے ذریعہ انسانوں میں پیدا ہونے والے چند امراض کو اس سبق میں بیان کیا جا رہا ہے جن میں امیبائیس

(Amoebiasis)، اسہال (Diarrhoea)، کالا آزار (Kaia Azar)، لیشمانیائیس (Lishmaniasis) اور طیریا (Malaria) شامل ہیں۔


(1) امیبائیس (Amoebiasis)

اس مرض کو عام طور پر امیبائی پیچش (Amoebic Dysentery) کہا جاتا ہے۔ جو اینٹامیبا ہسٹالیکریکا (Entamoeba histolytica) کے ذریعہ بچوں اور بالغوں میں واقع ہوتا ہے۔ یہ ایک دروں آنتی طفیلی ہے جو بڑی آنت کے اوپری حصہ کی مخاطی (Mucous) اور زیرین مخاطی (Submucous) پر توں میں رہتے ہیں اور امیبائی پیچش کا باعث بنتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے بڑی آنت کی دیوار میں ناسور (Ulcer) پیدا ہوتا ہے۔ حاجت کے ساتھ مخاط (Mucous) اور خون خارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد اور مردہ، مٹکی بھی ہوتی ہے۔ اگر تعد یہ شدید ہو تو بڑی آنت کی دیوار میں گہرے ناسور پیدا ہو جاتے ہیں اور آنت کی دیوار میں سوراخ پیدا کرتے ہوئے ٹھکی کہلہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور دموئی سیلان (Haemorrhage)، درم باریطون (Peritonitis) کا باعث بنتے ہیں جو مہلک ثابت ہوتا ہے۔




شکل 12.21

پیش کیسٹی مرحلہ (Pre-Cystic Stage)



شکل 12.20


اینٹامیبا ہسٹالیکریکا (تغذیائی مرحلہ)




شکل 12.24
چہ مرکزی کیسہ



شکل 12.23
دہ مرکزی کیسہ



شکل 12.22
یک مرکزی کیسہ



شکل 12.25
ایٹا میا سٹائیریکا کی دور حیات

کہنہ امیبیاسس (Chronic Amoebiasis) میں طفیلی آنت کی دیوار میں موجود خون کی شریانوں میں سوراخ کرتے ہیں اور جگری بائی دوران خون میں داخل ہو کر جسم کے مختلف اعضاء جیسے جگر، شش اور دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے جگر میں امیبائی جگری ورم (Amoebic Hepatitis)، شش اور دماغ میں پھوڑے (Abscess) پیدا ہوتے ہیں۔



فکل 12.27

امیبائی پیچش (Amoebic Dysentery) میں آنت پر ابتدائی زخم (Early Lesions) کلنی نما بیماری اور تاسور

فکل 12.26

امیبائی پیچش (Amoebic Dysentery) میں آنت پر ترقی زدہ زخم (Advanced Lesions) جس کے اساس سیاہ مائع سے بھرے دھبے ہیں اور جس کے اطراف خونی حصہ ہوتا ہے۔



شکل 12.28

جگر پر ایمنیسیڈا ہسٹالیکٹیکا (Entamoeba histolytica) کے باعث
ایمیبائی جگری پھوڑے (Amoebic Liver Abscess)

ایمنیسیڈا ہسٹالیکٹیکا اپنی دور حیات کو صرف ایک ہی میزبان یعنی انسان میں مکمل کرتے ہیں۔ اس طفیلی کے تعدی مراحل چو مرکزی کیسے (Tetranucleate Cysts) ہوتے ہیں جو مریض کے فضلہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تعدی مراحل یعنی چو مرکزی کیسے ہاتھ یا ناستوں کے ذریعہ غذا اور پانی میں منتقل ہو جاتے ہیں اور غذا اور پانی کے ساتھ انسان کی غذائی تالی کی بڑی آنت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے مرکزوں کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ کیسہ کی دیوار حل ہو جاتی ہے جس سے طفیلی آنت میں آزاد ہو جاتے ہیں اور جائے وقوع اور غذا حاصل کرنے کیلئے بڑی آنت کی دیوار میں داخل ہو جاتے ہیں اور مرض پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔


اس مرض سے بچاؤ کے لئے السدادی تدابیر میں فضلہ کی مناسب طور پر نکالی، حفظان صحت کا خیال، غذائی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا اور انھیں حشرات سے محفوظ رکھنا، اجابت سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے دھونا، مریضوں کا مناسب ادویات کے ذریعہ علاج

کردار اور غیر شامل ہیں۔

(2) اسہال (Diarrhoea)

یہ انسانوں میں واقع ہونے والا ایک عام ستھری مرض ہے۔ یہ مرض گیارڈیا آنتی (*Giardia intestinalis*) یا گیارڈیا لمبلیا (*Giardia lamblia*) نامی پردو زوا (اول حیوانیہ) کے باعث واقع ہوتا ہے۔ اس طفیلی کو اس کی شکل کے اعتبار سے "آنت کا شاندار قدیم انسان" (Grand Old Man of Intestine) کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی چھوٹی آنت اور بڑی آنت میں بحیثیت طفیلی زندگی گزارتا ہے اور آنت کی اندرونی مخاطی پر ت کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اسہال (Diarrhoea) یا گیارڈیائیٹ (Giardiasis) نامی مرض کا باعث بنتا ہے۔ اس مرض کی علامتوں میں سیالی جلاب جس میں زردی مائل رگج اور الرجی شامل ہیں۔ اجابت کے ذریعہ مخاط اور خون خارج نہیں ہوتا بلکہ صرف پانی ضائع ہوتا ہے جس کی وجہ سے تابدگی (Dehydration) واقع ہو جاتی ہے۔ اس طفیلی کے کیے (Cysts) تعدی مراحل کہلاتے ہیں جو غذا اور پانی کے ساتھ انسان کی غذا کی تالی میں پہنچ کر بیماری کا باعث بنتے ہیں۔

اس مرض کا علاج اور انسدادی تدابیر اسپیشل کی طرح ہی کی جاتی ہیں۔




فصل 12.29

گیارڈیا لمبلیا

(3) کالا آزار (Kala Azar)

یہ انسان میں واقع ہونے والا مرض ہے۔ اس مرض کو ڈم ڈم بخار (Dum Dum Fever) سیاہ بخار (Black Fever) یا اشتہائی لیو مانیاسیس (Visceral Leishmaniasis) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرض بہار، آسام، بنگال، شمالی آفریقہ، اٹلی، اسپین، جنوبی امریکہ اور چین وغیرہ میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ مرض انسان میں لیو مانیاسیس ڈونوفانی (*Leishmania donovani*) نامی پروٹوزوا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ طفیلی جگر (Liver)، طحال (Spleen)، عظمیٰ کودے (Bone Marrow)، آنتی قاطیہ (Intestinal Mucosa) اور لمفی غدود (Lymph Glands) کے جالداروں سرطانی خلیوں کو جائے مسکن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس مرض کی خاص علامتوں میں بخار کے علاوہ جگر اور طحال کا بڑھ جانا شامل ہیں۔ یہ مرض ریت مکھی (Sand Fly) کے ذریعہ پھیلتا ہے جو ثانوی میزبان بھی ہوتی ہے۔

اس مرض کے پھیلنے پر قابو پانے کے لئے DDT اور BHC کے استعمال کے ذریعہ ریت مکھیوں کا خاتمہ، مخزن میزبان جیسے بلیوں اور کتوں سے محفوظ رہنا یا ان کا خاتمہ جیسی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔



شکل 12.31

لیو مانیاسیس




شکل 12.30

لیو مانیاسیس



شکل 12.32

ریت کھی




شکل 12.33

لیشمانیہ ڈلودانی کی دور حیات




ص 12:34

موزک کلا آزار۔ جلدی لیشا نوانڈ (چہرے پر پھنسیاں)



ص 12:35

موزک کلا آزار۔ جلدی لیشا نوانڈ (چہرے پر گھٹی نما پھنسیاں)



فکل 12.36

کالا آزار سے متاثرہ طحال جس میں طحال پھیلی ہوئی اور گنجان ہوتی ہے
جس پر ابھار اور نشیب کے متواتر حصے پائے جاتے ہیں

4 بشری لیشمانیاسیس (Cutaneous Leishmaniasis) یا مفلّی تاسور (Oriental Sore)

یہ مرض ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی افریقہ، برازیل اور میکسیکو میں عام طور پر واقع ہوتا ہے۔ یہ مرض بھی انسان میں ریت مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس سے لیشمانیا ٹروپیکا (*Leishmania tropica*) انسانی خون میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس مرض کے لئے اخلاقی مدت چند ہفتوں سے چھ ماہ تک ہوتی ہے۔


مریض کے جسم پر بالخصوص چہرے پر پھوڑے نکل آتے ہیں جن کا حاشیہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پھوڑا گہرا ہوتا ہے۔ اس کے اطراف سرخ رنگ کا حلقہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ پھوڑا تقریباً چھ ماہ کے بعد از خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اس مرض کے پھٹنے پر قابو پانے کے لئے ذیل کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔

(1) ریت مکھیوں کا DDT , BHC کے چمڑکاؤ کے ذریعہ خاتمہ۔

(2) مخزن میزبان کا خاتمہ۔


(3) انفرادی طور پر ریت کھیوں کے کاٹنے سے محفوظ رہتا۔

(4) ٹیکہ لگوانا وغیرہ۔



ح 12.38

لیشمانیا ٹریکس کا لیشمانیا ٹریکس مرحلہ
جلد کی تڑاں جس میں کھاں اکال خلیے اور لیشمانیا ٹریکس



فکل 12.37

لیشمانیا ٹریکس کا لیچمونوٹاڈ مرحلہ



فکل 12.39

بشری لیشمانیا سیس (Cutaneous Leishmaniasis)
چمڑے اور ہاتھ پر مفلّی تاسور (Leishmania tropica) (Oriental Sore)

(5) ملیریا طفیلی (Malarial Parasite)

ملیریا شاید انسانوں کی ایک قدیم ترین بیماری ہے۔ اہل یونان بھی اس بیماری سے واقف تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دلدلوں اور کچڑ سے آنے والی گندی ہوائیں اس بیماری کا سبب بنتی ہیں (یونانی Mala گندی، Aeria = ہوا) یہ منطقہ حارہ اور منطقہ معتدلہ کے کئی ممالک کی ایک عام بیماری ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی علاقوں میں اس کو اہم بیماری سمجھا جاتا ہے کیوں کہ یہ کمزوری اور ہلاکت کی راست یا بالراست ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایک دروں غلوی خون کے طفیلی (دسوی طفیلی) پلاسموڈیم سے پیدا ہوتی ہے۔

پلاسموڈیم کی چار انواع دریافت کی گئی ہیں۔ جو وائی ویاکس (Vivax) 'فالسی جیرم' (Falciparum)، ملیریائی (Malariae) اور اوویل (Ovale) ہیں۔ پی۔ اوویل (P. ovale) سے پیدا ہونے والی ملیریا بیماری کی بہت کم اطلاع ملتی ہے کیوں کہ یہ نوع مشرقی اور مغربی افریقہ اور فلپائن میں پائی جاتی ہے۔ مختلف انواع مختلف قسم کے ملیریا پیدا کرتی ہیں۔ ان تمام میں سب سے زیادہ شدید پی۔ فالسیرم (P. Falciparum) ہے کیوں کہ اس کی دوا محرم (Drug Resistant) سلیس ماہرین طب کے لئے ایک مسئلہ بن گئی ہیں۔

کچھ سال قبل تھیل پھروں کی آبادی اور طفیلی پر قابو پاتے ہوئے اس مرض پر قائل لحاظ قابو پایا گیا تھا۔ تاہم طفیلی اور حامل طفیلی دوا محرم شکلوں کی ارتقاء کی وجہ سے دوبارہ وجود میں آ گئے۔ ان کا وجود ترقی پذیر اور زرقی یافتہ ممالک میں صحت عامہ کے انتظام کے لئے چیلنج بن چکا ہے۔ ملیریا کے پھیلنے کو روکنے اور مریضوں کے کامیاب علاج کے لئے سائنس دان اور صحت کے ادارے اب نئے ادویات اور ٹیکوں کی دریافت میں بہترین مصروف ہیں۔

1880ء میں چارلس لاوریان (Charles Laveran) نے پہلی مرتبہ مریض کے خون میں ملیریا کے طفیلی کو دریافت کیا۔ 1892ء میں ریچارڈ فیلر (Richard Pfeifer) نے ملیریا کی ترسیل (Transmission) میں خون چوسنے والے حشرات کے رول کو تجویز کیا۔

1894ء میں سر پاتریک مائنسن (Sir Patrick Manson) نے ملیریا طفیلی کی منتقلی میں پھروں کے رول کو تجویز کیا۔ 29 August, 1897ء میں سر رونالڈ راس (Sir Ronald Ross) نے سکندر آباد کے فوجی اسپتال میں اس مرض کی تحقیق کرتے ہوئے اودہ انا فلیس (Female Mosquito) کے معدہ (Stomach) میں پلاسموڈیم (Plasmodium) کے بیض خلیوں (Oocysts) کو دریافت کیا جس کے لئے انھیں 1902ء میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 29 August, 1897ء کو سارے ملک میں "ہیم پھر"

(Malaria Day) کے طور پر منایا جاتا ہے۔



شکل 12.40

سر رونالڈ راس (Sir Ronald Ross)

1898ء میں اطالوی ماہر سائنسدان گراسی (Grassi) اور اس کے رفقاء نے انسانی ملیریا طفیلی کی مکمل جنسی دور حیات کو مادہ اتالیس (Anopheles) چمھر میں دریافت کیا۔


1948ء میں کرنل شارٹ اور گرانہم (Col. Shortt and Granham)، برطانوی ماہرین اول حیوانیات (Protozoologist)، نے دریافت کیا کہ طفیلی انسانی جسم میں سب سے پہلے جگری خلیوں پر حملہ کرتے ہیں اور خون کے سرخ جیسوں (RBC) میں داخل ہونے سے قبل پیش امر شقاقت (Pre-Erythrocytic Schizogony) کو انجام دیتے ہیں۔

1965ء میں روڈزینسکا وغیرہ (Rudzinska et al.) نے طفیلی کی ہالائے خوردبینی ساخت (Ultra Structure) کا مطالعہ کیا۔

ملیریا طفیلی کی دور حیات (Life Cycle of Malarial Parasite)

ملیریا بیماری پیدا کرنے والے طفیلی کا دور حیات دو میزبانوں میں تکمیل پاتا ہے۔ ایک ابتدائی (Primary Host) میزبان

انسان، اور دوسرا درمیانی (Intermediate) میزبان یا ثانوی میزبان (Secondary Host) یا حامل (Carrier) مادہ اتالیس (Anopheles) چمھر۔



شکل 12.41
مادہ آفاتیس مچھر

طفیلی کی ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقلی مچھر کے کاٹنے کے ذریعہ ہوتی ہے جو کم دبیش حیاتی نیکہ اندازی (Life Inoculation) جیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں جیسے پیدائشی تعدیہ (Congenital Infection)، ڈرگس (Drugs) کے مادی اشخاص کے ذریعہ آلودہ سوئی کا استعمال وغیرہ۔ خاص طور پر فقر الدم یا کسی بھی وجہ سے خون کی منتقلی (Blood Transfusion) کے دوران طیرا طفیلی کے تعدیہ مرحلے انسان کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور طیرا بیماری کے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔


طفیلی کی دور حیات تبدیل نسل (Alternation of Generations) کی نشاندہی کرتی ہے۔ غیر جنسی دور حیات جس کو شقایقیت (Schizogony) بھی کہا جاتا ہے انسان میں واقع ہوتی ہے۔ جنسی دور حیات جس کو بذرہ زائی (Sporogony) کہا جاتا ہے مچھر میں واقع ہوتی ہے۔ یہ غیر جنسی دور اور جنسی دور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل نسل کو انجام دیتے ہیں۔ غیر جنسی دور تین مراحل میں واقع ہوتا ہے۔

(i) پیش از جنسی شقایقیت (Pre-Erythrocytic Schizogony)

(ii) بروں از جنسی شقایقیت (Exo-Erythrocytic Schizogony)

بہت بالغ طفیلی تغذیائی حوانچہ (Trophozoite) کہلاتا ہے۔ یہ ایسا نام، ایک مرکزی ہوتا ہے۔ غلیہ مایہ (Cytoplasm) میں دانے دار غلوی عضوئے (Cell Organelles) جیسے رائبوزوس (Ribosomes)، دروں مائی جال (Endoplasmic Reticulum)، گالٹی اجسام (Golgi Bodies)، توایہ (Mitochondria) موجود ہوتے ہیں۔ نقل و حرکت

(Locomotion) اور انقباضی خالیے (Contractile Vacuoles) غیر موجود ہوتے ہیں۔ غذائی خالیے (Food Vacuoles) موجود ہوتے ہیں۔ ان میں ہیโมزائین (Haemozine) نامی زہرنا مادہ پایا جاتا ہے۔




شکل 12.42

بالغ تغذیائی حیوانچہ

(i) پیش احمر جسمی دور یا شقاقیت (غیر جنسی مرحلہ - 1) (Pre-Erythrocytic Cycle or Schizogony (A sexual Phase - 1))


پیش احمر جسمی دور (Pre-Erythrocytic Cycle) کی شروعات بذریعہ انچہ (Sporozoite) سے ہوتی ہے۔ طفیل کی غیر فقری (Invertebrate) میزبان سے فقری (Vertebrate) میزبان میں منتقلی راست خون میں نیکہ اندازی (Inoculation) کے ذریعہ واقع ہوتی ہے۔ متعدی مادہ انائیس مچھر طفیلی بذریعہ انچہ (Sporozoite) مرحلہ کو لعاب (Saliva) کے ساتھ انسان کے جسم میں خون چوسنے کے دوران داخل کرتی ہے۔ تعدیہ (Infection) کے تقریباً آدھے گھنٹہ کے بعد بذریعہ انچہ دوران خون سے غائب ہو جاتے ہیں اور جگر کے کئی ہائپوٹیلیوں (Parenchymatous Cells) میں داخل ہوتے ہیں اور تقریباً 10 دنوں میں پیش احمر جسمی دور کو مکمل کر لیتے ہیں۔



شکل 12.43

بذره حیوانی

بذره حیوانی بچے جگری خلیوں میں داخل ہو کر غذا حاصل کرتے ہوئے اپنی جسامت میں بڑھ جاتے ہیں اور شکل میں گول بن جاتے ہیں اور شقایہ (Schizont) کہلاتے ہیں۔ شقایہ کثیر پارگی (Multiple Fission) کے ذریعہ تقسیم ہو کر تقریباً 1000 پارہ حیوانی (Merozoites) پیدا کرتا ہے۔ اس کثیر پارگی کو شقایہ کہا جاتا ہے۔ پارہ حیوانی جگری خلیہ کے ٹوٹنے پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ غیر جنسی تولید کے اس مرحلہ کو پیش احمر جنسی شقایہ (Pre-Erythrocytic Shizogony) کہا جاتا ہے۔ آزاد ہونے والے پارہ حیوانی (Cryptozoites) یا نقلی پارہ حیوانی (Cryptomerozoites) کہلاتے ہیں۔




شکل 12.44

پیش احمر جنسی دور یا شقایہ (غیر جنسی مرحلہ - 1)

بروں احمر جسمی دور یا شقایقیت (غیر جنسی مرحلہ - 2)

یہ غیر جنسی تولید کا دوسرا مرحلہ ہے جو بکری خلیوں میں ہی واقع ہوتا ہے۔ پیش احمر جسمی دور میں پیدا ہونے والے نئی پارہ حیوانچے غیر متاثرہ بکری خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور غذا حاصل کرتے ہوئے جسامت میں بڑھتے ہیں۔ ان کو شقایقہ (Schizont) کہا جاتا ہے۔ شقایقہ کثیر پارگی کے ذریعہ تقسیم ہوتا ہے اور دوسری نسل کے تقریباً ایک ہزار پارہ حیوانچوں (Merozoites) کو پیدا کرتا ہے جن کو بعد نئی پارہ حیوانچے (Metacryptomerozoites) کہا جاتا ہے۔ بعد نئی پارہ حیوانچے دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ (1) خرد بعد نئی حیوانچے (Micro-Metacryptozoites) یا خرد بعد نئی پارہ حیوانچے (Micro-Metacryptomerozoites) جو جسامت میں چھوٹے اور کافی تعداد میں ہوتے ہیں اور (2) کلاں بعد نئی حیوانچے (Macro Metacryptozoites) یا کلاں بعد نئی پارہ حیوانچے (Macro-Metacryptomerozoites) جو جسامت میں بڑے لیکن تعداد میں کم ہوتے ہیں۔

خرد بعد نئی حیوانچے (Micro-Metacryptozoites) احمر جسمی شقایقیت (Erythrocytic Schizogony) کی شروعات کرتے ہیں جب کہ کلاں بعد نئی حیوانچے (Macrometacryptozoites) وغیرہ متاثرہ بکری خلیوں پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور بروں احمر جسمی دور (Exo-Erythrocytic Cycle) کو جاری رکھتے ہوئے پارہ حیوانچوں (Merozoites) کے مخزن (Reservoir) کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ پارہ حیوانچے میزبان یا ادویات کے اثر کے لئے مزاحم ہوتے ہیں۔ یہ بکری خلیوں میں کئی سالوں تک رہتے ہیں جس کے دوران کوئی کلینیکی علامتیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ یہ خون کے سرخ جسموں کو متاثر کر سکتے ہیں اور کم از کم دو سال تک بلیر یا کو دوبارہ پیدا کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔



شکل 12.45

بروں احمر جسمی دور یا شقایقیت (غیر جنسی مرحلہ - 2)

احمر جسمی دور یا اشتقاقیت (غیر جنسی مرحلہ-3) (Erythrocytic Cycle or Schizogony)

(A Sexual Phase - 3)

احمر جسموں (Erythrocytes) میں واقع ہونے والی طفیلی کی غیر جنسی تولید احمر جسمی دور (Erythrocytic cycle) یا احمر جسمی اشتقاقیت (Erythrocytic Schizogony) کہلاتی ہے۔ بروں احمر جسمی دور کے بعض خرد بعد مخفی پارہ حیوانچے (Micro-Metacrypto Merozoites) جگر سے دوران خون میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ خون کے احمر جسموں میں یہ داخل ہو جاتے ہیں اور ان جسموں سے غذا حاصل کرتے ہوئے اپنی جسامت میں اضافہ کرتے ہیں۔ طفیلی کے اس مرحلہ کو تغذیائی حیوانچہ مرحلہ (Trophozoite Phase) کہا جاتا ہے۔


تغذیائی حیوانچہ (Trophozoite) میں ایک خالیہ (Vacuole) ظاہر ہوتا ہے جس کی جسامت میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرکزہ ایک جانب کو ہٹ جاتا ہے۔ اس مرحلہ پر طفیلی ایک حلقہ (Ring) کے مانند دکھائی دیتا ہے اس لئے اس مرحلہ کو سنگیٹ حلقی مرحلہ (Signet Ring Stage) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طفیلی کی جسامت میں اضافہ کے ساتھ خالیہ غائب ہو جاتا ہے اور اب طفیلی ایک ایسا (Amoeba) کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس مرحلہ کو امیبائی مرحلہ (Amoeboid Stage) کہا جاتا ہے۔

طفیلی خلیہ مایہ میں سیاہ رنگ کے صبغے (Pigments) دکھائی دیتے ہیں جس کو ہیمازائن (Haemozoin) کہا جاتا ہے۔ جو ہیموگلوبن (Haemoglobin) کی تحلیل کا حاصل ہوتا ہے۔

سرخ جسموں کی سطح پر مخصوص قسم کے دانے ظاہر ہوتے ہیں جن کو شفٹنر کے نقطے (Schuffners Dots) کہتے ہیں۔ ان کے دریافت کرنے والے کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

طفیلی متعدد بار تقسیم ہوتا ہے اور 6 تا 36 (مختلف انواع میں) پارہ حیوانچے پیدا کرتا ہے جن کو احمر جسمی پارہ حیوانچے (Erythrocytic Merozoites) کہتے ہیں۔ یہ سرخ جسموں میں پھول کی پتھریوں کے مانند ترتیب پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس مرحلہ کو (Rosette Stage) کہا جاتا ہے۔ سرخ جیسے پھٹ پڑتے ہیں اور احمر جسمی پارہ حیوانچے خون میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ غیر متاثرہ احمر جسموں پر حملہ کرتے ہیں اور احمر جسمی دو کو جاری رکھتے ہیں۔ انسان کے سرخ دھوسی جسموں (Red Blood Corpuscles) میں احمر جسمی دور کو گالگی کے دور (Cycle of Golgi) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ دور طفیلی کی انواع کے لحاظ سے 48 تا 72 گھنٹوں میں تکمیل پاتا ہے۔

خون میں پارہ حیوانچوں اور ہیوزائین (Haemozoin) کے آزاد ہونے کے ساتھ مریض میں طیرا کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔
یہ علامتیں تیز بخار کے ساتھ ہر 48 تا 72 گھنٹوں کے وقفہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔



شکل 12.46

انسانی دور یا شقائقیت (غیر جنسی مرحلہ-3)

زولجہ خلیوں کی تیاری (Formation of Gametocytes)

متعدد بار شقائقیت (Schizogony) کے واقع ہونے پر خلیوں کی کثیر تعداد پیدا ہوتی ہے جو میزبان کی موت کا سبب بنتی ہے اور جو خور و خلیوں کی موت کا باعث بھی ہے۔ لہذا طفیلی کی نسل کو قائم رکھنے کے لئے طفیلی کی دوسرے غیر متاثر میزبان میں منتقلی اہمائی ضروری ہوتی ہے۔ طفیلی جنسی تولید کو انجام دینے کے قابل بننے کے لئے غیر فقری میزبان میں داخل ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی متعدد بار شقائقیت کے نتیجے میں کھوئے ہوئے شباب کو جنسی تولید کے ذریعہ دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ جنسی تولید کو انجام دینے کی تیاری (دوا جوں (Gametes) کی

پیدائش کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ لمبریا کی طفیلی میں یہ ایک قابل قدر توافق ہے جس کے ذریعہ لمبریا کی طفیلی اپنی نسل کی بقاء اور تولید کے لئے غیر جنسی تولید کی جنسی تولید کے ساتھ تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر طفیلی تبدیلی نسل (Alternation of Generation) کو ظاہر کرتا ہے۔

انجنسی دور کے بار بار اعادہ کے بعد خون کے سرخ جیسوں میں دو اقسام کے پارہ حیوانچے (Merozoites) پیدا کئے جاتے ہیں۔ (i) خرد زونجہ خلیے (Microgametocytes) یا نر زونجہ جو چھوٹے لیکن تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ ان کا مرکزہ بڑا اور درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ (2) کلاں زونجہ خلیے (Macrogametocytes) یا مادہ زونجہ۔ یہ بڑی جسامت کے ہوتے ہیں اور تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کا مرکزہ چھوٹا جامد (Compact) اور ایک جانب میں پایا جاتا ہے۔

بنتہ زونجہ خلیے انسانی خون میں تقریباً ایک ہفتہ تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ خون میں غیر عامل رہتے ہیں ان کی مزید نشوونما مادہ اناپلیس نامی مچھر میں ہوتی ہے۔ اگر طفیلی دوسری انواع کے مچھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ان میں زندہ نہیں رہ سکتے کیوں کہ یہ مچھر ہضم کر لئے جاتے ہیں۔

زونجہ خلیے مادہ اناپلیس میں داخل ہوتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں کیوں کہ یہ ان کے ہاضمی رس کے لئے مزا م ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے دوسرے پارہ حیوانچے عدم مزاحمتی صلاحیت کی وجہ سے ہضم کر لئے جاتے ہیں۔

بنتہ زونجہ خلیے انسان کے سطحی رموی وعاؤں (Blood Vessels) میں ہجرت کر لیتے ہیں تاکہ مچھر کے جسم میں داخل ہونے کے مواقع زیادہ میسر ہو سکے۔ سطحی خون کو چوسنے کے لئے کاٹتے ہیں۔ یہ طفیلی کے لئے غیر فحری میزبان میں داخل ہونے کے لئے تعجب خیز طفیلی توافق ہے۔

پلاسموڈیم کی مچھر میں صنفی دور (Sexual Cycle of Plasmodium in Mosquito)

راس کا دور بذریعہ زائی (Cycle of Ross - Sporogony)

مچھر میں پلاسموڈیم کی دور حیات کو بذریعہ زائی (Sporogony) یا راس کا دور (Cycle of Ross) کہا جاتا ہے جس کو سب سے پہلے راس (Ross) نے مچھر میں دریافت کیا۔

مچھر جب متاثرہ شخص کو خون چوسنے کے لئے کاٹتا ہے تو متاثرہ شخص کے خون میں پائے جانے والے غیر عامل زونجہ خلیے (Gametocytes) مچھر کی غذا کی تالی میں داخل ہو جاتے ہیں۔

زولجہ کی تشکیل (Gamete Formation)

خرد زولجہ خلیوں (Microgametocytes) سے نر زولجے (Male Gametes) اور کلاں زولجہ خلیوں

(Macrogametocytes) سے مادہ زولجے (Female Gametes) تیار ہوتے ہیں۔

خرد زولجہ خلیوں کے مرکزے تخفیفی تقسیم (Meiosis) کے ذریعہ 8 تا 6 یک گنا (Haploid) دختر مرکزوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیلی حصہ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خلیہ مایہ زولجہ خلیہ کی سطح سے 8 تا 6 سوطیہ (Flagellum) نمادھاگوں کی شکل میں باہر نکل آتا ہے۔ ہر ایک دھا کہ میں ایک ایک دختر مرکزہ داخل ہوتا ہے۔ یہ مرکزہ بردار دھاگے نر زولجے یعنی خرد زولجے کہلاتے ہیں۔ زولجہ خلیہ سے یہ نر زولجے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یک گنا نر زولجوں (Haploid Male Gametes) کی تیاری مردوں سوطیہ براری (Exflagellation) یا سوطیہ براری (Flagellation) کہلاتی ہے۔ نر زولجے مچھر کے معدہ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

کلاں زولجہ خلیہ (Macrogametocyte) میں پختگی تقسیم (Maturation Division) (تخفیفی تقسیم Meiosis) واقع ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں یک گنا مادہ زولجے (Haploid Female Gametes) نمودار ہوتے ہیں۔ مادہ زولجے غیر متحرک ہوتے ہیں۔ ان پر خلیہ مائی زائندہ نمودار ہوتا ہے جس کو وصول کنندہ مخروط (Cone of Reception) یا باروری مخروط (Fertilization Cone) کہا جاتا ہے۔


باروری (Fertilization)

ایک واحد خرد زولجہ (Microgamete) کلاں زولجہ (Megagamete) میں باروری مخروط کے ذریعہ داخل ہوتا ہے جس کے باعث باروری (Fertilization) یا طواں زواجیت (Syngamy) واقع ہوتی ہے۔ دونوں زواجوں کے مرکزے ایک دوسرے میں ضم ہو کر دو گنا جفتہ (Diploid Zygote) تیار کرتے ہیں جس میں ایک واحد انفہامی مرکزہ (Fusion Nucleus) یا طواں نوات (Synkaryon) پایا جاتا ہے۔ چوں کہ انفہامی زولجے غیر مشابہ ہوتے ہیں اس لئے طواں زواجیت کو غیر ہم زواجیت (Anisogamy) کہا جاتا ہے۔

کیسہ بندی (Encystment)

جفتہ کی تیاری کے 24 گھنٹوں بعد جفتہ دودہ نما (Vermiform)، لانا اور متحرک بن جاتا ہے۔ اس کو دودہ میواچہ (Vermicule) یا بیض حرکتیہ (Ookinete) کہا جاتا ہے۔ بیض حرکتیہ مچھر کے معدہ کی دیوار میں داخل ہوتا ہے اور اس کی بیرونی قہریدی

کیسہ سے تقریباً 10,000 بذرہ حیوانچے پیدا ہوتے ہیں۔ بذرہ حیوانچے پھھر کے لعابی غدود میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک تخمینہ کے مطابق پھھر کے ایک لعابی غدود میں بذرہ حیوانچوں کی تعداد تقریباً 200,000 ہوتی ہے۔



شکل 12.48

مساثرہ پھھر کا معدہ


بذرہ حیوانچے (Sporozoites)

بذرہ حیوانچے (Sporozoites) انسان کے لئے تعدی مرحلہ (Infective Stage) ہوتا ہے۔ اس کی شکل درمختی نما (Sickle Shaped) ہوتی ہے۔ بذرہ حیوانچے کی بیرونی پرت پیلیکل (Pellicle) کی ہوتی ہے۔ اس میں پائے جانے والے لمبی کھوکھلے ریشک (Fibrils) شکل و حرکت کا فعل انجام دیتے ہیں۔ اس میں میزبان کی بافت میں سرایت کرنے کی میکانیت پائی جاتی ہے۔ اس میں کئی تو اسی (Mitochondria) پائے جاتے ہیں جو اس کے لئے توانائی پیدا کرتے ہیں۔

جب ایک مساثرہ پھھر صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو ہزاروں بذرہ حیوانچے (Sporozoites) انسان کے خون میں داخل ہو جاتے

ہیں۔

مچھر میں جنسی تولید



شکل 12.49 پلاسماؤڈیم دیپیکس کی دور حیات

☆ انسان میں بیکٹریا کے باعث پیدا ہونے والے امراض میں ہیضہ (Cholera)، ٹائفائیڈ (Typhoid)، خناق (ڈیفٹھریا Diphtheria)، نیونیا (Pneumonia)، کزاز (ٹیتانوس Tetanus)، اسہال (Diarrhoea)، ہڈام (Leprosy) اور طاعون (Plague) شامل ہیں۔

یہ ایک متعدی اور مہلک مرض ہے جس میں انسان کی غذائی مٹی متاثر ہوتی ہے۔ یہ مرض ویریو کالیرا (*Vibrio cholera*) نامی گرام منفی (Gram -ve) بیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔

اس مرض کی علامتوں میں اسہال، قے، پیشاب کا کم خارج ہونا، عضلات میں درد، زبان کا خشک ہونا، آنکھوں کا اندر دھننا اور کمزوری کا ظاہر ہونا شامل ہیں۔ اس مرض میں عام طور پر ایک دن میں 30 تا 40 مرتبہ آبی دست آتے ہیں جس کے ساتھ برقی (Electrolytes) یعنی سوڈیم، پوٹاشیم، اور کلورائیڈ کے رواں ضائع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دست ہو جانے سے تابدگی (Dehydration) واقع ہوتی ہے۔

انسان میں یہ مرض سالونیلا ٹائپی (*Salmonella typhi*) نامی گرام منفی بیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک مرض حاد (Acute Disease) اور مقامی مرض ہے۔

سالونیلا ٹائپی بیکٹریا سے آلودہ غذا اور پانی اس مرض کے تعدیہ (Infection) کا ذریعہ ہے۔ یہ بیکٹریا مریض کے پیشاب اور فضلہ میں پائے جاتے ہیں جو مریض کے ساتھ راست ربط، حامل طفیلی (Vector) حشرات، آلودہ غذا اور پانی اور دیگر اشیاء کے ذریعہ صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ٹائفائیڈ نامی مرض کا باعث بنتے ہیں۔

اس بیماری کی علامتوں میں مستقل 102 تا 103 درجہ فارن ہیت تپش، بخار کا شام کے اوقات میں ظاہر ہونا، آنت میں چھلے قابل ذکر ہیں۔

ٹائفائیڈ بخار کی شناخت وائڈل جانچ (Vidal Test) کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

دق مرض مانگو بیکٹریا ٹیوبرکولاس (*Mycobacterium tuberculosis*) نامی بیکٹریا کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ دق کا مرض پیدا کرنے والے اس بیکٹریا کو کوچ (Koch) نے سب سے پہلے دریافت کیا۔ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس بیماری سے بچھڑے

متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی شناخت ایکس رے (X-Rays) کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

جذام مرض مائیکو بیکٹریئم لپھرے (*Mycobacterium leprae*) نامی بیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض میں مریض کی جلد اور تحلیکی اعصاب شدید متاثر ہوتے ہیں۔

خناق مرض بچوں میں کوری بی بیکٹریئم ڈیفٹیریا (*Corynebacterium diphtheriae*) نامی بیکٹریا کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اس بیماری کی انتہائی مدت 2 تا 5 دن ہوتی ہے۔ اس بیکٹریا کی وجہ سے مریض کے حلق، ناک اور غدد شدید متاثر ہوتے ہیں۔ کالی کھانسی چھوٹے بچوں میں ہونے والا ایک عام مرض حاد (Acute Disease) ہے جو پیسیس پرائوس (*Bacillus pertussis*) نامی بیکٹریا کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔

☆ یہ مرض مٹی میں پائے جانے والے کلاسٹریئم ٹیٹانی (*Clostridium tetani*) نامی بیکٹریا کے ذریعہ افزا ہونے والے بڑوں سم (Exotoxins) کے اثر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض سے متاثرہ مریض میں گردن اور جڑوں کے عضلات میں سکڑاؤ اور سختی، اعضاء ٹھنکی، ریزہ کے ستون کے شوکہ (Spine) کا خمیدہ ہونا، مرگی (Epilepsy) اور تشنج (Convulsions) اور دانت کیلی یا لک بنگل (Lockjaw) جیسی علامتیں پائی جاتی ہیں۔

☆ وائرس (Virus) کے ذریعہ انسان میں کئی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں خسرہ (Measles)، چچک (Small Pox)، مچھوٹی چچک (Chicken Pox)، بھسورے (Mumps)، انفلوینزا (Influenza)، پولیو ماییلیٹس (Polio Myelitis)، رابیس (Rabies) سمیت ہیپائٹس (Infective Hepatitis) وغیرہ عام طور پر پائے جانے والے امراض ہیں۔

☆ انسان میں خسرہ مرض مدہجلا وائرس (*Rubeola virus*) سے پیدا ہوتا ہے جو انسان میں دہن، ناک اور حلق کے راستہ سے قلیمرہ (Droplet) کے ذریعہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتوں میں اچانک بخار کا آنا جس کے ساتھ ہی جلد پر گلابی یا سرخ دھبوں کا ظاہر ہونا، خشک کھانسی، ناک کا بہنا، حلق اور پیچھے دھبوں کا متاثر ہونا، مدہجی کو دیکھنے سے آنکھوں میں تکلیف، سردی اور سر کا درد وغیرہ شامل ہیں۔

☆ چچک ایک متعدی اور کافی مہلک مرض ہے۔ اس مرض کا باعث بننے والے دیرپولا وائرس (*Variola virus*) انسان کے جسم میں قلیمرہ (Droplet) کے ذریعہ یا راستہ بدل یا اس وائرس سے آلودہ کپڑے یا کوئی شے کے ساتھ تماس میں آنے پر منتقل ہوتے ہیں۔

☆ ہندوستان کو 1977ء میں چچک سے آزاد ملک قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ دیش میں چچک (Small Pox) سے متاثرہ آخری مریض 24th May, 1975 کو پایا گیا تھا۔

☆ چھوٹی چھچک دار سیلا زوسٹر وائرس (Varicella zoster virus) کے باعث قطرہ (Droplets)، آلودہ اشیاء یا راستہ ربط کے ذریعہ پھیلتا ہے۔

☆ گلسوئے پانچ تا پندرہ سال کی عمر کے بچوں میں واقع ہونے والا مرض ہے۔ اس مرض میں مریض کے لعابی غدود جیسے غدود وکلیہ (Parotid Glands) میں سوجن پیدا ہوتی ہے۔ منہ کے کھلنے میں درد، بخار، سر کا درد وغیرہ اس مرض کی علامتیں ہیں۔

☆ انفلوینزا پارامیکزو وائرس (Paramyxovirus) کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامتوں میں اچانک بخار، ٹھنڈی بلغم کی کھانسی، سر کا درد، جسم کا درد، ناک کا بہنا، آنکھوں سے پانی نکلنا، چھینکنا، اضطراب اور چہرہ کا سوجنا وغیرہ شامل ہیں۔

☆ پولیو مائیلیٹس بچوں میں واقع ہونے والا ایک عام مرض ہے جس کو فالج اطفال بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث بننے والے پولیو وائرس (Polio virus) بچہ کے جسم میں غذا، پانی اور دودھ کے ساتھ یا ذیلی تنفسی راستہ یا راستہ ربط کے ذریعہ داخل ہوتے ہیں۔

☆ رابیز مرض رابیز وائرس (Rabies virus) کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ یہ وائرس کتوں، بلیوں، بندروں وغیرہ کے لعابی غدود میں پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کو عام طور پر آب گریزی (Hydrophobia) کہا جاتا ہے۔

☆ متعدی جگری ورم (Infectious Hepatitis) یا جگری ورم قسم اے (Type A Hepatitis) ہپائٹس اے وائرس (HAV) کے باعث عموماً بچوں اور کسن بالغوں میں واقع ہوتا ہے۔ یہ وائرس برقان (Jaundice) کا باعث بنتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے بخار، اضطراب، جلی، قے، جگر میں سختی واقع ہوتی ہے۔

☆ ہیمپٹلی جگری ورم (Serum Hepatitis) یا جگری ورم قسم بی (Type B Hepatitis) مرض ہپائٹس بی وائرس (Hepatitis B Virus) کی وجہ سے بچوں کی بہ نسبت بالغوں میں عام طور پر ہوتا ہے۔ اس مرض کے متاثرہ مریض میں سرخ پٹکے (Rash)، جوڑوں کا درد (Arthralgia) اور جوڑوں میں ورم پایا جاتا ہے۔ کہنہ مرض (Chronic Disease) میں تھن جگر (Cirrhosis) (جگر کا سکڑاؤ) ہو جاتا ہے۔

☆ اکتسابی قلت مامونی مارفہ (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ایک نئی بیماری ہے۔ جو کٹھنٹ ایڈس (AIDS) ہے۔ یہ مرض HIV وائرس کے ذریعہ لائق ہوتا ہے جو کئی بیماریوں اور علامتوں کا مجموعہ ہے۔ تعدیہ کا آخری مرحلہ ایڈس (AIDS) کہلاتا ہے جس کے دوران مریض میں قلت مامونی میکانیت (Immuno Deficiency Mechanism) مستقل طور پر ضائع ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں مریض بے شمار دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایچ آئی وی (HIV) کی جانچ کے لئے خصوصی طور پر

ایلیسا جانچ (ELISA Test) کو انجام دیا جاتا ہے۔

☆ اول حیوانیوں کے ذریعہ انسانوں میں پیدا ہونے والے چند امراض میں امیبیاسس (Amoebiasis)، اسہال

(Diarrhoea) اور طیریا (Malaria) وغیرہ شامل ہیں۔

☆ امیبیاسس (Amoebiasis) کو عام طور پر امیبیائی پیچش (Amoebic Dysentery) کہا جاتا ہے جو اینامیبا ہسٹالٹیکا

(*Entamoeba histolytica*) کے ذریعہ بچوں اور بالغوں میں واقع ہوتا ہے۔ اجابت کے ساتھ مخاط (Mucous) اور خون خارج

ہوتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں درد، مرڈ اور متلی بھی ہوتی ہے۔

☆ کالا آزار (Kala Azar) کو ڈم ڈم بخار یا سیاہ بخار یا ایشمانیا سیس بھی کہا جاتا ہے۔

☆ بشری لیشمانیا سیس (Cutaneous Leishmaniasis) بیماری سے متاثرہ مریض کے چہرے پر گہرے پھوڑے پیدا ہوتے

ہیں جن کا حاشیہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔

☆ انسان میں طیریا (Malaria) کا باعث بننے والی طفیلی کی تین انواع پائی جاتی ہیں جن میں پلاسموڈیم فالسی جیرم

(*Plasmodium falciparum*) پلاسموڈیم ملیریے (*Plasmodium malariae*) اور پلاسموڈیم اوویل (*Plasmodium*

ovale) شامل ہیں۔

☆ انسان میں ملیریا بیماری مادہ انفلکس (Female Anopheles) کی مچھر کے ذریعہ پھیلتی ہے۔

5 نمونہ امتحانی سوالات

5.1 طویل جوابی سوالات

- (1) انسان میں بیکٹریا کے باعث کونسی بیماریاں لاحق ہوتی ہے۔ کسی ایک بیماری کو بیان کیجئے۔
- (2) انسان ہیضہ کی بیماری سے کس طرح متاثر ہوتا ہے اس بیماری کی علامتیں اور انسدادی طریقوں کو بیان کیجئے۔
- (3) انسان میں ٹائیفائیڈ بخار کس بیکٹریا کے ذریعہ واقع ہوتا ہے؟ یہ کس طرح انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اس بیماری کی علامتوں اور انسدادی طریقوں کو مختصر بیان کیجئے۔
- (4) "وق ایک متعدی بیماری ہے" پر ایک مجموعہ لکھئے۔

- (5) انسان میں جذام کی علامتوں اور بیماری کی اقسام کو بیان کیجئے۔
- (6) بچوں میں کوئی متعدی بیماریاں بیکٹریا کے ذریعہ واقع ہوتی ہیں ان کو مختصر ایمان کیجئے۔
- (7) کلاسیڈیم ٹیٹانی (Clostridium tetani) بیکٹریا کے باعث واقع ہونے والی بیماری کو مختصر ایمان کیجئے۔
- (8) خسرہ بیماری بچوں میں کس طرح منتقل ہوتی ہے اس بیماری کی علامتوں اور انسدادی طریقوں کو بیان کیجئے۔
- (9) " چیچک ایک انتہائی مہلک اور متعدی بیماری تھی " بیان کیجئے۔
- (10) حسب ذیل پر مختصر نوٹ لکھئے
- (a) چھوٹی چیچک (b) گلہوے (c) انفلویزا (d) پولیو ماییلیس
- (11) جگری ورم (Hepatitis) بیماری کو نئے وائرس کے باعث واقع ہوتی ہے؟ جگری ورم کی اقسام کو مختصر ایمان کیجئے۔
- (12) حسب ذیل پر مختصر نوٹ لکھئے
- (a) اسپیشائیس (b) اسپہال (c) کالا آزار (d) بشریشمانیائیس
- انسان میں لمبریا بیماری کس طرح واقع ہوتی ہے پلاسما سوڈیم کی دور حیات کو بیان کرتے ہوئے لمبریا کی علامتوں اور انسدادی طریقوں کو بیان کیجئے۔

5.2 مختصر جوابی سوالات

- (1) برقیہ سیال (Electrolyte Fluid) کی کیا اہمیت ہے؟ برقیہ سیال کی اجزائے ترکیبی کیا ہے؟
- (2) ٹائٹائیڈ بنجار کی شناخت کس طرح کی جاتی ہے؟
- (3) دق کے علاج میں کوئی ادویات استعمال کی جاتی ہیں؟
- (4) بچوں میں ڈی پی ٹی (DPT) ٹیکہ کوئی بیماریوں پر قابو پانے کے لئے دیئے جاتے ہیں؟
- (5) ہندوستان کو کس سنہ میں چیچک سے آزاد ملک قرار دیا گیا؟ ہندوستان میں اس بیماری سے متاثرہ آخری مریض کب ملا گیا تھا؟
- (6) پولیو وائرس بچوں میں کوئی اعضا کو متاثر کرتے ہیں؟ اس وائرس سے واقع ہونے والی بیماری کا علاج اور بچاؤ کس طرح کیا جاتا ہے؟
- (7) رابیز (Rabies) بیماری کو آئگریزی (Hydrophobia) کیوں کہا جاتا ہے؟

- 7.3 مفروضی سوالات
- (8) متحدہ جگہری ورم اور مصلی جگہری ورم کے درمیان کیا فرق ہے؟
- (9) اسہال یا گیاردیاسیس (Giardiasis) سے متاثرہ مریض میں تائیدیگی (Dehydration) کیوں واقع ہوتا ہے؟
- (10) انسان میں بلیریا بیماری کو پیدا کرنے والے پائسوڈیم طفیلی کے آخر جسمی دور حیات کے دوران کون سے مراحل وقوع پذیر ہوتے ہیں؟

5.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

[illegible]

ٹافائیڈ بخار کی شناخت — کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

دق بیمار کی شناخت ————— کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

بچوں میں خناق (فصیریا) بیماری کی وجہ سے طلق کی اندرونی سطح پر ————— تیار ہوتی ہے۔

کراڑی بیماریاں بیماری کے علاج میں مریض کو _____ دیکھے لگوائے جاتے ہیں۔

5.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

- (1) بچوں میں خسرو بیماری کے دوران ثانوی بیماریاں واقع ہوتی ہیں جیسے

- (a) خیشوی نیونیا اور ورم دماغ (b) ورم ہاں بطوں (Dermatitis)

- (c) دق

- (2) ٹالھائی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے لگائے جانے والے لیے

- (DPT) (b) TAB (a)

- PHAV** (c

- (3) انسان میں کالا آزار بیماری کا باعث بننے والے لیسمانیاڈ ذہنی نامی پروٹوزوا کے لئے ثانوی میزبان

- (a) ریت کھسی (Sand Fly) (b) مادہ مچھرائی فیلس

- (c) **زچھرا تا فلیس**

- (4) انسان میں طیریا کی علامتیں جیسے ہاڑ اور تیز بخار خون کے سرخ جیسوں (RBC) کے شق ہونے سے پکا ایک خوارے کی شکل

میں خارج ہونے والے دانوں کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دانے کھلاتے ہیں

(a) ہیمازوین (Haemozoin) (b) گلوبین (Globin)

(c) ہیماگلوبین (Haemoglobin)

(5) حیاتیاتی کنٹرول میں استعمال کی جانے والی سروائش پھلیاں

(a) گمبوسیا (Gambusia) اور لیوسٹس (Lebistes) (b) مرل پھلی

(c) چٹاس چٹاس

5.3.3 جوڑیاں لگائیے۔

(1) ڈم ڈم بخار (Dum Dum Fever) لیلیسا جانچ (ELISA Test) ()

() کلشریڈیم پھلیاں

(2) 29 August, 1897 ٹائڈنگ (Dehydration) ()

(3) ٹائڈنگ (Jaundice) ()

(4) لک جھک (Lockjaw) مانگو بکریلیو بکریلاس ()

() (Mycobacterium tuberculosis)

(5) گیاردیاسس (Giardiasis) "یوم پیریا" ()

(6) خسرہ قانچ اطفال ()

(7) کوچ (Koch) چورکزی کیسہ (Tetranucleate Cyst) ()

(8) پولیو مائیکس ریت بکھی (Sand Fly) ()

(9) ایچ آئی وی (HIV) کی جانچ مرض روڈیلا وائرس (Rubella virus) ()

(10) امیبائی پیچش (Amoebic Dysentery) کے لئے تعدیہ مرحلہ وائڈل جانچ (Vidal Test) ()

سبق 13 صحت (Health)

سبق کا خاکہ	1
تمہید	2
سبق کا متن	3
3.1 عمدہ صحت کی تعریف	
3.2 عمدہ صحت کے فوائد	
3.3 عمدہ صحت کو قائم رکھنے میں تعلیم کا رول	
3.4 صحت کو متاثر کرنے والے عوامل	
3.4.1 اندرونی عوامل	
3.4.1.1 اندرونی عوامل کے سبب پیدا ہونے والے امراض	
3.4.2 بیرونی عوامل	
3.4.2.1 بیرونی عوامل کے سبب پیدا ہونے والے امراض	
خلاصہ	4
زائد معلومات	5
فرہنگ	6
مموذہ امتحانی سوالات	7
7.1 مختصر جوابی سوالات	
7.2 طویل جوابی سوالات	

7.3 معروضی سوالات

- 7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے
- 7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔
- 7.3.3 جوڑیاں لکائیے۔

سبق کا خاکہ 1

اس سبق میں آپ صحت سے متعلق درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ عمدہ صحت کی تعریف
- ☆ عمدہ صحت کے فوائد
- ☆ عمدہ صحت کو قائم رکھنے میں تعلیم کا رول
- ☆ صحت کو متاثر کرنے والے عوامل

2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ خوردبینی عضویوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ صحت سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جس کو آپ اس دنیا میں ہماری ہا مقصد بقاء زندگی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ صحت سے متعلق مشہور مقولہ ہے "تندرستی ہزار گنت ہے" (Health is Wealth)۔ اپنی صحت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور حفاظت ہم سب کا فرض اولین ہے۔ اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ کس طرح صحت پر مختلف بیرونی اور اندرونی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں۔ ان امراض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور عمدہ صحت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے تاکہ آپ انفرادی، اجتماعی اور قومی سطح پر بہتر سے بہتر کام انجام دے سکیں۔

سبق کا متن 3

3.1 عمدہ صحت کی تعریف

عمدہ صحت سے مراد کسی شخص کی طبی، دماغی اور سماجی حالت کی بہتری اور خوشحالی ہے نہ کہ صرف بیماریوں سے آزادی کا نام صحت ہے۔ عمدہ صحت ایک نعمت ہے، خوشحالی کی حالت ہے، پریشانیوں اور نفسیاتی دباؤ سے آزادی ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ہا مقصد بقاء زندگی عمدہ صحت کے بغیر ناممکن ہے۔ انفرادی، اجتماعی اور قومی سطح پر بہتر انداز میں کام انجام دینے کی صلاحیت کا انحصار عمدہ صحت پر مبنی ہے۔ ایک صحت مند انسان کا ہمارے ذہن میں تصور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ :

- (a) بیمار یوں سے آزاد ہوتا ہے۔
 (b) ہاتھ یا پیر سے معذور نہیں ہوتا ہے۔
 (c) ذہنی مسائل میں گرفتار نہیں رہتا۔
 (d) سماجی اور نفسیاتی دباؤ سے آزاد ہوتا ہے۔
 (e) کسی بھی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا نہیں رہتا ہے۔

3.2 عمدہ صحت کے فوائد

عمدہ صحت ہمارے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے اور نہ صرف ہم کو انفرادی طور پر ترقی سے ہمکنار کرتی ہے بلکہ ہماری سوسائٹی، کمیونٹی اور بالآخر اجتماعی طور پر ہمارے ملک کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ انسان کی خوشحالی کا راز اس کی عمدہ صحت میں پنہاں ہے جو اس دنیا میں خوش و خرم زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے۔

3.3 عمدہ صحت کو قائم رکھنے میں تعلیم کا رول

عمدہ صحت کو قائم رکھنے میں تعلیم اہم رول ادا کرتی ہے۔ تعلیم انسان کو نہ صرف متوازن غذا کے استعمال کی اہمیت اور مختلف غذاؤں کی غذائی قدر سے واقف کرواتی ہے بلکہ ہمارے جسمانی نظاموں کے کام کرنے کی میکانیت، جسمانی اعضاء سے متعلق مختلف تحولی امراض ان کے اسباب، بخور و بنی مرض زرا (Pathogens) کے باعث پیدا ہونے والے امراض اور ان کے انسدادی طریقوں کے علاوہ مختلف کیمیائی اشیاء جیسے تمباکو، الکل، شراب اور نشہ آور ادویات کے مہلک اثرات سے بھی واقف کرواتی ہے۔

3.4 صحت کو متاثر کرنے والے عوامل

انسانی صحت کو متاثر کرنے والے تمام عوامل کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (1) اندرونی عوامل (Intrinsic Factors)

اور (2) بیرونی عوامل (External Factors)۔

3.4.1 اندرونی عوامل (Intrinsic Factors)

امراض کا سبب بننے والے وہ تمام عوامل جو انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں اندرونی عوامل کہلاتے ہیں۔ ان میں سے چھ اہم

عوامل جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں حسب ذیل ہیں۔

- (a) مختلف جسمانی حصوں یا اعضاء کی سوء کارکردگی (Malfunctioning)

(b) جینیاتی عارضے (Genetic Disorders)

(c) ہارمونی عدم توازن (Hormonal Imbalance)

(d) جسم کے ماسونی نظام کی سوء کارکردگی (Malfunctioning of Immune System)

3.4.1.1 اندرونی عوامل کے سبب پیدا ہونے والے امراض

انسان میں اندرونی عوامل کے سبب پیدا ہونے والے امراض کو تحولی امراض (Metabolic Diseases) یا عضوی امراض کہا جاتا ہے جن کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

(a) جسمانی اعضاء کی سوء کارکردگی کے سبب پیدا ہونے والے امراض

ہمارے جسم کے مختلف اعضاء جیسے دل (Heart)، گردے (Kidney)، ہڈیاں (Bones)، آنکھ کے عدسے (Eye Lens) وغیرہ کی سوء کارکردگی یعنی غیر مناسب افعال کے سبب پیدا ہونے والے امراض کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے جیسے :

(i) توارثی عوامل (Hereditary Factors)

یہ عوامل والدین سے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔

(ii) پیدائشی نقائص (Congenital Defects)

اس قسم کے نقائص پیدائش کے وقت سے ہی موجود ہوتے ہیں۔

(iii) اعضاء کی اچانک یا آہستہ سوء کارکردگی (Slow or Sudden Malfunctioning of the Organs)

بعض اعضاء کی کارکردگی بعض اوقات اچانک متاثر ہو جاتی ہے یا پھر کافی آہستہ متاثر ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں ان اعضاء سے متعلق عارضے پیدا ہوتے ہیں جیسے قلبی عارضے۔

(iv) بعض جسمانی خلیوں کا غیر قابو نمو (Uncontrolled Growth of Some Body Cells)

انسان کے جسم میں بعض بالٹوں (Tissues) کے خلیوں کا نمو غیر قابو ہو جاتا ہے جو ٹیورمر (Tumor) اور سرطان (Cancer) کا باعث بنتا ہے۔ سرطان کی شناخت اگر ابتدائی مراحل میں نہ ہو اور علاج نہ کیا جائے تو یہ موت کا باعث بنتا ہے۔ مختلف عوامل سرطان کا سبب بنتے ہیں ان میں سگریٹ نوشی، زیادہ توانائی والی شعاعوں جیسے گاما شعاعوں (Gamma rays) سے متاثر ہونا، بعض صبغوں (Dyes) اور

کیمیائی اشیاء کا استعمال وغیرہ شامل ہیں۔

بعض جسمانی اعضاء کی سوء کارکردگی کے سبب انسان میں پیدا ہونے والے امراض کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 1 مختلف امراض اور متعلقہ اعضاء

امراض	اعضاء
قلبی ناکامی (Cardiac Failure)	دل
گردے کی ناکامی (Kidney Failure)	گردے
عظمی مسامداری (Osteoporosis)	ہڈیاں
قریب بینی (Myopia) اور موتیا بند (Cataract)	آنکھ کے عدسے

(b) جینیاتی امراض (Genetic Diseases)

ایسے امراض جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں جینیاتی امراض کہلاتے ہیں۔ انسان میں پیدا ہونے والے دو اہم جینیاتی امراض میں

ہیموفیلیا (Haemophilia) اور سکل فقر الدم (Sickle Cell Anaemia) قابل ذکر ہیں۔

ہیموفیلیا ایک نادر جینیاتی مرض ہے جس میں جسم کے کسی معمولی سے بھی زخم سے نکلنے والا خون باسانی بخند نہیں ہوتا ہے اور اس طرح خون کافی دیر تک بہتے رہتا ہے۔ خون کی کافی مقدار کے خارج ہو جانے کے سبب موت واقع ہوتی ہے۔ اس مرض کی شناخت انجماد خون کی معین مدت میں طوالت کے باعث کی جاتی ہے۔

سکل فقر الدم (Sickle Cell Anaemia) ایک ایسا جینیاتی مرض ہے جس میں جلا ہونے والے مریض کے خون کے سرخ جیسے (Red Blood Corpuscles) ناقص قسم کے ہیموگلوبین (Haemoglobin) کی موجودگی کے باعث درانتی نما شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ درانتی نما سرخ جیسے جسم میں گردش کے دوران باسانی تباہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فقر الدم (Anaemia) یعنی خون کی کمی واقع ہوتی ہے اور خون ناقص قسم کا بن جاتا ہے۔ اس مرض میں جلا اشخاص ناقص قسم کے خون اور فقر الدم کی موجودگی کے باعث مدافعت کی صلاحیت کھودیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے تعدیہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور عموماً درمیان عمر کو پہنچنے سے قبل موت سے ہمارا

ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض امریقہ لے بعض علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں عام طور پر دانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مدھیہ پردیش، بہار اور مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔

(c) ہارمونی امراض (Hormonal Diseases)

ہارمونس (Hormones) ایک قسم کے پروٹینس ہیں جو ہمارے جسم کی طبعی اور صحت مند نشوونما سے متعلقہ مختلف افعال کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ہارمونس کی قلت یا اس کی پیداوار میں نقص مختلف امراض کا باعث بنتی ہے جن کو ہارمونی امراض کہا جاتا ہے۔ چند اہم ہارمونی امراض حسب ذیل ہیں:

(a) ایلیمی، کرٹینیزم (Cretinisms) (b) ذیابیطس (Diabetes)

(c) دیوگانتسم (Gigantism) (d) پست قامتی (Dwarfism)

(a) ایلیمی، کرٹینیزم (Cretinisms)

ایلیمی (کرٹینیزم - Cretinisms) کے معنی "کمزور ذہنیت" ہے۔ یہ مرض بچوں میں پایا جاتا ہوتا ہے۔ بچہ کی غذا میں آیوڈین (Iodine) کی قلت گردن کے حصہ میں پائے جانے والے درقہ غدود (Thyroid Glands) کی کارکردگی میں کمی کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے تھائیراکسن (Thyroxin) نامی ہارمون کی قلت واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ کا دماغی نشوونما رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کا نمو بھی متاثر ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بالآخر ڈھانچہ پوری طرح نمو نہیں پاتا اور اس میں ایک جسم کی مخفی نظر آتی ہے۔



شکل 13.1 ایلیمی (Cretinism)

(b) ذیابیطس (Diabetes)

ذیابیطس ایک عام مرض ہے جو انسولین (Insulin) نامی ہارمون کی قلت کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ جسم میں انسولین کی قلت کی وجہ سے ہضم شدہ شکر مکمل طور پر جسم میں استعمال نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے شکر کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے۔ اس حالت کو ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ خون میں شکر کی زائد مقدار کی وجہ سے انسان کئی اقسام کے تھکے کا شکار ہو جاتا ہے۔

(c) دیوقامتگی (Gigantism)

یہ مرض نخاعی غدود (Pituitary Gland) سے نمونگی ہارمون (Growth Hormone) کی زائد مقدار کے افراز ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ نمونگی ہارمون کی زائد مقدار یا نخاعی غدود کی فوق فطیلت (Hyperactivity) کی وجہ سے بڑیوں کا نمو کافی تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑیوں کی لالچائی میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے جس کے باعث انسان کی جسامت کافی اونچی ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو دیوقامتگی (Gigantism) کہا جاتا ہے۔ ایک دیوقامت بالغ انسان کی لالچائی 8۲7 فٹ تک ہو سکتی ہے۔



شکل 13.2
دیوقامت

(d) پست قامتی (Dwarfism)

اس طبی حالت کا مرض بخائی غدود سے افراز ہونے والے نموئی ہارمون کی قلت کے باعث واقع ہوتا ہے۔ نموئی ہارمون کی قلت یا بخائی غدود کی پست فعلیت (Hypoactivity) کی وجہ سے ہڈیوں کا نمو رک جاتا ہے جس کے باعث انسان کا قد پست رہتا ہے۔ اس حالت کو پست قامتی (Dwarfism) کہا جاتا ہے۔ ایک پست قامت بالغ شخص کی لائبلائی صرف 2 تا 3 فٹ ہوتی ہے۔




تقل 13.3

پست قامت (دایاں) اور تاثر مل شخص (بایاں)

(d) الرجی امراض (Allergic Diseases) یا الرجی (Allergy)

بعض اشخاص جب پر دشمن افراط غذا کی جیسے مچھلی، اٹھ اور غیرہ یا مخصوص ترکاریاں یا دیگر خورد و نوش کی اشیاء بطور غذا استعمال کرتے ہیں تو ان کے جسم پر سرخ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں اور جلد پر چھوٹے چھوٹے ابھار دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر دھول کے ذرات یا زیرہ دانے (Pollen Grains) سانس تالی میں داخل ہو جائیں تو چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ ان اشخاص کو ان اشیاء کے لئے حساس کہا جاتا ہے۔ ایک انسان میں مختلف اشیاء جیسے دھول، زیرہ دانے، بعض غذائی اشیاء جیسے اٹھ، مچھلی اور دالیں اور بعض ادویات یا ریشے وغیرہ کے لئے پائی جانے والی حساسیت کو الرجی (Allergy) کہا جاتا ہے۔ ان اشیاء کے لئے جسم میں واقع ہونے والے غیر موافق رد عمل کو الرجی تعاملات (Allergic Reactions) کہا جاتا ہے۔ الرجی دراصل جسم میں واقع ہونے والے مامونی نظام (Immune System) کی سوء یا ناقص کارکردگی ہے۔ مامونیت سے مراد متعدد بار واقع ہونے والے تعدیہ کے خلاف جسم کی مدافعتی صلاحیت ہے۔ لیکن یہی مدافعت کی

میکانیسم یعنی تعامل جب غیر معمولی طور پر بیش فاعلی (Hyper Active) ہو جاتا ہے تو اس حالت کو الرجی یا فوق حساسیت (Hyper Sensitivity) کہا جاتا ہے۔ دوسرے بھی الرجی تعامل کے باعث پیدا ہونے والا مرض ہے۔ الرجی سے بچنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ الرجی کے اسباب یعنی کس شے سے الرجی پیدا ہوتی ہے معلوم کریں اور اس شے کے استعمال سے گریز کریں یا اس شے سے اپنے آپ کو بچائیں۔



شکل 13.4

الرجی کا رد عمل

3.4.2 بیرونی عوامل (Extrinsic Factors)

عوامل جو انسان کے جسم میں بیرونی طور پر داخل ہوتے ہیں اور امراض پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں بیرونی عوامل (Extrinsic Factors) کہلاتے ہیں۔ ہماری صحت کو متاثر کرنے والے اہم بیرونی عوامل حسب ذیل ہیں۔

(a) ناکافی غذا

(b) امراض پیدا کرنے والے خرد بینی عضوئے جیسے جراثیم (Bacteria)، وائرس (Virus)، پھپھوندی (Fungi) اور پروٹوزوا۔

(c) ماحولی آلود کار (Environmental Pollutants)۔

(d) عادت (Habit) پیدا کرنے والی اشیاء جیسے تمباکو، الکحل، نشہ آور ادویات وغیرہ۔

3.4.2.1 بیرونی عوامل کے سبب پیدا ہونے والے امراض

مذکورہ بالا بیرونی عوامل ہمارے جسمانی نظام کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں جس کے باعث مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں جن کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

(a) ناکافی غذا کے سبب واقع ہونے والے امراض

غذا میں لازمی مقویات جیسے کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)، چھمبات (Fats)، لمبیات (Proteins)، معدنیات (Minerals) اور حیاتیات (Vitamins) کی قلت کے باعث پیدا ہونے والے امراض کو تغذیائی امراض (Nutritional Diseases) کہا جاتا ہے۔ بعض اہم تغذیائی امراض کو سبق "تغذیہ" میں بیان کیا جا چکا ہے۔

(b) خرد بینی عضویوں کے سبب پیدا ہونے والے امراض

انسان میں خرد بینی عضویوں جیسے جراثیم، وائرس، پھپھوندی، اور پروٹوزوا (Protozoa) کے باعث کئی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ جن کو تفصیل سے سبق "عام انسانی امراض" میں بیان کیا گیا ہے۔

سرطان (Cancer)

سرطان صرف ایک مرض نہیں بلکہ ممکن ہے کہ یہ کئی امراض کا مجموعہ ہے۔ جسم کے کسی حصہ یا عضو میں غیر معمولی نمو دراصل غیر قابو یافتہ خلوی تقسیم کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے خلیوں کا تودہ ہے جس کو رسولی (Tumor) کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر عضو کے زائد نمو کو رسولی کہا جاتا ہے۔ رسولیاں دو اقسام کی ہوتی ہیں۔

(1) سلیم رسولیاں (Benign Tumors)

(2) مہلک رسولیاں (Malignant Tumors)



شکل 13.4a معدنی تاسور۔ سلیم رسولی شکل 13.4b معدنی تاسور۔ مہلک رسولی

(1) سلیم رسولیاں (Benign Tumors)

جسم کے کسی حصہ میں نمو پانے والی ایسی رسولیاں جو اتصالی ہافت (Connective Tissue) کی پرت سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں سلیم رسولیاں (Benign Tumors) کہلاتی ہیں۔ یہ رسولیاں جسم میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو نہیں پھیلتی جیسا کہ مہلک رسولیاں پھیلتی ہیں۔ یہ رسولیاں مہلک نہیں ہوتیں لیکن مریض کی زندگی میں بعض وقت یہ رسولیاں ارد گرد کے دوسرے اعضاء پر ہذاڑا لیتی ہیں جس کے باعث ان اعضاء کے افعال متاثر ہو جاتے ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ رسولیاں کافی آہستہ نمو پاتی ہیں۔ یہ نہ ہی مٹھی (Infective) ہوتی ہیں اور نہ ہی تواریثی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بہتر ہے کہ ان کو ٹل جراحی کے ذریعہ جسم سے نکال دیا جائے۔

(2) مہلک رسولیاں (Malignant Tumors) یا سرطان (Cancer)

ایسی رسولیاں جن کا نمو غیر محدود ہوتا ہے اور جو جسم میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو پھیلتی ہیں مہلک رسولیاں یا سرطان کہلاتی ہیں۔ سرطان کے خلیے (Cancer Cells) دسوی دعائی نظام (Blood Vascular System) یا لنفی نظام (Lymphatic System) کے ذریعہ جسم میں دور دور تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ان اعضاء میں سرطان کے نمو کا باعث بنتے ہیں۔ مہلک رسولی کے وہ حصے جن کی جڑیں جسم میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں انتقال اعضاء (Metastases) کہلاتے ہیں۔ اس طرح منتقلی کے باعث دوسرے اعضاء میں نمو پانے والی رسولی کو انتقال عضوی رسولی (Metastatic Tumor) کہا جاتا ہے۔ تاہم سرطان ابتدائی مرحلہ (Primary Phase) میں مخصوص عضو تک ہی محدود رہتا ہے لیکن سرطان کے خلیے ثانوی مرحلہ (Secondary Phase) میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ انتقال عضوی (Metastasis) کے باعث جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتے ہیں۔ جس طرح پودے کی جڑیں زمین میں پھیل جاتی ہیں اس طرح جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی سرطان پھیل جاتا ہے۔ اس مرحلہ پر علاج ناممکن ہو جاتا ہے اور مریض کی موت چند ہی دنوں میں یقینی طور پر واقع ہوتی ہے۔

سرطانی خلیوں (Cancerous Cells) کی خصوصیات

نارمل خلیوں کے برخلاف سرطانی خلیے (Cancerous Cells) مختلف شکلیاتی اور فعلیاتی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں جن کو مختصر اذیل میں پیش کیا گیا ہے۔

- (1) سرطانی خلیوں میں خلوی تقسیم کا عمل قابو کے باہر ہو جاتا ہے اور خلیوں کی تنظیم متاثر ہو جاتی ہے۔
- (2) خلیے جو سرطانی خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اپنے مخصوص افعال کو ضائع کر دیتے ہیں۔
- (3) سرطانی رسولی کو اگر عمل جراحی کے ذریعہ مریض کے جسم سے نکال کر دوسرے شخص کے جسم میں پیوست کر دیا جائے اور مناسب

خون کی سربراہی فراہم کی جائے تو رسولی کے خلیوں میں تقسیم کا عمل جاری رہے گا اور رسولی میں شوکانی آہستہ ہوگا۔ لہذا سرطانی رسولی کا حصہ میزبان کے جسم میں بحیثیت طفیل (Parasite) برتاؤ کرتا ہے۔

(4) سرطانی خلیوں کی شکلیات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ شکل، جسامت اور رنگنے کے تعاملات (Staining Reactions) میں بے قاعدہ ہو جاتے ہیں۔


(5) ان خلیوں میں پائے جانے والے عضوے (Organelles) اپنی ساخت میں غیر طبعی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔

(6) سرطانی خلیوں میں خفی تقسیم (Mitosis) کا عمل غیر طبعی ہو جاتا ہے۔

(7) بین خلوی کلسیم (Calcium) کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سرطانی خلیے باسانی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر جسم کے دوسرے حصوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور انتقال عضوی کا باعث بنتے ہیں۔

(8) سرطانی خلیوں میں پانی اور رائبو نیوکلک ترشہ (RNA) (Ribonucleic Acid) کی مقداریں بڑھ جاتی ہیں۔


(9) سرطانی خلیوں میں آکسیجنی تنفس کو انجام دینے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہ شکر پاشیدگی (Glycolysis) کے ذریعہ توانائی (Energy) حاصل کرتے ہیں۔



شکل 13.5

سرطان کا خلیہ جس کی سطح پر تریق زائی مقام (Antigenic Site)

پائے جاتے ہیں جو ہلاکتی خلیہ (Killer Cell) سے ربط قائم کرتے ہیں۔



سرطان کا خلیہ تقسیم ہوتا ہوا جس کی سطح پر IgG ضد اجسام جڑے رہتے ہیں۔

سرطان کے اسباب (Causes of Cancer)

سرطان کے اسباب کیا ہیں؟ انسان آج بھی اس سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے۔ تاہم کئی عوامل سرطان کا سبب بننے میں شریک کار ہوتے ہیں جنہیں ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

(a) جینیاتی عوامل (Genetic Factors)

جینیاتی عامل (Genetic Factor) کی وجہ سے بعض اشخاص میں سرطان دراصل واقع ہوتا ہے۔ مرد اشخاص میں پستانوں کی غدود (Mammary Gland) کا سرطان واقع نہیں ہوتا جب کہ یہ صرف عورتوں میں واقع ہوتا ہے۔ اسٹیرائڈ جنسی ہارمونز (Steroid Sex Hormones) حقیقت میں مرد اور عورتوں دونوں کے تولیدی نظام (Reproductive System) میں سرطان کے نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔ اس ہارمون کی وجہ سے عورتوں میں پستانی غدود اور رحم (Uterus) اور مردوں میں قنیب (Penis) اور صُمن (Scrotum) میں سرطان نشوونما پاتا ہے۔ اسٹیرائڈ جنسی ہارمونز جسم کے خلیوں میں پائے جانے والے جینز (Genes) کو حسب معمول متحرک کرتے ہیں جس کی وجہ سے تولیدی افعال حسب معمول انجام دیئے جاتے ہیں۔ اگر اسٹیرائڈ جنسی ہارمونز کی وجہ سے خلیوں میں واقع مخصوص جینز شدید طور پر متحرک ہو جاتے ہیں تو یہ سرطان کا سبب بنتے ہیں۔

سرطان کے نشوونما کا سب سے اہم سبب جینیاتی مادہ یعنی ڈی۔ این۔ اے (DNA) میں تبدیلی ہے۔ DNA میں تبدیلی متبدل (Mutation) کہلاتی ہے۔ متبدل کا باعث بننے والے مختلف عوامل کو متبدل کار (Mutagenes) کہا جاتا ہے۔ ایسے عوامل جو توانائی ترشوں (Nucleic Acid) کے اساس (Bases) کے تسلسل میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں متبدل کار (Mutagenes) کہلاتے ہیں۔

سرطان کا باعث بننے والے تبدل کار کو سرطان زا (Carcinogenes) کہا جاتا ہے۔ تبدل کار یعنی سرطان زا انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد جنس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنس کی عاملیت متاثر ہو جاتی ہے یا غیر نارمل لحمیات (Proteins) کی تالیف عمل میں آتی ہے جو سرطان کے نشوونما کا باعث بنتی ہے۔

بعض اشخاص میں جین تبدل (Gene Mutation) واقع ہوتا ہے اور متاثرہ DNA کی مرمت کے لئے درکار خامرے (Enzymes) غیر موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان اشخاص میں سرطان کے وقوع پذیر ہونے کا قوی امکان رہتا ہے۔

سرطان زا تین اقسام کے ہوتے ہیں جن میں (a) طبعی سرطان زا (Physical Carcinogens) (b) کیمیائی سرطان زا (Chemical Carcinogens) اور (c) حیاتی سرطان زا (Biological Carcinogens) شامل ہیں۔

(a) طبعی سرطان زا (Physical Carcinogens)

سرطان پیدا کرنے والے طبعی سرطان زا میں لاشعاعیں (X-Rays)، بالائے بنفشی شعاعیں (Ultra Violet Rays) اور تابکار شعاعیں (Radioactive Rays) شامل ہیں۔

(b) کیمیائی سرطان زا (Chemical Carcinogens)

کیمیائی سرطان زا میں الکحل، ڈائمر، تمباکو، دھواں، بیسنزی ڈائمن (Benzidine)، بیٹا نیفٹھائل امائن (Beta - Naphthyl Amine)، 4-امائنو ڈائی فینائل (4-Amino Diphenyl)، پوٹاشیم آرسینائیٹ (Potassium Arsenite)، آرسینک مرکبات (Arsenic Compounds)، ڈی۔ ڈی۔ ٹی (DDT)، بیریلیم نمکیات (Beryllium Salts)، بیریلیم زک نمکیات (Beryllium Zinc Salts)، کو بالٹ (Cobalt)، نکل (Nickel)، کرومیم (Chromium)، سوڈان - IV صنف (Sudan - IV Pigment)، غذائی صنعت اور پار پے صنعت میں استعمال ہونے والے رنگ (Dyes)، غذائی ملاوٹیں جیسے سیکرائین (Saccharine)، سوڈ کاروں سے نکلنے والے اخراجی مادے وغیرہ شامل ہیں۔

(c) حیاتی سرطان زا (Biological Carcinogens)

بعض وائرس صرف حیوانات میں سرطان پیدا کرتے ہیں۔ وائرس انسان میں سرطان پیدا نہیں کر سکتے۔

عمر بطور عامل (Age as a Factor)

انسان میں عمر بھی ایک عامل ہے جو سرطان کا باعث بنتی ہے۔ سرطان ایسے معمر اشخاص میں نمود پاتا ہے جن میں ناکافی ماسونی نظام

(Immune System) پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سرطان ایسے مریضوں میں واقع ہوتا ہے جو خود ماسونی امراض (Auto Immune Diseases) پر قابو پانے کے لئے ماسونی نظام میں انحطاط پیدا کرنے والی ادویات کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ مثلاً کارٹیسون (Cortisone) ادویات ماسونی نظام میں انحطاط پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔

سرطان کی اقسام (Types of Cancers)

سرطان کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جنہیں مختلف نام سے موسوم کیا جاتا ہے جیسے لیوکیمیا (Leukemia)، سلیسٹھمچی (سارکوما

(Sarcoma)، سرطان سلیسٹھ (کارسینوما (Carcinoma)، شحمی سلیسٹھمچی (لائپو سارکوما (Lipo sarcoma) -

(a) لیوکیمیا (Leukemia)

خون کے ابیض جیسوں (Leucocytes) کے سرطان کو لیوکیمیا (Leukemia) کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا سرطان ہاتھوں کے علاوہ عموماً ہچوں میں دیکھا جاتا ہے۔ لیوکیمیا میں ابیض جیسوں کی تعداد میں قابل لحاظ اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سرخ جیسوں (RBC) کی تیاری میں کمی واقع ہوتی ہے نیز ابیض جیسوں کی مدافعتی صلاحیت تخفیف پا جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف اقسام کے خورد بینی عضوہوں کے باعث مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جسم پر تعدیہ (Infection) کی گلیاں نمودار ہو جاتی ہیں جو جسم کے اندرونی اعضاء میں بھی واقع ہوتی ہیں۔ خاص کر دماغ اور قلب کے حصہ میں اگر یہ گلیاں نمودار ہو جائیں تو فوراً موت کا سبب بن جاتی ہیں۔

(b) سلیسٹھمچی (سارکوما (Sarcoma)

اتصالی ہاتھوں (Connective Tissues)، خاص کر عضلات، ہڈی، شہرہ، لیمفی غدود (Lymph Glands) وغیرہ کے سرطان کو سلیسٹھمچی (سارکوما (Sarcoma) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

(c) سرطان سلیسٹھ (کارسینوما (Carcinoma)

اگر سرطان سرخلی ہاتھوں (Epithelial Tissues)، جلد کو تیار کرنے والے غلیوں کی چمٹی پرت، غذائی نالی کی اندرونی سطحوں، پیچھے پڑے ہالہ اور پستانی غدود کو متاثر کرتا ہے تو ایسے سرطان کو کارسینوما (Carcinoma) کہا جاتا ہے۔


انسان کے پستانوں میں سرطان سلیسٹھ (Carcinoma) میں دماغ کے بڑے غلیے بازو کی جانب بٹ جاتے ہیں۔ ہرمل غلیہ میں لونی اجسام (Chromosomes) کی تعداد 46 ہوتی ہے جن میں سے 43 لونی اجسام واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ سرطان کے غلیہ میں لونی اجسام کی تعداد میں 60 تک اضافہ ہو جاتا ہے۔



فصل 13.8

انسانی پستان سرطانی سلعہ (Carcinoma)

دماغ کے بڑے خلیے ہازد کی جانب پٹے ہوئے جس کو تیر کے نشانات ظاہر کرتے ہیں



فصل 13.7

عقسی سرطانی سلعہ (Osteosarcoma)



فصل 13.10

انسانی سرطان کے خلیے میں 60 سے زائد لونی اجسام



فصل 13.9

نارل خلیے میں 46 لونی اجسام میں سے 43 واضح دکھائی دیتے ہیں۔

(d) فحشی سلحہ لحمی (Liposarcoma)

جسم کے کسی حصہ پر بھی اگر چربی جمع ہو جائے تو وہ فحشی رسولی کہلاتی ہے۔ جس کو لایپوما (Lipoma) کہا جاتا ہے۔ جو مہلک نہیں ہوتا لیکن لایپوما کافی طویل عرصے میں عضلاتی ہفتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جو مہلک رسولی (Malignant Tumor) ہوتی ہے۔ اس رسولی کو فحشی سلحہ لحمی (لایپوسارکوما Liposarcoma) کہا جاتا ہے جو ایک قسم کا سرطان ہے۔ اس لئے فحشی سلحہ (Lipoma) کو آپریشن کے ذریعہ نکال دیا جائے تو اس مہلک سرطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

سرطان کی شناخت

ابتدائی مراحل پر سرطان کی شناخت حسب ذیل علامتوں کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

- ☆ اشتہا (بھوک) میں بتدریج کمی۔
- ☆ جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی۔
- ☆ خون میں قابل لحاظ کمی۔
- ☆ کھانسی کا خاص کر مسلسل دو ہفتوں سے زیادہ مدت تک آنا۔
- ☆ مسہ (Mole) یا گومڑی (Wart) کا اچانک ظاہر ہونا۔
- ☆ اجابت کی عادت میں مستحکم تبدیلی۔
- ☆ حلق میں درد اور آواز میں تبدیلی۔
- ☆ عورتوں میں پستانی غدود میں سخت رسولیوں کا پیدا ہونا۔

سرطان کا علاج اور انسدادی تدابیر

اگر سرطان سے متاثرہ عضو ابتدائی مراحل میں ہے تو سرطان کا علاج طاقتور لاشعاعوں (X-Rays) اور تابکار ادویات کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ رسولیوں کو عمل جراحی کے ذریعہ جسم سے نکال دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ صحت کا خیال، خاص کر تہا کو کے معاملات کے استعمال سے گریز، شراب کے استعمال سے گریز، موزوں غذاؤں کا استعمال، مستحکم جسمانی ورزش وغیرہ انسدادی تدابیر کے اختیار کرنے سے سرطان سے بچا جاسکتا ہے۔

تسمم غذا (Food Poisoning)

ہم جس غذا کو استعمال کرتے ہیں وہ تمام تر ہر لیے مادوں اور تعدیہ کا باعث بننے والے عوامل سے آزاد ہونی چاہئے۔ لیکن ایک عام انسان ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز غذا میں پائے جانے والے مہلک زہریلے مادے زندگی کے لئے خطرہ بن جاتے ہیں۔ مرض کی شدت یا درجہ کا انحصار استعمال کی گئی زہر آلود غذا کی مقدار، غذا میں شامل زہریلے مادوں کی تخفی قوت اور خود اس غذا کو استعمال کرنے والے شخص کی انفرادی قوت برداشت اور حالت صحت پر ہوتا ہے۔ زہر آلود غذا کے مضر اثرات کا ظاہر ہونا تسمم غذا (Food Poisoning) کہلاتا ہے۔ تسمم غذا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔

(a) تسمم غذا جو نباتات اور حیوانات میں قدرتی طور پر پائے جانے والے زہریلے مادوں کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔

(b) تسمم غذا جو غذائی اشیاء میں زہریلے کیمیائی مادوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(c) تسمم غذا جو غذا میں ضرر رساں بیکٹریا کے شامل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(a) تسمم غذا جو نباتات اور حیوانات میں قدرتی طور پر پائے جانے والے زہریلے مادوں کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔

بعض غذائی اشیاء میں مہلک اشیاء قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں۔ جب اس قسم کی غذائی اشیاء کی زائد مقدار کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے تو انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چائے اور سمندری غذاؤں میں فلورائیڈس (Fluorides) کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے جو نابل استعمال کی جانے والی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے۔ منطقہ حارہ (Tropical) ممالک، جیسے ہندوستان میں فی یوم قابل استعمال نابل فلورائیڈ کی مقدار 0.8ppm ہوتی ہے جب کہ ٹشک چائے میں یہ 75 ppm تا 100 ppm ہوتی ہے اور سمندری غذا میں 5 ppm تا 15 ppm ہوتی ہے۔

قلوی زمین (Alkaline Soil) میں اگنے والی غذاؤں میں سلیمنیم (Selenium) بکثرت موجود ہوتا ہے۔ اس غذا کے استعمال سے نشرو نما رک جاتی ہے، اشتہا (بھوک) ضائع ہو جاتی ہے، ہال چھڑ جاتے ہیں، معدی آنتی اظطراب اور جگر کا تشع (Cirrhosis) واقع ہوتا ہے۔

پالک اور دیگر بزرگ کاریوں میں نائٹریٹ (Nitrate) کی تھوڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ کھاد کے زائد استعمال کے باعث غذائی اشیاء میں نائٹریٹ کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے جو تسمم (Poisoning) کا باعث بنتا ہے۔

مشر دم (Mushroom) قدرتی طور پر بافراطی اگتا ہے۔ غیر خوردنی مشر دم کی قسم میں ایک مہلک شے پائی جاتی ہے جس کو امانیٹا فلوائیڈس (Amanita Phalloides) کہا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کے مہلک مشر دم کی قسم کو بطور غذا نوش کرنے پر ہشکی درد، قے، شدید

پھاس، مچلی، خون اور مخاط آلود دست جیسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔



شکل 13.11

مشر دم امانیتا فالوئڈس (Amanita Phalloides)

پالک، امرتا تھ (Amaranth) اور دیگر سبز ترکاریوں میں آکزالک ترشہ (Oxalic Acid) کی تھوڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ ان ترکاریوں کی زائد مقدار کا بطور غذا استعمال گردوں کی پتھری کا باعث بنتا ہے۔ آکزالک ترشہ کی زائد مقدار کا استعمال جسم میں کالشیم (Calcium)، میگنیشیم (Magnesium)، لوہا (Iron) اور کاپر (Copper) کے استحصال (Assimilation) کو متاثر کرتا ہے۔ سویا بین (Soya Bean) میں مائع ٹریپسن (Trypsin Inhibitor) موجود ہوتا ہے جو ناقص ہضم پذیر ہوتا ہے۔ بغیر چکے ہوئے یا نامناسب پکائے ہوئے سویا بین کا استعمال لبلبہ (Pancreas) کے لئے مہلک ہوتا ہے۔ بہتر طور پر پکانے سے اس کا مہلک اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سویا بین میں ہیما گلوٹینینس (Heamagglutinins) پایا جاتا ہے جس میں خون کے احمر جیسوں (RBC) کو جمیدہ (Agglutinate) کرنے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ سویا بین کو مناسب طور پر پکانے سے ہیما گلوٹینینس منسوخ ہو جاتا ہے اور خون کے احمر جیسوں پر اس کا نقصان دہ اثر ضائع ہو جاتا ہے۔

بعض بیٹھے پانی کی مچھلیوں میں مہلک تھیامینیز (Thiaminase) موجود ہوتا ہے جو پکانے پر ضائع ہو جاتا ہے۔ اٹڑے کی

سفیدی میں اے ویٹین (Avidin) موجود ہوتا ہے جو ضد حیاتی عامل (Antibiotic Factor) ہے جو گرم کرنے پر غیر قائل بن

جاتا ہے۔

(b) کسم غذا (Food Poisoning) جو غذائی اشیاء میں زہریلے کیمیائی مادوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی


ہے۔

اس قسم کی تسمم غذا یا مقصد ہوتی ہے جس کو غذائی ملاوٹ (Food Adulteration) کہا جاتا ہے۔ (جس کو آئندہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے) یا اتفاقی طور پر واقع ہوتی ہے جیسے غذائی اشیاء یعنی آٹا، میدہ، دودھ کا پوڈر اور دیگر غذائی اشیاء میں مہلک کیمیائی اشیاء جیسے حشرات کش، مزار کش یا زہریلی کیمیائی اشیاء اتفاقی طور پر شامل ہو جاتی ہیں۔

(c) تسمم غذا (Food Poisoning) جو غذا میں بیکٹریا کے شامل ہونے کے سبب واقع ہوتا ہے۔

(i) تسمم غذا بذریعہ سالمونیللا (Salmonella) بیکٹریا

سالمونیللا نامی بیکٹریا عموماً شیر فارم اور پولٹری فارم میں پائے جاتے ہیں جو وہاں پر موجود حیوانات میں امراض پیدا کرتے ہیں۔ ان متاثرہ حیوانات سے یہ بیکٹریا وہاں کی غذائی پیداوار یعنی انڈوں، دودھ اور گوشت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ان بیکٹریا سے آلودہ انڈے دودھ اور گوشت بطور غذا استعمال کی جاتی ہیں تو یہ بیکٹریا معدہ اور آنت میں پہنچ کر نمو پاتے ہیں اور زہریلے مادے یعنی سم (Toxins) کا افراز کرتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے معدہ یا آنت میں طویل عرصہ تک نہ صرف موجود رہتے ہیں بلکہ آنت کی دیوار سے خون میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اور تسمم غذا کا سبب بنتے ہیں۔ ان زہریلے مادوں کی وجہ سے انسان سگی، قے، شکمی درد اور اسہال (Diarrhoea) سے متاثر ہو جاتا ہے۔ سالمونیللا پیرائٹیفوسس بیکٹریا (*Salmonella paratyphosus bacillus*) انسان میں پیرائٹیفوسس (Paratyphoid) کا باعث بنتا ہے۔




شکل 13.12 سیلس بائفوسس بیکٹریا (سالمونیللا تعدیہ)

(ii) تسمم غذا (Food Poisoning) بذریعہ سٹیفیلوکوکسی (Staphylococci) بیکٹریا


سٹیفیلوکوکسی نامی بیکٹریا انسان کے انہی راستہ (Nasal Passage) اور عضوئی تعدیہ (Septic Infections) جیسے

جلدی پھنسیوں، مہاسوں، عفونی تراشوں (Septic Cuts) میں بکثرت پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ناخنوں اور انگلیوں کے ذریعہ غذائی اشیاء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بیکٹریا غذا میں زہریلے مادے خارج کرتے ہیں جو حرارتی مزاحمت (Heat Resistant) ہوتے ہیں۔ جب ان بیکٹریا سے آلودہ غذائی اشیاء پکائی جاتی ہیں تو بیکٹریا حرارت سے ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن زہریلے مادے حرارت سے غیر متاثر رہتے ہیں۔ جب یہ غذائی اشیاء نوش کی جاتی ہیں تو ان میں موجود زہریلے مادے تسم غذا کا باعث بنتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے معدی آنتی نالی کو متاثر کرتے ہیں لیکن خون میں جذب نہیں ہوتے۔ ان زہریلے مادوں کی وجہ سے مریض میں شکمی اضطراب، درد اور بکثرت قے بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔



شکل 13.15

اسٹافیلوکوکسی جو پیپ (Pus) تیار کرتے ہیں۔



شکل 13.14

اسٹریپٹوکوکسی جو حلق کا عارضہ پیدا کرتے ہیں۔


(iii) تسم غذا (Food Poisoning) بذریعہ کلاسٹریڈیم (Clostridium) بیکٹریا

کلاسٹریڈیم بوٹولینم (*Clostridium botulinum*) نامی بیکٹریا عموماً ڈبے میں بند غذائی اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بیکٹریا غیر آکسیجنی (Anaerobic) ہوتے ہیں اور آکسیجن کی غیر موجودگی میں ڈبے میں بند غذاؤں میں بافراطموں پاتے ہیں اور زہریلے مادوں کا انفرز کرتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے کافی طاقتور ہوتے ہیں اور شدید تسم غذا کا باعث بنتے ہیں۔ تسم غذا جو کلاسٹریڈیم بوٹولینم (*Clostridium botulinum*) نامی بیکٹریا کے باعث واقع ہوتی ہے بوٹولزم (Botulism) کہلاتی ہے۔ بوٹولزم بیماری اگرچہ کہ بہت نادر (Rare) ہوتی ہے تاہم کافی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تسم غذا کی علامتوں میں سر کا درد، بخار، متلی، قے اور اسہال شامل ہیں۔ بوٹولزم میں ان علامتوں کے علاوہ آنکھیں، گردن کے عضلات اور تنفسی مراکز (Respiratory Centres) فالج (Paralysis) سے متاثر ہو جاتے ہیں۔

تے ہیں جس کے نتیجہ میں موت 24 گھنٹوں تا 8 دنوں میں واقع ہوتی ہے۔ کلاسٹریڈیم پوٹولینم بیکٹریا سے خارج ہونے والا زہریلا مادہ کافی طاقت ور ہوتا ہے جس کو عصی سم (عصبی زہر) (Neurotoxin) کہا جاتا ہے۔ اس کی انتہائی قلیل مقدار یعنی 1/100 ملی گرام بھی انسان کی موت کا باعث بنتی ہے۔ اگر مریض پوٹولزم سے بچ بھی جائے تو مکمل رو بصحت ہونے کے لئے کافی طویل مدت (8 ماہ سے زائد عرصہ) درکار ہوتی ہے۔

کلاسٹریڈیم پوٹولینم سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ اس بیکٹریا سے پیدا ہونے والا زہر حرارت کے لئے کافی حساس ہوتا ہے۔ اس لئے ڈبے میں بند رکھی ہوئی غذاؤں کو 100°C تپش پر چند منٹ تک گرم کرنے پر نہ صرف بیکٹریا ہلاک ہو جاتے ہیں بلکہ ان سے پیدا ہونے والا زہر بھی ناکارہ ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ تمام غذائی اشیاء خاص کر ڈبوں میں بند کی ہوئی غذاؤں 100°C تپش پر گرم کرنے کے بعد استعمال کی جائیں تاکہ بیکٹریا اور ان کے زہریلے مادے تباہ ہو جائیں۔

اسی طرح مختلف بیکٹریا کے باعث مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں۔ جیسے ویبریو کالیرا (*Vibrio comma* (cholera)) کے باعث ہیضہ (Cholera) نامی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری متعدی ہوتی ہے جو اس بیماری کے بیکٹریا سے آلودہ غذا اور پانی کے ذریعہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیلتی ہے۔ اس بیماری میں اسہال، قے، پیروں میں ٹہرنے کی صلاحیت کی کمی، ٹائیڈگی (Dehydration) اور پیاس وغیرہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔




شکل 13.17

ویبریو کالیرا (*Vibrio comma* (cholera))

{ *Vibrio comma* (cholera) }


کورین بیکٹریئم ڈفٹھریا (*Coryne bacterium diphtherae*) کے ذریعہ 3 تا 5 سال کی عمر کے بچوں میں خناق (ڈفٹھریا) نامی مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامتوں میں بخار، کھانسی، حلق کی سطح پر خاکی سفید جھلی کی تیاری شامل ہیں۔ یہ ایک مہلک مرض ہوتا ہے



شکل 13.18

کورین بیکٹریئم ڈفٹھریا (*Coryne bacterium diphtherae*)


بیسیلیس اسپہال نامی مرض پسیلس فچیلہ (*Bacillus shjella*) کے باعث پیدا ہوتا ہے۔



شکل 13.19

بیسیلیس فچیلہ

کلاسیڈیم ٹیٹانی (Clostridium tetani) ٹیٹانس (Tetanus) نامی مرض کا باعث بنتا ہے۔




فکل 13.20

کلاسیڈیم ٹیٹانی (Clostridium tetani)

(d) تسیم غذا بذریعہ لیسر جنس (Aspergillus) پھپھوندی (Fungus)

لیسر جنس نامی پھپھوندی عموماً اجناس جیسے گہوں، مدھان، مکی وغیرہ اور بنزیوں پر سو پاتی ہے اور زہریلے مادے کو پیدا کرتی ہے جس کو افلاتاکسن (Aflatoxin) کہا جاتا ہے۔ افلاتاکسن تسیم غذا کا سبب بنتا ہے۔ افلاتاکسن جگر کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ لیسر جنس پھپھوندی خاص کر غذائی اشیاء جیسے موگک پھلیوں پر جو غیر سوزوں طور پر ذخیرہ شدہ رہتی ہیں اور جن میں رطوبت موجود رہتی ہے سو پاتی ہے۔



فکل 13.21

لیسر جنس (Aspergillus)

غذائی ملاوٹ (Food Adulteration) اور اس کی جانچ (Detection)


آج ساری دنیا میں غذائی ملاوٹ (Food Adulteration) ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو سنگین صورت حال اختیار کر گیا ہے۔

ملاوٹی اشیاء اس قدر غذائی اشیاء کے مشابہ ہوتی ہیں کہ ایک عام انسان ان کی شناخت کرنے سے قاصر ہے۔ اس سبب میں ملاوٹی اشیاء اور ان کی جانچ کے سادہ طریقے مختصر بیان کئے گئے ہیں۔

جدول غذائی اشیاء ، ملاوٹی اشیاء اور طریقہ جانچ۔

غذائی اشیاء	ملاوٹی اشیاء	طریقہ جانچ
دانے دار اجناس	ریت اور کنکریاں	ہاتھ کی ہتھیلی پر استحانی چاول کے دانے لیجئے اور ہاتھ کو بہتر رنگ پانی میں ڈوبو۔ ریت اور کنکریاں پانی میں ڈوب جائیں گی۔
دالیں	مینائل زرد (Metanil Yellow)	5 گرام استحانی دال کو 5 ملی لیٹر پانی میں ملائیے اور اس کو ہلایئے۔ اس میں ہائیڈروکلورک ترشہ کے چند قطرے ڈالیئے۔ گلابی رنگ کا ظاہر ہو تا مینائل زرد کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔
چنے کی دال یا دیگر دالیں	کیسری دال (Kesari Dal)	(a) ایک گلاس میں دال کی تھوڑی مقدار لیجئے۔ اور اس میں 5 ملی لیٹر ہائیڈروکلورک ترشہ کو ڈالئے۔ اس گلاس کو 15 منٹ کے لئے جوش کھاتے ہوئے پانی میں رکھیے۔ گلاس میں گلابی رنگ کا پید ہونا کیسری دال کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔
باجرہ (Bajra)	ارگٹ (Ergot)	(b) کیسری دال کی شکل فائنہ (Wedge) نما ہوتی ہے۔ ایک گلاس میں 20% نمک کے محلول کو لیجئے اور اس میں استحانی باجرہ کے دانوں کو ڈالیئے۔ ارگٹ محلول کی سطح پر تیرتا ہے اور باجرہ تہہ میں ڈوب جاتا ہے۔
روا یا سوچی (Rawa)	لوہے کا برادہ	روا (Rawa) میں مٹھناٹیس کو گنداریئے۔ لوہے کا برادہ مٹھناٹیس پر چٹ جائے گا۔
روا یا سوچی (Rawa) or Sooji)		

بھونے ہوئے چنے کول ٹار (Coal Tar) چنے اور کول ٹار کے رنگ میں واضح تمیز کیا جاسکتا ہے۔
 دودھ اور دودھ کے پانی کی موجودگی لیکٹومیٹر (Lactometre) کے ذریعہ
 حاصلات کی کشش ثقل (Specific Gravity) کی بنیاد پر شناخت کی
 جاسکتی ہے۔ ٹارل نوئی کشش ثقل 1.030 اور 1.034 کے
 درمیان ہوتی ہے۔



شکل 13.22 لیکٹومیٹر کا استعمال دودھ میں پانی کی موجودگی کی شناخت

آلودگی کے سبب واقع ہونے والے امراض

ماحولی آلودگی سے مراد نقصان دہ کیمیائی اشیاء اور شعاعوں کا ہوا، پانی اور زمین میں اضافہ جس کے باعث جاندار اجسام میں
 مضر رساں اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ماحول میں آلودگی پیدا کرنے والی اشیاء کو آلود کار (Pollutants) کہا جاتا ہے۔ آلودگی پیدا کرنے
 والے کیمیائی آلود کار مختلف ذرائع سے ماحول میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم ذرائع ذیل میں پیش کئے گئے ہیں۔

- ایچمن جیسے لکڑی، کول (Coal)، تیل اور پٹرول۔
- صنعتوں کے فضل کیمیائی مادے۔
- کارخانوں سے حادثاتی طور پر خارج ہونے والی زہریلی اشیاء۔

(d) زراعت میں زائد استعمال کئے جانے والے حشرات کش (Insecticides)، ضارکش (Pesticides) اور کیمیائی کھاد۔

(e) کونکے کی کان میں کام کرنے والے اشخاص، سنگ تراش، بنگر۔

اینڈھن جیسے لکڑی اور کول (Coal) کے جلنے یا موٹر گاڑیوں میں پٹرول کے جلنے سے ہوا میں دھواں، کاربن کے ذرات اور گیس
آلود کار جیسے کاربن مانو آکسائیڈ (CO)، کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2)، سلفر ڈائی آکسائیڈ (SO_2)، نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (NO_2) اور
سیسہ (Pb) کے مرکبات داخل ہو جاتے ہیں اور ہوائی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ آلود کار انسانوں میں مختلف امراض جیسے سرکامہ، سیدہ کا
درد، سانس لینے میں دشواری، الرجی، کھانسی، چھینکا، آنکھوں اور نغصوں میں جلن، پیچہ دردوں کے امراض وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔

صنعتوں کے فاضل کیمیائی مادے جو زمین پر پھینک دیئے جاتے ہیں کافی مہلک کیمیائی آلود کار ہوتے ہیں۔ ان میں سیسہ، پارہ
(Mercury) اور سیانائیڈ جسم میں داخل ہو کر مختلف نظاموں کو متاثر کرتے ہیں اور امراض کا باعث بنتے ہیں۔ صنعتوں سے خارج ہونے
والے یہ مہلک کیمیائی آلود کار قریبی آبی ذخائر جیسے کنواں، دریا، تالاب اور جھیل وغیرہ میں داخل ہو کر آبی آلودگی پیدا کرتے ہیں۔ حیوانات اور
انسان جب ان آلودہ آبی ذخائر سے پانی کو استعمال کرتے ہیں تو امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص کر ان آلودہ آبی ذخائر میں رہنے والی
مچھلیوں کے جسم میں یہ آلود کار داخل ہو جاتے ہیں اور جب انسان ان مچھلیوں کو بطور غذا استعمال کرتا ہے تو یہ آلود کار انسان کے جسم میں منتقل ہو
جاتے ہیں اور مہلک امراض پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے ایسے آلودہ آبی ذخائر میں رہنے والے حیوانات کو بطور غذا استعمال کرنے سے منع کر دیا جا
تا ہے کیوں کہ ان کے جسم میں یہ مہلک کیمیائی آلود کار ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔

صنعتوں سے حادثاتی طور پر خارج ہونے والی زہریلی گیسیں حیوانات اور انسانوں میں کافی مہلک اثرات پیدا کرتی ہیں جس
سے نہ صرف جانی نقصان ہوتا ہے بلکہ ان کے جسم میں جینیاتی تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں اور مہلک اثرات کا
سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں "بھوپال گیس حادثہ" جو دسمبر 1984 میں واقع ہوا تھا وہ آج تک دنیا میں واقع ہونے والے
سب سے زیادہ مہلک کیمیائی آلودگی کا عظیم حادثہ ہے جس میں کافی جانی نقصان ہوا تھا۔ بھوپال میں واقع یونین کاربائیڈ پلانٹ (فیکٹری)
سے حادثاتی طور پر اچانک میتھائل آکسوسیانیٹ (Methyl Iso-Cyanate) نامی خطرناک زہریلی گیس ہوا میں خارج ہو گئی جو یونین
کاربائیڈ پلانٹ کے قریب وجوار میں رہنے والے سینکڑوں انسانوں اور حیوانات کی موت کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں میں اس گیس
کی وجہ سے جسمانی نظام کی کارکردگی کے متاثر ہونے کی وجہ سے صحت کو کافی نقصان پہنچا اور جینیاتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں جو نسل در نسل منتقل
ہوتی رہیں گی۔

ہانوں اور کھیتوں میں پھلوں، اجناس اور ترکاریوں کی فصل کو ضار (Pests) سے محفوظ رکھنے کے لئے زائد استعمال کئے گئے کیمیائی ذریعے ضار کش جیسے DDT اور BHC راست یا بالواسطہ انسانوں اور حیوانوں کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ضار کش پھلوں، اجناس اور ترکاریوں کی سطح پر جم جاتے ہیں اور انھیں اگر اچھی طرح دھوئے بغیر بطور غذا استعمال کر لیا جائے تو یہ راست طور پر صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ ضار کش کیمیائی مادے پھلوں اور اجناس میں داخل ہو کر ان کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور جب یہ بطور غذا استعمال کئے جاتے ہیں تو بالواسطہ طور پر ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں۔

کونکے کی کانوں، پتھروں کی کانوں، پارچہ ہانی، سمٹ اور ایس بیس ٹاس (Asbestos) کی صنعت میں کام کرنے والے اشخاص یا سنگ تراشی میں طویل عرصہ تک کام کرنے والے اشخاص میں پیشہ ورانہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہسپیرڈوں میں سانس کے ذریعہ داخل ہونے والے سلیکا کی دھول (Silica Dust) سے سلی کوکس (Silicosis)، کونکے کی دھول سے نیو موکونڈوسس (Pneumoconiosis) ایس بیس ٹاس دھول (Asbestos Dust) سے ایس بیس ٹاسس (Asbestosis)، کپاس اور اؤلن (Wool) کی دھول سے دق (Tuberculosis) جیسے پیشہ ورانہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔

انسانوں میں شعاعوں کے ذریعہ پیدا ہونے والی ماحولی آلودگی کے سبب واقع ہونے والے امراض میں سرطان، لیموکیما (Leukaemia) اور جلدی نقصان قابل ذکر ہیں۔ ایسی تمام شعاعیں جن کا طول موج چھوٹا اور توانائی زیادہ ہوتی ہے انسانوں کی صحت پر معضرت رساں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ انسان کی صحت کو متاثر کرنے والی تین اقسام کی شعاعیں حسب ذیل ہیں۔

(1) ہالائے بنفشی شعاعیں (Ultra Violet Rays) یا (U.V. - Radiations)

(2) لاشعاعیں (X-Rays) یا (X- Radiations)

(3) گاما شعاعیں (Gama Rays) یا (Gama - Radiations)

سورج سے حاصل ہونے والی روشنی تین اقسام کی شعاعوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کا طول موج مختلف ہوتا ہے۔ ان میں

(a) زیریں سرخ شعاعیں (Infra Red Radiation) (b) مرئی شعاعیں (دکھائی دینے والی شعاعیں) (Visible Rays) اور

(c) ہالائے بنفشی شعاعیں (Ultra Violet Radiations) شامل ہیں۔ ان تینوں شعاعوں میں سے صرف ہالائے بنفشی شعاعیں انسانوں کی صحت پر کافی معضرات پیدا کرتی ہیں۔ ہالائے بنفشی شعاعیں جب انسان کے جسم پر پڑتی ہیں تو جسم کا خلوی مسو، تجوی کار کردگیاں اور جینیاتی کار کردگیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ سورج سے نکلنے والی ہالائے بنفشی شعاعوں کا بہت بڑا حصہ کرہ فضاء میں موجود اوزون پر ت (Ozone)

Layer) کے ذریعہ جذب کر لیا جاتا ہے جب کہ ان شعاعوں کی قلیل مقدار ہی ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن بعض الودکار جیسے ایروسل (Aerosol) سے اوزون کی اس پرت کو کافی نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اوزون کی پرت میں سوراخ پیدا ہو رہے۔ سوراخوں سے یہ نقصان وہ بالائے منفشی شعاعیں کہہ فضاء میں داخل ہو رہے ہیں۔

انسان کے جسم میں لاشعاعوں کی قلیل مقدار بھی طویل عرصہ تک گزرتی جائے تو ہالتوں کو شدید نقصان کا باعث بنتی ہیں جس کے علاوہ یہ جینیاتی تبدیلیوں کو بھی پیدا کرتی ہیں۔ تنگستن (Tungsten) دھات پر کیتھوڈ (Cathode) شعاعوں کے گزرنے سے لاشعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔ گاما شعاعیں نیوکلیائی ریکٹر (Nuclear Reactor) یا ایٹم بم (Atom Bomb) میں نیوکلیائی انشقاق (Nuclear Fission) کے دوران پیدا ہوتی ہیں۔ گاما شعاعوں کا طول موج کافی کم ہوتا ہے لیکن یہ لاشعاعوں کی بہ نسبت زیادہ مہلک اثرات پیدا کرتی ہیں۔

- گاما شعاعیں خلیہ کے تحولی افعال کو متاثر کرتی ہیں، خلوی غشاء کو نقصان پہنچاتی ہیں اور خامروں کی مہلیت میں تخفیف کرتی ہیں۔
- لونی اجسام (Chromosomes) اور جینس (Genes) کے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔
- غیر مطلوبہ خلوی تقسیم کا سبب بنتی ہیں۔
- ہافتوں، خلیوں اور دوسری جسموں کو تباہ کرتی ہیں۔
- سرطان اور لیوکیما جیسے انتہائی مہلک امراض پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔
- تواریثی تبدیلیوں کو پیدا کرتی ہیں جو مستقبل کی نسلوں کی جسمانی بناوٹ میں نقص کو پیدا کرتی ہیں۔
- حاملہ عورتوں اور بچوں میں متلائی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔
- گاما شعاعیں آنکھ سے نہ ہی دکھائی دیتیں ہیں اور نہ ہی ان کے فوری اثرات ظاہر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے بچنا ہونے والے ممکنہ خطرات ہمیشہ لاحق رہتے ہیں۔ ان کا کوئی علاج آج تک بھی دریافت نہیں ہو سکا۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے ہیرو شیماء پر جو ہری بم (Atom Bomb) گرایا گیا جس سے بے شمار نیوکلیائی شعاعیں خارج ہوئیں جن کے اثر سے ہزاروں افراد بیک وقت لقمہ اجل ہو گئے لیکن جو افراد بچ گئے ان میں بھی ان شعاعوں کے لاپرواہی کے تمام کے تحولی عارضے (Metabolic Disorders)، جلدی نقصان، سرطان اور لونی اجسامی نقائص (Chromosomal Defects) لاحق ہو گئے جو تمام تواریثی قسم کے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی جسمانی بناوٹ میں نقص نسل در نسل ظاہر ہوتا گیا۔

عادت (Habit) پیدا کرنے والی اشیاء سے متعلق امراض

انسان اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف اشیاء کے استعمال کا عادی بن جاتا ہے۔ ایسی اشیاء جو انسان کو دن بہ دن زیادہ سے زیادہ مختصر رہنے والا بنا دیتی ہیں عادت پیدا کرنے والی اشیاء کہلاتی ہیں۔ یہ نشہ آور ہوتی ہیں۔ ان میں تین اہم اشیاء شامل کی جاتی ہیں۔ (a) تمباکو (b) الکحل اور (c) نشیات (Narcotic Drugs) یا نفس رخی ادویات (Psychotropic Drugs)۔

(a) تمباکو کے مضر اثرات

تمباکو ایک زہریلا ہرزہ (Weed) ہے۔ اس میں نیکوٹین (Nicotine) موجود رہتا ہے جو انتہائی زہریلا مادہ ہے۔ نیکوٹین محرک (Stimulant) بھی ہے اور زہریلا بھی ہے۔ انسان تمباکو مختلف طریقوں جیسے سگریٹ نوشی، ناس (ناک کے ذریعہ اندر کھینچنا) اور چبانے کے ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ تمباکو عادت پیدا کرنے والی ایک شے ہے جس کی وجہ سے بے شمار مضر اثرات یا امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تمباکو کے عادی اشخاص میں مختلف اقسام کے نقصان دہ اثرات یا عارضے ظاہر ہوتے ہیں جن کی صراحت ذیل میں مختصراً کی گئی ہے۔

- (1) تمباکو کو سگریٹ نوش یا سگار کی شکل میں استعمال کرنے سے پیچھڑوں کا سرطان (Lung Cancer) اور قلبی حملہ (Heart Attack) لاحق ہوتا ہے۔ سگریٹ نہیں پینے والے اشخاص کی بہ نسبت سگریٹ نوش کرنے والے اشخاص میں پیچھڑوں کے سرطان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

- (2) تمباکو کا دھواں تنفسی نظام کے ہر حصہ کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ناک، حلق اور پیچھڑوں کی اندرونی سطر میں سوزش پیدا کرتا ہے اور کھانسی اور خراش پذیری کا باعث بنتا ہے۔

- (3) تمباکو دھواں وعادوں (Blood Vessels) پر ہلکے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تمباکو میں موجود نیکوٹین اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ یہ فوراً دھواں وعادوں میں سکڑاؤ پیدا کرتا ہے۔ لہذا سگریٹ نوش نہ کرنے والے اشخاص کی بہ نسبت سگریٹ نوش کرنے والے اشخاص میں قلبی حملہ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بالخصوص ضعیف اشخاص میں جہاں تصلب شریان (Arteriosclerosis) کی وجہ سے تنگ وعاین مزید تنگ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ان کا قلب کمزور ہو جاتا ہے اور ایک معمولی قلبی حملہ کا شکار بھی ہو سکتا ہے

- (4) تمباکو کا استعمال خون کے دباؤ میں اضافہ اور قلب پر بگاڑ (Strain) پیدا کرتا ہے۔

- (5) تمباکو چبانے سے ذہنی سرطان (Oral Cancer) لاحق ہوتا ہے۔

- (6) بیڑی اور سگریٹ میں تمباکو کے جلنے سے نکلنے والے دھواں (Fumes) میں زہریلی گیسیں (Gases) پائی جاتی ہیں جن میں

کاربن مانو آکسائیڈ (CO)، ہائیڈروجن سیانائیڈ (HCN) اور غیر محسوس شدہ کوئٹن شامل رہتی ہیں۔ یہ تمام کمیسز نہ صرف سگریٹ نوش کرنے والے اشخاص کی صحت کو متاثر کرتی ہیں بلکہ سگریٹ استعمال نہیں کرنے والے اشخاص کی صحت کو بھی متاثر کرتی ہیں جو ان کے قریب رہتے ہیں جن تک یہ دھواں پہنچ سکتا ہے۔

عالمی صحت تنظیم (World Health Organisation) نے تمباکو کے بے شمار مضر اثرات سے آگاہی کرنے کی خاطر سگریٹ سے متعلق تمام اشتہارات اور سگریٹ کی پیکٹس پر یہ عبارت "سگریٹ نوشی صحت کے لئے مضر ہے" تحریر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی سے گریز کرے اور تمباکو کے بے شمار مضر اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔

(b) الکحل کے مضر اثرات

الکحل نشہ آور ہوتی ہے اس لئے اس کا استعمال بھی انسان کو اس کے استعمال کا عادی بناتا ہے۔ الکحل کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں جیسے شراب (Wine)، دہسکی (Whisky)، برائڈی (Brandy) اور جن (Gin) یا ٹاڈی (Toddy) (سینہ می) جو صحت کے لئے مضر ہیں




شکل 13.23

نشہ آور الکحل کی پوٹیں

انسان ابتدا میں الکحل کی تھوڑی مقدار کو استعمال کرتا ہے لیکن مسلسل استعمال کی وجہ سے اس کا عادی بن جاتا ہے اور وہ الکحل کی زیادہ سے زیادہ مقدار کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الکحل غذائی مٹی کی دیوار میں خون کی شعریالوں (Blood Capillaries) میں چیز سے جذب ہو جاتی ہے اور خون کی گردش کے ذریعہ جسم کے تمام اعضاء کو پہنچ جاتی ہے۔ الکحل اگرچہ جسم کے خلیوں میں غلطی محسوس (Cellular Respiration) کے دوران استعمال کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے لیکن الکحل کو اس کے مضر اثرات کی وجہ سے غذا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ الکحل جسمی اعضاء کو متحرک بناتی ہے لیکن زیادہ مقدار میں الکحل کا استعمال دماغی ہوشیاری میں کمی

پیدا کرتا ہے اور جگر (Liver) کو شدید نقصان کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ الکحل کے عادی اشخاص میں کئی مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں جنہیں ذیل میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔

- (1) الکحل عصبی نظام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ الکحل سے معدہ، دموئی دعائیں اور گردے شدید متاثر ہوتے ہیں۔
- (2) زائد الکحل کے استعمال کے باعث جگر میں چربی جمع ہو جاتی ہے جو جگر کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔
- (3) الکحل جسم میں مختلف امراض کے خلاف مدافعتی صلاحیت میں تخفیف پیدا کرتی ہے۔ خاص کر پھیپھڑوں کے متاثر ہونے سے دق اور نمونیا جیسے امراض لاحق ہوتے ہیں۔



شکل 13.24
الکحل کی انسانی جسم میں منتشری

- (4) الکحل انسان کی فیصلہ ساز خصوصیت کو متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ دہنی توازن کو کھونے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔
- (5) الکحل خاندان کے معاشی حالات کو متاثر کرتی ہے اور کئی سماجی برائیوں کا سبب بھی بنتی ہے۔
- (6) الکحل مرثک کے حادثات کی تعداد میں اضافہ کا باعث بھی بنتی ہے اور سماجی زندگی کے علاوہ گھر طرز زندگی کو بگاڑ دیتی ہے۔



ایک سال عمر

چار سال عمر

دھائی سال عمر

شکل 13.25

تین بچوں میں الکحل کے باعث واقع ہونے والے مہلک مارے
تینوں میں آنکھیں چھوٹی، کسی قدر تھوڑی بڑھی ہوئی جو بالائی چیزے کی انحرافی نشوونما
کے باعث ظاہر ہوتی ہے۔ ان تمام تینوں کی IQ قدر 60 سے کم ہے۔

نشیات (Narcotic Drugs) یا نفس رنجی ادویات (Psychotropic Drugs)

ایسی ادویات جو انسان میں غشی پیدا کرتی ہیں نشیات (Narcotic Drugs) یا نفس رنجی ادویات (Psychotropic Drugs) کہلاتی ہیں جیسے افیم (Opium)، ہیرین (Heroin)، کوکین (Cocaine)، گانجا (Ganja)، مورفین (Morphine)۔
باربیتوریش (Barbiturates) وغیرہ۔ الکحل اور تبا کو کے استعمال کو اپنی مضبوط قوت ارادی کے تحت چھوڑا جاسکتا ہے لیکن نشیات کو چھوڑنا
انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ نیز انسان ابتداء میں ان ادویات کی تھوڑی مقدار کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن اپنے بے قابو خواہشات کی کھنی کے لئے
زیادہ سے زیادہ مقدار کی طلب کرتا ہے اور اس کے استعمال کا عادی بن جاتا ہے۔ ان کا فوراً چھوڑنا زندگی کے لئے ایک خطرہ بن جاتا ہے۔

یہ ادویات مندرجہ ذیل مضر اثرات پیدا کرتی ہیں یہاں مختصر ایمان کئے گئے ہیں۔

(1) عصبی نظام اور دیگر جسمانی اعضاء میں مضر اثرات پیدا کرتی ہیں۔

(2) کے باعث بصارت، سننے کی صلاحیت، تنفسی نظام اور قلبی و عائی نظام (Cardiovascular System) پر برے اثرات

مرتب ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال ایک سماجی برائی ہے اور غیر قانونی یوں کی ہمت افزائی میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ ان ادویات کے عادی افراد ان ادویات کو اپنے جسم میں داخل کروانے کے لئے بسا اوقات مشترک سوئی اور انجکشن استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایس (AIDS) کا مریض ہو تو اس کو استعمال کی گئی سوئی اور انجکشن کے ذریعہ دوسرے شخص میں بھی یہ مرض داخل ہو جاتا ہے۔

نشیات (Narcotic Drugs) کو بعض سورتوں میں بعض امراض کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ادویات انتہائی مضر رساں ہوتی ہیں اس لئے ان کی فراہمی کو سختی سے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ صرف ڈاکٹر کی سفارش پر ہی ان کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔ اکثر ممالک میں ان ادویات کے عادی لوگوں کو ان ادویات سے چھٹکارا دلانے کے لئے مخصوص دوا خانے اور مراکز کھولے جاتے ہیں جہاں مناسب ماحول اور بہتر طبی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ان ادویات کے استعمال سے لوگوں کو ممکنہ طور پر چھٹکارا دلایا جاتا ہے۔

4 خلاصہ

- ☆ عمدہ صحت سے مراد کسی شخص کی طبی، دماغی اور سماجی حالت کی بہتری اور خوش حالی ہے نہ کہ صرف بیماریوں سے آزادی کا نام عمدہ صحت ہے۔
- ☆ صحت کو اندرونی اور بیرونی عوامل متاثر کرتے ہیں۔
- ☆ اندرونی عوامل جو انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں جیسے جسمانی اعضاء کی سوء کارکردگی یا ناقص کارکردگی کے باعث پیدا ہوتے والے امراض، جینیاتی امراض، ہارمونی امراض اور الرجی امراض۔
- ☆ بیرونی عوامل میں جو انسان کے جسم میں بیرونی طور پر داخل ہوتے ہیں ان میں ناکافی غذا، خوردبینی عضو، ماحولی آلود کار اور مادت پیدا کرنے والی اشیاء جیسے تمباکو، الکحل، نشیات شامل کئے جاتے ہیں۔
- ☆ جسمانی اعضاء جیسے دل، گردے، ہڈیاں اور آنکھ کے عدد سے وغیرہ کی سوء کارکردگی کا انحصار تواریق عوامل، پیدا آشی خفاص، اعضاء کی اچانک یا آہستہ سوء کارکردگی اور جسمانی غلیوں کے غیر قابو ہو رہوتا ہے۔

- ☆ جینیاتی امراض نسل در نسل منتقل ہونے والے امراض ہوتے ہیں جیسے ہیمو فیلیا (Haemophilia) اور مکمل سیل فقر الدم (Sickle Cell Anaemia)۔
- ☆ ہارمونی امراض ہارمونز کی قلت یا ان کے افراز میں نقص کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں۔ چند اہم ہارمونی امراض میں کرٹینزم (Cretinism)، ذیابیطیس، دیو قاستی، پست قاستی قابل ذکر ہیں۔
- ☆ بعض اشخاص میں ارجی پروٹین افراط غذاؤں، دھول، زیرہ دانوں اور بعض ادویات کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔
- ☆ غذا میں لازمی مقویات کی قلت کے باعث تغذیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں۔
- ☆ خوردبینی عضو یعنی جراثیم، وائرس، پھپھوندی اور پروٹوزوا انسان میں کئی امراض پیدا کرتے ہیں۔
- ☆ ماحولی آلودگی انسان میں مختلف امراض کا باعث بنتی ہے۔
- ☆ شعاعوں کے ذریعہ پیدا ہونے والی ماحولی آلودگی کے سبب پیدا ہونے والے امراض میں سرطان، لیوکیمیا اور جلدی امراض قابل ذکر ہیں۔
- ☆ عادت پیدا کرنے والی اشیاء میں تمباکو، الکحل اور نشیات شامل کئے جاتے ہیں۔
- ☆ تمباکو کے استعمال سے پھیپھڑوں کا سرطان، ذی سرطان، خون کا دباؤ اور قلبی حملہ جیسے مہلک امراض لاحق ہوتے ہیں۔
- ☆ الکحل نشہ آور ہے۔ یہ جسمی اعضاء کو متحرک بناتا ہے لیکن زیادہ مقدار میں اس کے استعمال سے جگر کو شدید نقصان ہوتا ہے۔ ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔
- ☆ نشیات کے استعمال سے تنفسی نظام، پیسی و عانی نظام، بصارت، سننے کی صلاحیت وغیرہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف چند نشیات بطور دوا استعمال ہوتی ہیں۔

5 زائد معلومات

کیا آپ جانتے ہیں؟

- ☆ تمام خوردبینی اجسام ہماری جسمانی تپش یعنی $98.6^{\circ} F$ یا $37^{\circ} C$ پر بہتر طور پر نمو پاتے ہیں۔
- ☆ جراثیم $20^{\circ} C$ تا $43^{\circ} C$ پر نمو پاتے ہیں اور تیزی سے غیر منفی تولید انجام دیتے ہیں۔

- ☆ جراثیم کے نم میں کی 40°C پر واقع ہوتی ہے اور 45°C پر نمورک جاتا ہے۔
- ☆ دودھ کو 30 منٹ تک 62°C یعنی 143°F پر گرم کرنے پر جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں اور دودھ استعمال کی قابل ہو جاتا ہے۔
- ☆ انجائی سرچش پر جراثیم ہلاک نہیں ہوتے بلکہ ان کا نمو اور عاملیت (Activity) رک جاتی ہیں۔
- ☆ جراثیم کو UV روشنی اور سورج کی تیز روشنی کے ذریعہ بھی ہلاک کیا جاسکتا ہے۔

6 فرہنگ

انگریزی اصطلاح	لفظ	اردو اصطلاح	تشریح
Adukeration	اولٹریشن	ملاوٹ	غذائی اشیاء میں دیگر اشیاء کا اضافہ
Allergy	الرجی	الرجی	امراض جو جسم میں بے ضرر بیرونی شے کے داخل ہونے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے ضد اجسام (Antibodies) کی فوق عاملیت کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں۔
Agglutination.	اگلٹینیشن	چسپیدگی	ایسا عمل جو عدم مطابقت کے حامل دو کیمیائی مرکبات کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے تریاق زہا (Antigen) اور ضد اجسام (Antibodies) عدم مطابقت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چسپیدہ ہو جاتے ہیں۔
Anaemia	انیمیا	فقر الدم	ایسی حالت جس میں خون میں احمر جیسوں (Erythrocytes) یا ہیموگلوبین (Haemoglobin) کی قلت یا ناقص ہیموگلوبین کی وجہ سے خون میں آکسیجن کو منتقل کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔

Anaerobic	اینیروبک	غیر آکسیجی	آکسیجن کی عدم دستیابی سے متعلق جیسے غیر آکسیجی تخمیں آکسیجن کی غیر موجودگی میں واقع ہوتا ہے۔
Antibiotic	اینٹی بائیوٹک	ضد حیات	حیات کے مخالف۔ ایسی کیمیائی شے جو جاندار عضو یون کو ہلاک کرتی ہے۔
Arteriosclerosis	آرٹیرپواسکلیراسس	تصلب شریان	بیماری جس میں شریان کی دیوار سخت اور دبزد ہو جاتی ہے جس سے اس کی پلمپ کی خاصیت ضائع ہو جاتی ہے۔
Assimilation	ایسی میلیشن	استحالہ	ہضم شدہ غذائی مادوں اور دیگر مادوں کی تجزیہ میں تبدیلی۔
Atherosclerosis	ایٹروواسکلیراسس	ایٹروواسکلیراسس	شریان کی دیوار میں چربی کا جمع ہونا جس کی وجہ سے اکثر شریان میں پلمپ کی خاصیت ضائع ہو جاتی ہے۔
Benign Tumor	بیمائن ٹیومر	سلیم	بے ضرر رسولی جو سرطان کا باعث نہیں بنتی۔
Cataract	کنارکٹ	موتیابند	مرض چشم۔
Carcinogenesis	کارسینوجینیسیس	سرطان زائی	ایسا عمل جس میں جسم کے کسی حصہ میں سرطان پیدا ہوتا ہے۔
Connective Tissue	کنک ٹیوشو	اتصال یافتہ	ایک جیسے افعال انجام دینے والے غلیظوں کا مجموعہ جو دوائی اعضاء کو متصل کرتا ہے۔
Congenital	کوئجینٹل	پیدائشی	حالت یا خصوصیت جو پیدائش کے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے۔
Cretinism	کریٹینیزم	اہلی یا قمار	بچوں میں واقع ہونے والا ایسا مرض جو تھیراکسن (Thyroxin) کی قلت کے باعث واقع ہوتا ہے جس میں چلنے اور بات کرنے میں تاخیر ہوتی ہے۔
Diarrhoea	دائرہیا	اسہال	مرض جس میں دست کثرت سے آتے ہیں اور جن کے ساتھ پانی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے۔

Dwarfism	دوارفیزم	پست قامتی	حالت جس میں جسم کے حصوں کا نمو رک جاتا ہے جس کے باعث قد کافی کم ہوتا ہے۔
Gigantism	جائی جیائیزم	دیو قامتی	حالت جس میں جسم کے حصوں کا نمو ضرورت سے زائد ہوتا ہے جس کے باعث قد کافی لاجا ہو جاتا ہے۔
Immunity	ایمیونٹی	بامونیت	جسم میں تعدیہ (Infection) کے خلاف مدافعت کی صلاحیت۔
Insecticide	انیکٹی سائیڈ	حشرات کش	ادویات یا کیمیائی مرکبات جو حشرات کو ہلاک کر دیتے ہیں۔
Infection	انفکشن	تعدیہ	جسم میں بیماری پیدا کرنے والے اعضاء کی داخل ہونا۔
Lipoma	لائپوما	فحمی سلعہ	جسم کے کسی حصہ پر چربی کا جمع ہونا۔
Malignant	میلیگ منٹ	مہلک	جسم کا حصہ یا خلیے جو سرطان کا باعث بنتے ہیں۔
Myopia	مایوپیا	قرب بینی	آنکھوں کا نقص جس کی وجہ سے قریب کی شے دکھائی دیتی ہے لیکن دور کی شے دکھائی نہیں دیتی۔
Mutation	میوٹیشن	تبدل	کسی نوع میں کوئی خاص تبدیلی کا اچانک ظاہر ہونا۔
Nuclear Fission	نوکلیئر فیشن	نیوکلیائی انشطار	ایسا عمل جس میں ایک بڑا مرکزہ چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے جس کے دوران توانائی کی کثیر مقدار خارج ہوتی ہے۔
Osteoporosis	آسٹیوپوروسس	عظمیٰ مسامہ اری	ہڈیوں کی بیماری جس میں ہڈیاں کیمیشیم کی عدم دستیابی یا کیمیشیم کے تحول کے متاثر ہو جانے کے باعث مسامہ اری ہو جاتی ہیں۔
Poison	پوائزن	سم	زہر - کیمیائی شے جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔
Pollutant	پولیوٹنٹ	آلود کار	ایسی شے جس کا ماحول میں اضافہ ماحول کی خرابی کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے جاندار اجسام کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔

Pollution	پولیوشن	آلودگی	ماحول میں کسی شے کا اضافہ جو جاندار میں نقصان دہ اثرات پیدا کرتا ہے۔
Scrotum	اسکروٹم	صفن یا کیسہ خاویہ	جسم کے بیرونی جانب قہری کیسہ جس میں لیجے موجود ہوتے ہیں۔
Uterus	یوٹیرس	رحم	بیض قنات (Oviduct) کا پھیلا کشادہ حصہ جس میں جنین (Embryo) کا نشوونما واقع ہوتا ہے۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) عمدہ صحت سے کیا مراد ہے؟
- (2) ایک صحت مند انسان کے متعلق آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے؟
- (3) عمدہ صحت کو قائم رکھنے میں تعلیم کس طرح آپ کی رہنمائی کرتی ہے؟
- (4) جسمانی اعضاء کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے انسان میں پیدا ہونے والے چند امراض اور ان سے متعلقہ اعضاء کی فہرست مرتب کیجئے۔
- (5) دیوتاقسی (Gigantism) مرض کا سبب بتائیے۔
- (6) پست قاعسی (Dwarfism) مرض کس طرح واقع ہوتا ہے؟
- (7) الرجی (Allergy) سے کیا مراد ہے؟ بعض الرجی امراض کے نام بتائیے۔
- (8) انسولین کی اہمیت کی تشریح کیجئے۔
- (9) تغذیائی امراض سے کیا مراد ہے؟ چند اہم تغذیائی امراض کے نام بتائیے۔
- (10) DDT اور BHC کس طرح صحت کو متاثر کرتے ہیں؟

7.2 طویل جوابی سوالات

- (1) ہارمونی امراض کی تعریف کیجئے۔ کسی دو ہارمونی امراض کو تفصیل سے بیان کیجئے۔
- (2) جیناتی امراض سے کیا مراد ہے؟ انسان میں واقع ہونے والے کوئی دو جیناتی امراض کی تشریح کیجئے۔
- (3) صحت کو متاثر کرنے والے اندرونی اور بیرونی عوامل سے کیا مراد ہے؟ ان کی فہرست بنائیے۔
- (4) الرجی امراض پر ایک نوٹ لکھیے۔
- (5) آلودگی کے سبب واقع ہونے والے امراض کو بیان کیجئے۔
- (6) انسان کی صحت کو متاثر کرنے والی تین اقسام کی شعاعیں کونسی ہیں؟ ہمارے جسم پر ان شعاعوں کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔
- (7) تمباکو کے مضر اثرات کو بیان کیجئے۔
- (8) الکحل کے عادی اشخاص میں پائے جانے والے مضر اثرات کو بیان کیجئے۔
- (9) نشیات کیا ہوتے ہیں؟ ان کے مضر اثرات کی وضاحت کیجئے۔
- (10) پھیپھوندی سے پیدا ہونے والے امراض کو بیان کیجئے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

- (1) والدین سے اولاد میں منتقل ہونے والے عوامل کو..... کہا جاتا ہے۔
- (2) انسان کے جسم میں بعض بافتوں کے خلیوں کا نمونہ غیر قابو ہو جاتا ہے۔ جو..... اور..... کا باعث بنتا ہے۔
- (3) در قیہ غدود کی کارکردگی میں کمی..... مرض کا باعث بنتی ہے۔
- (4) نفاذی غدود کی..... کی وجہ سے ہڈیوں کا نمونہ کانی تیز ہو جاتا ہے۔
- (5) ایک پست قامت بالغ شخص کی لائبل صرف..... فٹ ہوتی ہے۔
- (6) دمہ بھی..... مرض ہے۔
- (7) بھوپال گیس کا حادثہ..... ٹائی زہریلی گیس کے خارج ہونے سے واقع ہوا۔

- (8) _____ اور _____ کی دخول سے دق نامی پیشہ ورانہ مرض لاحق ہوتا ہے۔
- (9) _____ کو اوزون پرت (Ozone Layer) جذب کر لیتی ہے۔
- (10) تنگسٹن (Tungsten) دھات پر کیتھوڈ (Cathode) شعاعوں کے نکلانے سے _____ شعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔

7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) نیوکلیائی انشطار (Nuclear Fission) عمل کے دوران کونسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں؟

- (a) لاشعاعیں (b) گاما شعاعیں
(c) کیتھوڈ شعاعیں (d) بالائے بنفش شعاعیں

2 ہیروئین (Heroin) کیا ہے ؟

- (a) مٹھیات (b) اکل
(c) تمباکو میں موجود زہریلا مادہ (d) جراثیم

(3) شعاعوں کے ذریعہ کونسا مرض پیدا ہوتا ہے؟

- (a) ذیابیطس (b) گلہڑ
(c) کریمینوم (d) سرطان

(4) ہیپوفلیا کونسا مرض ہے؟

- (a) تغذیائی (b) ہارمونی
(c) جینیائی (d) الرجی

(5) لیوکیمیا مرض کا سبب کیا ہے؟

- (a) غذا کی قلت (b) پردھن الافراط غذا کا استعمال
(c) ماحولی آلودگی (d) نفعی غدود کی خرابی

(6) صحت کو متاثر کرنے والا امرونی عامل کونسا ہے؟

- (a) ہارمونی عدم توازن
(b) تمباکو کا استعمال
(c) الکحل کا استعمال
(d) نشیات
- (7) صحت کو متاثر کرنے والا پیردنی عامل کونسا ہے؟

- (a) تمباکو
(b) ہارمونی عدم توازن
(c) مامونیاتی نظام
(d) جینیاتی عارضہ
- (8) کس ہارمون کی قلت کے باعث ہضم شدہ شکر جسم میں استعمال نہیں کی جاتی؟

- (a) تھائیراکسن
(b) انسولین
(c) گلوکاکان
(d) نموئی ہارمون
- (9) سلی کوکس (Silkosis) مرض کس سے واقع ہوتا ہے؟

- (a) کوئلہ کی دھول
(b) سیلکا دھول
(c) ایس بیس ٹاس دھول
(d) اوہن کی دھول
- (10) لوہی اجسام کے لئے کونسا آلود کار نقصان کا باعث بنتا ہے؟

- (a) گاما شعاعیں
(b) الکحل
(c) تمباکو
(d) انیم

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

B	A
()	(1) باربیتوریٹس (Barbiturates)
()	(2) الکحل
()	(3) تمباکو
()	(4) گاما شعاعیں
()	(5) کوئلہ کی دھول
نگوٹین	
نیوموکنیوسس (Pneumoconiosis)	
میجائیل آکسوسایٹ	
نشیات	
تغذیاتی امراض	

()	جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔	بھوپال گیس	(6)
()	نمائی غدد کی فوق فعلیت	حیاتین کی قلت	(7)
()	تواریثی تغیرات	دیو قامت	(8)
()	زیرہ دانے	پست قامت	(9)
()	نمائی غدد کی پست فعلیت	الرجی	(10)

سبق 14 پہلی طبی امداد (First Aid)

- 1 سبق کا خاکہ
- 2 تمہید
- 3 سبق کا متن
 - 3.1 پہلی طبی امداد کی تعریف اور مقاصد
 - 3.2 پہلی طبی امداد پہنچانے کے لئے ضروری ہدایات
 - 3.3 پہلی طبی امداد کے اصول
 - 3.4 غرقاب نقص کے لئے پہلی طبی امداد
 - 3.5 فکلتہ ہڈیوں کے لئے پہلی طبی امداد
 - 3.5.1 فکلتہ کی اقسام
 - 3.5.2 فکلتہ کی علامات
 - 3.5.3 فکلتہ کے لئے پہلی طبی امداد
 - 3.6 لوگنے ہر دی جانے والی پہلی طبی امداد
 - 3.7 آفتاب زدگی کے لئے پہلی طبی امداد
 - 3.8 سانپ کے ڈسنے پر پہلی طبی امداد
 - 3.9 صحت کی ایجنسیاں
 - 3.9.1 صحت کے نگہداشتی نظام کی خصوصیات

4	سبق کا خلاصہ
5	نمونہ امتحانی سوالات
5.1	مختصر جوابی سوالات
5.2	طویل جوابی سوالات
5.3	معروضی سوالات
5.3.1	خالی جگہوں کو پر کیجئے
5.3.2	صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے
5.3.3	جوڑیاں لگائیے

سبق کا خاکہ 1

اس سبق میں آپ درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ پہلی طبی امداد کی تعریف، مقاصد، اصول
- ☆ غرقاب شخص کے لئے طبی امداد
- ☆ شکستہ ہڈیوں کے لئے پہلی طبی امداد
- ☆ لو لگنے اور آفتاب زدگی کے لئے پہلی طبی امداد
- ☆ سانپ کے ڈسنے کے لئے پہلی طبی امداد
- ☆ صحت کی ایجنسیاں

2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ صحت کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ پہلی طبی امداد (First Aid) کے متعلق معلومات حاصل کریں گے جو اتفاقی حادثات میں بے حد کارآمد ہوتے ہیں۔ چونکہ مختلف حادثات کا شکار ہونے والے افراد کو کسی دواخانہ سے رجوع کرنے سے قبل پہلی طبی امداد فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ متاثرہ شخص کی حالت کو مزید ابتر ہونے سے بچایا جاسکے یا اس کی جان کو بچایا جاسکے۔ اس لئے پہلی طبی امداد سے متعلق معلومات اور تربیت کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیز پہلی طبی امداد کے دصولوں کو بھی اچھی طرح جاننا ضروری ہے تاکہ پہلی امداد فراہم کرنے کے لئے اختیار کئے جانے والے تمام مراحل بلا خوف و اضطراب انجام دیئے جاسکیں۔ اس کے علاوہ اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے دیہی اور شہری علاقوں کی آبادی کے نگہداشتی نظام کو اختیار کیا ہے جس کا مقصد ان علاقوں کی آبادی کی صحت میں بہتری پیدا کرنے کے لئے اہم اقدامات کو انجام دینا ہے۔

سبق کا متن 3

3.1 پہلی طبی امداد (First Aid) کی تعریف اور مقاصد

پہلی طبی امداد سے مراد کسی حادثہ یا بیماری سے متاثرہ شخص کو فوری عارضی طور پر پہنچائی جانے والی امداد ہے، جس کا مقصد ذیل

میں بیان کیا گیا ہے۔

(1) حادثہ یا بیماری سے متاثرہ شخص کی زندگی کو بچایا جائے۔

(2) درد اور تکلیف سے نجات دلائی جائے۔

(3) مریض کو ڈاکٹر سے رجوع ہونے یا مریض کو دوا خانہ لے جانے تک مریض کی حالت کو بگڑنے سے بچایا جائے۔

پہلی طبی امداد کو سب سے پہلے ایک جرمن سائنسدان ایس مارچ (EsMarch) (1823 تا 1908) نے دریافت کیا۔ اس کے بعد پہلی طبی امداد کو مقبول عام کرنے میں انگلینڈ کی سینٹ جانس ایمبولینس سروس (St. John's Ambulance Service)، برٹش ریڈ کراس سوسائٹی (British Red Cross Society) اور سینٹ انڈریوس سروس (St. Andrew's Service) نے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ یہ تنظیمیں آج بھی عوام کو پہلی طبی امداد کی تربیت دینے میں نمایاں رول ادا کر رہی ہیں۔

3.2 پہلی طبی امداد پہنچانے کے لئے ضروری ہدایات

(1) حادثہ کا شکار ہونے والے شخص سے فوری رجوع ہو جائیے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیجئے۔

(2) موزوں حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے حالت سے نمٹنے کی کوشش کیجئے۔

(3) کوئی قطعی فیصلہ نہ کریں ورنہ متاثرہ شخص کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

(4) پہلی طبی امداد پہنچانے سے قبل معلومات اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

(5) حادثہ کے واقعات یا بیماری کا سبب فوری دریافت کیجئے اور یہ معلوم کیجئے کہ یہ حادثہ کس طرح واقع ہوا ہے۔

(6) حادثہ یا بیماری کی نشانیوں اور علامتوں جیسے جاڑا، بخار، متلی، موجن، جسم کے حصوں کی شکل میں بگاڑ کا مختصر وقت میں بغور مشاہدہ۔

کھل طور پر کر لیجئے۔

(7) پہلی طبی امداد کے اصولوں کو اختیار کیجئے اور متاثرہ شخص کو پہلی طبی امداد پہنچائے۔

3.3 پہلی طبی امداد کے اصول

حادثہ یا بیماری سے متاثرہ شخص کی زندگی بچانے کے لئے چند اہم اصولوں کو اختیار کیا جاتا ہے جو پہلی طبی امداد کی کامیابی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔

(a) پہلی طبی امداد دینے کے لئے اختیار کئے جانے والے تمام مرحلوں کو بلا خوف سلسلہ وار انجام دیجئے۔

(b) تنفس کا مشاہدہ کیجئے اور تنفس کے علاج کو اولین ترجیح دیجئے۔

- (c) وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے چوں کہ زندگی کے لئے ہر ثانیہ قیمتی ہوتا ہے۔
- (d) متاثرہ شخص کے جسم کے کسی بھی حصہ سے اگر خون بہہ رہا ہو تو مناسب طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے خون کے بہنے کو روکنے کی کوشش کیجئے۔
- (e) متاثرہ شخص کو پینچنے والے صدمے کا علاج کیجئے۔ اس مقصد کے لئے اس کو احتیاط کے ساتھ بہت کم حرکت دیجئے۔
- (f) متاثرہ شخص کو تازہ ہوا پینچنے کا راستہ فراہم کیجئے۔
- (g) متاثرہ شخص کے اطراف لوگوں کو جمع ہونے مت دیجئے اور انھیں اس بات سے واقف کروائیے کہ متاثرہ شخص نہ صرف محفوظ ہاتھوں میں ہے بلکہ اس کو پہلی طبی امداد بھی بہت جلد ہی دی جائے گی۔
- (h) متاثرہ شخص کو بلا ضرورت بار بار حرکت دینے سے گریز کیجئے اور اس کے کپڑے بھی نانا تار پیئے۔
- (i) متاثرہ شخص کو ڈاکٹر سے رجوع کرواتے وقت یہ اطلاع فراہم کیجئے کہ متاثرہ شخص کو پہلی طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ اگر متاثرہ شخص کو ایمبولینس (Ambulance) کے ذریعہ دوا خانہ پہنچایا جا رہا ہے تو ایمبولینس کو بھی اس قسم کی اطلاع دے دیجئے۔
- اس سبق میں چند عام حادثات کے لئے پہلی طبی امداد کے متعلق معلومات فراہم کی جارہی ہیں۔

3.4 غرقاب شخص کے لئے پہلی طبی امداد

جب کوئی شخص پانی میں غرقاب ہو تو اس کو بچانے کے لئے اس کی مدد کرنی چاہئے۔ تیراکی سے واقفیت رکھنے والے شخص کو ہی ڈوبے ہوئے شخص کو پانی سے باہر نکالنے کے لئے پانی میں غوطہ لگانا چاہئے اور اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے پھرتی کے ساتھ ڈوبے ہوئے شخص کو پانی سے باہر نکالنا چاہئے۔ ڈوبے کے دوران متاثرہ شخص کے ناک، منہ اور حلق کے راستہ سے پانی پھینچوڑوں میں داخل ہو جاتا ہے جو سانس میں دشواری کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے ساتھ کچڑیا کوئی دوسری اشیاء بھی داخل ہو کر تنگی راستوں کو بند کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے متاثرہ شخص کا تنفس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر متاثرہ شخص کا تنفس جلد بحال نہ کیا جائے تو وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لئے جتنی جلد ممکن ہو سکے اتنی جلد تنفس کو بحال کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ متاثرہ شخص کی زندگی کو بچایا جاسکے۔ لہذا غرقاب شخص کے لئے پہلی طبی امداد میں (1) تنگی راستوں کی صفائی (2) پھینچوڑوں سے پانی کا اخراج (3) مصنوعی دم براری (Artificial Expiration اور (4) مصنوعی دم درکشی (Artificial Inspiration) شامل ہیں۔

(1) تنفسی راستوں کی صفائی

امدادی کارکن کو چاہئے کہ وہ سب سے پہلے متاثرہ شخص کے ناک، منہ اور حلق میں جمع شدہ کچڑیا کوئی دوسری اشیاء کو صاف کر لے۔
شہ کو قوت سے کھولے اور دوسرے کارکن ان اشیاء کو اپنی انگلیوں سے نکال لے اور صاف کر لے۔

(2) پھیپھڑوں سے پانی کا اخراج

متاثرہ شخص کے پھیپھڑوں سے جمع شدہ پانی کو خارج کرنے کے لئے اس کو پیٹ کے بل لٹا دینا چاہئے اور اس کے چہرے کو ایک جانب موڑ دینا چاہئے۔ اس کے بعد اس کی پیٹھ کو ہاتھوں سے دبانا چاہئے جس کی وجہ سے پانی پھیپھڑوں سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔

(3) مصنوعی دم براری (Artificial Expiration)

پھیپھڑوں سے پانی کو خارج کرنے کے بعد شخص کو بحال کرنے کے لئے پہلے مصنوعی طور پر دم براری (Expiration) کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے امدادی کارکن اپنے گھٹنوں کے سہارے متاثرہ شخص کے بازو پیٹھ کراپے ہاتھوں کی مدد سے پیٹھ کو اس قدر دبا دینا چاہئے کہ صدری کبفہ کا حجم کم ہو جائے۔ حجم میں کمی اندرونی ہوا کے دباؤ میں اضافہ کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں سے ہوا باہر خارج ہو جاتی ہے۔




شکل 14.1

مصنوعی تنفس - تنفیس کرتے ہوئے

(4) مصنوعی دم درکشی (Artificial Inspiration)


مصنوعی دم براری کو انجام دینے کے بعد مصنوعی دم درکشی (Inspiration) کو انجام دینا چاہئے۔ دم درکشی کے لئے متاثرہ شخص

کی پیٹھ پردہاد کو بتدریج کم کرتے جاسں جس کے باعث مدد ری کہلہ کے کشادہ ہو جانے سے نجم میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں اندرونی ہوا کے دہاد میں کمی واقع ہوتی ہے اور ہوا باہر (زیادہ دہاد) سے تنزی کے ساتھ ناک کے ذریعہ بھیچر دوں میں داخل ہو جاتی ہے۔



شکل 14.2

مصنوی تنفس۔ منہ سے منہ کے ذریعہ تنفس کو بحال کرتے ہوئے



شکل 14.3

مصنوی تنفس۔ ہوگلر۔ نیلسن کا طریقہ (Holger-Nielsen Method)

دونوں عمل یعنی مصنوعی دم برادری اور مصنوعی دم درکشی کو 16 تا 18 مرتبہ فی منٹ کی شرح پر محسوس بحال ہونے تک دہرایا جاتا چاہئے۔ اسی دوران متاثرہ شخص کو اس کے سلیپ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گرم کپڑوں میں لپیٹ دینا چاہئے۔ متاثرہ شخص کو ہوش میں آنے اور نکلنے کے قابل ہونے کے بعد گرم کانی یا چائے نوش کرانی چاہئے۔

3.5 شکستہ ہڈیوں کے لئے پہلی طبی امداد

ہڈیوں کے ٹوٹنے کو شکستگی یا فریکچر (Fracture) کہا جاتا ہے۔ عموماً حادثات میں ہاتھوں اور پیروں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ ان صورتوں میں پہلی طبی امداد دینے کے لئے شکستگی کی نوعیت، مقام اور وجہ سے متعلق واقفیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے ہم شکستگی کی اقسام سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔

3.5.1 شکستگی کی اقسام (Types of Fractures)

(1) سادہ شکستگی (Simple Fracture)

اس قسم کی شکستگی میں ہڈی مکمل یا جزوی طور پر ٹوٹ جاتی ہے لیکن ٹوٹنے کے مقام پر کسی قسم کا زخم واقع نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کی شکستگی کو بند شکستگی (Close Fracture) بھی کہتے ہیں۔



فصل 14.4

سادہ شکستگی

(2) مرکب شکستگی (Compound Fracture)

اس قسم کی شکستگی میں ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے اور ٹوٹنے کے مقام پر زخم بھی واقع ہوتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ٹکڑوں کے سرے سلی ہاتھوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جلد کو چیر کر باہر نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے خون بھی بہنے لگتا ہے۔ علاج نہ کئے جانے پر اس زخمی حصہ پر کسی بھی قسم کا تعدیہ (Infection) بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی شکستگی کو کھلی شکستگی (Open Fracture) بھی کہتے ہیں۔



فصل 14.5

مرکب شکستگی

(3) پیچیدہ شکستگی (Complicated Fracture)

اس قسم کی شکستگی میں نہ صرف ہڈی ٹوٹی ہے بلکہ جسم کے اندرونی اعضاء جیسے دماغ، جگر، طحال، دوسری وعائیں اور اعصاب بھی متاثر ہوتے ہیں۔

(4) متعدد شکستگی (Comminuted Fracture)

اس قسم کی شکستگی میں ہڈی ایک سے زائد مقامات پر ٹوٹی ہے۔

(5) متصادم ٹکرائی (Impact Fracture)

اس قسم کی ٹکرائی میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سرے ایک دوسرے میں دھنس جاتے ہیں۔

(6) سبز ٹیٹی کی ٹکرائی (Green Stick Fracture)

اس قسم کی ٹکرائی عموماً بچوں میں واقع ہوتی ہے۔ اس میں ہڈی ٹوٹی نہیں بلکہ مڑ جاتی ہے۔

3.5.2 ٹکرائی کی علامتیں (Symptoms of Fracture)

مختلف اشخاص میں ٹکرائی کی مختلف علامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ہی شخص میں تمام علامتیں دکھائی نہیں دیتیں۔ اس کا انحصار ہڈیوں کی ٹکرائی کی نوعیت پر ہوتا ہے۔

- سوجن اور درد ٹکرائی کے مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔
- ٹکرائی کے مقام پر معمولی سادہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔
- زخمی حصہ کو حرکت دینے میں دشواری ہوتی ہے۔
- ٹوٹی ہوئی ہڈی سے جڑے ہوئے عضلات میں سکڑا واقع ہوتا ہے اور جوڑوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ ہڈی کے ٹوٹے ہوئے سرے ایک دوسرے پر منطبق ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جوارح کی جسامت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
- ٹکرائی کے مقام پر چرچراہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔
- ٹکرائی کے مقام پر غیر فطری حرکات دکھائی دیتے ہیں۔

3.5.3 ٹکرائی کے لئے پہلی طبی امداد

- اگر کسی حادثہ میں کسی شخص کے ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں تو اس متاثرہ شخص کو پہلی طبی امداد مقام حادثہ پر ہی دینے کی کوشش کیجئے۔
- متاثرہ شخص کو حرکت دینے سے جہاں تک ممکن ہو گریز کیجئے۔
- زخموں پر فوری توجہ دیجئے۔ زخم کو صاف کیجئے اور خون کے بہنے کو روکنے کی کوشش کیجئے۔ متاثرہ ہاتھ یا پیر کو لکڑی کی چھڑیوں سے سہارا دینے پر نہ صرف خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے بلکہ خون کی نالیوں، اعصاب اور عضلات کو مزید نقصان محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔
- ٹکرائی ہڈی کی حرکت کو روکنے کے لئے لکڑی کی چھڑیوں اور بیاض تیج کا استعمال کیجئے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ بیاض تیج شکستہ

ہڈی پر ٹانگائیں بلکہ شکستہ مقام کے اطراف لگائیں۔

(e) مریض کو قریبی دوا خانہ کو منتقل کیجئے تاکہ مناسب علاج کیا جاسکے۔

3.6 لو لگنے پر دی جانی والی پہلی طبی امداد

اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہماری جلد ایک حسی عضو ہے جس کو محصلہ حرارت (Thermal Receptor) کہا جاتا ہے۔ نیز ہمارے جسم کی تپش معین رہتی ہے یعنی 97°F تپش برقرار رہتی ہے اور جسم کی اس تپش پر تمام تحولی تعاملات کو طبعی طور پر انجام دینے کے لئے ہمارا جسم متوافق ہوتا ہے۔ اس لئے انسان ہم حرارتی (Homeothermic) کہلاتا ہے۔ جسم کی اس معین تپش کو قائم رکھنے کے لئے جلد میں دسویں دعائی (Blood Vessels) پائی جاتیں ہیں۔ ان دسویں دعادوں میں گردش کرنے والے خون سے پانی بخارات بن کر خارج ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے یعنی تپش میں مزید اضافہ نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم میں واقع ہونے والے کیمیائی تعاملات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی حرارت جسمانی تپش میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جلد سے پانی کا بخارات کی شکل میں خارج ہونا معین تپش کو قائم رکھنے کے لئے بے حد ضروری ہے۔ تاہم ہماری جلد ہمارے ارد گرد کے ماحول میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کے لئے حساس ہوتی ہے۔ نیز ہماری جلد میں پسینے کے غدود (Sweat Glands) پائے جاتے ہیں جو خون سے نمکیات اور پانی کو علیحدہ کرتے ہیں اور پسینہ کی شکل میں جسم سے خارج کرتے ہیں۔ خارج ہونے والا پسینہ حرارت کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اچانک زیادہ تپش کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو لو لگنا کہا جاتا ہے۔ لو لگنے کے دوران جب کسی شخص پر اچانک زیادہ حرارت یعنی تپش کا اثر ہو جاتا ہے تو جسم سے زیادہ پانی اور نمکیات پسینے کی شکل میں خارج ہو کر جسم میں پانی اور ضروری نمکیات کی کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ جسم کے خلیوں میں درکار نمکیات کا ارتکاز کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خلیوں سے پانی باہر خارج ہوتا ہے جو جسم میں تابدگی (Dehydration) کا باعث بنتا ہے۔ اس حالت میں تمام حیاتی کیمیائی تعاملات متاثر ہو جاتے ہیں جو موت کا سبب بنتے ہیں۔ متاثرہ شخص کو تابدگی سے بچانے کے لئے پہلی طبی امداد ضروری ہوتی ہے جس کا مقصد جسم میں درکار نمکیات کے ارتکاز کو دوبارہ قائم کرنا ہوتا ہے تاکہ جسم میں دوبارہ باز آبدگی پیدا ہو جائے اور جسم کے تمام خلیوں میں پانی کی درکار مقدار حاصل ہو جائے۔ لہذا متاثرہ شخص کو پہلی طبی امداد کے طور پر 0.9% سوڈیم کلورائیڈ کا محلول یا مخصوص برقیوں کا محلول یعنی الیکٹرال (Electrol) پلایا جاتا ہے۔

3.7 آفتاب زدگی (Sun Stroke) کے لئے پہلی طبی امداد


ایسے اشخاص جو گرم مقامات پر رہتے ہیں آفتاب زدگی (Sun Stroke) کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ شدید گرما کے موسم میں بھی اشخاص

آفتاب زدگی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں متاثرہ شخص میں سر کا درجہ تیز بخار جو $105^{\circ} F$ تا $107^{\circ} F$ تک ہوتا ہے۔ پسینہ کا خارج نہ ہونا، اضطراب وغیرہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ تیز شدید بخار کی وجہ سے موت کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے۔

لہذا آفتاب زدگی سے متاثرہ شخص کو فوراً پہلی طبی امداد کا فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بخار میں قابل لحاظ کمی پیدا کی جاسکے۔ اس مقصد کے لئے متاثرہ شخص کو ہوا دار ٹھنڈے مقام کو منتقل کرنا چاہئے اور کپڑوں کو نکال دینا چاہئے، پیروں اور ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہئے، جسم کو ٹھنڈے پانی میں بھیجے ہوئے کپڑے سے پونچھا چاہئے اور بھیجے ہوئے کپڑے سے ڈھانکنا چاہئے۔ خاص کر پیشانی پر بھیجا ہوا کپڑا رکھنا چاہئے۔ ان تدابیر کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہئے جب تک کہ جسم کی تپش میں $101^{\circ} F$ تا $102^{\circ} F$ تک کمی نہ ہو جائے۔


3.8 سانپ کے ڈسنے (Snake Bite) پر پہلی طبی امداد

ہندوستان میں پائے جانے والے سانپ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ (i) زہریلے اور (ii) غیر زہریلے۔ زہریلے سانپوں میں ناگ سانپ کوبرا (Cobra)، ناگ ناچا (Naja naja)، ناگ راج کبرا اور فیکس ہٹا (Ophiophagus hanna)، انڈین کرےٹ (Indian Krait) یا بنگارس سیردلیس (Bangarus coeruleus)، پٹی دار کرےٹ بنگارس فیٹائس (Bangarus fasciatus) کیس کرےٹا (Echis carinata) وائپر رسلی (Viper russelli) اور سمندری سانپ لہنائیڈرےٹا (Enhydrina) یا ہائیڈروفیس (Hydrophis) وغیرہ شامل ہیں۔




شکل 14.6


ناگ سانپ، ناگ ناچا (Naja naja)



فکل 14.7
پٹی دار کریمٹ (Banded Krait)




فکل 14.8
دابھی



فکل 14.9


لہمہاڈرینا (سندری سانپ)




فکل 14.10

ہائڈروفس (سندری سانپ)


غیر ذہریلے سانپوں میں ہندوستانی اڈوہا پائتھان (Python)، اندھا سانپ ٹفلوپس (Typhlops) ڈھاکن (Dhamin) وغیرہ شامل ہیں۔



شکل 14.11
ہندوستانی اژدھا (ڈھانچن)





شکل 14.12
پریکس (سینڈبو)




شکل 14.13

نیاس (دھاسن)

زہریلے سانپوں کے منہ میں زہر آگ (Poison Apparatus) موجود ہوتا ہے جو زہر غدود (Poison Gland) زہر قات (Poison Duct) اور ایک جوڑے زہریلے دانت (Poison Teeth) یا فینگ (Fangs) اور کئی چھوٹے دانتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ زہر غدود (Poison Gland) نکلنے غدود (Parotid Glands) کی تبدیل شدہ ساخت ہے جو بوتلی کہلہ (Buccal Cavity) کے چھت میں موجود ہوتا ہے۔ ڈسنے کے دوران زہر غدود سے خارج ہوتا ہے اور قات سے گزرتا ہوا فینگ (Fang) کے کھانچوں میں پہنچ جاتا ہے اور بلا خرافسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔




شکل 14.14
زہریلے سانپ کے فینکس



فصل 14.15


سانپ مع زہریلے دانت، فینکس (Fangs)

سانپ کے زہر کو سم (Toxins) کہا جاتا ہے۔ زہر دو قسم کا ہوتا ہے (a) عصبی سم (Neurotoxin) اور (b) دسوی پاش سم (Hemolytic Toxin)۔ عصبی سم عصبی نظام پر عمل کرتا ہے۔ یہ بھری عصب (Optic Nerve) کو متاثر کرتا ہے جس کے باعث برقی متاثر ہوتی ہے جو اندھے پن کا باعث بنتی ہے یا ڈائفرام (Diaphragm) کے فریک عصب (Phrenic Nerve) کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے تنفسی قالج واقع ہوتا ہے۔ دسوی پاش سم (Haemolytic Toxin) دسوی جسموں (Blood Corpuscles) اور دسوی وعاو (Blood Vessels) پر اثر کرتا ہے جس کے باعث دسوی جیسے پھٹ جاتے ہیں۔ دسوی وعاو کی اندرونی دیواروں (Endothelium) ضائع ہو جاتی ہے۔ خون دسوی وعاو سے خارج ہو کر ارد گرد کی پائنتوں میں جمع ہو جاتا ہے اور نچھو ہو جاتا ہے۔ خون کے ضائع ہونے اور دسوی جسموں کے پھٹنے کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے۔



فصل 14.16 زہر آک

سانپ کے ڈسنے کا علاج کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ زہریلا ہے یا غیر زہریلا ہے اور زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے یا نہیں۔ زہریلے سانپ کے منہ میں چھوٹے دانتوں کے علاوہ بڑے دانتوں، ٹینکس (Fangs) کا ایک جوڑ پایا جاتا ہے۔ اس لئے جب زہریلا سانپ کسی شخص کو کاٹتا ہے تو کانٹے کے مقام پر ٹینکس کی وجہ سے دو بڑے دائری سوراخ پیدا ہوتے ہیں اور چھوٹے دانتوں کے بھینے کی وجہ سے کئی چھوٹے سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔



شکل 14.18

غیر زہریلے سانپ کے کانٹے کے مقام پر
صرف چھوٹے سوراخ

شکل 14.17a, b

زہریلے سانپ کے کانٹے کے مقام پر
دو بڑے سوراخوں کے علاوہ چھوٹے سوراخ

غیر زہریلے سانپ کے منہ میں صرف چھوٹے دانت پائے جاتے ہیں یعنی بڑے دانت ٹینکس (Fangs) غیر موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے کسی شخص کو جب غیر زہریلا سانپ کاٹتا ہے تو کانٹے کے مقام پر چھوٹے دانتوں کے بھینے کی وجہ سے صرف چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں۔


زہریلے سانپ کے کانٹے کی صورت میں جب زہر متاثرہ شخص کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو مختلف علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سانپ کے کانٹے کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے۔ خون زخم سے مسلسل بہتے رہتا ہے۔ بخیر نہیں ہوتا بلکہ چند گھنٹوں تک بہتے رہتا ہے۔ کانٹے کے مقام پر سوجن ظاہر ہوتی ہے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ خاص کر سبزی مائل یا نیلے رنگ کی دکھائی دیتی ہے۔

غیر زہریلے سانپ کے کانٹے کی صورت میں متاثرہ شخص کے زخم سے خارج ہونے والا خون زخم پر فوراً بخیر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون ضائع نہیں ہوتا۔ درد خفیف سا ہوتا ہے۔ سوجن نمودار نہیں ہوتی۔ جلد کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ سانپ کے کانٹے کی وجہ سے متاثرہ شخص میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ لہذا غیر زہریلا سانپ ہو تو متاثرہ شخص کو یقین کروانا ضروری ہوتا ہے کہ کانٹے والا سانپ غیر

زہریلا ہے تاکہ اس شخص کے دل سے خوف دور ہو جائے اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اس صورت میں علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تاہم زخم کو صاف کرنا چاہئے۔ صاف پانی سے دھو دینا چاہئے اور زخم پر پٹی باندھ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسرے جراثیم داخل نہ ہو اور سرایتی ٹانوی تعدیہ سے محفوظ رہ سکے۔

زہریلے سانپ کے کاٹنے کی صورت میں یا شک کی صورت میں کہ کاٹنے والا سانپ زہریلا ہے یا غیر زہریلا ہے پہلی طبی امداد فراہم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ متاثرہ شخص کی جان کو بچایا جاسکے۔ سب سے پہلے متاثرہ شخص کو یعنی جس کو سانپ کاٹ چکا ہے تسلی دی جائے کہ موزوں اور موثر تدابیر اختیار کی جارہی ہیں تاکہ جان کو خطرہ سے بچایا جاسکے۔ فوراً کٹے ہوئے مقام سے تھوڑے فاصلہ پر دل کی جانب جسم کے اطراف دستی یا کپڑے کی پٹی کے ذریعہ مضبوطی سے باندھ دیا جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ خون دل کو نہ پہنچ سکے ورنہ خون کے ساتھ زہر بھی دل کو پہنچ جائے گا اور وہاں سے جسم کے تمام حصوں کو منتقل ہو کر متاثرہ شخص کی موت کا سبب بن جائے گا۔ لہذا اپنی کو دل کی جانب زخم سے تھوڑے فاصلہ پر مضبوطی سے باندھ دیا جانا چاہئے۔ پٹی باندھنے کا عمل صرف 15 تا 20 منٹ کے اندر ہونا چاہئے۔ باندھنے میں تاخیر نہ ہونے دیا جائے۔ پٹی باندھنے کے ذریعہ بعد کاٹنے کے مقام کے قریب جراثیم سے پاک چاقو کے ذریعہ 6 ملی میٹر گہرے چند "x" نما تراش لگائی جائے اور ان تراشوں سے خون کو باہر بہنے کا موقع دیا جائے تاکہ زہر بھی خون کے ساتھ باہر خارج ہو جائے۔ تب زخم کو صاف پانی سے دھو دینا چاہئے۔ اس کے بعد زخم پر ایک چمکی پوتا شیم پر میکلیٹ لگانا چاہئے جو زہر کے اثر کو مزید کم کرتا ہے۔

متاثرہ شخص کے زخم سے زہر کو دوسرے شخص کے ذریعہ راست منہ سے چوس کر بھی نکالا جاسکتا ہے لیکن زہر کو چوس کر نکالنے والے شخص کے منہ میں کسی بھی قسم کا زخم یا خراش نہیں ہونا چاہئے ورنہ زہر اس شخص کے خون میں سرایت کر جائیگا اور وہ بھی زہر سے متاثر ہو جائے گا۔ تاہم زہر اس طرح چوس کر نکالنا زیادہ موزوں نہیں ہوتا بلکہ زخم کے قریب کاٹ کر خون کے ساتھ زہر کو خارج کرنے کا طریقہ کافی سہل اور موزوں ثابت ہوتا ہے۔



شکل 14.19

ڈوری کا اطلاق - پٹی کول کی جانب زخم سے تھوڑے فاصلہ پر مضبوطی سے باندھنے کا طریقہ۔
پٹی کو سانپ کے ڈسے ہوئے مقام سے اوپر کچھ فاصلہ پر ہاتھ کے اطراف لپیٹنے، ایک گانٹھ لگائے،
چھڑی کو گانٹھ پر رکھیے اور مزید دو گانٹھ لگائیے، چھڑی کو اس قدر گھومائیے کہ گانٹھ مضبوط ہو جائے
اور خون کا بہنا کنٹرول میں رہ سکے۔

3.9 صحت کی ایجنسیاں (Health Agencies)

ہر انسان کو خوشحال اور ہا مقصد زندگی گزارنے کے لئے عمدہ صحت ضروری ہوتی ہے لیکن بڑھتی ہوئی آبادی، سوشلیوں کی رہائش گاہیں، ارد گرد کا آلودہ ماحول، زمین پر کوڑا کرکٹ اور فضلوں کے ذخیر کے علاوہ غیر متوازن غذا کا استعمال وغیرہ انسان کی صحت کو متاثر کرنے کا باعث بنتے ہیں اور انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ مختلف مرض زائ (Pathogens) انسان میں مہلک امراض کا سبب بنتے ہیں۔ ایک انسان میں واقع ہونے والا مرض خاندان کے تمام افراد کو متاثر کرتا ہے اور مزید وسعت اختیار کرتے ہوئے پورے دیہات یا شہر کی آبادی کو متاثر کرتا ہے۔ ایک فرد کی صحت کا خیال رکھنا اور اس کو امراض سے بچانا اور نجات دلانا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ پورے طبقے یا شہر یا دیہات کی پوری آبادی کی صحت کا خیال رکھنا اور اس کو امراض سے نجات دلانا اہم ہے۔ لہذا امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لئے مختلف ذرائع کے ذریعہ حفاظتی اور احتیاطی اقدامات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیماری سے متاثرہ افراد کے لئے سوژہ طور پر طبی سہولتوں کو فراہم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آبادی کا زیادہ حصہ دیہی علاقوں کی آبادی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لئے ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے دیہی اور شہری علاقوں کی آبادی کی صحت کے نگہداشتی نظام کو اختیار کیا ہے جن کے ذریعہ حاصل ہونے والے مقاصد درج ذیل ہیں جن پر آبادی کی بہتر صحت کا انحصار ہوتا ہے۔

(1) شرح اموات میں کمی کرنا۔

(2) بڑھتی ہوئی آبادی پر روک لگانا یعنی آبادی کے اضافہ کو کم کرنا

(3) حیات کی متوقع معیار کو بڑھا دینا

(4) تغذیائی درجہ کو فروغ دینا

(5) بنیادی سہولتوں خاص کر صفائی اور خواندگی کے لئے بہتر مواقع فراہم کرنا

(6) احتیاطی اور حفاظتی اقدامات شروع کرنا

(7) طبی سہولتوں کا فراہم کرنا

(8) آلودگی کی روک تھام کرنا۔

3.9.1 صحت کے نگہداشتی نظام کی خصوصیات

صحت کے نگہداشتی نظام کو اپنے مقاصد کے حصول کے لئے حسب ذیل خصوصیات کا حامل ہونا چاہئے۔

(1) بیماریوں کا علاج کرنے اور ان کے پھیلنے کو روکنے کی صلاحیت رکھنا چاہئے۔

(2) دیہی آبادی اور شہری آبادی کے لئے یہ نظام قابل قبول ہونا چاہئے۔

(3) اس نظام میں عوامی نمائندوں کو شریک ہونے کی اجازت دی جانی چاہئے۔

(4) علاج سستی کی کم خرچ کا ہونا چاہئے تاکہ عوام بآسانی اس کو برداشت کر سکیں۔

ہندوستان میں صحت کے نگہداشتی نظام دیہی اور شہری آبادی کی صحت میں بہتری پیدا کرنے کے لئے اہم خدمات کو انجام

دیتے۔ اس سبق میں صحت کے نگہداشتی نظام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

(1) دواخانے (Hospitals)

ہندوستان کے دیہی اور شہری علاقوں میں صحت کے نگہداشتی نظام کا ایک بڑا حصہ دواخانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دواخانے دو قسم کے

ہوتے ہیں (a) خانگی دواخانے اور (b) سرکاری دواخانے۔ اس سبق میں سرکاری دواخانوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

دیہی آبادی کے مسائل شہری آبادی کے مسائل سے مختلف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے صحت کی نگہداشتی ضرورتوں کی نوعیت بھی مختلف

ہوتی ہے۔ ان ضرورتوں کی تکمیل کے لئے حکومت کی جانب سے مختلف صحت کے نگہداشتی نظام کو قائم کیا گیا ہے جن کو ذیل میں بیان کیا

جا رہا ہے۔

(a) دیہی حفاظتی نظام صحت (Rural Health Care System)

ہمارے ملک کی بیشتر آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ اس آبادی کی صحت کی حفاظت کے لئے مختلف حفاظتی نظام قائم کئے گئے ہیں جو اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ان میں حسب ذیل نظام شامل ہیں۔

(i) دیہی رہنمائے صحت (Village Health Guide)

دیہی رہنمائے صحت ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک چھوٹے طبقہ میں سماجی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے۔ یہ حکومت کا تقرر کردہ ملازم نہیں ہوتا بلکہ اس کو حکومت کی جانب سے علاقائی تجوہ کے طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے۔ اس کا انتخاب طبقہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس رہنمائے صحت کو خاص تربیت دی جاتی ہے اور اس کو کچھ ادویات فراہم کی جاتی ہیں جس کے ساتھ ان ادویات اور علاج معالجہ سے متعلق ضروری معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔

دیہی رہنمائے صحت کے فرائض

(1) مختلف حادثات کے لئے پہلی طبی امداد کو فراہم کرنا۔

(2) سادہ امراض کا علاج و معالجہ کرنا۔

(3) حفظان صحت، ماں اور بچہ کی نگہداشت۔ سے متعلق معلومات فراہم کرنا۔

(4) چھوٹے کنبہ کے اصول کے فوائد سے آگاہ کرنا۔

(ii) مقامی دایہ

دیہی علاقوں میں عموماً روایتی طریقہ پر حاملہ عورتوں کی زچگیاں مکان میں ہی ہوتی ہیں۔ ایسی خاتون جو حاملہ عورتوں کی زچگیاں انجام دیتی ہے دایہ کہلاتی ہے۔ دایہ عموماً غیر تعلیم یافتہ اور غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ یہ زچگی سے متعلق سائنسی طریقہ اور دیگر معلومات سے نا آشنا ہوتی ہے۔ اس کو ماں اور بچہ کی صحت کی نگہداشت کا خیال نہیں رہتا اور زچگی کے وقت واقع ہونے والی پیچیدگیوں پر قابو پانے سے بھی یہ قاصر رہتی ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتی علاقوں میں شرح اموات زیادہ ہوتی ہے۔ حکومت نے ان حالات پر قابو پانے کے لئے دیہی علاقوں میں صحت کی اسکیم کو شروع کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت دایوں کو نہ صرف حاملہ عورتوں کی زچگیاں انجام دینے کے لئے سائنسی طریقہ کی تربیت دی جا رہی ہے بلکہ ماں اور بچہ کی صحت کی نگہداشت اور زچگی کے دوران بسا اوقات واقع ہونے والی پیچیدگیوں سے متعلق ضروری معلومات فراہم کی جا رہی ہیں جس کا مقصد شرح اموات میں کمی پیدا کرنا ہے۔ اس طرح تربیت یافتہ

دائیں چھوٹے کنیوں کی دیکھ بھال سے متعلق اصولوں کی اشاعت اور ان کی خوشحال زندگی کو فروغ دینے میں نمایاں رول ادا کر رہی ہیں۔

(iii) آنگن واڑی کارندے

دیہی علاقوں میں چھوٹے کنبے مخصوص مثن میں گزر بسر کرتے ہیں۔ ایسے مخصوص محل کو آنگن واڑہ کہا جاتا ہے۔ حکومت ان کنیوں کی آبادی کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لئے مختلف اسکیموں کو رو بہ عمل لاتی ہے۔ ان میں اتمای برائے اطفال نشوونما اسکیم (انٹیکر ٹینڈ ڈیولپمنٹ اسکیم Integrated Child Development Scheme) بھی ہے جس کے تحت آنگن واڑی کارندے مقرر کئے جاتے ہیں۔ ہر ایک ہزار کی آبادی کے لئے ایک آنگن واڑی کارندہ منتخب کیا جاتا ہے جس کو آبادی کے مختلف پہلوؤں جیسے صحت، تغذیہ، بچوں کی نشوونما کو فروغ دینے سے متعلق ضروری معلومات کے ساتھ خاص تربیت دی جاتی ہے۔ آنگن واڑی کارندے کے فرائض حسب ذیل ہیں:

(a) صحت کی نگہداشت کے لئے مسلسل طبی جانچ انجام دینا۔

(b) بچوں میں مختلف امراض سے مدافعت پیدا کرنے کے لئے ٹیکہ اندازی کو انجام دینا۔

(c) صحت کی نگہداشت سے متعلق معلومات فراہم کرنا۔

(d) غیر رسمی ابتدائی تعلیم کے لئے اسکوئی تعلیم فراہم کرنا۔

(iv) دیہی دواخانے (Rural Hospitals)

دیہی علاقوں میں رہنے والی آبادی عموماً معاشی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے۔ انھیں اپنے معمولی مسائل کے حل کے لئے اضلاع اور شہروں کو جانا کافی دشوار ہوتا ہے۔ طبی امداد حاصل کرنے کی غرض سے بھی یہ لوگ اضلاع یا شہروں کو نہیں جاسکتے۔ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے دیہی علاقوں میں دواخانے قائم کئے جاتے ہیں جن کا مقصد دیہی عوام کو طبی خدمات فراہم کرنا ہوتا ہے۔

v ذیلی مرکزی دواخانے (Sub-Centre Hospitals)

دیہی علاقوں میں 3000 تا 5000 کی آبادی کے لئے قائم کئے گئے دواخانے ذیلی مرکزی دواخانے کہلاتے ہیں۔ ہر ایک دواخانہ ایک عورت اور ایک مرد کے زیر نگرانی ہوتا ہے۔ ان ذیلی دواخانوں کے فرائض حسب ذیل ہیں۔

(a) صحت کی نگہداشت کرنا۔

(b) طبی امداد حاصل کرنے کے متعلق معلومات مہیا کرنا۔

(c) ٹیکہ اندازی کے ذریعہ ماسونیاتی پروگرامس کو انجام دینا۔

(vi) ابتدائی مراکز صحت (Primary Health Centres)

دیہی علاقوں کی آبادی کی ابتدائی صحت کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے مقصد سے ہر ایک لاکھ آبادی کے لئے ایک ابتدائی مرکز صحت کو قائم کیا جاتا ہے۔ ایک ابتدائی مرکز صحت تقریباً 100 دیہاتوں کا احاطہ کرتا ہے جو ایک میڈیکل آفسر، بلاک توسیعی معلم (Block Extension Educator) ایک لیڈی ہیلتھ اسسٹنٹ (Female Lady Health Assistant)، ایک کمپونڈر (Compounder)، ایک ڈرائیور اور ایک لیبارٹری ٹیکنیشن (Laboratory Technician) کے زیر نگرانی ہوتا ہے۔ اس مرکز صحت میں ایک جیب اور معمولی قسم کی جراحی کی سہولتیں بھی مہیا ہوتی ہیں۔

ابتدائی مراکز صحت کے فرائض حسب ذیل ہیں۔

- عوام کو طبی امداد فراہم کرنا۔
- ماں اور بچے کی صحت کی نگہداشت کرنا۔
- خاندانی منصوبہ کو انجام دینا۔
- مقامی امراض پر قابو پانا۔
- مختلف امراض کے پھیلنے کو روکنے کے لئے انسدادی اقدامات کو رو بہ عمل لانا۔
- امراض سے متاثرہ اشخاص کی مردم شماری کرنا اور اس سے متعلق شماریاتی معلومات فراہم کرنا۔
- تعلیم صحت پر خصوصی توجہ دینا۔
- دایہ اور رہنمائے صحت کو درکار تربیت فراہم کرنا۔
- لیبارٹری کی بنیادی ضروریات کی تحقیقات کرنا۔
- لیبارٹری کی کارکردگی پر توجہ دینا۔

(viii) کمیونٹی مراکز صحت (Community Health Centres)

دیہی علاقوں میں کمیونٹی مراکز صحت عوام کی طبی خدمات کرتے ہیں۔ ہر ایک لاکھ آبادی کے لئے ایک کمیونٹی مرکز صحت ہوتا ہے جس کے تحت 100 بستر پر مشتمل دوا خانہ طبی خدمت کو انجام دیتا ہے۔ اس دوا خانہ میں بنیادی ضروریات کے علاوہ ادویات اور سرجری کے ماہر ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اس دوا خانہ میں ایکس رے (X-Ray) کی سہولتوں کے علاوہ پیچیدہ امراض کے علاج و معالجہ اور آپریشن کی

تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں

(b) شہری مراکز نگران صحت (Urban Health Care Centre)

شہری آبادی کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کے مقصد سے ضلعی دواخانے قائم کئے جاتے ہیں۔ یہ دواخانے ضلع کے مستقر پر واقع ہوتے ہیں۔ متعلقہ ضلع یا کسی بھی دوسرے ضلع یا ملک کے کسی بھی حصہ سے تعلق رکھنے والے مریض ان دواخانوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دواخانے عموماً عصری سہولتوں سے لیس رہتے ہیں۔ ان میں کئی مختلف طبی شعبہ جات کے ماہر سرجنس (Surgeons) ڈاکٹرس، کمپوٹررس، نرسس، کلینکی ماہرین موجود رہتے ہیں۔ ان دواخانوں میں علاج و معالجہ کی تمام بنیادی ضروریات فراہم کی جاتی ہیں۔ شہری دواخانے دو قسم کے ہوتے ہیں جن میں (a) بعض دواخانے صرف بیمار یوں کے علاج کے لئے مخصوص ہوتے ہیں اور (b) تدریسی دواخانے جو میڈیکل کالجوں سے ملحقہ رہتے ہیں جن میں تدریس کا انتظام رہتا ہے۔ یہاں ڈاکٹرس اور نرسوں کو طبی تربیت دی جاتی ہے۔

شہری اور دیہی علاقوں کی آبادی کی صحت کی نگہداشت ضروریات کی تکمیل حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے متذکرہ بالا مختلف نظام کے علاوہ دیگر خانگی تنظیموں کے ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ ان میں بعض رضا کارانہ تنظیمیں جیسے ایڈمین ریڈ کراس سوسائٹی دیہی اور شہری علاقوں میں دواخانے قائم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایلو پیتھی، ہومیو پیتھی، آیورویڈک اور یونانی ڈاکٹرس بھی اپنے طریقہ علاج و معالجہ کے ذریعہ مختلف امراض کا علاج کرتے ہیں۔ تاہم یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک تربیت یافتہ شخص یا ڈاکٹر سے ہی رجوع ہوں۔ غیر سند یافتہ یا عطائی نیم حکیم سے بیماری کے علاج کروانے میں زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے۔

4 سبق کا خلاصہ

- ☆ پہلی طبی امداد سے مراد کسی حادثہ یا بیماری سے متاثرہ شخص کو فوری عارضی طور پر پہنچائی جانے والی امداد ہے۔
- ☆ پہلی طبی امداد کا مقصد متاثرہ شخص یعنی مریض کی زندگی کو بچانا، درد اور تکلیف سے نجات دلانا، مریض کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے میں مدد کرنا ہے۔
- ☆ پہلی طبی امداد کو فراہم کرنے کے لئے اختیار کئے جانے والے تمام مرحلوں کو بلا خوف سلسلہ اور انجام دینا چاہئے۔
- ☆ دینے کے دوران متاثرہ شخص کے ناک، منہ، حلق کے راستہ سے پانی پیچھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے اور کچھڑا کوئی شے بھی

داخل ہوتی ہے۔ لہذا غرقاب شخص کے لئے پہلی طبی امداد میں تنفسی راستوں کی صفائی، پیچھڑوں سے پانی کو خارج کرنا، شخص کو بحال کرنے کے لئے مصنوعی دم براری اور مصنوعی دم درکشی کو اختیار کرنا شامل ہیں۔

- ☆ شکستہ بڑیوں کی اقسام میں سادہ شکستگی، مرکب شکستگی، پیچیدہ شکستگی، مفت شکستگی، متضاد شکستگی، اور سبز ہڈی کی شکستگی شامل ہیں۔
- ☆ شکستگی کے لئے پہلی طبی امداد میں متاثرہ شخص کو حرکت دینے سے گریز کرنا، زخم کو صاف کرنا، خون کے بہنے کو روکنا، متاثرہ جوارج کو کٹری کی چیزوں سے سہارا دینا یا باندھنا کا استعمال کرنا وغیرہ شامل ہیں۔

- ☆ لوٹکنے پر پہلی طبی امداد کا مقصد جسم میں درکار نمکیات کے ارتکاز کو دوبارہ قائم کرنا تاکہ دوبارہ باز آبیگی پیدا ہو سکے اور تازہ بیدگی (Dehydration) سے بچاؤ ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص کو 0.9 فی صد سوڈیم کلورائیڈ کا محلول یا الکترولٹ کا محلول پلایا جانا چاہئے۔
- ☆ آفتاب زدگی کے لئے پہلی طبی امداد کا مقصد بخار میں قابل لحاظ کمی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جسم کو بھیکے ہوئے کپڑے سے پونچھا اور بھیکے ہوئے کپڑے سے ڈھانکنا چاہئے۔ یہ تدابیر جسم کی پیش کو 101°F تا 102°F تک کم کرنے تک جاری رکھنا چاہئے۔

- ☆ سانپ کے ڈسنے پر پہلی طبی امداد کا اصل مقصد متاثرہ شخص کے جسم میں داخل ہونے والے زہر کو مکمل طور پر جتنا جلد ممکن ہو سکے خارج کرنے کے لئے تدابیر اختیار کرنا ہوتا ہے۔
- ☆ ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے دیہی اور شہری علاقوں کی آبادی کی صحت کے نگہداشتی نظام کو اختیار کیا ہے جس کا مقصد ان علاقوں کی آبادی کی صحت میں بہتری پیدا کرنے کے لئے اہم اقدامات کو انجام دیتا ہے
- ☆ صحت کی نگہداشتی نظام کا بڑا حصہ خانگی اور سرکاری دوا خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
- ☆ دیہی حفاظتی نظام صحت کے تحت دیہی رہنمائے صحت مقامی دایہ آنگن واڑی کارندے دیہی دوا خانے، ذیلی مرکزی دوا خانے، ابتدائی مراکز صحت اور کیونٹی مراکز صحت اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔

شہری مراکز نگران صحت کے تحت قائم کئے گئے شہری دوا خانے دوا اقسام کے ہوتے ہیں جن میں (i) دوا خانے جو صرف بیماریوں کے علاج کے لئے مخصوص ہوتے ہیں اور (ii) تدریسی دوا خانے جو میڈیکل کالجوں سے ملحقہ ہوتے ہیں جن میں تدریسی کام انجام دیا جاتا ہے۔

5 نمونہ امتحانی سوالات



5.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) پہلی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟
- (2) پہلی طبی امداد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
- (3) غرقاب شخص کے جسم کے کس حصے میں پانی جمع ہو جاتا ہے؟
- (4) ہڈیوں کی شکستگی کی اقسام کی فہرست مرتب کیجئے؟
- (5) سبز بنی کی شکستگی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟
- (6) کس جسم کی شکستگی میں ہڈی ایک سے زائد مقامات پر ٹوٹتی ہے؟
- (7) دیہی رہنما صحت کون ہوتا ہے؟
- (8) آئگن دائرہ سے کیا مراد ہے؟
- (9) کتنی آبادی کے لئے ذیلی مرکزی دواخانے قائم کئے جاتے ہیں؟
- (10) تابدگی (Dehydration) سے کیا مراد ہے؟

5.2 طویل جوابی سوالات

- (1) پہلی طبی امداد کی کامیابی کے لئے کون سے اصولوں کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے؟
- (2) پہلی طبی امداد پہنچانے کے لئے ضروری ہدایات کی فہرست مرتب کیجئے۔
- (3) غرقاب شخص کو پہلی طبی امداد فراہم کرنے کے دوران مصنوعی دم براری اور مصنوعی دم درکشی کو کس طرح انجام دیا جاتا ہے؟
- (4) شکستگی کی اقسام کونسی ہیں؟ ہر ایک کی تشریح کیجئے۔
- (5) شکستگی کی علامتیں بیان کیجئے۔
- (6) شکستگی کے لئے پہلی طبی امداد کس طرح دی جاتی ہے؟
- (7) لو لگنے سے ظاہر ہونے والی علامتوں کو بیان کیجئے اور اس سلسلہ میں پہلی طبی امداد کس طرح پہنچائی جاتی ہے؟ تشریح کیجئے۔

- (8) زہریلے اور غیر زہریلے سانپوں کے کاٹنے سے ظاہر ہونے والی علامتوں کا مقابل کیجئے۔
- (9) آفتاب زدگی کی علامتیں اور پہلی طبی امداد کو بیان کیجئے۔
- (10) زہریلے سانپوں کے ڈسنے کی صورت میں پہلی طبی امداد کس طرح پہنچائی جاتی ہے؟ بیان کیجئے۔
- (11) دیہی رہنمائے صحت کو نئے ہوتے ہیں اور اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ بیان کیجئے۔
- (12) ذیل پر مختصر نوٹ لکھئے۔

(a) مقامی دایہ

(b) آنگن داڑی کارندے

(13) ابتدائی مراکز صحت اور اس کے فرائض پر ایک نوٹ لکھئے۔

(14) شہری مراکز گران صحت کی اہمیت کو بیان کیجئے۔

5.3 معروضی سوالات

5.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے

- (1) پہلی طبی امداد کو..... نای سائنسدان نے دریافت کیا۔
- (2) غرقاب شخص کو پہلی طبی امداد پہنچانے کے دوران مصنوعی دم براری اور مصنوعی دم درنشی کو.....
مرتبہ فی منٹ کی شرح پر تنفس بحال ہونے تک دہرایا جانا چاہئے۔
- (3) قسم کی شگستگی میں ہڈی ایک سے زائد مقامات پر ٹوٹتی ہے۔
- (4) اسکیم کے تحت آنگن داڑی کارندے مقرر کئے جاتے ہیں۔
- (5) دیہی علاقوں میں..... کی آبادی کے لئے قائم کئے جانے والے دواخانے
ذیلی مرکزی دواخانے کہلاتے ہیں۔

5.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے

- (1) زہریلے سانپ کے منہ میں کس قسم کے دانت پائے جاتے ہیں؟
- (a) چھوٹے دانت (b) صرف بڑے دانت (Fangs)

- (c) چھوٹے دانتوں کے علاوہ ایک جوڑ بڑے دانت یعنی فینکس (Fangs)
- (d) دانت نہیں پائے جاتے
- (2) دموئی پاش سم (Haemolytic Toxin) جسم میں کس حصے پر اثر کرتا ہے؟
- (a) عصبی نظام (b) بصری عصب (c) فریک عصب (Phrenic Nerve)
- (d) دموئی جیسوں اور خون کی نالیوں
- (3) عصبی سم (Neurotoxin) کسی نظام پر اثر کرتا ہے؟
- (a) عصبی نظام (b) دموئی جیسے (c) دموئی وعادوں
- (d) عصبی نظام اور دموئی وعادوں دونوں پر
- (4) سمندری زہریلا سانپ کونسا ہے؟
- (a) Vipper (b) کریت (krait) (c) کنگ کوبرا (King Cobra)
- (d) ہینڈریٹ (Enhydrina)
- (5) زہر غدود کو نئے غدود کی تبدیل شدہ شکل ہے؟
- (a) نقیہ غدود (Parotid Glands) (b) پسینہ کے غدود (Sweat glands)
- (c) مخاطی غدود (Mucous Glands) (d) a اور c دونوں

5.3.3 جوڑیاں لگائیے

B	A
() 100 بستروں پر مشتمل دواخانہ	(1) شہسلی کا مقام
() ایک لاکھ کی آبادی کے لئے	(2) بڑی ڈنٹری نہیں بلکہ مڑ جاتی
() ہم حرارتی	(3) کھل یا جزوی طور پر ہڈی کا ٹوٹنا
() سبز بنی کی شہسلی	(4) کمیونٹی مراکز صحت کے تحت
() ایک ہزار کی آبادی کے لئے	(5) ابتدائی مراکز صحت کا قیام

- (6) آئنگن واڑی کارندہ () چڑاہٹ کی آواز
- (7) انسان () اندھاپن
- (8) آفتاب زدگی () ذیلی مرکزی دواخانے
- (9) ٹیکہ اندازی کے ذریعہ مامونیاتی پردگرام () سادہ شکل
- (10) عصی سم () $105^{\circ} F$ تا $107^{\circ} F$ بخار

سبق 15 اندھا پن یا نابینائی کا انسداد

(Prevention Of Blindness)

- 1 سبق کا خاکہ
- 2 تمہید
- 3 سبق کا متن
- 3.1 انسداد اندھا پن یا نابینائی کی روک تھام
- 4 خلاصہ
- 5 نمونہ امتحانی سوالات
- 5.1 مختصر جوابی سوالات
- 5.2 طویل جوابی سوالات
- 5.3 معروضی سوالات
- 5.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے
- 5.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے
- 5.3.3 جوڑیاں لگائیے

1 سبق کا خاکہ

اس سبق میں آپ انسداد اندھا پن یا نابینائی کی روک تھام (Prevention Of Blindness) کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔


2 تمہید

پچھلے سبق میں آپ پہلی طبی امداد سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ انسانوں میں انسداد اندھا پن یا نابینائی کی روک تھام سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے چونکہ آنکھ ایک اہم حسی عضو ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس سبق کے مطالعہ کے ذریعہ آپ بخوبی سمجھ سکیں گے کہ اندھا پن کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر کس طرح قابو پایا جاسکتا ہے خاص کر ہماری غذاؤں میں کس طرح کی مناسب تبدیلی کس طرح اندھا پن کے خاتمہ کو یقینی بنا سکتی ہے۔


3 سبق کا متن

3.1 انسداد اندھا پن یا نابینائی کی روک تھام (Prevention of Blindness)

آنکھ ایک ضیائی مصلہ عضو (Photoreceptor) ہے جس کا شمار اہم حسی اعضاء میں کیا جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو دیکھنے کے لئے آنکھوں کی بصارت کو نقصان سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ آنکھ کی اندرونی پرت شبکیہ (Retina) میں مخصوص خلیے عصائے (Rods) اور مخروطے (Cones) پائے جاتے ہیں۔ یہ خلیے بصارت کو ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عصاؤں میں بصارتی صبغہ پایا جاتا ہے جس کو رہوڈاپسن (Rhodopsin) کہا جاتا ہے۔ جب کہ مخروطوں میں آئیوڈاپسن (Iodopsin) نامی صبغہ پایا جاتا ہے۔ رات یا کم روشنی میں دیکھنے کے لئے عصاؤں میں رہوڈاپسن ضروری ہوتا ہے جب کہ دن کی روشنی میں دیکھنے کے لئے آئیوڈاپسن ضروری ہوتا ہے۔ ان صبغوں کی تیاری ان ہی خلیوں میں انجام پاتی ہے جس کے لئے حیاتین اے (Vitamin A) درکار ہوتا ہے۔ حیاتین اے کی کمی ان بصارتی صبغوں کی تیاری کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے اندھا پن واقع ہوتا ہے۔



شکل 15.1
انسانی آنکھ کی ساخت



شکل 15.2
عصاء (Rod) اور مخروط (Cone)

اندھا پن زندگی کے کسی بھی عمر میں واقع ہو سکتا ہے۔ مختلف امراض کی وجہ سے بھی بالعموم میں اندھا پن واقع ہوتا ہے۔ خاص کر ذیابیطس (Diabetics) سبز موتیا (Glaucoma) اور موتیا بند (Cataract) جیسے امراض کی وجہ سے آنکھوں کی بصارت ضائع ہو جاتی ہے اور اندھا پن واقع ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں بصارت مستقل طور پر ضائع ہو جاتی ہے جس کو دوبارہ بحال کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں ضائع شدہ بصارت کو علاج کے ذریعہ دوبارہ بحال کر دیا جاسکتا ہے۔ تاہم بصارت کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ غربت اور ناقص تغذیہ خاص کر زرخیز و نامناسب کی صحت پر مختلف اقسام کے اثرات مرتب کرنے کے باعث بنتے ہیں۔ غذا میں پروٹین، حیاتین اور معدنیات کی کمی انسانوں میں تغذیائی قلتی امراض پیدا کرتے ہیں جو بصارت کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ہندوستان میں ناقص تغذیہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے اور اس سے پیدا شدہ مختلف مسائل کو حل کرنے کے مقصد سے قومی تغذیائی پالیسی (National Nutritional Policy) کو قائم کیا گیا ہے جو سرگرم ہے۔

ناقص تغذیہ میں پروٹین اور خاص کر حیاتین اے کی قلت ایک اہم مسئلہ ہے۔ حیاتین اے کی کمی بصارت کے ضائع ہونے کا باعث بنتی ہے۔ خاص کر ہمارے ملک کی آبادی کا 12 تا 15 فی صد حصہ کم عمر کے گروہوں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے تقریباً 7 ملین بچے حیاتین اے کی قلت کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی بینائی سے محروم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق غذا میں حیاتین اے کی قلت کی وجہ سے تقریباً 60,000 بچے سالانہ بینائی سے محروم ہوتے ہیں۔ غذا میں حیاتین اے کی مستحکم کمی یا قلیل مدتی کمی بصارت کو متاثر کرتی ہے۔ بصارت میں کمی جیسی ابتدائی علامتوں پر فوری توجہ نہ دی جائے تو بالآخر اندھا پن واقع ہوتا ہے۔ لہذا غذا میں حیاتین اے کی قلت کے باعث واقع ہونے والے اندھے پن (Blindness) کا خاتمہ (Eradication) ہمارا قومی مقصد ہے۔ کس بچوں، جوانوں، بوڑھوں، حاملہ عورتوں اور دودھ دینے والی ماؤں کے لئے حیاتین سے بھرپور غذائیں فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے بچوں، والدین اور سماج میں تحریک پیدا کرنا بھی ضروری ہے جس کے لئے کئی ایجنسیاں قائم کی گئی ہیں۔ تعلیم کے ذریعہ بھی اسکولی بچوں کو حیاتین اے اور موزوں غذا کی اہمیت سے واقف کراتے ہوئے اندھے پن پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اندھے پن کے خاتمہ کے لئے مختلف ذرائع جیسے مادری مراکز صحت (Maternal Health Centres) ابتدائی طبی مراکز، دیہی رہنما، سماجی لیڈرس، آنگن واڑی کارندے، مقامی دایہ وغیرہ عوام میں شعور پیدا کرتے ہوئے مختلف لائحہ عمل کو رو بہ عمل لانے میں کافی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ نیز اس مقصد کے حصول کے لئے ٹی۔وی، ریڈیو اور پوسٹرس کے ذریعہ بھی مختلف پروگرامس کی تشہیر کی جاسکتی ہے۔

بچوں کی شب کوری (Night Blindness) سے محفوظ رکھنے کے لئے حیاتین اے سے بھرپور غذاؤں کا پابندی سے استعمال

ضروری ہوتا ہے۔ حیاتین اے سے بھرپور غذائیں جیسے انڈے، دودھ، گھی، پھل، کاجو، تیل، ہیز، ترکاریاں، سرخ لوبی، پالک، گاجر، سوجنی کی پھل، پپائی اور آم وغیرہ پابندی سے بطور غذا استعمال کرنی چاہئے۔ جس سے اندے پن کا نہ صرف خاتمہ ہوگا بلکہ ہماری تغذیائی معیار میں بھی قابل لحاظ حد تک اضافہ ہو جائے گا۔

حیدرآباد میں واقع قومی ادارہ تغذیہ (National Institution of Nutrition) نے بچوں میں انسداد شب کوری کے لئے حیاتین اے کی کثیر خوراک دینے کے طریقے کو ایجاد کیا ہے۔ اس ادارہ نے شب کوری سے محفوظ رکھنے کے لئے حیاتین اے کی 2,00,000 IU یا 60,000 مائکروگرامس مقدار کو تجویز کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ سنٹر (Indian Council of Medical Centre) نے بھی بچوں کو شب کوری سے محفوظ رکھنے کے لئے حیاتین اے کی 20,000 IU مقدار کے خوراک تجویز کی ہے۔

جدول 1 ہندوستان کے لئے تجویز کردہ حیاتین اے کا یومیہ خوراک۔

گروہ (Groups)	ریٹینول (Retinol) mg	حیاتین اے (vitamin A) بیٹا کیروٹین (β Carotene) mg
مرد (Man)	600	2400
عورت (Woman)	600	2400
حاملہ عورت (Pregnant woman)	600	2400
دودھ دینے والی عورت (Lactating Woman)	950	3800
بچے (6 تا 12 ماہ)	300	1200
بچے (1 تا 6 سال عمر)	400	1600
بچے (7 تا 12 سال عمر)	600	2400
بالغ	600	2400

- ☆ آنکھ ایک ضیائی محصلہ عضو ہے۔
- ☆ عصائے اور مخروط طے بصارت کے ذمہ دار خلیے ہوتے ہیں جو آنکھ کی اندرونی پرت شبکیہ (Retina) میں پائے جاتے ہیں۔
- ☆ عصائے میں رہوڈوپسن نامی بصارتی صبغہ موجود ہوتا ہے جو کم روشنی میں بصارت کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے۔
- ☆ مخروط طے میں آئیوڈوپسن نامی بصارتی صبغہ ہوتا ہے جو دن کی روشنی میں بصارت کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے۔
- ☆ بصارتی صبغوں کی تیاری کے لئے حیاتی اے درکار ہوتا ہے۔
- ☆ حیاتی اے کی قلت بصارتی صبغوں کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے اندھا پن واقع ہوتا ہے۔
- ☆ ذیابیطیس، ہیزموتیا اور موتیا بند جیسے امراض کی وجہ سے بالوں میں اندھا پن واقع ہوتا ہے۔
- ☆ زیرغذا و نما بچوں میں غربت اور ناقص تغذیہ جیسے غذا میں پروٹین، حیاتی اے اور معدنیات کی کمی بصارت کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔
- ☆ ناقص تغذیہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لئے قومی تغذیائی پالیسی کو قائم کیا گیا ہے۔
- ☆ اندھا پن کے خاتمہ کے لئے مختلف ذرائع مادی مراکز صحت ابتدائی طبی مراکز، دیہی رہنما، سماجی رہنما، آنگن واڑی کارندے، مقامی دایہ کافی مدد معاون ہوتے ہیں۔
- ☆ بچوں کو شب کوری سے محفوظ رکھنے کے لئے حیاتی اے سے بھرپور غذائیں جیسے انڈا، دودھ، گھی، مچھلی کا جگر، تیل، ہیزترکاریاں، سرخ لوکی، پالک، سوجنی کی پھلیاں، گاجر، پیائی اور آم وغیرہ پابندی سے بطور غذا استعمال کرانی چاہئے۔
- ☆ ICMR کے مطابق بچوں میں انسداد اندھا پن کے لئے 20,000 IU حیاتی اے کی مقدار تجویز کی گئی ہے۔
- ☆ قومی ادارہ تغذیہ نے بچوں میں انسداد شب کوری کے لئے حیاتی اے کے 2,00,000 IU یا 60,000 تا 60,000 گرام پر مشتمل خوراک تجویز کی ہے۔



5.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) آنکھ کی اندرونی پرت میں کون سے اہم خلیے پائے جاتے ہیں؟
- (2) بصارتی صفوں کی تیاری کن خلیوں میں انجام پاتی ہے؟
- (3) عموماً کس قسم کے امراض بالعموں میں اندھا پن کا سبب بنتے ہیں؟
- (4) ہندوستان میں ناقص تغذیہ کے پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لئے کونسی پالیسی کو قائم کیا گیا ہے؟
- (5) اندھا پن کے خاتمہ کے لئے کون سے اہم ذرائع قابل ذکر ہیں؟
- (6) حیاتی اے سے بھرپور غذائیں کونسی ہیں؟ ان کے نام لکھیے۔

5.2 طویل جوابی سوالات

- (1) اندھا پن سے محفوظ رہنے کے لئے آنکھ کی اندرونی پرت کی اہمیت کی وضاحت کیجئے۔
- (2) بالعموں اور بچوں میں اندھا پن کے مختلف اسباب پر بحث کیجئے۔
- (3) ہمارے ملک کی آبادی میں حیاتی اے کی قلت کے باعث اندھا پن کا تجزیہ کس طرح ہے؟ تفریح کیجئے۔
- (4) انسداد اندھا پن میں حیاتی اے کی اہمیت پر ایک مضمون لکھیے۔

5.3 معروضی سوالات

5.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

- (1) رات کی روشنی میں بصارت کے لئے _____ نامی بصارتی صدف ضروری ہے۔
- (2) رات یا کم روشنی میں بصارت کے لئے _____ نامی بصارتی صدف ضروری ہے۔
- (3) دودھ دینے والی عورت کے لئے تجویز کردہ حیاتی اے کا یومیہ خوراک _____ ہے۔
- (4) ICMR کے مطابق بچوں کو انسداد اندھا پن کے لئے حیاتی اے کی _____ مقدار دیا جانا چاہئے۔
- (5) رتوڈ ایسن اور آئیڈ ایسن کی تیاری بالترتیب _____ اور _____ خلیوں میں انجام پاتی ہے۔

5.3.2 متن جواب نی متا مدرن تپ

- (1) عصائے (Rods) اور مخروطے (Cones) آنکھ کے کس پرت میں پائے جاتے ہیں؟
 (a) شبکیہ (Choroid) (b) شبکیہ (Retina) (c) صلبیہ (Sclerotic)
 (2) اندھا پن زندگی کی کس عمر میں واقع ہوتا ہے؟
 (a) صرف 10 سال کی عمر میں (b) 10 تا 15 سال کی عمر کے دوران
 (c) 40 سال کی عمر کے بعد (d) زندگی کے کسی بھی عمر میں
 (3) غذا میں کس حیاتین کی قلت اندھا پن کا سبب بنتی ہے؟
 (a) حیاتین بی (b) حیاتین سی (c) حیاتین اے (d) حیاتین ڈی
 (4) آنکھ کو کس قسم کا عضو کہا جاتا ہے؟
 (a) کیمیائی مصلہ (b) ضیائی مصلہ (c) لمسی مصلہ (d) شمی مصلہ
 (5) اعزین کونسل آف میڈیکل ریسرچ سنٹر نے بچہ کو شب کوری سے محفوظ رکھنے کے لئے حیاتین اے کی کتنی مقدار تجویز کی ہے۔
 (a) 20,000 I.U. (b) 600 I.U. (c) 60,000 mg
 (6) آنکھ کس قسم کا عضو ہے؟
 (a) ضیائی محاصلہ (Photoreceptor) (b) کیمیائی محاصلہ (Chemoreceptor)
 (c) مذکورہ بالا میں سے کوئی نہیں
 (7) آنکھ کے شبکیہ میں پائے جانے والے مخروطوں میں کیا پایا جاتا ہے؟
 (a) آئیڈوپسن (Iodopsin) (b) روڈاپسن (Rhodopsin)
 (c) تھیراکسن (Thyroxin)

5.3.3 جوڑیاں لگائیے

B	A
قوی تغذیائی پالیسی	بصارتی صیغوں کی تیاری
()	(1)

- () عصا اور خرد ط (2) ناقص تغذیہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ
- () حیاتین " اے " فکیہ (3)
- () حیدر آباد (4) حیاتین " اے " سے بھرپور
- () مچھلی کا جگر بنی تیل (5) قومی ادارہ تغذیہ

سبق 16 توانائی کی دنیا (World of Energy)

1	سبق کا خاکہ
2	تمہید
3	سبق کا متن
3.1	توانائی کی تعریف
3.2	توانائی کا حساب لگانا
3.3	توانائی کی مختلف اقسام
3.4	جائدار عضویوں میں توانائی کی تبدیلی
3.4.1	توانائی کی منتقلی
3.4.2	توانائی کا استحصال
3.5	اساسی تحولی شرح
3.6	ماحولیاتی نظام میں توانائی کا بہاؤ
3.6.1	ماحولیاتی نظام کی پیداواری
3.7	حیاتی کیت بطور حیاتی ایندھن
3.7.1	سوشل فاریٹری
3.7.2	غیر رواجی توانائی کے ذرائع
4	خلاصہ
5	زائد معلومات

فرہنگ	6
نمونہ امتحانی سوالات	7
7.1 مختصر جوابی سوالات	
7.2 طویل جوابی سوالات	
7.3 معروضی سوالات	
7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے	
7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے	
7.3.3 جوڑیاں لگائیے	

1 سبق کا خاکہ



اس سبق میں آپ حسب ذیل عنوانات کے تحت معلومات حاصل کریں گے۔

- ☆ توانائی کی تعریف
- ☆ کام اور توانائی
- ☆ توانائی کی مختلف شکلیں
- ☆ توانائی کا استعمال
- ☆ زندہ عضویوں کے لئے درکار توانائی
- ☆ اساسی تحولی شرح
- ☆ ماحولیاتی نظام میں توانائی کا تعلق
- ☆ حیاتی کیت بطور حیاتی ایندھن
- ☆ غیر رواجی توانائی کے ذرائع

2 تمہید



پچھلے سبق میں آپ انسداد اندہ حاپن سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں آپ توانائی کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے چوں کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر نظام کی کارکردگی کا انحصار توانائی پر ہی ہوتا ہے۔ جاندار عضویوں کو اپنی جہاں زندہ گی کے لئے بھی توانائی درکار ہوتی ہے۔ توانائی سے مراد "کام کرنے کی بالقوہ صلاحیت ہے"۔ فطرت میں توانائی کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ مختلف افعال کو انجام دینے کے لئے توانائی کی مخصوص مقدار درکار ہوتی ہے۔ نیز ہم توانائی کی مختلف شکلوں کو اپنی روزمرہ زندہ گی میں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ہم حیاتی کیت کو بطور حیاتی ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ چوں کہ تمام حیاتی دنیا اپنی زندہ گی کے لئے توانائی کے استعمال پر منحصر ہے۔ غیر رواجی توانائی کے ذرائع کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

3.1 توانائی (Energy)

2 توانائی سے مراد "کام کرنے کی بالقوة صلاحیت ہے" توانائی کے ذریعہ ہی تمام اقسام کی کارکردگیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ہمارا سانس، گفتگو کرنا، کھانا، چلنا، اشیاء کو اٹھانا، سانس کا چلنا، پرندوں کا پرواز کرنا، ہوائی جہاز کا اڑنا، موٹر کاروں کا چلنا، بارش کا برساؤ وغیرہ جیسے لامحدود افعال انجام دینے کے لئے توانائی درکار ہوتی ہے۔ مختلف کام کو انجام دینے کے لئے توانائی مختلف شکلوں میں استعمال ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر فطرت میں توانائی کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ جاندار عضویوں کو اپنی بناء زندگی کے لئے بھی توانائی درکار ہوتی ہے۔

تمام جاندار عضویوں کے جسم میں زندگی کے عمل (Life Processes) کے دوران طبعی (Physical) اور کیمیائی (Chemical) تعاملات واقع ہوتے ہیں۔ وہ تمام کیمیائی تعاملات جو جسم کی تپش کو قائم رکھنے کے لئے توانائی کو پیدا کرنے سے وابستہ ہوتے ہیں اور جسم کے غریزی (Vital) افعال کو انجام دینے کے لئے توانائی فراہم کرتے ہیں توانائی تحول (Energy Metabolism) کہلاتے ہیں۔ جاندار اجسام توانائی کو حاصل کرنے کے لئے خامری تعاملات (Enzymatic Reactions) کے ذریعہ کاربوہائیڈریٹس کو سادہ اکائیوں میں توڑتے ہیں۔ یہ تحلیل تعاملات کہلاتے ہیں۔ پیچیدہ سالمات کا سادہ سالمات میں ٹوٹنا مخربی تعامل (Catabolism) کہلاتا ہے۔ اس تعامل کے دوران آزاد ہونے والی توانائی تمام خلوی افعال (Cellular Functions) کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تحول کا تحلیل مرحلہ (Degradation Phase of Metabolism) ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ایسا کیمیائی تعامل جس میں پیچیدہ اشیاء کی تیاری سادہ اشیاء سے عمل میں آتی ہے تعمیری تعامل (Anabolism) کہلاتا ہے۔ اس کو تحول کا تعمیری مرحلہ (Constructive Phase) کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ نمو، مرمت، افزائے، ذخیرہ اندوزی اور تولید میں مدد و معاون ہوتا ہے۔ مخربی اور تعمیری دونوں تعاملات ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایک کی غیر موجودگی میں دوسرا تعامل واقع نہیں ہوتا۔ اس نوعیت کو تحولی میزان (Metabolic Balance) کہا جاتا ہے۔

شعاعی ترکیب ایک تعمیری فعل ہے جب کہ تنفس ایک مخربی فعل ہے۔ شعاعی ترکیب کے دوران ہر پتے سادہ سالمات جیسے پانی اور کابن ڈائی آکسائیڈ کو کلوروفل اور اشعاعی توانائی (Radiant Energy) کی موجودگی میں استعمال کرتے ہیں اور پیچیدہ مرکب نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس کو تیار کرتے ہیں۔ اس دوران اشعاعی توانائی کیمیائی توانائی

(Chemical Energy) میں تبدیل ہوتی ہے جو نٹرا سے اور اے ٹی پی (ATP) کے سالمات میں کیمیائی بند کی شکل میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ لہذا اشعاعی ترکیب نہ صرف قیمری فعل ہے بلکہ یہ کیمیائی توانائی کو پیدا کرنے والا ایک ذریعہ کی شکل میں ہے۔ جب کہ تنفس ایک تخریبی عمل ہے جس میں پیچیدہ مرکب یعنی گلوکوز کی شکلیں واقع ہوتی ہیں جس کے نتیجہ میں سادہ مرکبات یعنی پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ تیار ہوتے ہیں اور گلوکوز کے سالمات میں محفوظ کیمیائی توانائی آزاد ہوتی ہے جو جسم کے مختلف افعال کو انجام دینے، جسم کی تپش کو قائم رکھنے اور اے ٹی پی (ATP) کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ لہذا تنفس بھی توانائی پیدا کرنے والا عمل ہے لیکن یہ ایک تخریبی عمل ہے۔ لہذا اجزاء کے جسم میں واقع ہونے والے بعض تعاملات تخریبی اور بعض تعاملات قیمری قسم کے ہوتے ہیں جس کو مجموعی طور پر تحول (Metabolism) کہا جاتا ہے۔

$$\text{Catabolism} + \text{Anabolism} = \text{Metabolism}$$

مختصر یہ کہ جسم میں واقع ہونے والے تعاملات جیسے اشعاعی ترکیب (جائبات کی صورت میں) اور تنفس توانائی پیدا کرنے والے تعاملات ہیں جب کہ نقل و حرکت، نمو، اخراج اور دوران خون وغیرہ میں توانائی صرف کی جاتی ہے۔

3.2 توانائی کا حساب لگانا (Accounting Energy)

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کام کرنے کی صلاحیت توانائی کہلاتی ہے۔ کام کو جول (Joule) میں ناپا جاتا ہے۔ الفاظ دیگر کام کی اکائی جول کہلاتی ہے۔ ایک جول کام سے مراد کسی چیز کو ایک نیوٹن (Newton) طاقت کے ذریعہ ایک میٹر کے فاصلہ تک حرکت میں لانا ہے۔ 100 گرام کیت کے جسم کو ایک میٹر کی بلندی تک اونچا اٹھانے پر ایک جول کام واقع ہوتا ہے چوں کہ توانائی کام کرنے کی قابلیت ہے۔ لہذا ایک جول کام میں توانائی کی مخصوص مقدار ملوث رہتی ہے۔ اس لئے توانائی کو بھی جول میں ناپا جاتا ہے ایک کلو گرام وزنی پتھر کو ایک میٹر کی اونچائی تک اٹھانے کے لئے 9.8 جولس (Joules) توانائی درکار ہوتی ہے۔ جب یہی ایک کلو گرام کا پتھر زمین کی سطح پر واپس آ جاتا ہے تو اتنی ہی مقدار یعنی 9.8 جول کام واقع ہوتا ہے۔ لہذا اس پتھر کی توانائی بالکل ٹھیک 9.8 جولس ہو گی۔ لہذا توانائی کی اکائی بھی جول (Joule) ہوتی ہے۔ الفاظ دیگر مختلف افعال کو انجام دینے کے لئے توانائی کی مخصوص مقدار درکار ہوتی ہے جس کو ذیل کے جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول 1 مختلف افعال کو انجام دینے کے لئے توانائی کی مخصوص درکار مقدار۔

فعال	مطلوبہ توانائی کی مقدار
دل کی ایک دھڑکن کے دوران دل کے ذریعہ کیا گیا کام	تقریباً 1 J
ایک لیٹر پٹرول سے حاصل ہونے والی توانائی	تقریباً 37 MJ (37000000 J)
ایک پیالی چائے کی تیاری میں درکار توانائی	تقریباً 75 KJ
ایک میٹر کی اونچائی تک ایک کلو گرام وزنی پتھر کو اٹھانے کے لئے مطلوبہ توانائی	تقریباً 10 J

روزمرہ زندگی میں مختلف مشغلوں کے دوران توانائی کی ضرورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں جس کو ذیل کے جدول میں


پیش کیا گیا ہے۔

جدول 2 روزمرہ زندگی میں مختلف مشغلوں کے دوران توانائی کی ضرورتیں۔

مشغلہ	جسم کے فی کلو گرام وزن کے حساب سے فی گھنٹہ استعمال ہونے والی توانائی جو لس میں
تیند کے دوران	4.62
بیٹھنے کے دوران	6.47
بیٹھ کر کام کرنے کے دوران	7.39
ساکن کھڑا ہونے کے دوران	8.32
اوسط رفتار چلنے کے دوران	13.86
ہلکی ورزش کے دوران	16.63
سخت جسمانی ورزش کے دوران	23.1

توانائی کی ضرورتوں کا انحصار عمر اور پیشہ کی مناسبت سے بھی مختلف ہوتا ہے جس کو تریسم کے ذریعہ ظاہر کیا گیا

ہے۔ اس کے علاوہ زیر نشوونما بچوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے بھی توانائی کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے۔



شکل 16.1

توانائی کی ضروریات بالفاظِ عمر

3.3 توانائی کی مختلف اقسام

فطرت میں توانائی مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے۔ جیسے (1) میکینکی توانائی مثلاً حرکی توانائی (Kinetic Energy) اور توانائی بالقوة (Potential Energy)، (2) اشعاعی توانائی یا شمسی توانائی (Solar Energy or Radiant Energy)، (3) ہوائی توانائی (Wind Energy)، (4) آبی توانائی (Hydro Energy)، (5) مدوجزر توانائی (Tidal Energy)، (6) بحری حرارتی توانائی (Geothermal Energy)، (7) کیمیائی مائند توانائی (Chemical or Bond Energy)، (8) حرارتی توانائی (Thermal Energy) اور (9) برقی توانائی (Electrical Energy)۔

(1) میکینکی توانائی (Mechanical Energy)

توانائی کی تمام اقسام میں سادہ ترین توانائی کی شکل میکینکی توانائی ہے۔ میکینکی توانائی دو اقسام کی ہوتی ہے۔

(i) حرکی توانائی (Kinetic Energy) (K.E)

کسی جسم کی حرکی توانائی یا توانائی بالقوة (K.E) سے مراد وہ توانائی ہے جو ایک جسم اپنی حرکت کی وجہ سے حاصل

کرتا ہے۔ الفاظ دیگر حالت حرکت کے دوران جسم میں پائی جانے والی توانائی توانائی بالفعل کہلاتی ہے۔ لفظ Kinetic یونانی لفظ ہے جس کے معنی "حرکت" کے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تیز رفتار گولہ جب کسی شیشے سے ٹکراتا ہے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شیشہ کا ٹوٹنا ایک کام ہے۔ لہذا تیز رفتار گولہ میں توانائی موجود ہے جو کام کو انجام دینے کا باعث بنتی ہے۔ کام کرنے کی قابلیت توانائی کہلاتی ہے۔

(ii) توانائی بالقوة (Potential Energy)

توانائی بالقوة سے مراد وہ توانائی ہے جو جسم میں حالت سکون کے دوران پائی جاتی ہے۔ لفظ Potential لاطینی لفظ ہے جس کے معنی "قابل ہوتا" ہے۔ مثال کے طور پر گھڑی کی کمائی میں جو مڑی ہوئی حالت میں ہوتی ہے توانائی بالقوة پائی جاتی ہے۔ جب کمائی کے سچ کھل جاتے ہیں تو فصل انجام دیا جاتا ہے یعنی گھڑی کے ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لہذا مڑی ہوئی حالت میں گھڑی کی کمائی میں جمع شدہ توانائی توانائی بالقوة کہلاتی ہے چوں کہ اس میں کام کو انجام دینے کی قابلیت موجود ہوتی ہے۔ لہذا توانائی بالقوة کسی بھی جسم میں جمع شدہ توانائی ہے۔


توانائی بالقوة اور توانائی بالفعل کا حاصل جمع ہمیشہ مستقل ہوتا ہے۔

$$P.E + K.E = \text{Constant}$$

(2) اشعاعی توانائی (Radiant Energy)


سورج توانائی کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ تارے یا کوئی چراغ یا بلب بھی روشنی کی توانائی کے ذرائع ہیں۔ روشنی برقی مقناطیسی اشعاع (Electromagnetic Radiation) کی ایک شکل ہے جو توانائی کے چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے جن کو کوانٹا (Quanta) کہا جاتا ہے۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق 75 ہزار ٹرائلین (Trillion) Kwh نیویم شمسی توانائی زمین پر پڑتی ہے۔ ہندوستان سورج سے تقریباً 5×10^{15} Kwh فی سال توانائی حاصل کرتا ہے۔ زمین روشن دن کی صورت میں تقریباً 1000 Watts شمسی اشعاع فی مربع میٹر حاصل کرتی ہے۔ شمسی توانائی قابل تجدید (Renewable) توانائی کہلاتی ہے جو ختم نہ ہونے والی توانائی ہے۔ شمسی روشنی (Solar Light) اور حرارت توانائی میں تبدیل ہوتے ہیں جس کو برقی (Electricity) میں تبدیل کیا

جاتا ہے۔ برق کو مختلف مقاصد جیسے بلب روشن کرنے، پمپ کرنے، اور موٹر گاڑی کی پائری میں استعمال کیا جاتا ہے۔
 شمس توانائی کا استعمال ہر مقاصد کی تکمیل کے لئے اہمیت کا حامل بنتا جا رہا ہے۔ خاص کر شمس حراری آلہ، شمس آبی دھڑ
 (Solar Water Heater)، شمس سل (Solar Cell)، شمس کوکر (Solar Cooker)، فوٹو گرافائی نوری میٹرس
 (Photographic Light Meters)، ٹیلیفون (Telephone)، شمس اشعاع گر (Solar Radiator)، پانی کو پمپ
 کرنے کی مشین اور؛ لکڑا یک آلات جیسے شمس موٹر گاڑی، موٹر سائیکل، کیا کولیٹر (Calculator)، گھڑیاں اور بچوں کے
 کھلونے وغیرہ کو تیار کیا جا رہا ہے جو شمس توانائی پر کام کرتے ہیں۔




فصل 16.2


شمس آبی دھڑ




فصل 16.3
ششی حراری آکر




فصل 16.5
ششی کو کر



فصل 16.4
ششی میل



شکل 16.7 ہوائی مل



شکل 16.6 پھر کی

جاند ار عضوئے بھی ششی توانائی پر راست یا بالواسطہ منحصر رہتے ہیں۔ سبز نباتات شعاعی ترکیب کے دوران نشاستہ کی ی میں ششی توانائی کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو کیمیائی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں جب کہ حیوانات توانائی کے لئے نباتات پر منحصر ہوتے ہیں اور نباتات میں محفوظ ہونے والی اس کیمیائی توانائی کو اپنی زندگی کے مختلف عمل کو انجام دینے میں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا حیوانات بھی ششی توانائی پر بالواسطہ منحصر رہتے ہیں۔ اس طرح ششی توانائی تمام جاند ار عضویوں کے لئے کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

(3) ہوائی توانائی (Wind Energy)

زمینی سطح کے مختلف حصے غیر مساوی طور پر گرم ہونے کے نتیجہ میں ہوا (Wind) کے جھونکے چلتے ہیں۔ ہوا میں پائی جانے والی توانائی ہوائی توانائی (Wind Energy) کہلاتی ہے۔ ہوائی توانائی میکانیکی اور برقی توانائی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہوا کی قوت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ ہوائی گرنی (Wind Mill) کے پتروں کو گھوما سکتی ہے جو ٹربین (Turbine) کو حرکت میں لاتی ہے جس کے نتیجہ میں برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ ہوائی گرنی پانی کو پمپ کرنے، گھریلو، تجارتی، صنعتی اور زراعتی مقاصد کی تکمیل کے لئے برقی (Electricity) پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ہندوستان کو ہوائی توانائی پیدا کرنے کے لحاظ


سے دنیا میں چوتھا مقام حاصل ہے۔ جرمنی، یونائیٹڈ اسٹیٹ (United State) اور ڈنمارک ہوائی توانائی کو پیدا کرنے میں سرفہرست ہیں۔ ہوائی توانائی سے امریکہ (USA)، جرمنی، ڈنمارک اور ہندوستان میں بالترتیب 1350 MW، 1000 MW اور 2500 MW برقی رو پیدا کرتے ہیں۔

(4) آبی توانائی (Water or Hydro-energy)

آبی طاقت (Hydro-power) کو آبپاشی (Irrigation) اور سیلاب (Flood) کو قابو میں رکھنے کے لئے مؤثر طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شمسی اشعاع مائاتی دور (Hydrological Cycle) کو کارگر بناتی ہے۔ پانی میں موجود توانائی کو حاصل کرنے کے لئے پانی کو ٹربین (Turbine) میں سے قوت ثقل (Gravity) کے تحت گزارا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں کم خرچہ آبی توانائی پیدا ہوتی ہے۔

(5) مدوجزری توانائی (Tidal Energy)

مدوجزری (Tides) میں پائی جانے والی توانائی بالقوتہ (Potential Energy) کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ کم از کم 3 میٹر بلند مدوجزری توانائی کو پیدا کرنے کی قابل ہو سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے 1966 میں مدوجزری کے پلانٹ (Tidal Power Plant) کو فرانس میں قائم کیا گیا ہے۔ روس، کناڈا، لندن، امریکہ، چین اور آسٹریلیا مدوجزری توانائی کو پیدا کرنے کے مراکز ہیں۔



فصل 16.8

مدوجزری کے پلانٹ

(6) جبری حرارتی توانائی (Geothermal Energy)

زمین کی خندقوں یا اندرونی حصوں میں پیدا ہونے والی توانائی کو جبری حرارتی توانائی (Geothermal Energy) کہا جاتا ہے۔ عموماً جبری حرارتی توانائی زمین کی سیالک چٹانوں (Sialic Crust) میں دستیاب ہوتی ہے جہاں تابکار عناصر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی توانائی زمین کی گہرائی کی پرتوں کی جبری کرہ میں اضافہ کے باعث تیار ہونے والے نئے جبری کرہ (Lithosphere) میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک پرت دوسری پرت کے نیچے غرق ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک علاقہ تیار ہوتا ہے۔ اس علاقہ کو منہائی علاقہ (Subduction Zone) کہا جاتا ہے۔ منہائی علاقہ (Subduction Zone) کو آگ کے بحر اکاٹلی حلقہ (Pacific Ring of Fire) کے نام سے سب سے پہلے دریافت کیا گیا ہے جو جبری حرارتی توانائی کو پیدا کرنے کا زرخیز علاقہ ہے اور اس توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ امریکہ، نیوزی لینڈ، جاپان اور فیلیپائن اور دیگر ممالک میں جبری حرارتی توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں شمالی مشرقی ہمالیہ (North East Himalaya)، مہاراشٹر، ساحل گجرات، نزد اور وادی داسودر کو جبری حرارتی توانائی پیدا کرنے والے مقامات کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔

(7) کیمیائی یا بند توانائی (Chemical or Bond Energy)


کیمیائی اشیاء جو ہروں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے درمیان کیمیائی بند (Chemical Bonds) پائے جاتے ہیں۔ ان کیمیائی بند میں توانائی کی مخصوص مقدار ذخیرہ کی ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ بند ٹوٹتے ہیں تو ان میں ذخیرہ شدہ توانائی آزاد ہو جاتی ہے۔ تمام جاندار عضویے مختلف کیمیائی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں جس کے دوران آزاد ہونے والی توانائی مختلف افعال کو انجام دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ کھڑی، کولہ، پٹرول وغیرہ ایندھن کہلاتے ہیں جن کے سالمات میں توانائی کیمیائی بند کی شکل میں ذخیرہ رہتی ہے۔ جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو توانائی کی کافی مقدار آزاد ہوتی ہے جس کو مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے بجوان، کارخانوں میں مشینوں کو چلانے یا صنعتی پیداوار کو حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جاندار عضویوں میں توانائی کے حصول کے لئے گلوکوز کے سالمات تھن کے دوران استعمال کئے جاتے ہیں جن میں ذخیرہ شدہ کیمیائی توانائی کھسک کے ذریعہ آزاد ہوتی ہے جو نہ صرف مختلف عمل کو انجام دینے میں استعمال ہوتی ہے بلکہ اے ٹی پی (ATP) کے سالمات کی تیاری میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ حیاتی عمل کو انجام دینے کے لئے ATP کے سالمات میں ذخیرہ شدہ توانائی ضرورت کے وقت استعمال کی جاتی ہے اس لئے ATP کو توانائی کی کرنسی کہا جاتا ہے۔


(8) حرارتی توانائی (Thermal Energy)

انسان کی روزمرہ زندگی میں حرارتی توانائی وسیع طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تمام جاندار عضویہ کاربوہائیڈریٹس، لہسیات اور شحمیات کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ ان غذائی اشیاء کی شکید کے نتیجہ میں توانائی آزاد ہوتی ہے جو نہ صرف زندگی کے عمل کو انجام دینے میں استعمال ہوتی ہے بلکہ جسم میں مخصوص تپش کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ موسم سرما کے دوران سرد موسم سے اپنے کو مخصوص تپش پر رکھنے کے لئے عضلات میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو جسم کو سرد موسم سے محفوظ رکھتی ہے۔


(9) برقی توانائی (Electrical Energy)

برقی پاردار ذرات جیسے الیکٹرانس (Electrons) یا رداں (Ions) جب ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ کی جانب حرکت کرتے ہیں تو توانائی پیدا ہوتی ہے جس کو برقی توانائی (Electrical Energy) کہا جاتا ہے۔ جاندار عضویوں کے جسم کے غلیوں اور عضویوں جیسے تولیے یا سہزینوں میں برقی قوت (Electrical Potential) پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عصبی نظام میں برقی قوت پیدا ہوتی ہے جو اطلاعات کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام حیاتیاتی نظاموں میں غلیوں کی غشاء کی دونوں جانب پائے جانے والے رداں کے ارتکاز کے فرق کی وجہ سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ بعض برقی مچھلیاں بھی برقی رو پیدا کرتی ہیں۔ ان کے جسم میں برقی (الیکٹرک) عضو پایا جاتا ہے جس میں برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ الیکٹرک رے (Electric Ray) جیسے ٹارپیڈ (Torpedo) میں 60 وولٹس (Volts)، نارسین (Narcine) میں 37 وولٹس اور اسکٹس (Skates) جیسے راجا (Raja) میں 14 وولٹس اور بعض عظمی مچھلیاں جیسے الیکٹروفورس (Electrophorus electricus) میں 600 وولٹس (Volts) اور مالا پٹرورس (Malapterurus) میں 350 تا 450 وولٹس (Volts) برقی رو پیدا ہوتی ہے جو ان مچھلیوں پر حملہ کرنے والے دوسرے حیوانات کو شاک دیتی ہیں۔






شکل 16.10
الکٹروفورس الکٹریکس



شکل 16.12
الکٹریک رے میں برقی عضو کا اندرونی حصہ



شکل 16.11
الکٹریک رے


3.4 جاندار عضویوں میں توانائی کی تبدیلی

آپ توانائی کی تعریف سے بخوبی واقف ہوں گے کہ توانائی کام کرنے کی قابلیت ہے۔ سائنس کی دو شاخ جس میں جاندار عضویوں کے نظام میں حرکی توانائی کا مطالعہ کیا جاتا ہے حیاتی توانیات (Bioenergetics) کہلاتی ہے۔ کوئی بھی طبعی مظہر یا کیمیائی تعامل توانائی کے استعمال کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ لہذا توانائی تمام اقسام کے نظام میں کام کو انجام دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ حیاتی نظام میں بھی توانائی میں تبدیلیاں حرکیات (Thermodynamic) کے قوانین کے مطابق واقع ہوتی ہیں۔ حرکیات کے پہلے قانون کے مطابق "کسی نظام میں توانائی کی جملہ مقدار ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔" بالفاظ دیگر توانائی نہ پیدا کی جاسکتی ہے اور نہ ہی ضائع کی جاسکتی ہے بلکہ یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ حرکیات کے دوسرے قانون کے مطابق "کسی نظام میں جب کوئی عمل واقع ہوتا ہے تو آزاد توانائی (Free Energy) میں کمی واقع ہوتی ہے اور بے قاعدگی (انٹراپی Entropy) میں اضافہ ہوتا ہے۔"


فطرت میں توانائی کی تبدیلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں (i) توانائی کی منتقلی (Energy Transfer) اور (ii) توانائی کا استحصال (Energy Transformation)۔

3.4.1 توانائی کی منتقلی (Energy Transfer)

یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں توانائی ایک شے سے دوسری شے میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو یا ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں منتقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تنفسی شے جیسے گلوکوز میں کیمیائی توانائی رہتی ہے۔ یہ توانائی تنفس کے دوران آزاد ہوتی ہے اور اس آزاد ہونے والی توانائی کو ADP اور غیر نامیاتی فاسفیٹ سے ATP کی تیاری میں اخذ کر لیا جاتا ہے۔ ATP کے سالمات میں موجود کیمیائی توانائی عامل الجذب (Active Absorption)، رواں کے حمل و نقل (Transport of Ions) حیاتی تالیفی (Biosynthetic) تعاملات جو استحکام، مرمت، ہموار نشوونما کے لئے درکار ہوتے ہیں کے لئے دستیاب ہوتی ہے۔ ATP کو غلیہ میں توانائی کی کرنسی کہا جاتا ہے۔ اس میں پائی جانے والی توانائی کسی بھی قسم کے کیمیائی تعامل میں ذخیرہ کی جاتی ہے یا یہ ایک شکل سے دوسری شکل جیسے حرارت، روشنی یا برقی رد میں تبدیل ہوتی ہے۔



شکل 16.13 ATP کا توانائی کی منتقلی اور توانائی کے استعمال میں رول



شکل 16.14


3.4.2 توانائی کا استحصال (Energy Transformation)

توانائی کی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی توانائی کا استحصال (Energy Transformation) کہلاتی ہے جس

کو ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔

(a) حیاتی کرہ (Biosphere) میں سب سے اہم توانائی کا استحصال شعاعی ترکیب کے دوران توانائی یا روشنی کی توانائی کی کیمیائی توانائی میں تبدیلی ہے۔ تمام حیاتی دنیا اپنی زندگی کے لئے اسی توانائی کے استحصال پر منحصر ہے۔

- (b) جاندار نظام میں ہمیشہ توانائی کا استحصال عمل میں آتا ہے۔ غذا میں ذخیرہ شدہ توانائی بالقوة نفس کے دوران آزاد ہوتی ہے اور ATP کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔
- (c) ATP میں ذخیرہ شدہ کیمیائی توانائی منور دو دوں (Worms) یا نور آفرینی (Luminescent) مچھلیوں میں روشنی کو پیدا کرنے کے لئے دستیاب ہوتی ہے۔
- (d) اعصاب (Nerves) میں ہجان (Impulse) کی منتقلی کے لئے یا برقی رے (Electric Ray) نامی مچھلیوں میں برقی شاک پیدا کرنے کے لئے ATP کی توانائی برقی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔
- (e) توانائی کا عام استحصال حرارتی توانائی کی پیدائش ہے جو جسم کو گرم رکھنے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔
- (f) عضلات (Muscles)، ہڈیے (Cilia) اور سوطے (Flagella) کی کارکردگی کے لئے کیمیائی توانائی کی میکائیکی توانائی میں تبدیلی ضروری ہے۔




شکل 16.15

توانائی کا استحصال

توانائی کا ضائع ہونا اور اینٹروپی (Entropy)

کسی نظام میں توانائی کی تبدیلی یا توانائی کے استحصال کے دوران توانائی کی کم یا زیادہ مقدار ضائع ہو جاتی ہے۔ ضائع

ہونے والی توانائی حرارت کی شکل میں ہوتی ہے۔ توانائی کی بلند توانائی والے علاقہ سے کم توانائی والے علاقہ کو منتقلی کے دوران توانائی کے ذرات کے درمیان تصادم واقع ہوتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجہ میں بے قاعدگی (Disorder) یا (Randomness) واقع ہوتی ہے۔ اس بے قاعدگی کو اینٹروپی (Entropy) کہا جاتا ہے۔ توانائی کی بلند توانائی والے علاقہ سے کم توانائی والے علاقہ کو منتقلی کے دوران توانائی ضائع ہوتی ہے جس کی وجہ سے اینٹروپی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔



شکل 16.16


توانائی کا ضائع ہونا اور اینٹروپی (Entropy)

حکیمات کے دوسرے قانون کے مطابق نظام کے کسی بھی طبعی یا کیمیائی عمل کے واقع ہونے میں آزاد توانائی (Free Energy) میں کمی واقع ہوتی ہے اور بے قاعدگی اینٹروپی (Entropy) میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاندار نظام میں بے قاعدگی یعنی اینٹروپی کے زیادہ وقوع پذیر ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ چونکہ جاندار نظام میں ہزاروں قسم کے کیمیائی تعاملات اور طبعی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور ان تمام میں توانائی کی منتقلی اور توانائی کا استعمال عمل میں آتا ہے چوں کہ توانائی کی تبدیلی یا استحاله سونی صد (100%) موثر نہیں ہوتا بلکہ جاندار نظام میں باقاعدہ اور مسلسل توانائی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اینٹروپی جاندار نظام کی سوت کا باعث بنتی ہے۔ اس لئے جاندار نظام کو اس اینٹروپی پر غالب ہونے کے قابل استعمال یا آزاد توانائی کو نظام میں داخل کرنا ضروری ہوتا ہے جس کو وہ ارد گرد کے ماحول سے یا راست طور پر سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں جیسا کہ خود تغذیائی (Autotrophs) نباتات میں ہوتا ہے یا وہ دوسرے عضویوں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ دگر تغذیائی (Heterotrophs) عضویوں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاندار نظام ماحول سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ آزاد توانائی نہ صرف اینٹروپی پر قابو پالیتی ہے بلکہ نظام میں مخصوص تعاملات کو انجام دیتے ہوئے توانائی کا اضافہ کرتی ہے۔

3.5 اسای تحولی شرح (Basal Metabolic Rate) (BMR)

اسای تحولی شرح سے مراد کسی مرکب کا تحول (Metabolism) فی اکائی وقت ہے۔ مختلف حیوانات میں تحولی گنجائش مختلف ہوتی ہے اس لئے توانائی کی ضروریات ہر ایک نوع کے لئے مختلف ہوتی ہے چوں کہ اس کا انحصار تحولی گنجائش پر ہوتا ہے۔ متنوع حرارتیوں (Poikilotherms) جیسے پھلی، میٹھک، وغیرہ میں غذا سے آزاد ہونے والی بیشتر توانائی طبعی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متنوع حرارتی حیوانات کے لئے زیادہ تپش پر آکسیجن کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے۔ ان حیوانات میں تحولی شرح کی پیمائش مخصوص حالات کے تحت کی جاتی ہے۔ اس کو معیاری تحولی شرح (Standard Metabolic Rate) کہا جاتا ہے۔


ہم حرارتیوں (Homotherms) جیسے چلپاسے، پرندے اور پستانوں میں کم تپش پر آکسیجن کی زیادہ مقدار کا صرفہ عمل میں آتا ہے جو عضلات کی کارکردگی سے وابستہ رہتی ہے۔ ان حیوانات میں اسای تحولی شرح (Basal Metabolic Rate) وہ اقل ترین توانائی کو ظاہر کرتی ہے جو غذا کے استعمال کے 12 تا 18 گھنٹوں بعد گرم کرہ فضاء میں مکمل آرام یا فاقہ کی حالت کے دوران جسم کی عام سرگرمیوں کو قائم رکھنے کے لئے درکار ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر اسای تحولی شرح سے مراد ملی لیٹر آکسیجن کا صرفہ فی منٹ ہے۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ اسای تحولی شرح کو معلوم کیا جاتا ہے اسپائیرومیٹر (Spirometer) کہلاتا ہے۔ اسای تحولی شرح بچوں میں بہ نسبت بالغوں کے زیادہ ہوتی ہے جب ماحول کی تپش زیادہ ہوتی ہے تو عورتوں میں اسای شرح مرد کی بہ نسبت کم ہوتی ہے۔



16.16 شکل
اسپائیرومیٹر

چوں کہ غذا کے ذریعے کے بعد عضویہ کی تحولی سرگرمیاں متحرک ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور غذا کے تحول میں اساسی سطح سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اساسی تحولی شرح جسمانی حرارت، ہارمون اور دیگر سرگرمیوں کے علاوہ عمر، جنس (Sex)، جسمانی وزن، صحت اور جسم میں اندرونی افرازات پر منحصر ہوتی ہے۔ بخار کی حالت میں اساسی تحولی شرح میں 7% اضافہ فی درجہ فارن ہیت یا 13% اضافہ فی درجہ سنٹی درجہ پیش ہوتا ہے چوں کہ زیادہ پیش پر تمام کیمیائی تعاملات کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

زیادہ جسامت کے حامل پستانوں میں اساسی تحولی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے تاہم اساسی تحولی شرح کو جب حیوان کے فی کلو گرام جسمانی وزن کے لحاظ سے ظاہر کیا جائے تو یہ واضح ہو گا کہ کم جسمانی وزن رکھنے والے پستانوں میں اساسی تحولی شرح زیادہ جسمانی وزن والے پستانوں کی بہ نسبت زیادہ ہو گی۔ مثال کے طور پر چوہوں میں اساسی تحولی شرح زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت ہاتھی یا دوسرے زیادہ وزن والے حیوانات کے۔ مختلف پستانوں میں مشاہدہ کی گئی اساسی تحولی شرح کو ذیل کی ترسیم کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل 16.17
مختلف پستانوں میں اساسی تحولی شرح

چھوٹے حیوانات کی جسمی ساختی طور پر بڑے حیوانات کی طرح ہی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے اور حرارت کا نقصان جسم کے سطحی رقبہ کے اضافہ کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا چھوٹے حیوانات میں اساسی تحولی شرح بہ نسبت بڑے حیوانات کے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے چھوٹے حیوانات کو اپنا جسم گرم رکھنے کے لئے زیادہ توانائی پیدا کرنا ہوتا ہے۔

3.6 ماحولیاتی نظام میں توانائی کا بہاؤ (Energy Flow in Ecosystem)

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام جاندار عضویوں کو یعنی نباتات اور حیوانات کو اپنی بقاء زندگی کے لئے توانائی کی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ ماحولیاتی نظام میں بھی جاندار عضویوں کو زندگی کی سرگرمیاں انجام دینے کے لئے توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس نظام میں توانائی کا اہم ذریعہ شمسی توانائی ہے جو روشنی کی شعاعوں کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق تقریباً 57% شمسی توانائی کرہ فضاء میں جذب کی جاتی ہے جس کا تقریباً 36% حصہ زمین پر پہنچتا ہے۔ پودے تقریباً 0.08% شمسی توانائی کو حاصل کرتے ہیں لیکن اس حاصل ہونے والی توانائی کا صرف 50% حصہ شعاعی ترکیب کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ لہذا سبز پودے شعاعی ترکیب کے دوران صرف 1.5% شمسی توانائی کو کیمیائی توانائی کی شکل میں ذخیرہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی نظام کے تمام عضویے اقل ترین توانائی کی مقدار پر منحصر رہتے ہیں۔ پودے توانائی کو توانائی بالقوۃ کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں جو ماحولیاتی نظام میں ایک تغذیائی مرحلہ سے دوسرے تغذیائی مرحلہ کو غذا کے طور پر نوش کرنے اور نوش کئے جانے کی صورت میں منتقل ہوتی ہے جس کو غذائی زنجیر کہا جاتا ہے۔ غذائی زنجیر میں شمسی توانائی پیدا کنندہ گان میں کیمیائی توانائی بالقوۃ کی شکل میں محفوظ ہوتی ہے۔ پیدا کنندہ گان یعنی سبز نباتات کو جب ابتدائی صارفین یعنی نبات خور حیوانات نوش کرتے ہیں تو یہ توانائی غذا کی شکل میں ابتدائی صارفین میں منتقل ہو جاتی ہے اور جب ابتدائی صارفین کو ثانوی صارفین یعنی گوشت خور بطور غذا استعمال کرتے ہیں تو یہ توانائی غذا کی شکل میں ثانوی صارفین میں منتقل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ثانوی صارفین سے ثالثی صارفین یعنی گوشت خور جو ثانوی صارفین کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں کو منتقل ہوتی ہے۔ شمسی توانائی کی ماحولیاتی نظام میں پیدا کنندہ گان سے ایک کے بعد دیگر تغذیائی مراحل کو متعلق ماحولیاتی نظام میں توانائی کا بہاؤ (Energy Flow in Ecosystem) کہلاتی ہے۔ تاہم ہر ایک تغذیائی مرحلہ پر اس توانائی بالقوۃ کا 80% تا 90% حصہ حرارت کی شکل میں تلف یا کسی اور تعامل کے دوران ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح توانائی کی کافی کم مقدار ہی پھر مایہ (Protoplasm) میں ثبت ہو جاتی ہے۔ ہر مرحلہ پر ضائع ہونے والی توانائی دوبارہ ماحولیاتی نظام میں داخل نہیں ہوتی۔

3.6.1 ماحولیاتی نظام کی پیداواری (Productivity of Ecosystem)

ماحولیاتی نظام کی پیداواری سے مراد پیداوار کی شرح (Rate of Production) ہے۔ پیداوار کی شرح سے مراد اکائی وقت میں ذخیرہ شدہ نامیاتی مادوں کی مقدار ہے۔ ماحولیاتی نظام میں پیداواری کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔

(a) ابتدائی پیداواری (Primary Productivity)

ابتدائی پیداواری پیدا کنندہ گان سے منسلک ہوتی ہے جن میں خود تغذیائی (Autotrophs) جن میں پشتر شعاعی ترکیبی (Photosynthetic) عضویے اور بعض کیمیائی ترکیبی (Chemosynthetic) خوردبینی عضویے شامل ہیں۔ ان میں جھونے اور بڑے سبز پودے، نباتی جل چہ (Phytoplanktons) اور شعاعی ترکیبی بیکٹریا (Photosynthetic Bacteria) شمار کئے جاتے ہیں۔ پیدا کنندہ گان شعاعی ترکیب کے دوران نشاستہ کو تیار کرنے میں شمسی توانائی کو کیمیائی توانائی بالحوۃ کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ ابتدائی پیداواری سے مراد وہ شرح ہے جس پر پیدا کنندہ گان میں شمسی توانائی شعاعی ترکیبی اور کیمیائی ترکیبی سرگرمیوں کے باعث کیمیائی توانائی کی شکل میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ ان پیدا کنندہ گان میں ذخیرہ شدہ یا پیدا شدہ کیمیائی توانائی کو ابتدائی پیداوار (Primary Production) کہا جاتا ہے۔ ابتدائی پیداواری مزید دو اقسام کی ہوتی ہے۔ (i) کل ابتدائی پیداواری (Gross Primary Productivity) اور (ii) خالص ابتدائی پیداواری (Net Primary Productivity)۔

(i) کل ابتدائی پیداواری (Gross Primary Productivity)

پیدا کنندہ گان کے ذریعہ شعاعی ترکیب کے دوران پیدا ہونے والی جملہ کیمیائی توانائی کو کل ابتدائی پیداوار (Gross Primary Production) کہا جاتا ہے اور وہ شرح جس پر جملہ کیمیائی توانائی شعاعی ترکیب کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے کل ابتدائی پیداواری (Gross Primary Productivity) کہلاتی ہے۔ یعنی کل ابتدائی پیداوار سے مراد شعاعی ترکیب کی جملہ شرح ہے جس میں پیکائش کے وقت تنفس میں استعمال شدہ نامیاتی مادے بھی شامل کئے جاتے ہیں۔

(ii) خالص ابتدائی پیداواری (Net Primary Productivity)

پیدا کنندہ گان کل ابتدائی پیداوار کے کچھ حصہ کو فعلیاتی سرگرمیوں کو انجام دینے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ ہاتھوں میں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اس ذخیرہ شدہ توانائی کو خالص ابتدائی پیداوار (Net Primary Production) کہا جاتا

ہے اور اس ذخیرہ شدہ توانائی کی شرح کو خالص ابتدائی پیداواری (Net Primary Productivity) کہا جاتا ہے۔

(b) ثانوی پیداواری (Secondary Productivity)

یہ صارفین (Consumers) یا دگر تغذیائی حیوانات (Heterotrophs) سے منسلک رہتی ہے۔ وہ شرح جس پر صارفین کی سطح پر توانائی ذخیرہ ہوتی ہے ثانوی پیداواری کہلاتی ہے۔ نبات خور (Herbivores) یعنی ابتدائی صارفین پودوں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں اور خالص ابتدائی توانائی (Net Primary Energy) کو ثانوی توانائی (Secondary Energy) میں تبدیل کرتے ہیں اور غیر ہضم شدہ قابل مبادلہ مادوں کو فضلہ کی شکل میں جسم سے باہر خارج کرتے ہیں۔ لہذا فضلہ کی شکل میں توانائی ضائع ہوتی ہے۔ فضلہ کی شکل میں خارج ہونے والی توانائی کو خالص ابتدائی توانائی میں سے منہا کیا جائے تو حاصل ہونے والی توانائی کل ثانوی پیداوار کہلاتی ہے۔


$$\text{Net Primary Production} - \text{Energy Lost Through Faeces} = \text{Gross Secondary Production}$$

نبات خور اس کل ثانوی پیداوار میں سے کچھ حصہ کو تحولی تعاملات میں استعمال کر لیتے ہیں۔ موز کے دوران نبات خور کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے اور بقیہ حصہ ہانتوں میں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اس ذخیرہ شدہ توانائی کو خالص ثانوی پیداوار (Net Secondary Production) کہا جاتا ہے۔ الفاظ دیگر نبات خور توانائی کے ایک حصہ کو مواد اور نگہداشت کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے باعث ان کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے جس کو ثانوی پیداوار کہا جاتا ہے۔

گوشت خور جب نبات خور عضویوں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں تو نبات خور میں ذخیرہ شدہ نامسمائی مادے گوشت خور کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی کھال، ہڈیاں، خول، ہال، پر، ناخن، کھر اور سیگ وغیرہ کو گوشت خور ہضم نہیں کرتے یا یہ نوش ہی نہیں کئے جاتے۔ لہذا ان حصوں میں ذخیرہ توانائی گوشت خوروں کو دستیاب نہیں ہوتی بلکہ فضلہ کی توانائی ضائع ہو جاتی ہے اور توانائی کا کچھ حصہ جو ان کے فضلہ میں پایا جاتا ہے وہ بھی فضلہ کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا گوشت خور حیوانات میں خالص ثانوی پیداوار یا توانائی بہ نسبت نبات خور حیوانات کے کم پائی جاتی ہے۔

نبات خور اور گوشت خور حیوانات جب مر جاتے ہیں تو ان میں پائی جانے والی توانائی تحلیل کنندہ گان جیسے قحطی

غذا خور (Detritus Feeders) اور گندہ نبات خور (Saprophytic) عضویوں کے لئے توانائی کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔




حل 16.18

توانائی کا بہاؤ

پودوں کے ذریعہ جذب شدہ روشنی	L_A	داخل ہونے والی جملہ توانائی	I
خالص ابتدائی پیداوار	P_N	کل ابتدائی پیداوار	P_a
غیر استعمال شدہ توانائی	NU	جانوری پیداوار	P
متحس	R	غیر استعمال شدہ توانائی خارج کردہ (Egested)	NA

لہذا ماحولیاتی نظام میں ہر ایک تغذیاتی مرحلہ پر توانائی کا نقصان ہوتا ہے۔ پیدا کنندگان کے مرحلہ پر توانائی کی مقدار اعظم ترین ہوتی ہے اور یہ ایک تغذیاتی درجہ سے دوسرے تغذیاتی درجوں تک حواتر کم ہوتی رہتی ہے جس کو توانائی کے

اہرام (Pyramids of Energy) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔



شکل 16.19

توانائی کا اہرام

3.7 حیاتی کیت بطور حیاتی ایندھن (Biomass as Biofuels)

جاندار اجسام جیسے نباتات اور حیوانات کے اجسام جن مادوں سے تیار ہوتے ہیں انہیں حیاتی کیت کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جاندار کا جسم حیاتی کیت کہلاتا ہے۔ روزمرہ استعمال کئے جانے والے مختلف ایندھن کاربن پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں توانائی کی مخصوص مقدار کیمیائی بند یا کیمیائی توانائی کی شکل میں ذخیرہ رہتی ہے۔ یہ ایندھن آکسیجن کی موجودگی میں جلائے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو مختلف مقاصد کی تکمیل کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ خاص کر دیہاتوں میں 80% گھریلو توانائی کی ضروریات کی تکمیل حیاتی کیت جیسے لکڑی، زرعی کوڑہ کرکٹ، اور مویشیوں کے گوبر کی لپیٹوں سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں صنعت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جاندار عضویوں کے مردہ اجسام کو حیاتی کیت کہا جاتا ہے جس کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی کاربن کے علاوہ ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود رہتے ہیں۔

لکڑی (Wood)

لکڑی کو خاص کر گھروں میں روایتی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان شروع ہی سے اس کو آگ پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ دنیا کی تقریباً 50% آبادی لکڑی کو ہی بطور ایندھن استعمال کرتی ہے۔ لکڑی

سستی اور بآسانی دستیاب ہونے والا ایندھن ہے۔ کٹری جنگلات کی پیداوار ہے۔ کٹری روایتی چولہوں میں جلائی جاتی ہے لیکن ان کی کارکردگی بہت کم یعنی 8% ہوتی ہے۔ اس قسم کے چولہوں میں کٹری کو جلانے پر ناکمل احتراق واقع ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں دھواں پیدا ہوتا ہے جو صحت کے لئے سخت مضر ہے۔ تاہم سائنسی طور پر تیار کئے گئے بغیر دھواں کے چولہوں کے ذریعہ ان دونوں مسائل پر قابو پایا ہے۔ ان میں ایندھن کا خرچ بہت کم ہوتا ہے نیز یہ زیادہ کارگر ہوتے ہیں۔ چولہے کے ساتھ چنی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعہ دھواں کافی بلندی پر چنی کے راستہ کے ذریعہ خارج ہو جاتا ہے اور انسان کی صحت پر اس کا مضر اثر نہیں پڑتا۔

ایشیاء اور یورپ کی غریب عوام اپنی گھریلو توانائی کی ضروریات کی تکمیل کے لئے کٹری کو ہی بطور ایندھن استعمال کرتی ہے۔ یہ قریبی جنگلات سے کٹری کو بآسانی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر رہائشی مقامات کو وسعت دینے کے لئے جنگلات کی کٹائی ناگزیر بن گئی ہے جس کی وجہ سے کٹری کا حصول ایک مشکل مسئلہ بن چکا ہے۔ عوام ان صورتوں میں ناقص کٹری اور نیم خشک کٹری کو اپنی گھریلو اغراض کے لئے استعمال کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس قسم کی کٹری جلانے پر نہ صرف دھواں کافی مقدار میں خارج ہوتا ہے بلکہ ان سے زہریلی گیس بھی خارج ہو سکتی ہے جو صحت کے لئے مضر ہوتی ہے۔ یہ گیس عموماً آنکھوں کے موتیابند کا سبب بنتی ہے جیسا کہ حیدرآباد کے مرکز برائے خلوی اور سالماتی حیاتیات (Centre for Cellular and Molecular Biology) کے حالیہ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے۔ عوام کے بعض گردہ نعثوں کو جلانے کے لئے بھی کٹری کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک فحش کو جلانے کے لئے تقریباً 300 کلو گرام کٹری درکار ہوتی ہے۔ آندھرا پردیش میں شرح اموات کا تناسب تقریباً 15 فی صد ہے۔ اس طرح اس ریاست میں ایک سال میں تقریباً 90 لاکھ اموات واقع ہوتی ہیں جس کے چوتھائی حصہ کو جلایا جاتا ہے جس کے لئے ہر سال 25000 ٹن کٹری درکار ہوتی ہے۔

شہری اور دیہی علاقوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر آبادی کے رقبہ اور زراعت کو کافی وسعت دی جا رہی ہے اس لئے جلتن کی کٹری کے بحران پر قابو پانے کے لئے زراعتی زمین کو جنگلاتی زمین میں تبدیل بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تاہم جلتن کی عمدہ کٹری کے درختوں کو اگانے کے لئے نجری زمین کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح نجری زمین پر صرف جلتن کی کٹری کے درختوں کو اگانا توانائی شجر کاری (Energy Plantation) کہلاتا ہے۔ توانائی شجر کاری کے منتخب کئے جانے والے

درختوں میں ذیل کی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

(a) درخت تیزی سے نمو پانے کی صلاحیت اور لانے قد کی خصوصیت کے حامل ہوں۔

(b) درخت کی لکڑی سے حرارت کی کثیر مقدار حاصل ہو۔

3.7.1 سوشل فاریسٹری

سوشل فاریسٹری ایک اسکیم ہے جس کے تحت روایتی درختوں کا تحفظ کیا جاتا ہے خاص کر جنگل کے قرب و جوار کے دیہاتوں کی ناکارہ یا فاضل زمین کو درخت لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ان درختوں کو ان ہی دیہاتیوں کے ذریعہ اگایا جاتا ہے اور ان کی نگہداشت کرائی جاتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ توانائی پیدا کرنے والے درخت حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان درختوں سے حاصل ہونے والی اشیاء سے بھی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اس طرح جنگل کا تحفظ کرتے ہیں۔

سوشل فاریسٹری کے مقاصد

- (1) ناکارہ یا فاضل زمین کو درختوں کو لگانے کے لئے استعمال میں لانا۔
- (2) جنگل کے قرب و جوار میں بسنے والی آبادی کو فائدہ پہنچانا۔
- (3) ان درختوں سے فائدہ مند اشیاء جیسے غذا، چارہ، ایندھن، کھاد، چوبیہ، پھل، پھول اور بیج کے حصول کے ذریعہ مقامی کمیونٹی کو خود ملکی بنادینا۔
- (4) زمین کو پانی، طوفان، آندھی کے ذریعہ کٹاؤ سے بچانا۔
- (5) مختلف دیسی انواع کے درختوں کی شجر کاری کرنا۔
- (6) شجر کاری کے ذریعہ ماحولیات کا تحفظ کرنا۔
- (7) دیہاتیوں کو زراعت میں مشغول رکھنا۔
- (8) ہمہ مقصدی درخت کی انواع کی شجر کاری کے ذریعہ دیہی صنعتوں کے لئے خام اشیاء فراہم کرنا اور ان صنعتوں کو ترقی دینا۔
- (9) دیہاتیوں کی آمدنی کے ذرائع کو وسعت دینا۔ خاص کر زراعت کو ترقی دینا اور اس کو ریشم سازی، سونیشیوں کی انفرانٹل نسل کرنے اور مشروم کی پیداوار میں مدد حاصل کرنے کے لئے استعمال کرنا۔

(10) مقامی کیونٹی کو قائمہ مہیا کرتا۔

(11) دیہاتیوں کے لئے روزگار کے مواقع فراہم کرتا۔

(12) جلتن کی لکڑی کے بحران کو حل کرتا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے کرنے کے لئے گھریلو چولہوں سے پیدا

ہونے والی توانائی کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے اور پیدا ہونے والی توانائی اور حرارت کو موثر طریقہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ چولہوں کی کارکردگی میں اضافہ کیا جاتا ہے اور جلتن کی لکڑی کی ضرورت میں کمی پیدا کی جاتی ہے۔ جس کے باعث جنگلات کی کٹائی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سائنسی طریقہ کے ذریعہ چولہوں کو اس طرح تیار کرنا کے جلتن کی لکڑی سے پیدا ہونے والی اس توانائی کو مقید اور منتقل کیا جاسکے۔ نیز دھواں اور زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کیا جاسکے۔

سوشل قاریٹری ان مقاصد کی تکمیل کے ذریعہ ماحولیاتی توازن کو مستحکم بنانے میں کافی مدد و معاون ہوتی ہے۔ اس لئے سوشل قاریٹری کو حالیہ دور میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔

3.7.2 غیر رواجی توانائی کے ذرائع

لکڑی کو توانائی پیدا کرنے کا رواجی ذریعہ کہا جاتا ہے۔ لکڑی کے سوا دیگر متبادل اشیاء جن کو بطور ایندھن استعمال کرتے ہوئے توانائی پیدا کی جاتی ہے غیر رواجی توانائی کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ ان میں ہرزہ (Weeds)، زراعت، ڈائری فارم، گھروں اور صنعتوں سے پیدا کی جانے والی ناکارہ اشیاء شامل کئے جاتے ہیں جنہیں بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

ہرزہ (Weeds) بطور ایندھن

ہرزہ وہ غیر مطلوبہ نباتات ہیں جو ناکارہ زمین، کھیتوں، آبی ذخائر، دریاؤں اور سمندر کے ساحل پر اگتے ہیں۔ یہ تیزی سے نشوونما پانے والے سبز نباتات ہیں۔ ان کو نشوونما پانے کے لئے زمین یا آبی ذخائر کی زرخیزی یعنی پانی اور نمکیات کو استعمال کر لیتے ہیں اور تیزی سے نشوونما پاتے اور پھیلنے ہوئے زمین کے ایک بڑے حصہ کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ سبز ہونے کی وجہ سے شعاعی ترکیب کو انجام دیتے ہیں اور شمسی توانائی کو کیمیائی توانائی کی شکل میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی حیاتی کیمیت میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ کھیتوں میں اگنے والے ہرزے فصلوں کو معاشی نقصان کا باعث بنتے ہیں اس لئے انہیں کھیتوں سے نکال دینا ضروری ہوتا ہے۔ ان ہرزوں کو جمع کر کے خشک کیا جاسکتا ہے اور ان میں ذخیرہ شدہ توانائی کو حاصل کرنے کے لئے

بطور ایندھن استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح یہ توانائی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہرزہ کے استعمال کے ذریعہ جلتن کڑی کی ضرورت میں قابل لحاظ کمی واقع ہوتی ہے اس طرح درختوں کی کٹائی کو کم کیا جاسکتا ہے اور جنگلات کا تحفظ کیا جاسکتا ہے۔ ہرزوں کو دیگر محارف میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں ہائیڈر جیس (Bio-gass) پلانٹ میں گائے کے گوبر کے ساتھ امدادی اشیاء کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔

خری ہرزہ سے نامیاتی اشیاء جیسے اگاراگار (Agar Agar) اور الجن (Algin) اخذ کیئے جاتے ہیں۔ ان دونوں نامیاتی اشیاء کو غذا، پارچہ، ادویات، مصنوعی رییشوں، کاغذ اور ڈبل ردنی کی تیاری کی صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندری ہرزے معدنیات، حیاتیات اور شائبہ عناصر کے غیر مصارفی ذرائع کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس لئے مویشیوں، مرغیوں، دیگر فارم کے حیوانات کو غذا کی خوراک مہیا کرتے ہیں۔ ہرزوں میں پوٹاشیم، میگنیشیم پائے جاتے ہیں اس لئے انہیں کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی کو محفوظ رکھنے کی زمینی خاصیت میں بہتری پیدا کرتے ہیں اور فصل کے معدنیاتی قلتی امراض کی انسداد کرتے ہیں۔

ناکارہ اشیاء بطور ایندھن

دیہی اور شہری علاقوں میں توانائی کی ضروریات کی تکمیل کے لئے ناکارہ اشیاء کو بھی توانائی کے متبادل ذرائع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناکارہ اشیاء کو راست یا بالواسطہ ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناکارہ اشیاء زراعت، شیر خانہ (ڈیری فارم) رہائشی گھروں، کارخانوں اور صنعتوں وغیرہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو راست طور پر جلانے میں استعمال کیا جاتا ہے یا انہیں دوسری اشیاء میں تبدیل کیا جاتا ہے اور تبدیل شدہ اشیاء کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔

ناکارہ اشیاء کا راست بطور ایندھن استعمال

دیہی اور شہری علاقوں میں مویشیوں کے گوبر کو سورج کی روشنی میں خشک کیا جاتا ہے۔ اور انہیں ایلو کے طور پر جمع کر لیا جاتا ہے اور ضرورت کے لحاظ سے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کلو خشک گوبر کو جلانے پر تقریباً 3000 حراری توانائی پیدا ہوتی ہے لیکن گوبر کو جلانے سے دھواں پیدا ہوتا ہے جو ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے اور صحت کو متاثر کرتا ہے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے جدید سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر چوبے تیار کئے گئے ہیں۔

ناکارہ اشیاء کا بالواسطہ بطور ایندھن استعمال

ناکارہ اشیاء کا راستہ بطور ایندھن استعمال ماحول کو آلودہ بنادیتا ہے۔ ان کے استعمال کے باوجود ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے جدید سائنسی طریقے پر حیاتی گیس پلانٹ تیار کئے گئے۔ ان پلانٹس میں تیار کی جانے والی گیس کو مختلف اغراض کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے کیوں کہ یہ توانائی کا بہتر ذریعہ ہے۔

موشیوں اور دیگر حیوانات کے علاوہ انسان کے فضلہ، گھروں، کارخانوں اور صنعتوں سے حاصل ہونے والی ناکارہ اشیاء سے توانائی حاصل کرنے کے لئے غیر ہوائی طریقہ کو استعمال کیا جا رہا ہے جس میں عمل تخمیر کے ذریعہ گیس پیدا ہوتی ہے جس کو حیاتی گیس (Bio Gas) کہا جاتا ہے۔ یہ گیس کئی گیسوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس گیس میں 50 تا 70 فی صد میتھین (Methane)، 30 تا 40 فی صد کاربن ڈائی آکسائیڈ اور قلیل مقدار میں ہائیڈروجن، نائٹروجن اور سلفائیڈ موجود رہتی ہیں۔ بائیو گیس کو چولہوں میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گیس سے توانائی کی کافی مقدار پیدا ہوتی ہے۔ 200 مکعب سنی میٹر گیس کو جلانے پر 900 حرارت توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس گیس کو جلانے پر دھواں خارج نہیں ہوتا اور کسی قسم کی زہریلی گیس بھی خارج نہیں ہوتی۔ لہذا اس گیس کے استعمال سے ماحول بھی آلودہ نہیں ہوتا۔ حیاتی گیس کی تیاری کے بعد گیس پلانٹ میں فاضل مادے بچے ہوئے ہوتے ہیں ان میں نائٹروجن اور فاسفورس کے مرکبات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ان فاضل مادوں کو زراعت میں عمدہ قسم کی دہی کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سڑن بھی نہیں ہوتی اور معر بیکٹریا بھی نہیں پائے جاتے ہیں۔

ہمارے ملک میں دو قسم کے بائیو گیس پلانٹ استعمال کئے جاتے ہیں جن میں (i) فکسڈ ڈوم قسم کا بائیو گیس پلانٹ اور (2) تیراؤ گیس ہولڈر قسم کا بائیو گیس پلانٹ شامل ہیں۔

حیاتی گیس پلانٹ میں حیاتی گیس کی تیاری تین مراحل میں تکمیل پاتی ہے۔

(i) پہلا مرحلہ ہوا باش بیکٹریا کا عمل :


حیاتی گیس پلانٹ میں ناکارہ اشیاء گوہر اور پانی کو ملا کر داخل کیا جاتا ہے اور اس پر ہوا باش بیکٹریا کا عمل کرایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ناکارہ اشیاء میں پائے جانے والے پیچیدہ نامیاتی مرکبات چھوٹے سادہ سالمات میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔

(ii) دوسرا مرحلہ غیر ہوا باش بیکٹریا کا عمل :

اس مرحلہ میں غیر ہواش بیکٹریا کا عمل پہلے مرحلہ میں حاصل ہونے والے چھوٹے سالمات پر کرایا جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں ان چھوٹے سالمات میں تخمیر (Fermentation) کا عمل انجام پاتا ہے جس کے دوران نامیاتی ترشے خاص کر وینک ترشے (Acetic Acids) پیدا ہوتے ہیں۔


(iii) تیسرا مرحلہ وینک ترشے پر میتھانوجینک بیکٹریا (Methanogenic Bacteria) کا ہوا کی غیر موجودگی میں عمل :

تیسرے مرحلہ میں اس ترشہ پر میتھانوجینک بیکٹریا (Methanogenic Bacteria) کا ہوا کی غیر موجودگی میں عمل کرایا جاتا ہے جس کے باعث میتھین (Methane) گیس پیدا ہوتی ہے۔ تیار ہونے والی ان گیسوں کو مخصوص خانوں میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ ان گیسوں کو اسٹریٹ پمپ چلانے کے علاوہ چھوٹی صنعتوں، گھریلو پکوان اور دیگر ضروریات میں بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔



شکل 16.20

فلکس ڈوم قسم کا بائیو گیس پلانٹ



شکل 16.21

تیراؤ گیس ہولڈر قسم کا بائیو گیس پلانٹ

پٹرول فصلیں (Petrocrops)

بعض نباتات میں پٹرولیم (Petroleum) اشیاء ذخیرہ کی جاتی ہے جن سے پٹرولیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کیلٹراپس پروسیرا (Calotropis procera) اور بعض کائی (Algae) میں پٹرولیم اشیاء کافی مقدار میں جمع رہتی ہے۔ ہائپو کوکس (Botryococcus) نامی کائی میں ہائیڈرو کاربن (Hydrocarbon) کی کافی مقدار ذخیرہ رہتی ہے۔ پٹرولیم بھی ایک ہائیڈرو کاربن ہے۔ اس کے علاوہ اس کائی کے ہائیڈرو کاربنس میں آلکنس (Alkenes) موجود رہتی ہے۔ لیکن موثر گاریوں میں بطور ایندھن استعمال کی جاسکتی ہے۔ ان پودوں سے حاصل ہونے والی پٹرولیم اشیاء کفایت بخش نہیں ہوتی تاہم ان مقاصد کی تکمیل کے لئے کاشت کی جانے والی ان پودوں کی فصلوں کو پٹرول فصلیں (Petrocrops) کہا جاتا ہے۔

سیس بنیادی خام اشیاء

گنے سے شکر حاصل کرنے کے بعد بچنے والے فاضل مادے مولاسس (Molasses) کہلاتے ہیں۔ مولاسس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینس اور نمکیات وغیرہ جیسے غذائی مادے موجود رہتے ہیں۔ یہ غذائی مادے ایسٹ (خمیر) کے نمو کے لئے

بھی سوزوں طور پر کار آمد ہوتے ہیں۔ ایسٹ غیر ہوا ہاش حالت میں شکر کو الکحل میں تبدیل کرتی ہے۔ ایسٹ سے الکحل کی تیاری الکحلی تخمیر (Alcoholic Fermentation) کہلاتی ہے۔ ایسٹ کے ذریعہ الکحل کی تیاری میں مولا سیس استعمال کیا جاتا ہے۔ مولا سیس کو سب سے پہلے پانی کے ذریعہ ہلکایا جاتا ہے اور اس میں درکار ضروری اشیاء کو داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایسٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایسٹ کے ذریعہ غیر ہوا ہاش تخمیر کا عمل انجام پاتا ہے جس میں شکر، چھانکھل الکحل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایسٹ کے خلیے تلچھٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جنہیں علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ حامل ہونے والے تلچھٹ کو دبا کر کھلی (Cake) تیار کی جاتی ہے۔ جو بطور چارہ مویشیوں کو مہیا کی جاتی ہے۔ الکحل کو عمل کشید کے ذریعہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

اس طرح مولا سیس سے اخذ کی جانے والی الکحل کو مختلف اغراض کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نیز الکحل کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ ادویات میں بھی اس کا استعمال بطور محلول کیا جاتا ہے۔

گنے سے رس نکال لینے کے بعد چھل ہوئی تا کارہ اشیاء کو بگدا (Bagasse) کہا جاتا ہے۔ اس کو سڑنے گنے کے بعد کھیتوں میں کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بگدے سے بھی الکحل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے ذریعہ اس کو سادہ شکر میں تبدیل کیا جاتا ہے جس کو بگدے کی شکریت (Saccharification of Bagasse) کہا جاتا ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والی سادہ شکر میں ایسٹ کے ذریعہ الکحلی تخمیر کا عمل انجام دیا جاتا ہے اور الکحل کو حاصل کیا جاتا ہے۔

گیسو حل (Gasohol)

گیسو حل (Gasohol) کو انکل اور پٹرول کا مرکب کہا جاتا ہے۔ ایسٹ کے ذریعہ الکحلی تخمیر کو انجام دیا جاتا ہے اور حاصل ہونے والی الکحل میں پٹرول کو مناسب تناسب میں ملایا جاتا ہے۔

4 خلاصہ

- ☆ توانائی سے مراد " کام کرنے کی طاقت و صلاحیت ہے۔ "
- ☆ دھبیہ سالمات کا سادہ سالمات میں ٹوٹنا مخز می تعامل (Catabolism) کہلاتا ہے۔
- ☆ ایسا کیمیائی تعامل جس میں دھبیہ اشیاء کی تیاری سادہ اشیاء سے عمل میں آتی ہے تعمیری تعامل (Anabolism) کہلاتا

☆ ہے۔ اس کو تحول کا تعمیری مرحلہ (Constructive Phase) کہا جاتا ہے۔
 جاندار کے جسم میں واقع ہونے والے بعض تعاملات تخریبی اور بعض تعاملات تعمیری قسم کے ہوتے ہیں جس کو مجموعی طور پر تحول (Metabolism) کہا جاتا ہے۔

$$\text{Catabolism} + \text{Anabolism} = \text{Metabolism}$$

☆ کام کو جول (Joul) میں ناپا جاتا ہے۔ یعنی کام کی اکائی جول کہلاتی ہے۔ ایک جول کام سے مراد کسی چیز کو ایک نیوٹن (Newton) طاقت کے ذریعہ ایک میٹر کے فاصلہ تک حرکت میں لانا ہے۔

☆ کسی جسم کی حرکی توانائی یا توانائی بالفعل (K.E) سے مراد وہ توانائی ہے جو ایک جسم اپنی حرکت کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر حالت حرکت کے دوران جسم میں پائی جانے والی توانائی بالفعل کہلاتی ہے۔

☆ توانائی بالقوة سے مراد وہ توانائی ہے جو جسم میں حالت سکون کے دوران پائی جاتی ہے۔

☆ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق 75 ہزار ٹرائلین Kwh (Trillion) فی یوم شمسی توانائی زمین پر پڑتی ہے۔

☆ شمسی حراری آلہ، شمسی آبی ریشتر (Solar Water Heater)، شمسی سیل (Solar Cell)، شمسی کوکر (Solar Cooker)، فوٹو گرافائی نوری میٹر (Photographic Light Meters)، ٹیلیفون (Telephone)، شمسی اشعاع گر (Solar Radiater)، پانی کو پمپ کرنے کی مشین اور الکٹرانک آلات جیسے شمسی موٹر گاڑی، موٹر سائیکل، کیا کولیٹر (Calclater)، گھڑیاں اور بچوں کے کھلونے وغیرہ کو تیار کیا جا رہا ہے جو شمسی توانائی پر کام کرتے ہیں۔

☆ الکٹرک رے (Electric Ray) نامی برقی مچھلیوں کے جسم میں الکٹرک عضوم پایا جاتا ہے۔ جس میں برقی قوت پیدا ہوتا ہے۔ ان الکٹرک عضوم میں برقی رو پیدا ہوتی ہے جو ان مچھلیوں پر حملہ کرنے والے دوسرے حیوانات کو شاک دیتی ہیں۔

☆ حرکیات کے پہلے قانون کے مطابق "کسی نظام میں توانائی کی جملہ مقدار ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔" بالفاظ دیگر توانائی نہ پیدا کی جاسکتی ہے اور نہ ہی ضائع کی جاسکتی ہے بلکہ یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
 حرکیات کے دوسرے قانون کے مطابق "کسی نظام میں جب کوئی عمل واقع ہوتا ہے تو آزاد توانائی (Free

(Energy) میں کی واقع ہوتی ہے اور بے قاعدگی (انٹروپی Entropy) میں اضافہ ہوتا ہے۔"

☆ فطرت میں توانائی کی تبدیلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں (i) توانائی کی منتقلی (Energy Transfer) اور (ii)

توانائی کا استحصال (Energy Transformation)۔

☆ توانائی کی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی توانائی کا استحصال (Energy Transformation) کہلاتی ہے۔

یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں توانائی ایک شے سے دوسری شے میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو یا ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں منتقل ہوتی ہے۔

☆ اساسی تحولی شرح (Basal Metabolic Rate) وہ اقل ترین توانائی کو ظاہر کرتی ہے جو غذا کے استعمال کے

18 تا 12 گھنٹوں بعد گرم کرہ فضاء میں مکمل آرام یا فاقہ کی حالت کے دوران جسم کی عام سرگرمیوں کو قائم رکھنے کے لئے درکار ہوتی ہے۔ اساسی تحولی شرح سے مراد ملی لیٹر آکسیجن کا صرفہ فی منٹ ہے۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ اساسی تحولی شرح کو معلوم کیا جاتا ہے اسپائیرومیٹر (Spirometer) کہلاتا ہے۔

☆ اساسی تحولی شرح بچوں میں بہ نسبت بالغوں کے زیادہ ہوتی ہے جب ماہ 10 کا، تپش زیادہ ہوتی ہے تو عورتوں میں اساسی شرح مرد کی بہ نسبت کم ہوتی ہے۔

☆ بنار کی حالت میں اساسی تحولی شرح میں 7% اضافہ فی درجہ فارن ہیٹ یا 13% فی صد درجہ سنٹی درجہ تپش ہوتا ہے چوں کہ زیادہ تپش پر تمام کیمیائی تعاملات کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

☆ چھوٹوں میں اساسی تحولی شرح زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت ہاتھی یا دوسرے زیادہ وزن والے حیوانات کے۔

☆ شش توانائی کی ماحولیاتی نظام میں پیدا کنندہ گان سے ایک کے بعد دیگر تغذیائی مراحل کو منتقلی ماحولیاتی نظام میں

توانائی کا بہاؤ (Energy Flow in Ecosystem) کہلاتی ہے۔

☆ ماحولیاتی نظام کی پیداواری سے مراد پیداوار کی شرح (Rate of Production) ہے۔ پیداوار کی شرح سے مراد

اکائی وقت میں ذخیرہ شدہ نامیاتی مادوں کی مقدار ہے۔ ماحولیاتی نظام میں پیداواری کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔

☆ پیدا کنندہ گان میں ذخیرہ شدہ یا پیدا شدہ کیمیائی توانائی کو ابتدائی پیداوار (Primary Production) کہا جاتا ہے۔

☆ پیدا کنندہ گان کے ذریعہ شعاعی ترکیب کے دوران پیدا ہونے والی جملہ کیمیائی توانائی کو کل ابتدائی پیداوار

(Gross Primary Production) کہا جاتا ہے اور وہ شرح جس پر جملہ کیسائی توانائی شعاعی ترکیب کے ذریعہ

پیدا ہوتی ہے کل ابتدائی پیداوار کی (Gross Primary Productivity) کہلاتی ہے۔

☆ ذخیرہ شدہ توانائی کو خالص ابتدائی پیداوار (Net Primary Production) کہا جاتا ہے اور اس ذخیرہ شدہ توانائی

کی شرح کو خالص ابتدائی پیداوار کی (Net Primary Productivity) کہا جاتا ہے۔

☆ وہ شرح جس پر صارفین کی سطح پر توانائی ذخیرہ ہوتی ہے ثانوی پیداوار کی کہلاتی ہے۔

Net Primary Production - Energy Lost Through Faeces = Gross Secondary

Production

☆ ماحولیاتی نظام میں ہر ایک تغذیائی مرحلہ پر توانائی کا نقصان ہوتا ہے۔ پیدا کنندگان کے مرحلہ پر توانائی کی مقدار

اعظم ترین ہوتی ہے اور یہ ایک تغذیائی درجہ سے دوسرے تغذیائی درجوں تک متواتر کم ہوتی رہتی ہے جس کو

توانائی کے ابھرام (Pyramids of Energy) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

☆ جاندار اجسام جیسے نباتات اور حیوانات کے اجسام جن مادوں سے تیار ہوتے ہیں انہیں حیاتی کیت کہتے ہیں۔ الفاظ

دیگر جاندار کا جسم حیاتی کیت کہلاتا ہے۔

☆ بنجر زمین پر صرف جلتن کی لکڑی کے درختوں کو اگانا توانائی شجر کاری (Energy Plantation) کہلاتا ہے۔

☆ توانائی کی بلند توانائی والے علاقہ سے کم توانائی والے علاقہ کو منتقلی کے دوران توانائی کے ذرات کے درمیان

تصادم واقع ہوتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجہ میں بے قاعدگی (Disorder) یا (Randomness) واقع ہوتی ہے جس کو

اینٹروپی (Entropy) کہا جاتا ہے۔

☆ سوشل فاریٹری ایک اسکیم ہے جس کے تحت روایتی درختوں کا تحفظ کیا جاتا ہے خاص کر جنگل کے قرب و جوار میں

لکڑی کو توانائی پیدا کرنے کا روایتی ذریعہ کہا جاتا ہے۔ لکڑی کے سوا دیگر متبادل اشیاء سے بھی توانائی پیدا کی جاتی

ہے۔ جس کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو غیر روایتی توانائی کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ ان میں ہر ذات

(Weeds)، زراعت، ڈائری فارم، گھروں اور صنعتوں سے پیدا کی جانے والی ناکارہ اشیاء شامل ہیں جنہیں بطور

ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔

- ☆ 200 مگہ سٹی میٹر گیس کو جلانے پر 900 حرارت توانائی پیدا ہوتی ہے۔
- ☆ حیاتی گیس پلاٹ میں حیاتی گیس کی تیاری تین مراحل میں تکمیل پاتی ہے۔ (i) پہلا مرحلہ ہو اہاش بیکٹریا کا عمل (ii) دوسرا مرحلہ غیر ہو اہاش بیکٹریا کا عمل (iii) تیسرے مرحلہ میں اس ترشہ پر میتھانو جینک بیکٹریا (Methanogenic Bacteria) کا ہوا کی غیر موجودگی میں عمل۔
- ☆ پودوں سے حاصل ہونے والی پیٹرولیم اشیاء کفایت بخش نہیں ہوتی تاہم ان مقاصد کی تکمیل کے لئے کاشت کی جانے والی پودوں کی فصلوں کو پیٹرول فصلیں (Petrocrops) کہا جاتا ہے۔
- ☆ گیسو حل (Gasohol) کو اکٹھل اور پٹرول کا مرکب کہا جاتا ہے۔

5 زائد معلومات

جوہر کے مرکزہ میں توانائی کی کافی مقدار ذخیرہ رہتی ہے۔ اس توانائی کو نیو کلیائی توانائی کہا جاتا ہے۔ جوہر یا جوہر کے ذرات سے حاصل ہونے والی توانائی کو جوہری توانائی (Atomic Energy) کہا جاتا ہے۔ دراصل جوہر کے مرکزہ کے (شعاع) (Fission of Nucleus) یا بھاری مرکزہ کا چھوٹے مرکزہ میں ٹوٹنے کے دوران توانائی کی کافی مقدار خارج ہوتی ہے۔ اس توانائی کو جوہری توانائی کہا جاتا ہے۔ جوہری توانائی بھی توانائی کی ایک قسم ہے۔ جوہر کے مرکزہ میں تعاملات واقع ہوتے ہیں جس کے دوران حرارت کی کافی مقدار خارج ہوتی ہے۔ اس حرارت میں موجود توانائی بھاپ کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس بھاپ سے برق پیدا کی جاتی ہے۔ حاصل ہونے والی اس برقی طاقت کو جوہری طاقت کہا جاتا ہے۔ ہندوستان نیو کلیائی توانائی میں کافی ترقی کر رہا ہے۔ نیو کلیائی توانائی کے میدان میں واقع ہونے والا انقلاب سستی توانائی کی وافر مقدار پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا نیز اس توانائی کے استعمال سے نہ صرف سمندر کے پانی کی شوریت دور کرنا ممکن ہو جائے گا بلکہ پانی سے ہائیڈروجن پلورین پیدا کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اسونیا بھی پیدا کی جاسکتی ہے، ممکن ہے کہ اس صدی کے اختتام تک ہندوستان نیو کلیئر پاور کی مدد سے 10,000 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کے قابل بن جائے گا۔

ہندوستان میں جوہری توانائی کے میدان میں ترقی آنجہانی پنڈت جواہر لعل نہرو کی دور رس بصارت کا نتیجہ ہے اور سب سے پہلا جوہری توانائی کمیشن 10 اگست 1948 میں ایچ۔ جے بھابھا (H.J. Bhabha) کے زیر صدارت قائم کیا گیا۔



شکل 19.22

بھبھا (H.J. Bhabha)۔ جے۔ بھبھا

ہندوستان میں جوہری توانائی میں ترقی بھبھا جے۔ بھبھا اور ان کے جانشینوں کی کادشوں کی مرہون منت ہے۔ 1948 میں پہلا جوہری توانائی قانون پیش کیا گیا اور اس کے بعد 21 ستمبر 1982 میں ایک نیا جوہری توانائی قانون بنایا گیا۔ اس قانون کے مطابق جوہری توانائی کا استعمال صرف پر امن مقاصد کے لئے ہی ہو گا جس میں ہندوستان کو کافی دلچسپی ہے۔

ہندوستان نے پر امن مقاصد کے لئے 18 مئی کو راجستان کے ریگستانی علاقہ پوکھران میں زیر زمین ٹھکانا کھدائی دھا کہ کرنے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا اور دیگر 9 ممالک میں اپنی بھاری نو کھدائی قابلیت کے لحاظ سے ترقی پذیر ممالک میں واحد ملک کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔

جوہری توانائی کمیشن کا سب سے بڑا سائنسی ادارہ ممبئی کے قریب ٹرا بمبی (Trombay) میں قائم کیا گیا۔ ہندوستان کا پہلا پاؤر اسٹیشن امریکہ کے تعاون سے ممبئی کے قریب 60 کلومیٹر واقع مقام تاراپور میں قائم کیا گیا جس کے لئے پلاننگ کمیشن نے 1958ء میں منظوری دی۔ اس کے بعد میں ایٹمی ری ایکٹروں کو راجستان کے رانا پرتاب ساگر نامی مقام پر نصب کیا گیا جس کی تعمیر میں ہندوستان اور کینیڈا کے سائنس دانوں اور انجینئروں نے اہم حصہ لیا۔ مگر اس میں کل پانچ کم کے مقام پر ایٹمی پاؤر اسٹیشن قائم کیا گیا جس کی برقی پیداوار کی صلاحیت 460 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ دو زیر تعمیر

پاؤر پلانٹ میں ایک اتر پردیش میں مادہ اور دوسرا گجرات میں کا کرپار میں قائم کیا جا رہا ہے۔

فرہنگ

6



Alcoholic Fermentation	الکدھا لک فرمیشن	الطعلی تخیر	ایسٹ سے الکحل کی تیاری۔
Anabolism	انابولیزم	تغیری تعامل	ایسا کیمیائی تعامل جس میں پیچیدہ اشیاء کی تیاری سادہ اشیاء سے عمل میں آتی ہے۔
Atomic Energy	اٹامک بیزرجی	جوہر توانائی	جوہر یا جوہر کے ذرات سے حاصل ہونے والی توانائی۔
Bagasse	باگاس	بگدا	گنے سے رس نکال لینے کے بعد بچی ہوئی ناکارہ اشیاء۔
Basal Metabolic Rate	بیسل میٹابولک ریٹ	اساسی تخویلی شرح	کسی مرکب کا تحول (Metabolism) کی اکائی وقت ہے۔
Biocenergetics	بائیو بیزرجک	حیاتی توانیات	سائنس کی وہ شاخ جس میں جاندار عضویوں کے نظام میں حر کی توانائی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
Biomass	بائیو ماس	حیاتی کیت	جاندار اجسام جیسے نباتات اور حیوانات کے اجسام جن مادوں سے تیار ہوتے ہیں انہیں حیاتی کیت کہا جاتا ہے۔
Catabolism	کٹابولیزم	تخریبی تعامل	پیچیدہ سالمات کا سادہ سالمات میں ٹوٹنا۔
Detritus Feeders	ڈیٹریٹس فیڈرز	قذافی غذا خور	مردہ نبات خور اور مردہ گوشت خور حیوانات میں پائی جانے والی توانائی کو استعمال کرنے

والے عضو ہے۔

Entropy	ینٹرپائی	بے قاعدگی	توانائی کی بلند توانائی والے علاقہ سے کم توانائی والے علاقہ کو منتقلی کے دوران توانائی کے ذرات کے درمیان تصادم کے نتیجے میں واقع ہونے والی بے قاعدگی (Disorder) یا

(Randomness)

Energy Plantation	یزرچی پلانٹیشن	توانائی شجر کاری	بجز زمین پر صرف جلتن کی کڑی کے درختوں کو اگانا۔
Energy Transformation	یزرچی ٹرانسمارمیشن	توانائی کا استحصال	توانائی کی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی۔
Fermentation	فرمینیشن	تخمیر	آکسیجن کی غیر موجودگی میں ایسٹ کے ذریعہ شکر کی الکحل اور CO_2 میں تبدیلی۔
Fission	فیوژن	انشقاق	بھاری مرکزہ کا چھوٹے مرکزوں میں ٹوٹنے کے دوران توانائی کی کافی مقدار خارج ہوتی ہے۔
Herbivores	ہیریورس	نبات خور	ابتدائی صارفین جو پودوں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔
Homotherms	ہومو تھرمس	ہم حراریوں	ایسے عضویہ جو اپنی جسمانی تپش کو ہر وقت برقرار رکھتے ہیں جیسے چلپا سے، پرندے اور پتلیے۔
Molasses	مولاسیس	مولاسیس	گنے سے شکر حاصل کرنے کے بعد بچنے والے فاضل مادے۔
Petrocrops	پیٹرو کارپس	پیٹرو فصلیں	پیٹرو لیوم اشیاء کو حاصل کرنے کے لئے کاشت کی

جانے والی پودوں کی فصلیں۔

Poikilotherms پوکی کیلو تھر مس متغیر حرارتی ایسے عضویے جن کی جسمانی تپش ماحول کے لحاظ

سے بدلتی رہتی ہے جیسے مچھلیاں اور جل تھیلے۔

Potential Energy پوٹینشل انرجی توانائی بالقوة توانائی بالقوة سے مراد وہ توانائی ہے جو جسم میں

حالت سکون کے دوران پائی جاتی ہے۔

Saprophytic سپرو فائٹک گند نبات خور مردہ نباتات سے غذا حاصل کرنے والے

عضویے۔

Weeds ویڈس ہر زات غیر مطلوبہ نباتات جو نا کارہ زمین، کھیتوں، آبی

ذخائر، دریاؤں اور سمندر کے ساحل پر اگتے ہیں۔

7 نمونہ امتحانی سوالات



7.1 مختصر جوابی سوالات

- (1) تخریمی تعامل اور تعمیراتی تعامل کے درمیان کیا فرق ہے؟ مثالیں دیجئے۔
- (2) ATP کو توانائی کی کرنسی کیوں کہا جاتا ہے؟
- (3) تجزیاتی حرارتی توانائی کس قسم کی چٹانوں میں دستیاب ہوتی ہے؟
- (4) اساسی تحولی شرح سے کیا مراد ہے؟
- (5) ماحولیاتی نظام کی پیداواری سے کیا مراد ہے؟
- (6) حیاتی کیفیت کی تعریف کیجئے۔
- (7) منور پودوں یا نور آفرینی مچھلیوں میں روشنی کو پیدا کرنے کے لئے کونسی توانائی دستیاب ہوتی ہے؟
- (8) ہر زات (Weeds) کیا ہیں؟
- (9) پیٹرو فصلیں (Petrocrops) کیا ہیں؟

(10) جول (Joul) سے کیا مراد ہے؟

7.2 طویل جوابی سوالات

(1) توانائی کا حساب کس طرح لگایا جاتا ہے؟

(2) توانائی کی اقسام کی فہرست مرتب کیجئے۔ اس کی کسی دو اقسام کو تفصیل سے بیان کیجئے۔

(3) توانائی بالفعل اور توانائی بالقوہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ مثالوں کے ذریعہ وضاحت کیجئے۔

(4) جلتن کی کڑی کے بحران پر قابو کس طرح پایا جاسکتا ہے؟ وضاحت کیجئے

(5) اساسی تحولی شرح سے کیا مراد ہے؟ مختلف حیوانات میں اساسی تحولی شرح کو بیان کیجئے۔

(6) ماحولیاتی نظام میں توانائی کے بہاؤ کو بیان کیجئے۔

(7) ابتدائی پیداواری سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام کو بیان کیجئے۔

(8) ثانوی پیداواری کی تعریف کیجئے اور اس کی وضاحت کیجئے۔

(9) توانائی شجر کاری سے کیا مراد ہے؟ توانائی شجر کاری میں منتخب شدہ پودوں کی خصوصیات کس طرح ہونی چاہئے؟

وضاحت کیجئے۔

(10) بے قاعدگی (Entropy) سے کیا مراد ہے؟ جاندار نظام میں بے قاعدگی کے زیادہ وقوع پذیر ہونے کا رجحان پایا جاتا

ہے۔ بحث کیجئے،

(11) توانائی کی منتقلی اور توانائی کے استحصال کے درمیان کیا فرق ہے؟ وضاحت کیجئے۔

(12) سوشل فاریسٹری کے مقاصد کو بیان کیجئے۔

(13) حیاتی گیس کیا ہے؟ اس کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ اس گیس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔

(14) غیر روایتی توانائی کے ذرائع پر ایک مضمون لکھیے۔

7.3 معروضی سوالات

7.3.1 خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

(1) کام کی اکائی ————— کہلاتی ہے۔

- (2) حالت حرکت کے دوران جسم میں پائی جانے والی توانائی ————— کہلاتی ہے۔
- (3) توانائی بالقوة اور توانائی بالفعل کا حاصل جمع ہمیشہ ————— ہوتا ہے۔
- (4) حیاتی نظام میں غلیبوں کی غشاء کی دونوں جانب پائے جانے والے ————— کے ارتکاز کے فرق کی وجہ سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔
- (5) عصبی نظام میں ————— پیدا ہوتا ہے۔
- (6) شعاعی ترکیب کے دوران ————— توانائی ————— میں محفوظ ہو جاتی ہے۔
- (7) شعاعی ترکیب ایک ————— فعل ہے جب کہ تنفس ————— فعل ہے۔
- (8) آزاد توانائی ————— پر قابو پالیتی ہے۔
- (9) اساسی تحولی شرح نامی آلہ کی مدد سے معلوم کی جاتی ہے۔
- (10) بحری ہر دے سے نامیاتی اشیاء جیسے ————— اور ————— کو اخذ کیا جاتا ہے۔
- 7.3.2 صحیح جواب کی نشاندہی کیجئے۔

- (1) روشن دن کی صورت میں زمین کتنی شمسی اشعار فی مربع میٹر حاصل کرتی ہے؟
- (a) 100 واٹ (b) 1000 واٹ
- (c) 5000 واٹ (d) 10000 واٹ
- (2) دنیا میں سب سے پہلے مدوجزری برقی پلانٹ کس ملک میں قائم کیا گیا؟
- (a) فرانس (b) امریکہ
- (c) چین (d) آسٹریلیا
- (3) عضلات اور ہڈیوں کی کارکردگی کے لئے کس قسم کی تبدیلی ضروری ہے؟
- (a) کیمیائی توانائی کی میکائیکل توانائی میں تبدیلی (b) میکائیکل توانائی کی ATP کی توانائی میں تبدیلی
- (c) شمسی توانائی کی برقی توانائی میں تبدیلی (d) توانائی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
- (4) ایک فحش کو جلانے کے لئے کتنی لکڑی درکار ہوتی ہے؟

- (a) 1000 کلو گرام (b) 5000 کلو گرام
(c) 300 کلو گرام (d) 3000 کلو گرام

(5) مرکز برائے غلوی اور سالانہ حیاتیات کہاں واقع ہے؟

- (a) مدراس (b) حیدر آباد
(c) کشمیر (d) بھوپال

(6) ثانوی پیداواری کن سے خشک رہتی ہے؟

- (a) پیدا کنندگان (b) صارفین
(c) گند خور (d) پیدا کنندگان اور گند خور دونوں

(7) ابتدائی پیداواری کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟

- (a) پیدا کنندگان (b) صارفین
(c) گند خور (d) پیدا کنندگان اور گند خور دونوں

(8) اساسی تحولی شرح کس قسم کے حیوان میں زیادہ ہوتی ہے۔

- (a) بڑی جسامت کے حیوان (b) سب سے چھوٹی جسامت کے حیوان
(c) اوسط جسامت کے حیوان (d) غیر متحرک حیوان

7.3.3 جوڑیاں لگائیے

B	A
() 1J	(1) برقی مچھلی
() الکٹران کی حرکت	(2) ہوائی توانائی
() 57 فی صد	(3) دل کی ایک دھڑکن کے لئے درکار توانائی
() 1.5 فی صد	(4) ایک لیٹر پٹرول سے حاصل ہونے والی توانائی
() ہوائی مل	(5) برقی توانائی

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (مدرسہ سیریز) کی چند مطبوعات
نوٹ: طلبہ و اساتذہ کے لیے خصوصی رعایت۔ تاجران کتب کو چھ ضوابط کیشن دیا جائے گا۔

جدید ہندوستان




مرتب:
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
صفحہ 229

آؤ حساب سیکھیں




مرتب:
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
صفحہ 306

ممالک اور ان کے باشندے



مرتب:
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
صفحہ 211

تہذیب کی تاریخ




مرتب:
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
صفحہ 187

ماحول کی کھنڈن



مرتب:
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
صفحہ 144

ہمارا آج کا ملک



مرتب:
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
صفحہ 105



قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

National Council for Promotion of Urdu Language
West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066