



تکامل الحاصل

$$\int \frac{1}{x} dx$$

=

$$\log x$$

شانی نارائن
لو

مکملی احصاء

ترقی اُردو بورڈ کی کتاب

مکملی احصاء

[بی۔ اے اور بی۔ ایس سی کے طلباء کے لیے]

شانتی نارائن

مترجم
سید ممتاز علی



نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا
نئی دہلی

1979 (1900)

© انگریزی : ایس۔ چاند اینڈ کمپنی۔ دہلی
اُردو : ترقی اُردو بورڈ، وزارت تعلیم اور سماجی بہبود، حکومت ہند

Original Title: INTEGRAL CALCULUS
Urdu Translation: TAKMILI EHSA

قیمت : 22/25

تقسیم کار:

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ

جامعہ نگر، نئی دہلی 110025، اُردو بازار، دہلی 110006
پرنس بلڈنگ، بمبئی 400003، یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ 202001

ڈائریکٹر نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا A-5 گرین پارک، نئی دہلی 16 نے
ترقی اُردو بورڈ (مرکزی وزارت تعلیم اور سماجی بہبود، حکومت ہند)
کے لیے برٹنی آرٹ پریس (پروپرائٹرز: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ) دریا گنج دہلی میں چھپوا کر شائع کیا۔

پیش لفظ

کسی بھی زبان کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں مختلف سائنسی، علمی اور ادبی کتابیں لکھی جائیں اور دوسری زبانوں کی اہم کتابوں کے ترجمے شائع کیے جائیں۔ یہ نہ صرف زبان کی ترقی کے لیے بلکہ قوموں کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اُردو میں اسکولوں اور کالجوں کی نصابی کتابیں، بچوں کے ادب، لغات اور سائنسی کتابوں کی ہمیشہ کمی محسوس کی جاتی رہی ہے حکومت ہند نے کتابوں کی اس کمی کو دور کرنے اور اُردو کو فروغ دینے کے لیے ترقی اُردو بورڈ قائم کر کے اعلا پیمانے پر معیاری کتابوں کی اشاعت کا ایک جامع پروگرام مرتب کیا ہے، جس کے تحت مختلف سائنسی و سماجی علوم کی کتابوں کے ترجمے اور اشاعت کے ساتھ لغات، انسائیکلو پیڈیا، اصطلاحات سازی، اور بنیادی متن کی تحقیق و تیاری کا کام ہو رہا ہے۔

ترقی اُردو بورڈ اب تک بہت سی نصابی کتابیں، بچوں کے ادب، علمی، ادبی اور سائنسی کتابیں شائع کر چکا ہے جنہیں اُردو دنیا میں بید مقبولیت حاصل ہوئی ہے، یہاں تک کہ بعض کتابوں کے دوسرے اور تیسرے ایڈیشن بھی شائع ہو رہے ہیں۔ زیر نظر کتاب بھی اسی اشاعتی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسے بھی علمی اور ادبی حلقوں میں پسند کیا جائے گا۔

کی۔ سی۔ سی۔

(ڈاکٹر ایس۔ ایم۔ عباس شارب)

پرنسپل پبلیکیشن افیسر

بیورو فار پروموشن آف اُردو۔ وزارت تعلیم اور سماجی بہبود، حکومت ہند

آٹھویں اشاعت کا دیباچہ

یہ کتاب کئی بار شائع ہو چکی ہے اور ہر بار اس پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ سابقہ ادیشن میں جو طباعت و غیرہ کی غلطیاں تھیں وہ اب دور ہو جائیں گی۔ مثالوں اور مشقوں میں بھی کچھ تبدیلیاں کرنے کے علاوہ علامتیں $\Rightarrow$ اور $\Leftarrow$ بھی استعمال کی گئی ہیں جن کے ترتیب وار معنی ہیں: ”تب“ ”جبکہ“ اور ”تبھی جبکہ“۔ امید کی جاتی ہے کہ ان کے استعمال سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

میں مرٹنڈاؤس دہلی کے شعبہ ریاضی کی کماری نیلا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ادیشن کی تیاری میں مجھے بھرپور تعاون دیا۔

شانتی نارائن

دہلی 20.7.1968

پہلی اشاعت کا دیباچہ

اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری کتاب ”Differential Calculus“ کی معاون کتاب کا کام دے اور اس طرح لکھی گئی ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے بی۔اے، بی۔ایس سی کے طالب علموں کی ضرورت کو پورا کرے۔

پہلے باب میں ”تفرقی سر کے برعکس“ مفہوم پر مبنی غیر معین تکملوں کی تعریف بتائی گئی ہے اور پھر معین تکملوں کا حیو مٹریائی مفہوم بتایا گیا ہے۔ اس باب میں غیر واجب تکملوں کا بھی آسان اور مختصر تذکرہ ہے۔ دوسرے باب میں تکمل کے دونوں طریقے۔ یعنی متغیری تبدیلی سے تکمل اور جسے سے تکمل کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرے چوتھے اور پانچویں ابواب میں باقاعدہ ترتیب وار جبری ناطق تفاعل، شلشی تفاعل اور جبری غیر ناطق تفاعل کا تکمل

بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کے ابواب میں تقسیم، تکمیل کے طریقوں کے حساب سے نہ کر کے، اُن تفاعلوں کی قسموں کے مطابق کی گئی ہے جن کا تکمیل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے طالب علموں کو تکمیل کی ترکیب پر مہارت حاصل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس کے بعد رقبہ، قوسی اصلاح اور گردش سطح اور حجم نکالنے میں تکمیلی احصائے استعمال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کسی معین تکملہ کا مفہوم بطور مجموعہ کی انتہا بتایا گیا ہے۔ یہ تذکرہ صرف جیومیٹری کی نظریے پر منحصر ہے، تخیلی خیالات پر نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر تخیلی ثبوت نہیں دیے کیونکہ مشکل ہونے کے باعث وہ طالب علم کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتے اور جو ثبوت عموماً دیے جاتے ہیں وہ نامناسب اور بہکانے والے ہوتے ہیں۔ تخیلی فارمولوں کا کوئی الگ باب نہیں ہے اور ایسی بھی صورتوں پر اُن کی مناسب جگہوں پر ہی غور کیا گیا ہے۔ آخری دو ابواب میں تفریقی مساوات پر مختصر ابتدائی نصاب دے دیا گیا ہے۔

اس کتاب میں مختلف قسم کے سوالات سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر سیتا رام گپتا ایم۔ اے، پی۔ ای۔ ایس کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے کتاب کے اس نسخے کے ایک حصہ کو دیکھنے کی مہربانی کی اور کسی بیش قیمت مشورے دیے۔ میں اپنے دوست اور ساتھی پروفیسر ادم پرکاش گپتا، ایم۔ اے، ڈی۔ اے۔ دی کالج لاہور اور پروفیسر رام جی داس سیال، ایم۔ اے، دیانند مکینیکل انسٹی ٹیوٹ، لاہور کا بھی بہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کتاب کی تیاری میں مدد دی۔ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں گا جو اس کتاب کو بہتر بنانے میں مشورے دیں گے یا ایسی غلطیوں کی طرف توجہ دلائیں گے جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں۔

شانتی نارائن

لاہور

دسمبر، 1942

فہرست مضامین

باب 1

معیاری نتائج کی جدول

17		تفاعل کے مکملہ کی تعریف	1-1
19		مکمل کا قدم تعین	1-3
20		معیاری ابتدائی مکملوں کی جدول	1-4
23		دو آسان مسئلے	1-5
27		معیّن تکملہ	1-6
29		معیّن مکملوں کی دو اہم خصوصیات	1-7
30		معیّن تکملہ کا جیومیٹریائی مفہوم	1-8
35		غیر واجب معیّن تکملے	1-9

باب 2

مکمل کے طریقے

(عوضی اور حصہ وار مکمل)

44		مکمل کے طریقے	2-1
45		عوضی سے مکمل	2-2
49		تین اہم قسم کے مکملے	2-3

2.4 ذیلی تفاعلوں کا تکمیل

		$1/\sqrt{(a^2-x^2)}, 1/\sqrt{(a^2+x^2)}, 1/\sqrt{(x^2-a^2)},$
58		$\sqrt{(a^2-x^2)}, \sqrt{(a^2+x^2)}, \sqrt{(x^2-a^2)}$
65		حصہ سے تکمیل 2.5
71		$e^{ax} \cos (bx+c)$ اور $e^{ax} \sin (bx+c)$ کا تکمیل 2.52
76		معین تکمیل 2.7
82		تحویلی فارمولے 2.8

باب 3

جبری ناطق تفاعلوں کا تکمیل

92		عمومی تبصرہ 3.1
97		وہ صورت جبکہ ایک ہی بار آئے والے خطی فیکٹر ہوں 3.2
98		وہ صورت جبکہ ایک بار یا کئی بار آئے والے خطی فیکٹر ہوں 3.3
100		وہ صورت جبکہ خطی یا دوسری ڈگری کے ایک ہی بار آئے والے فیکٹر ہوں 3.4
		$(Lx+M)/(Ax^2+2Bx+C)^n$ کا تکمیل اور $\int dx/(a^2+x^2)^n$ کے لیے 3.5
104		تحویلی فارمولا 3.6
110		عوضی سے جبری تفاعلوں کا تکمیل 3.7
114		کے جبری تفاعلوں کا تکمیل

باب 4

مشائاتی تفاعلوں کا تکمیل

		$\int \sin^n x dx$ کا تکمیل اور $\int \sin^n x dx$ کے لیے تحویلی فارمولا- 4.1
119		$\int_0^{n/2} \sin^n x dx$ حاصل کرنا

- 4-2 $\cos^n x$ کا تکمیل اور $\int \cos^n x dx$ کے لیے تحویلی فارمولہ
- 124 $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$ حاصل کرنا
- 128 $\int_0^{\pi/2} \sin^p x \cos^q x dx$ کا تکمیل اور $\sin^p x \cos^q x$ حاصل کرنا 4-3
- 136 $\int \tan^n x dx$ اور $\int \cot^n x dx$ کے لیے تحویلی فارمولے 4-4
- 4-5 $\sec^n x$ اور $\operatorname{cosec}^n x$ کا تکمیل اور
- 138 $\int \sec^n x dx$ اور $\int \operatorname{cosec}^n x dx$ کے لیے تحویلی فارمولے
- 4-6 $\sin^p x \cos^q x$ کا تکمیل جب کہ $p+q$ منفی جفت کامل عدد ہوں
- 140 $\int \sin^p x \cos^q x dx$ کے لیے مختلف تحویلی فارمولے
- 146 $\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعلوں کا تکمیل 4-7
- 4-81 $(a \cos x + b \sin x)/(c \cos x + d \sin x)$ اور $(a \cos x + b \sin x + c)/(d \cos x + e \sin x + f)$ کا
- 154 تکمیل کرنا
- 156 میں تکملوں کی دو خصوصیات 4-9
- 164 $\int \cos^m x \cos nx dx$ کے لیے تحویلی فارمولہ 4-10
- 165 $\int_0^a e^{-ax} \sin^n x dx$ حاصل کرنا 4-11

باب 5

غیر ناطق تفاعلوں کا تکمیل

- 5-1 x اور ایک خطی سرڈ $(ax+b)^{1/n}$ کے ناطق تفاعل کا تکمیل جب کہ n مثبت کامل عدد ہو۔
- 183 تکمیل $\int \sqrt{ax^2+bx+c} dx$, $\int dx/\sqrt{ax^2+bx+c}$ حاصل کرنا۔ 5-2
- 5-3 تفاعل $\int (Ax+B)dx/\sqrt{ax^2+bx+c}$
- 185 اور $\int (Ax+B)/\sqrt{ax^2+bx+c} dx$ کا تکمیل کرنا

187	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5-4	$\int x^n dx / \sqrt{ax^2 + bx + c}$ کے لیے تحویلی فارمولا
192	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5-5	تکملہ $\int dx / (Ax + B) \sqrt{ax^2 + bx + c}$ حاصل کرنا ..
194	..	..	..	..	..	..	..	..	..	تکملہ	$\int dx / (ax^2 + bx + c) \sqrt{Ax^2 + Bx + C}$ حاصل کرنا ..
196	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5-7	مشقاتی استحالوں کے ذریعے جبری غیرناطق تفاضلوں کا تکمیل
199	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5-8	$x^m (a + bx^n)^p$ کا تکمیل
205	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5-9	تکملہ $\int x^m (a + bx^n)^p dx$ کے لیے تحویلی فارمولا
213	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5-10	عام خیالات
217	..	..	..	..	..	..	..	..	..		متفرق مشقیں 1
226	..	..	..	..	..	..	..	..	..		متفرق مشقیں 2

باب 6

معین تکملہ بطور مجموعہ کی انتہا

232		6-1	تمہید
233		6-2	بنیادی مسئلے کا ثبوت ..
238		6-3	سلسلوں کا مجموعہ نکالنا

استعمال

باب 7

ہموار قطعوں کے رقبے

246		7-1	وہ رقبہ جو ایک منحنی x -محور اور دو عرضوں کے درمیان گھرا ہوا ہو ..
254		7-2	زاہد کی تربیع ..
258		7-3	قطعہ کا رقبہ ..

- 7.4 کسی بند مٹھی سے گھرا ہوا رقبہ 268
 7.5 معین تکملوں اور رقبوں کا تخمینہ لگانے کے لیے سمین کا اصول 277

توسی اصلاح

باب 8

ہموار مٹھیوں کی لمبائیاں

- 8.1 تمہید 288
 8.2 مٹھی $y = f(x)$ کی لمبائی کا فارمولا
 8.3 مٹھیوں $x = f(y)$; $x = f(t)$, $y = \phi(t)$; $r = f(\theta)$ کے توسوں
 8.4 کی لمبائی کے فارمولے 289
 8.5 کارٹیزی اور قطبی مساوات سے نجی مساوات حاصل کرنا 296
 8.5 علیس کی توسی اصلاح 302

باب 9

گردشی شکلوں کے حجم اور سطح

- 9.1 تمہید 307
 9.2 دو میں سے کسی محور کے گرد گھمانے پر بنے حجم کا فارمولا
 9.3 کسی بھی خط کے گرد گھمانے پر بنے حجم کا فارمولا 316
 9.4 مخروط کے فرسٹم کی سطح کا رقبہ 322
 9.5 گردشی سطح کے رقبہ کا فارمولا 323
 9.6 پائپس کے مسئلے 327
 9.7 گردشی سطح 329

334 متفرق مشقیں 3

باب 10

مرکز ثقل و جمود کا معیار اثر

341		تہید	10-1
342		مرکز ثقل	10-2
343		مرکز ثقل اور جمود کا معیار اثر	10-3
353		جمود کا معیار اثر	10-4

تفرقی مساواتیں

باب 11

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

360		ابتدائی تعین	11-1
364		اختیاری مستقل	11-2
366		وہ مساوات جن میں متغیر الگ الگ ہو سکتے ہوں	11-3
370		خطی مساوات	11-4
375		وہ مساوات جو خطی شکل میں بدل سکیں	11-5
377		ہم جنس مساوات	11-6
380		وہ مساوات جو ہم جنس صورت میں بدل سکیں	11-7
383		راست تفرقی مساواتیں	11-8
387		تکلی جزو	11-9

باب 12

وہ مساوات جو پہلے رتبے کی ہیں لیکن پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

- 391 { 12-1 تمہید
 12-2 p کے لیے حل ہو سکنے والی مساوات
 394 { 12-3 y کے لیے حل ہو سکنے والی مساوات
 395 { 12-4 x کے لیے حل ہو سکنے والی مساوات
 397 { 12-5 کلیہ کی مساوات
 400 { 12-6 پہلے رتبے کی تفرقی مساوات کا جیومیٹریائی مفہوم
 401 { 12-7 واحد حل

باب 13

قبیلہ منحنی کے مستدیر

- 409 { 13-1 تعریفیں
 13-2 کارٹیزی مختصات
 411 { 13-3 قطبی مختصات

باب 14

خطی مساواتیں

- 418 { 14-1 خطی مساوات کی تعریف
 14-2 تمامی تفاعل اور مکملہ خاص
 421 { 14-3 عامل - عاملوں کے چل ضرب کے لیے مبادلی اصول
 424 { 14-5 تمامی تفاعل حاصل کرنا

431		مکوس عامل	14-6
434		تکملہ خاص حاصل کرنا	14-7
439		تکملہ خاص نکالنے کے عملی اصول	14-81
460		ہم جنس خطی مساواتیں	14-10
466		متفرق مشقیں 4	

ضمیمہ 1

471	{	غیر واجب تکملوں کا تقارب	A-1
	{	وہ صورت جبکہ قطع تکمل لا متناہی ہو	A-21
474		وہ صورت جبکہ تکاملیہ لا متناہی ہو	A-22
475		نہیں اہم موازنی تکملے	A-3
480		بیٹا تفاعل	A-4
485		گاما تفاعل	A-5
487		بیٹا اور گاما تفاعلوں میں رشتہ	A-6

ضمیمہ 2

493		تکملی علامات کے تحت تفرق جبکہ حدیں مستقل ہوں	A-7
496		وہ صورت جبکہ تکملی حدیں متغیر ہوں	A-8
498		تکملی علامات کے تحت تفرق	A-9

لغت 1

512	(ix) — (xi)	انگریزی سے اردو	L-1
525	(ix) (xv)	اردو سے انگریزی	L-2

تعریفیں (Definitions)

معیاری نتائج کی جدول

1.1 - تفاعل (function.) کا تکملہ (Integral) : سیکاملیہ (Integrand.) :

اگر کسی تفاعل $f(x)$ کا تفرقی سر (differential coefficient) $F(x)$ ہو، یعنی اگر

$$\frac{df(x)}{dx} = F(x)$$

نوہم کہتے ہیں کہ $F(x)$ کا ایک تکملہ (Integral) یا آبائی (Primitive) $f(x)$ ہے اور ہم اسے علامتوں میں اس طرح لکھتے ہیں:

$$\int F(x)dx = f(x)$$

مثال کے طور پر $\cos$ کا ایک تکملہ $\sin x$ ہے، یعنی

$$\frac{d \sin x}{dx} = \cos x \Rightarrow \int \cos x dx = \sin x.$$

ایک اور مثال لیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $1/x$ کا ایک تکملہ $\log x$ ہے، یعنی

$$\frac{d \log x}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow \int \frac{1}{x} dx = \log x$$

dx میں حرف x یہ ظاہر کرتا ہے کہ تکملہ لحاظ متغیر x ہو رہا ہے۔

کسی تفاعل کا تکملہ معلوم کرنے کے عمل کو تکمل کہتے ہیں اور جس تفاعل کا تکمل ہو رہا ہو اُسے تکملیہ کہتے ہیں۔

چونکہ عمل اور تفرق ایک دوسرے کے معکوس عمل ہیں اس لیے

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x).$$

مشق: ثبات کیجیے کہ

- (i) $\int x dx = x^2/2$. (ii) $\int \sin x dx = -\cos x + C$.
(iii) $\int at^3 dt = at^4/4$. (iv) $\int 1/y dy = \log y + C$.

1.2 - تکملی احصاء (Integral Calculus) کے علم کا مقصد کسی دیے ہوئے تفاعل کا تکملہ نکالنے کے طریقوں کے دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ اس علم کا استعمال جیومیٹری اور قدرتی و سماجی سائنس میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ہم اس کتاب میں پڑھیں گے کہ اس علم کی مدد سے مستوی سطح کا اربعہ (Plane areas) قوس کی لمبائی (Lengths of arcs) گردشی ٹھوس شکلوں (solids of revolution) کے حجم اور سطح (Volumes and Surfaces) مرکز ثقل (Centre of gravity) اور معیار جمود کے معیار اثر (Moment of Inertia) کس طرح معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

تاریخی اعتبار سے اس علم کا آغاز ہموار قطعوں (plane regions) کا رقبہ نکالنے کے سلسلے میں ہوا اور یہ علم ایسے ارکان (terms) کے مجموعوں کی انتہائی قیمت (Limit) سے متعلق تھا جن میں ارکان کی تعداد انتہائی بڑھتی جائے اور ہر ارکان چھوٹا ہو کر صفر کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ دراصل جوڑنے کے اس عمل کی بنا پر ہی اس مضمون کا نام تکملی احصاء پڑا۔ یہاں تکمل کرنے کے لفظی معنی "جوڑ معلوم کرنا" ہے۔ بعد میں یہ دیکھا گیا کہ تکمل کے مضمون کو تفریق کا معکوس بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ اس علم کی تاریخی ترتیب میں پڑے بغیر، جیسا اور کہا جا چکا ہے تکمل کو ہم تفریق کا معکوس مضمون ہی سمجھیں گے۔ باب 9 میں ہم تکمل کو ارکان کے مجموعے کی حیثیت سے بھی پڑھیں گے۔

1.3' تکمیل کی قیمت کا عدم تعین (Indefinite valuedness of Integration):

عام تکملہ (General Integral): (Arbitrary Constant) اختیاری مستقل

اگر $F(x)$ کا ایک تکملہ $f(x)$ ہو تو $f(x) + c$ بھی $F(x)$ کا ایک تکملہ ہوگا جہاں c کوئی بھی مستقل (constant) ہے: کیونکہ اگر

$$\frac{d f(x)}{dx} = F(x)$$

$$\frac{d [f(x) + c]}{dx} = F(x) \quad \text{تو ساتھ ہی}$$

پھر مان لیجیے کہ $F(x)$ کے کوئی دو تکملے $I(x)$ اور $\varphi(x)$ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ

$$f'(x) = \varphi'(x) = F(x)$$

چونکہ تفاضلوں $f(x)$ اور $\varphi(x)$ کے تفرقی سر (differential coefficients) برابر ہیں اس لیے ان میں فرق صرف ایک مستقل کا ہی ہوگا، یعنی

$$f(x) - \varphi(x) = c$$

$$\Rightarrow f(x) = \varphi(x) + c,$$

جہاں c ایک مستقل ہے۔

ان باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی تفاعل کا تکملہ لاثانی (unique) نہیں ہوتا اور یہ کہ اگر $I(x)$ کا ایک تکملہ $\varphi(x)$ ہو تو

$$I(x) + c \quad \text{بھی } F(x) \text{ کا تکملہ ہوتا ہے جہاں } c \text{ کوئی بھی مستقل ہے؛} \quad (i)$$

$$I(x) + c \quad \text{میں } c \text{ کو مناسب قیمت (value) دے کر } F(x) \text{ کا ہر ایک تکملہ} \quad (ii)$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس لیے اگر $F(x)$ کا کوئی ایک تکملہ $I(x)$ ہو تو $I(x) + c$ اس کا عام تکملہ

(General integral) ہوتا ہے۔

مصنف کی کتاب Differential Calculus دیکھیے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی تفاعل کے دو تکملوں میں فرق صرف ایک مستقل کا ہی ہوتا ہے۔

مستقل c کو تکملی مستقل (constant of integrals) کہتے ہیں۔ عموماً تکملی مستقل لکھا نہیں جاتا اور $F(x)$ کے کسی بھی تکملہ کو $F(x) dx$ سے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ علامت $F(x) dx$ کی دراصل لامتناہی قیمتیں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تکمل کے مختلف طریقوں سے ہمیں ایک ہی تفاعل کے مختلف تکملے حاصل ہوں لیکن ہمیشہ اُن میں فرق صرف ایک مستقل کا ہی ہوگا۔

مشق: ثابت کیجیے کہ

(i) $4x^3$ کا عام تکملہ $x^4 + c$ ہے۔

(ii) $1/\sqrt{1-x^2}$ کا عام تکملہ $\sin^{-1} x + c$ ہے۔

(iii) $\sec x \tan x$ کا عام تکملہ $\sec x + c$ ہے۔

جہاں c ایک اختیاری مستقل ہے۔

۱۸ ابتدائی تکملوں کی جدول

اب ہم ابتدائی تکملوں کی فہرست دے رہے ہیں جو کہ ابتدائی تفاعلوں کے تفرقی سرور (differential coefficients) کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔

$$\begin{aligned} \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1}, (n \neq -1) & \therefore \frac{1}{n+1} \frac{d(x^{n+1})}{dx} &= x^n. \\ \int \frac{1}{x} dx &= \log x, & \therefore \frac{d(\log x)}{dx} &= \frac{1}{x}. \\ \int e^x dx &= e^x, & \therefore \frac{d(e^x)}{dx} &= e^x. \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\log a}, & \therefore \frac{d(a^x/\log a)}{dx} &= a^x. \\ \int \sin x dx &= -\cos x, & \therefore \frac{d(-\cos x)}{dx} &= \sin x. \end{aligned}$$

• جب $n = -1$ تو $x^n = x^{-1} = 1/x$ اور اس کا تکملہ $\log x$ ہے۔

$$\begin{aligned}
\int \cos x \, dx &= \sin x, & \therefore \frac{d(\sin x)}{dx} &= \cos x \\
\int \sec^2 x \, dx &= \tan x, & \therefore \frac{d(\tan x)}{dx} &= \sec^2 x \\
\int \operatorname{cosec}^2 x \, dx &= -\cot x, & \therefore \frac{d(-\cot x)}{dx} &= \operatorname{cosec}^2 x \\
\int \sec x \tan x \, dx &= \sec x, & \therefore \frac{d(\sec x)}{dx} &= \sec x \tan x \\
\int \operatorname{cosec} x \cot x \, dx &= -\operatorname{cosec} x, & \therefore \frac{d(-\operatorname{cosec} x)}{dx} &= \cot x \operatorname{cosec} x \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \sin^{-1} x \text{ or } -\cos^{-1} x, & \therefore \frac{d(\sin^{-1} x)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
& & &= \frac{d(-\cos^{-1} x)}{dx} \\
\int \frac{1}{1+x^2} \, dx &= \tan^{-1} x \text{ or } -\cot^{-1} x, & \therefore \frac{d(\tan^{-1} x)}{dx} &= \frac{1}{1+x^2} \\
& & &= \frac{d(-\cot^{-1} x)}{dx} \\
\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \, dx &= \sec^{-1} x \text{ or } -\operatorname{cosec}^{-1} x, & \therefore \frac{d(\sec^{-1} x)}{dx} &= \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \\
& & &= \frac{d(-\operatorname{cosec}^{-1} x)}{dx} \\
\int \cosh x \, dx &= \sinh x, & \therefore \frac{d(\sinh x)}{dx} &= \cosh x \\
\int \sinh x \, dx &= \cosh x, & \therefore \frac{d(\cosh x)}{dx} &= \sinh x.
\end{aligned}$$

یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب $n \neq -1$ تو x^n کا تکملہ پانے کے لیے x کی قوت نما
(index) میں ایک بڑھا کر x^{n+1} حاصل کر کے اسے $n+1$ سے تقسیم کر کے x^n کا تکملہ
ملتا ہے۔
مثال کے طور پر

$$\begin{aligned}
\int x^{\frac{1}{2}} \, dx &= \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{2}{3} x^{3/2}, \\
\int \frac{1}{x^2} \, dx &= \int x^{-2} \, dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = -\frac{1}{x}
\end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \log x$$

پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ $\log x$ اُسی وقت معنی رکھتا ہے جب x مثبت (positive) ہو۔ اس لیے جب ہم $d(\log x)/dx = 1/x$ یا $\int (1/x)dx = \log x$ لکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ x مثبت ہے۔ اگر x منفی (negative) ہو تو $(-x)$ مثبت ہوگا اور اس لیے $\log(-x)$ معنی رکھے گا۔ اس لیے اس صورت میں

$$\frac{d[\log(-x)]}{dx} = \frac{1}{-x} \times -1 = \frac{1}{x}$$

اس لیے x منفی ہو تو

$$\int \frac{1}{x} dx = \log(-x)$$

اس طرح $1/x$ کا تکملہ $\log x$ ہوگا اگر x مثبت ہو اور تکملہ $\log(-x)$ ہوگا اگر x منفی ہو۔ ان دونوں نتیجوں کو یکجا کر کے لکھ سکتے ہیں:-

$$\int \frac{1}{x} dx = \log |x|$$

جہاں $|x|$ کا مطلب x کی مطلق قیمت (absolute value) ہے:-

نوٹ 2: اوپر دی ہوئی فہرست میں معکوس مثلثاتی تفاعل (inverse trigo - nometrical functions) واحد قیمت (single-valued) تفاعل ہیں جن کی تعریف (Def - inition) مصنف کی کتاب Differential Calculus کے باب 2 میں دی ہوئی ہے۔ اس طرح

$$\sin^{-1} x, \tan^{-1} x, \cot^{-1} x, \operatorname{cosec}^{-1} x$$

بالترتیب $-\pi/2$ اور $\pi/2$ کے درمیان والے وہ زاویے ہیں جن کے

sine, tangent, Cotangent, Cosecant

x کے برابر ہوں۔ اسی طرح

$$\cos^{-1} x, \sec^{-1} x$$

تعریفیں

صفر اور x کے درمیان والے وہ زاویے ہیں جن کے

cosine , secant

x کے برابر ہوں۔

نوٹ 3 : اوپر دی ہوئی فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ $1/\sqrt{1-x^2}$ کے دو ٹکے $\sin^{-1}x$ اور $(-\cos^{-1}x)$ اس کا یہ مطلب نہیں کہ $\sin^{-1}x$ اور $-\cos^{-1}x$ برابر ہیں بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق ایک مستقل کے برابر ہے۔ دراصل ابتدائی علم مثلث (trigonometry) سے ہم جانتے ہیں کہ

$$\sin^{-1}x - (-\cos^{-1}x) = \sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$$

مشق : ذیل کے ٹکے حاصل کیجیے :

(i) x^3 ,	(ii) $\sqrt{x}$,	(iii) $\sqrt[3]{x^2}$,	(iv) $\sqrt{x^{-3}}$,
(v) 2^x ,	(vi) $(\frac{1}{2})^x$,	(vii) a^{2x} ,	(viii) e^{3x} .

جوابات :

(i) $\frac{3}{2}x^{\frac{5}{2}}$,	(ii) $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$,	(iii) $\frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}}$,	(iv) $-2x^{-\frac{3}{2}}$
(v) $\frac{2^x}{\log 2}$,	(vi) $\frac{-(\frac{1}{2})^x}{\log 2}$,	(vii) $\frac{a^{2x}}{2 \log a}$,	(viii) $\frac{e^{3x}}{3}$

1.5- دو آسان مسئلے (theorems)

1.51- پہلا مسئلہ :

$$(A) \dots\dots\dots \int a f(x)dx = a \int f(x) dx$$

یعنی ایک مستقل اور ایک تفاعل کے حاصل ضرب (product) کا ٹکڑا اس تفاعل کے ٹکڑے اور مستقل کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔

اس کا ثبوت اس کے مطابق (corresponding) تفرقی احصاء (Differential Calculus) کے اس مسئلے سے ملتا ہے جس کی رو سے ایک مستقل اور ایک تفاعل کے

حاصل ضرب کا تفرقی سر (Differential Coefficient) تفاعل کے تفرقی سر اور مستقل کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔
(A) کی داہنی جانب کا تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left[a \int f(x) dx \right] = a \frac{d}{dx} \int f(x) dx = a f(x),$$

$$\int a f(x) dx = a \int f(x) dx.$$

۱۰۵۲ دوسرا مسئلہ:

$$(B) \dots\dots\dots \int [f(x) \pm F(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int F(x) dx$$

یعنی دو تفاعلوں کے جوڑ (فرق) کا تکملہ اُن کے تکملوں کے جوڑ (فرق) کے برابر ہوتا ہے۔

اس کا ثبوت اس کے مطابق تفرقی حساب کے اُس مسئلے سے ملتا ہے جس کی رو سے دو تفاعلوں کے جوڑ (فرق) کا تفرقی سر اُن تفاعلوں کے تفرقی سروں (Differential Coefficients) کے جوڑ (فرق) کے برابر ہوتا ہے۔
(B) کی داہنی جانب کا تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \pm \int F(x) dx \right] = \frac{d}{dx} \int f(x) dx \pm \frac{d}{dx} \int F(x) dx$$

$$= f(x) \pm F(x)$$

$$\Rightarrow \int [f(x) \pm F(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int F(x) dx.$$

یہ آسانی اس مسئلے کی توسیع (Extension) تفاعلوں کی کسی محدود (finite) تعداد کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم پاتے ہیں

$$\int [f_1(x) \pm f_2(x) \pm f_3(x) \pm \dots \pm f_n(x)] dx$$

$$= \int f_1(x) dx \pm \int f_2(x) dx \pm \dots \pm \int f_n(x) dx$$

نوٹ : جب کسی تکاملیہ (integrand) کو ایسے کئی تکاملیوں کے جوڑ کی شکل میں رکھا جاسکے جن کے تکملے معلوم ہوں تب یہ دونوں مسئلے نہایت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ دراصل آگے دیکھیں گے کہ کسی تکاملیہ کو ایسے تکاملیوں جن کے تکملے معلوم ہوں کے جوڑ کی شکل میں رکھنے کا یہ طریقہ تکمل کا نہایت اہم اور کارآمد طریقہ ہے۔

مثالیں

1. $\int 3x^3 dx = 3 \int x^3 dx = \frac{3x^4}{4}$
2. $\int (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n) dx$
 $= \int a_0 dx + \int a_1 x dx + \int a_2 x^2 dx + \dots + \int a_n x^n dx$
 $= a_0 \int 1 dx + a_1 \int x dx + a_2 \int x^2 dx + \dots + a_n \int x^n dx$
 $= a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + a_2 \frac{x^3}{3} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$
3. $\int \left(\cos x + \frac{2}{x} - e^x \right) dx = \int \cos x dx + 2 \int \frac{1}{x} dx - \int e^x dx$
 $= \sin x + 2 \log x - e^x$
4. $\int \frac{3-5x^3+7x^4-9x^5}{x^6} dx = \int \left(\frac{3}{x^6} - \frac{5}{x^3} + \frac{7}{x^2} - 9 \right) dx$
 $= \int \frac{3}{x^6} dx - \int \frac{5}{x^3} dx + \int \frac{7}{x^2} dx - \int 9 dx$
 $= -\frac{3}{5x^5} + \frac{5}{3x^2} - \frac{7}{x} - 9x$
 $= \frac{-9+25x^3-105x^4-135x^5}{15x^5}$
5. $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \frac{(x^2+1)-1}{x^2+1} dx$
 $= \int \left(1 - \frac{1}{x^2+1} \right) dx$
 $= \int 1 dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx = x - \tan^{-1} x.$
6. $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx = \int \frac{x^3-1+1}{x^2+1} dx = \int \left(x - \frac{1}{x^2+1} \right) dx$
 $= \frac{x^2}{2} - x + \tan^{-1} x.$

7. $\int \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^3 x \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x \cos^3 x} dx + \int \frac{\cos^3 x}{\sin^3 x \cos^3 x} dx$
 $= \int \tan x \sec x dx + \int \cot x \operatorname{cosec} x dx$
 $= \sec x - \operatorname{cosec} x.$
8. $\int \sqrt{1 - \sin 2x} dx = \int \sqrt{(\sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x)} dx$
 $= \int \sqrt{(\sin x - \cos x)^2} dx$
 $= \int (\sin x - \cos x) dx$
 $= -\cos x - \sin x = -(\cos x + \sin x)$
9. $\int \sqrt{1 - \cos 2x} dx = \int \sqrt{2 \sin^2 x} dx$
 $= \int \sqrt{2} \sin x dx$
 $= \sqrt{2} \int \sin x dx = -\sqrt{2} \cos x.$

مشقیں

ذیل کے تکلی حاصل کیجیے :-

- $x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}}$
- $(x^3 + 2x + 3)/x^4$
- $\frac{(1+2x)^3}{x^4}$
- $\frac{2x^4 + 3}{x^2 + 1}$
- $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$
- $\frac{(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x^3})^2}{x}$
- $\frac{x^4 + x^2 + 1}{2(x^3 + 1)}$
- $\frac{x^3 - 1}{x^2 + 1}$
- $5 \cos x - 3 \sin x - \frac{2}{\cos^2 x}$
- $\frac{5 \cos^3 x + 7 \sin^3 x}{2 \sin^2 x \cos^2 x}$
- $\frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x}$
- $\sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x$
- $\frac{3 \cos x - 4}{\sin^2 x}$
- $\frac{1 + 2 \sin x}{\cos^3 x}$
- $\tan^2 x$
- $\cot^2 x$
- $(\tan x + \cot x)^2$
- $(1 - \cos 2x)/(1 + \cos 2x)$
- $\sqrt{1 + \sin 2x}$
- $\sqrt{1 + \cos 2x}$

جوابات

- $\frac{3}{4}x^{4/3} + \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{4}{5}x^{5/4}$
- $-(x^3 + x + 1)/x^5$

3. $-(1+9x+36x^2)/3x^3+8 \log x.$	4. $\frac{1}{3}(x^3-2x)+5 \tan^{-1} x.$
5. $x-2 \tan^{-1} x.$	6. $x+\frac{1}{3}x^{4/3}+\frac{1}{7}x^{7/6}$
7. $\frac{1}{6}(x^3+3 \tan^{-1} x).$	8. $\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x^2+x-2 \tan^{-1} x$
9. $5 \sin x+3 \cos x-2 \tan x$	10. $\frac{1}{4} \sec x - \frac{5}{4} \operatorname{cosec} x$
11. $-\sec x \operatorname{cosec} x.$	12. $-2 \cot 2 x.$
13. $-4 \cot x+3 \operatorname{cosec} x.$	14. $\tan x+2 \sec x.$
15. $\tan x-x.$	16. $-\cot x-x.$
17. $-2 \cot 2x.$	18. $\tan x-x$
19. $-\cos x+\sin x$	20. $\sqrt{2} \cos x$

معیّن تکملہ: 1.6

جیومیٹری اور کچھ دیگر مضامین میں تکمیلی احصاء استعمال کرنے میں اکثر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ متغیر x (variable) کی دودی ہوئی قیمتوں، مان پیچھے h اور b کے لیے تفاعل $f(x)$ کے ایک تکملے کی قیمتوں کا فرق معلوم کیا جائے۔ اس فرق کو وقفہ $[a, b]$ کے لیے $f(x)$ کا معیّن تکملہ (Definite integral) کہتے ہیں اور اسے

$$\int_a^b f(x) dx.$$

سے ظاہر کرتے ہیں۔
اس طرح

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

جہاں $F(x)$ تفاعل $f(x)$ کا کوئی تکملہ ہے۔
فرق $[F(b) - F(a)]$ کو کبھی کبھی $|F(x)|_a^b$ سے بھی ظاہر کرتے ہیں۔
اس طرح اگر $F(x)$ تفاعل $f(x)$ کا کوئی تکملہ ہو تو

$$\int_a^b f(x) dx = |F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

نمبر a کو تکمل کی زیریں حد (Lower limit) اور نمبر b کو تکمل کی صعودی حد (Upper limit) کہتے ہیں۔

یہ غور کرنے کی بات ہے کہ معین تکملہ کی قیمت یکتا ہوتی ہے اور یہ اُس خاص تکملے پر منحصر نہیں ہوتی جو اسے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اگر $F(x)$ کے بجائے $F(x)+c$ استعمال کرتے تو

$$\int_a^b f(x) dx = \left| F(x)+c \right|_a^b = \{ F(b)+c \} - \{ F(a)+c \} = F(b) - F(a),$$

اس طرح اختیاری مستقل c کٹ جاتا ہے اور ہمیں وہی قیمت ملتی ہے جو $F(x)$ استعمال کرنے پر ملتی ہے۔

مثالیں

1. $\int_1^2 x dx = \left| \frac{x^2}{2} \right|_1^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{3}{2}.$
2. $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \left| \tan^{-1} x \right|_0^1 = \tan^{-1} 1 - \tan^{-1} 0 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$
3. $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = \left| -\cos x \right|_0^{\pi/2} = -\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 = 1.$

مشقیں

ذیل تکملے حاصل کیجیے:

1. $\int_0^2 x^3 dx.$	2. $\int_0^2 (2x+3x^3) dx.$
3. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx.$	4. $\int_1^2 \frac{1}{x} dx.$
5. $\int_a^b e^x dx.$	6. $\int_0^1 x^4(1+x)^3 dx.$

تعریفیں

7. $\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \cos x \, dx.$	8. $\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \sec^2 x \, dx.$
9. $\int_0^2 \frac{x^4+1}{x^2+1} \, dx.$	10. $\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{2+3 \sin x}{\cos^2 x} \, dx.$
11. $\int_{-1}^{+1} \cosh x \, dx$	12. $\int_0^1 \sqrt{1+\cosh 2x} \, dx.$

جوابات

1. 4.	2. 12.	3. $\pi/6.$
4. $\log 2.$	5. $e^b - e^a$	6. $\frac{351}{280}.$
7. 1.	8. 1.	9. $2/3 + 2 \tan^{-1} 2.$
10. $2\sqrt{3}+3$	11. $(e^2-1)/e.$	12. $2 \sinh 1.$

1.7- معین تکملوں کی دواہم خصوصیات

$$(i) \quad \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx,$$

$$(ii) \quad \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx,$$

جہاں ، وقفہ $[a, b]$ میں یا اس کے باہر کا کوئی نقطہ ہے۔
ان کے ثبوت بہت آسان ہیں۔

مان لیجیے $F(x)$ تفاعل $f(x)$ کا کوئی تکملہ ہے، تو ہم پاتے ہیں

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

(i) ہم دیکھتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \int_b^a f(x) \, dx &= \left| F(x) \right|_b^a = F(a) - F(b) \\ &= -[F(b) - F(a)] \\ &= - \int_a^b f(x) \, dx. \end{aligned}$$

تکمیلی احصاء

اس طرح پہلا نتیجہ ثابت ہو گیا۔
(ii) اب

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx &= \left| F(x) \right|_a^c = F(c) - F(a). \\ \int_c^b f(x) dx &= \left| F(x) \right|_c^b = F(b) - F(c). \\ \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &= [F(c) - F(a)] + [F(b) - F(c)] \\ &= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

اس طرح دوسرا نتیجہ ثابت ہو گیا

1.8۔ معین تکملہ کا جیومیٹریائی مفہوم (Geometrical interpretation)

یہ ثابت کرنا کہ معین تکملہ

$$\int_a^b f(x) dx$$

منحنی (curve) $y = f(x)$ - محور (axis) اور دو عرضوں $x=a$ (ordinates) اور $x=b$ کے درمیان گھرے ہوئے رقبے کو ظاہر کرتا ہے۔

مان لیجیے $y = f(x)$ ۔ ملحوظ دو قائم محوروں (rectangular axes) کے ایک منحنی کی مساوات (equation) ہے اور مان لیجیے کہ A وہ رقبہ ہے جو منحنی x - محور ایک دیے ہوئے عرض AG ($OA = a$) اور ایک متغیر عرض MP (variable ordinate) کے درمیان گھرا ہوا ہے۔

مان لیجیے $OM = x$ جس سے کہ


$$MP = y = f(x)$$

رقبہ A اس معین MP کے مقام (position) پر منحصر ہے۔ جس کا فصلہ

تعریفیں

(abscissa) x ہے اور اس لیے یہ رقبہ x کا تفاعل ہے۔

ہم منحنی پر ایک نقطہ $P, Q(x + \Delta x, y + \Delta y)$ کے اتنا قریب لیتے ہیں کہ اگر ایک نقطہ منحنی پر P سے Q کو چلے تو اس کا عرض یا تو برابر بڑھے (تصویر 1) یا برابر گھٹے (تصویر 2)



$$OA = x + \Delta x, \quad NQ = y + \Delta y, \quad MN = \Delta x$$

x میں Δx کا اضافہ (increment) ہونے پر A میں ΔA کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ قطعہ $MNQPM$ (region) کے رقبے کے برابر ہے۔

قطعہ $MNQPM$ کا رقبہ ΔA دو مستطیلوں (rectangles) PN اور QM کے رقبوں $y \Delta x$ اور $(y + \Delta y) \Delta x$ کے درمیان ہوتا ہے۔
تصویر 1 کے لیے ہم پاتے ہیں

$$(y + \Delta y) \Delta x > \Delta A > y \Delta x$$

$$(i) \dots \dots \dots \Rightarrow (y + \Delta y) > \frac{\Delta A}{\Delta x} > y.$$

مان لیجیے y تاکہ $0 < \Delta x$ تب ہم (i) سے پاتے ہیں

$$\frac{dA}{dx} = y = f(x)$$

تصویر 2 کے لیے ہم پاتے ہیں

$$\Rightarrow y \Delta x > \Delta A > (y + \Delta y) \Delta x$$

$$y > \frac{\Delta A}{\Delta x} > (y + \Delta y),$$

اس لیے اس صورت میں بھی انتہا لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{dA}{dx} = y = f(x).$$

مان لیجیے $x = b$ پر عرض BH ہے۔ اب

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{dA}{dx} dx = \left| A \right|_a^b$$

$$= (x \text{ پر } A \text{ کی قیمت}) - (x \text{ پر } A \text{ کی قیمت})$$

$$= 0 - (\text{قطعه } GABHGA \text{ کا رقبہ})$$

$$= (\text{قطعه } GABHGA \text{ کا رقبہ})$$

جو کہ منحنی $y = f(x)$ محور اور دو عرضوں $x = a$ ، $x = b$ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ ہے۔


نوٹ : رقبہ تفاعل (area-function) کی جو تعریف (definition) اوپر دی گئی ہے وہ A کی مکمل تعریف کے لیے، تاکہ سبھی ممکن صورتیں (cases) شامل ہو سکیں، ہم A کو ان سبھی حصوں کے رقبوں کا جبری جوڑ سمجھتے ہیں جو کہ منحنی x -محور اور دو عرضوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ ہر حصے کے ساتھ مثبت یا منفی علامت ذیل کے رواج (convention) کے مطابق لگاتے ہیں:-

(i) مثبت علامت والے وہ حصے ہیں جو کہ ثابت عرض GA (fixed ordinate) کے داہنی طرف x -محور کے اوپر ہوتے ہیں یا پھر GA کے بائیں طرف x -محور کے نیچے ہوتے ہیں۔

(ii) منفی علامت والے وہ حصے ہیں جو کہ ثابت عرض GA کے داہنی طرف

تعریفیں

x - محور کے نیچے ہوتے ہیں یا پھر GA کے بائیں طرف x - محور کے اوپر ہوتے ہیں۔



تصویر 3

ان رواجوں (conventions) کو ذہن میں رکھ کر یہ ثابت کرنا آسان ہے کہ رقبہ A کی اس مکمل تعریف سے § 1-8 کا نتیجہ ہمیشہ صحیح رہے گا خواہ ثابت عرض GA کی نسبت متغیر عرض MP کا مقام (position) کچھ بھی ہو۔

مثالیں

1- مکمل کے ذریعے اس مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے جس کے خطوط کی مساواتیں


یہ ہیں :

$$x = 2 \text{ اور } y = x, v = 0$$

ساتھ ہی ابتدائی جیومیٹری سے اپنے نتیجے کی جانچ کیجیے۔

یہاں جو رقبہ درکار ہے وہ $y = x$ ، x - محور اور دو عرضوں $x = 0$ اور $x = 2$ کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس لیے درکار رقبہ

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 y \, dx = \int_0^2 x \, dx \\ &= \left| \frac{x^2}{2} \right|_0^2 = 2. \end{aligned}$$




تصویر 4

ابتدائی جیومیٹری سے، مثلث کا رقبہ

$$= \frac{1}{2} OA \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

اس طرح نتیجے کی جانچ ہوگئی۔

2۔ مکانی (parabola) $y^2 = 4x$ اور اس کے وتر خاص (latus rectum) کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔



ہمیں رقبہ LOL' معلوم کرنا ہے جو کہ تشاکل (symmetry) کی وجہ سے رقبہ LOS کا دوگنا ہے۔ قوس OL (Arc) کے کسی بھی نقطہ کے لیے

$$y = \sqrt{4a} \sqrt{x}$$

ساتھ ہی $OS = a$ اس لیے

$$\therefore \text{رقبہ } LOSL = \int_0^a y \, dx = \sqrt{4a} \int_0^a x^{\frac{1}{2}} \, dx$$

$$= \sqrt{4a} \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^a$$

$$= \sqrt{4a} \left\{ \frac{2}{3} (a)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} \cdot 0 \right\} = \frac{4}{3} a^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{4}{3} a^{\frac{3}{2}} = LOL'L \quad \therefore \text{درکار رقبہ}$$

مشقیں

1- x - محور اور $x = 0$ سے $x = \pi$ تک منحنی $y = \sin x$ کے درمیان گھرا رقبہ معلوم کیجیے۔

2- منحنی $y = \sec^2 x$ - x - محور اور عرض $x = \pi/4$ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

3- منحنی $y = e^x$ - x - محور اور عرضوں $x = -1$ اور $x = 1$ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

4- مکانی $y^2 = 4x$ کے اس حصے کا رقبہ معلوم کیجیے جو کہ خط $y = 4$ سے کٹتا ہے۔

5- منحنیوں $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کی تریسیم (trace) کیجیے جب کہ x صفر سے $\pi/2$ تک بڑھے اور x - محور اور ان کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

6- ثابت کیجیے کہ مکانی $xy = 1$ - x - محور اور دو عرضوں $x = 1$ اور $x = 2$ کے درمیان گھرے ہوئے قطعہ کا رقبہ $\log 2$ ہے۔

جوابات

1. 2, 2. 1, 3. $(e^2 - 1)/e$, 4. $1/24$, 5. $2 - \sqrt{2}$.

1.9- غیر واجب معین تکملے

معین تکملے

$$\int_a^b f(x) dx.$$

کی تعریف اور اس کے جیومیٹریائی مفہوم میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ (i) a اور b دونوں حدیں متناہی (finite) ہیں۔

اور (ii) $f(x)$ وقفہ $[a, b]$ میں مسلسل (continuous) ہے۔
 اب ہم تکملے کی اس تعریف کو وسیع کرتے ہیں تاکہ نئی تعریف میں وہ معین
 تکملے بھی شامل ہو سکیں جن کے لیے یا تو
 (i) a یا b یا دونوں لامتناہی (infinite) ہوں۔
 یا (ii) وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطے پر $f(x)$ لامتناہی ہو جاتا ہو یعنی وقفہ
 $[a, b]$ میں کوئی نقطہ c ایسا ہو کہ جب $x \leftarrow c$ تو $f(x) \leftarrow \infty$
 ان قسموں کے تکملے وسیع شدہ (Generalised) غیر واجب (Improper) یا
 لامتناہی تکملے کہلاتے ہیں۔

1.91۔ پہلی قسم کے غیر واجب معین تکملے

مان لیجیے کہ اوپری حد b لامتناہی ہے۔
 ہم تکملہ

$$\int_a^{\infty} f(x) dx,$$

کی قیمت نکالنے کے لیے پہلے تکملہ

$$\int_a^t f(x) dx,$$

کی قیمت نکالتے ہیں جہاں t کوئی نمبر ہے جو a سے بڑا ہے۔ اس معین تکملہ کی
 قیمت t پر منحصر ہے۔ اب $t \rightarrow \infty$ کے لیے ہم اس متناہی تکملے کی انتہا لیتے
 ہیں۔ اگر اس انتہا (limit) کا وجود ہو اور وہ متناہی ہو تو وہی انتہا تکملہ

$$\int_a^{\infty} f(x) dx.$$

کی قیمت کہلاتی ہے۔

اگر انتہا کا وجود نہ ہو یا وہ لامتناہی ہو تو

تعریفیں

$$\int_a^{\infty} f(x) dx$$

بے معنی ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لامتناہی تکملہ بے وجود ہے۔

مثالیں

1- تکملہ

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx.$$

حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم تکملہ

$$\int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx.$$

کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$\int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx = \left| \tan^{-1} x \right|_0^t = \tan^{-1} t - \tan^{-1} 0 = \tan^{-1} t$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \tan^{-1} t = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

2- تکملہ

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx,$$

کی قیمت نکالنے کے لیے پہلے ہم تکملہ

$$\int_1^t \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$\int_1^t \frac{dx}{\sqrt{x}} = \left| 2\sqrt{x} \right|_1^t = 2\sqrt{t} - 2$$

تکملی احصاء

جو کہ $1 + \infty$ پر خود ∞ کی طرف مائل ہوتا ہے۔
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لامتناہی تکملہ

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

بے وجود ہے۔

1.92- اب مان لیجئے کہ زیریں حد $-\infty$ ہے۔ تکملہ

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx,$$

حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم تکملہ

$$\int_c^b f(x) dx.$$

کی قیمت نکالتے ہیں، جہاں کہ c کوئی ایسا نمبر ہے جو b سے کم ہو۔ اگر $c \rightarrow -\infty$ کے لیے اس تکملہ کی انتہا کا وجود ہو اور وہ متناہی ہو تو اسے ہم تکملہ

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx.$$

کی قیمت کہتے ہیں۔

1.93- لامتناہی تکملہ

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx,$$

پر غور کرنے اور اگر ممکن ہو تو اس کی قیمت نکالنے کے لیے ہم ذیل دو تکملوں

$$\int_a^{\infty} f(x) dx, \text{ اور } \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

تعریفیں

پر غور کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں تکملوں کا متناہی وجود ہو تو ہم لکھتے ہیں

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx.$$

مشق 1۔ ذیل کے غیر واجب تکملوں کی قیمت نکالے

$$(i) \int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx, (ii) \int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^3}}, (iii) \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^4}, (iv) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

جوابات : (i) 1, (ii) 1, (iii) $\frac{1}{3}$, (iv) π .


مشق 2۔ ثابت کیجیے کہ تکیے

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx \text{ اور } \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

بے وجود ہیں۔

مشق 3۔ معنی $y = 1/x^2$ ، x - محور اور عرض $x = 1$ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔ یہاں جس قطعہ کا رقبہ نکالنا ہے وہ ∞ تک پھیلا ہوا ہے لہذا معمولی طور پر ہم اس کے رقبے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن انتہا لے کر اسے ذیل طریقے پر معنی دیے جاسکتے ہیں۔

مان لیجیے $a = OA$



تصویر - 6


کوئی متغیر عرض (variable ordinate) MP لیجیے جب کہ $OM = t$ اور قطعہ

GAMPG کے رقبے پر غور کیجیے۔ اگر عرض MP کے ∞ کی طرف مائل ہونے پر یہ رقبہ ایک متناہی انتہا کی طرف مائل ہوتا ہو تو ہم اس حد کو زیر غور لامتناہی قطعہ کا رقبہ کہتے ہیں۔
اس طرح ہم پاتے ہیں

$$\text{GAMPG رقبہ} = \int_1^{\infty} y \, dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} \, dx = -\left|\frac{1}{x}\right|_1^{\infty} = -\frac{1}{\infty} + 1$$

جو کہ $1 \leftarrow \infty$ ہونے پر 1 کی طرف مائل ہوتا ہے۔
لہذا متناہی قطعہ کا رقبہ وجود رکھتا ہے اور وہ 1 کے برابر ہے۔ یہ کہنے میں کہ لامتناہی قطعہ کا رقبہ 1 ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ MP کو کافی دور لے کر ہم قطعہ GAMPG کے رقبہ کو 1 کے جتنا قریب چاہیں لاسکتے ہیں۔
مشق 4۔ منحنی $y = 1/\sqrt{x}$ ، محور اور عرض $x = 1$ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ نکالنے کے سوال پر غور کیجیے۔

مان لیجیے $OM = 1$ اور $OA = 1$



$$\text{GAMPG رقبہ} = \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = \left|2\sqrt{x}\right|_1^{\infty} = 2(\infty - 1)$$

جو کہ $1 \leftarrow \infty$ ہونے پر خود ∞ کی طرف مائل ہوتا ہے۔

اس لیے اس صورت میں لامتناہی قطعہ کا رقبہ بے وجود ہے۔

تصویر 7

اس کا مطلب یہ ہے کہ MP کو کافی دور لے جا کر قطعہ GAMPG کے رقبے کو جتنا چاہیں اتنا بڑا کر سکتے ہیں۔
نوٹ۔ مشق 3 میں لامتناہی قطعہ کے رقبے کا وجود ہے جب کہ مشق 4 میں لامتناہی قطعہ کا رقبہ لامتناہی (infinite) ہے۔ یہ بات وجدانی طور پر (intuitively)

یوں سمجھ میں آتی ہے کہ مشق 3 میں منحنی x -محور کی طرف زیادہ تیزی سے جاتا ہے
بہ نسبت مشق 4 کے۔

مشق 5 - دوسرے ربع (second quadrant) میں منحنی $y = e^x$ اور دونوں
محاور (axes) کے درمیان گھڑے قطعہ کا رقبہ نکالنے کے سوال پر غور کیجیے۔

1.94 - دوسری قسم کے غیر واجب معین تکملے:

مان لیجیے کہ x کے a کی طرف مائل ہونے پر $f(x)$ خود ∞ کی طرف مائل ہوتا
ہے لیکن کسی اور نقطہ پر $f(x)$ لامتناہی (infinity) نہیں ہوتا اور مان لیجیے کہ h
کوئی مثبت نمبر ہے۔ ہم واجب تکملہ

$$\int_{a+h}^b f(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کی قیمت h کا تفاعل ہے۔ اگر $h \leftarrow 0$ ہونے پر h کا یہ تفاعل
کسی متناہی انتہا کی طرف مائل ہو تو اس متناہی انتہا کو غیر واجب تکملہ

$$\int_a^b f(x) dx.$$

کی قیمت کہتے ہیں۔ اگر ایسی انتہا کا متناہی وجود نہ ہو تو

$$\int_a^b f(x) dx$$

بے معنی ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر $f(x)$ ، $x \leftarrow b$ پر ∞ کی طرف مائل ہوتا ہو لیکن اور کسی نقطہ
پر $f(x)$ لامتناہی نہیں ہوتا تو ہم واجب تکملہ

$$\int_a^{b-h} f(x) dx.$$

کی انتہا $h \leftarrow 0$ ہونے پر لیتے ہیں۔ اگر اس کی انتہا کا متناہی وجود ہو تو ہم اسے

$$\int_a^b f(x) dx.$$

کی قیمت کہتے ہیں۔

اگر $f(x)$ وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر لامتناہی (infinity) کی طرف مائل ہوتا ہو تو ہم دو غیر واجب تکملوں

$$\int_c^b f(x) dx \text{ اور } \int_a^c f(x) dx$$

پر غور کرتے ہیں اور اگر دونوں کا متناہی وجود ہو تو ہم لکھتے ہیں

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

مشق 1 - غیر واجب تکملہ

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

کی جانچ کیجیے۔

سکالمیہ $1/\sqrt{1-x^2}$ اوپری حد 1 پر لامتناہی ہو جاتا ہے۔ اس تکملے کی جانچ کے لیے ہم تکملہ

$$\int_0^{1-h} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

کی قیمت نکالتے ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int_0^{1-h} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \left| \sin^{-1} x \right|_0^{1-h} \\ &= \sin^{-1} (1-h) - \sin^{-1} 0 \\ &= \sin^{-1} (1-h). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^{1-h} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{h \rightarrow 0} \sin^{-1} (1-h) = \sin^{-1} 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

2

تکمل کے طریقے

(Integration by Substitution) عوضی تکمل

(Integration by Parts.) اور حصہ سے تکمل

2-1۔ تکمل کے طریقے۔ تکمل کے چار خاص طریقے یہ ہیں:-
 (I) تکاملیہ کو ایسے تکاملیوں کے جوڑ کی شکل میں رکھنا جن کے تکمل معلوم ہوں۔
 (II) عوضی تکمل
 (III) حصہ سے تکمل
 (IV) متواتر تحویل (successive reduction) سے تکمل۔

ان میں سے تکمل کا پہلا طریقہ جو کہ §1.5 کے دونوں مسئلوں پر منحصر ہے وہ پہلے باب میں بتایا جا چکا ہے۔ تیسرے باب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تکمل کا یہ طریقہ جبری ناطق تفاعلوں (algebraic rational functions) کے تکمل کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔

دوسرے طریقے اس باب میں بتائے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حصہ سے تکمل کا طریقہ دراصل متواتر تحویل کا ہی طریقہ ہے کیوں کہ اس کی مدد سے ہم دو تفاعلوں کے حاصل ضرب کے تکمل کو ایک ایسے تفاعل کے تکمل کی شکل میں رکھ سکتے جو زیادہ

تکمل کے طریقے

آسانی سے حاصل ہو سکے۔ لہذا متواتر تحویل سے تکمل کا طریقہ حصہ سے تکمل کی ایک تدریجی (developed) شکل ہے۔
 اس باب میں ہم خاص طور سے تکمل کے مختلف طریقوں پر زور دیں گے اور اگلے تین ابواب میں تفاعلوں کی مختلف قسموں (Classes) پر غور کریں گے اور ان میں سے ہر قسم کے تفاعلوں کے تکمل کے طریقے بتائیں گے۔
 نوٹ۔ تکمل کا عمل اس قدر نظامی (systematic) نہیں ہے جتنا کہ تفرق (differentiation)۔ عام طور پر تجربہ ہی سکھاتا ہے کہ دیے ہوئے تفاعل کے تکمل کا سب سے سیدھا اور آسان طریقہ کیا ہے۔

2.2۔ عوضی سے تکمل

اس طریقے کے مطابق تکمل

$$\int f(x) dx$$

کو جس میں x غیر تابع (independent) متغیر ہے، ایک ایسے تکمل کی صورت میں رکھتے ہیں جس میں کوئی دوسرا متغیر، مان لیجیے، t غیر تابع متغیر ہو، جہاں x اور t میں کوئی مناسب رشتہ ہو۔
 اس سے ذیل نتیجہ نکلتا ہے

$$\int f(x) dx = \int f[\phi(t)] \phi'(t) dt,$$

اے اس طرح ثابت کر سکتے ہیں:-
 مان لیجیے

$$v = \int f(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} = f(x)$$

ہم پاتے ہیں

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f(x) \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow v = \int f(x) \frac{dx}{dt} dt = \int f[\phi(t)] \phi'(t) dt \quad (x = \phi(t) \text{ کیونکہ})$$

ابنہا ہم نے ثابت کر دیا کہ
بلحاظ x کی تفاعل $f(x)$ کا تکملہ بلحاظ t ، $f(x) \frac{dx}{dt}$ کے تکملے کے برابر ہوتا ہے۔

یہاں x کی جگہ پر $\phi(t)$ رکھنا ہوتا ہے۔
یہ طریقہ تبھی مفید ثابت ہوتا ہے جب کہ رشتہ $x = \phi(t)$ ایسا چنا جاسکے کہ
نئے سکالمیہ $f(x)(dx/dt)$ کا تکملہ معلوم ہو جائے۔
ایک ضروری نوٹ - یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نتیجہ

$$\int f(x) dx = \int f[\phi(t)] \phi'(t) dt$$

میں dx کی جگہ پر $\phi'(t)dt$ رکھ دیا گیا ہے اور یہ مان لینے پر کہ dx اور dt مختلف چیزیں ہیں $dx/dt = \phi'(t)$ سے اوپر کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ یہ مان لینے پر عرضی تکمل کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ (آگے مثال 3 دیکھیے)

یہاں جو بھی مانا گیا ہے اس کی منطقی توجیہ (logical justification) کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہاں یہ سرسری طور پر آسانی کے لیے بیان کیا گیا ہے۔

مثالیں

$e^x \cos e^x - 1$ کا تکمل کیجیے
اگر $e^x = t$ رکھیں تو

$$e^x = t \Rightarrow e^x \frac{dx}{dt} = 1 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{e^x}$$

اس لیے

$$\int e^x \cos e^x dx = \int \left(e^x \cos e^x \right) \frac{dx}{dt} dt$$

تکمل کے طریقے

$$= \int \left(e^x \cos e^x \right) \frac{1}{e^x} dt$$

$$= \int \cos t dt = \frac{\sin t}{\sin e^x}$$

تاکمل کیجیے $\sin^2 x \cos x - 2$
اگر $\sin x = t$ رکھیں تو

$$\cos x \frac{dx}{dt} = 1 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\cos x}$$

اس لیے

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos x dx &= \int \sin^2 x \cos x \cdot \frac{dx}{dt} dt \\ &= \int \sin^2 x \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} dt \\ &= \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} = \frac{\sin^3 x}{3} \end{aligned}$$

$$-3 \quad \int \frac{4x^3}{1+x^8} dx \text{ حاصل کیجیے۔}$$

اگر $x^4 = t$ رکھیں تو

$$4x^3 \frac{dx}{dt} = 1 \Rightarrow 4x^3 dx = dt. \quad (22 \text{ کا نوٹ دیکھیے})$$

$$\int \frac{4x^3}{1+x^8} dx = \int \frac{dt}{1+t^2} = \tan^{-1} t = \tan^{-1} x^4 \text{ اس لیے}$$

مشقیں

ذیل فنکشنوں کے تکمل حاصل کیجیے:۔

1. (i) $e^x \sin e^x$,

(ii) $2x e^{x^2}$,

(iii) $x^2 e^{x^3}$;

(iii) $e^{\log x} / x$,

(v) $e^{\tan t} \sec^2 t$,

(vi) $\frac{e^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}}$

(vii) $\frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2}$,

(viii) $\frac{e^{\sqrt{x}}}{3\sqrt{x}}$,

(ix) $\frac{e^x(1+x)}{\cos^2(xe^x)}$.

2. (i) $\cos^3 x \sin x$,

(ii) $\sqrt[3]{\sin x} \cos x$,

(iii) $3 \sin x \sec^4 x$.

3. (i) $\frac{\cos x}{1+\sin^2 x}$, (ii) $\frac{\tan^2 x \sec^3 x}{1+\tan^6 x}$,
 (iii) $\frac{2}{x[1+(\log x)^2]}$, (iv) $\frac{3e^{2x}}{1+e^{4x}}$, (v) $\frac{2x}{1+x^4}$,
 (vi) $\frac{x^5}{1+x^{13}}$, (vii) $\frac{2x^3}{1+x^8}$, (viii) $\frac{1}{e^x+e^{-x}}$.
 4. (i) $\frac{\cos x}{(1+\sin x)^2}$, (ii) $\frac{\sec^3 x}{(1+\tan x)^3}$, (iii) $\frac{(1-\log x)^3}{x}$
 5. (i) $4x^3 \operatorname{cosec}^2(x^4)$, (ii) $x^4 \sec^3(x^5)$, (iii) $x^3 \sin x^4$,
 (iv) $(\cos \sqrt{x})\sqrt{x}$, (v) $e^x \sec^3(e^x)$.
 6. (i) $\frac{\cos(\log x)}{x}$, (ii) $\frac{\sec^3(\log x)}{x}$,
 (iii) $\frac{\sin(2+3 \log x)}{x}$, (iv) $e^x \tan(e^x) \sec(e^x)$.
 7. (i) $\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$, (ii) $\frac{x^3}{\sqrt{1-x^6}}$,
 (iii) $\frac{2}{\sqrt{2-(2x+3)^2}}$, (iv) $\frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-\tan^2 x}}$
 8. (i) $\frac{x^3 \tan^{-1} x^3}{1+x^9}$, (ii) $\frac{2x \sin^{-1} x^3}{\sqrt{1-x^4}}$,
 (iii) $\frac{\tan \sqrt{x} \sec^3 \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$.

جوابات

1. (i) $\cos e^x$ (ii) e^{x^2} (iii) $\frac{1}{3} e^{x^3}$
 (iv) x (v) $e^{\tan x}$ (vi) $e^{\sin^{-1} x}$
 (vii) $e^{\tan^{-1} x}$ (viii) $\frac{2}{3} e^{\sqrt{x}}$ (ix) $\tan(xe^x)$
 2. (i) $\frac{1}{2} \cos^4 x$ (ii) $\frac{2}{3} \sin^{4/3} x$ (iii) $\sec^3 x$
 3. (i) $\tan^{-1}(\sin x)$ (ii) $\frac{1}{3} \tan^{-1}(\tan^3 x)$
 (iii) $2 \tan^{-1}(\log x)$ (iv) $\frac{2}{3} \tan^{-1}(e^{2x})$
 (v) $\tan^{-1} x^3$ (vi) $\frac{1}{3} \tan^{-1} x^3$ (vii) $\frac{1}{3} \tan^{-1} x^4$
 (viii) $\tan^{-1}(e^x)$
 4. (i) $-1/(1+\sin x)$ (ii) $-\frac{1}{3}(1+\tan x)^3$
 (iii) $-\frac{1}{3}(1-\log x)^3$

تکمل کے طریقے

5. (i) $-\cot x^4$ (ii) $\frac{1}{2} \tan x^5$ (iii) $-\frac{1}{2} \cos x^4$
 (iv) $2 \sin \sqrt{x}$ (v) $\tan e^x$
 6. (i) $\sin (\log x)$ (ii) $\tan (\log x)$ (iii) $-\frac{1}{2} \cos (2+3 \log x)$
 (iv) $\sec e^x$
 7. (i) $\sin^{-1} x^2$ (ii) $\frac{1}{2} \sin^{-1} x^3$ (iii) $\sin^{-1} [(2x+3)/\sqrt{2}]$
 (iv) $\sin^{-1} (\tan x)$
 8. (i) $\frac{1}{2} (\tan^{-1} x^2)^2$ (ii) $\frac{1}{2} (\sin^{-1} x^2)^2$ (iii) $(\tan \sqrt{x})^2$

2.3 - تین اہم قسم کے تکملے

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log f(x) - 2.31$$

اگر ہم $t = f(x)$ رکھیں تو $f(x) dx = dt$ اس لیے

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{dt}{t} = \log t = \log f(x)$$

لہذا ہم نے ثابت کر دیا کہ

اگر کوئی تفاعل ایک ایسی کسر (fraction) کی صورت میں ہو جس کا شمار کنندہ (numerator) اس کے نسب نما (denominator) کا تفرقی سر ہو تو اس تفاعل کا تکملہ نسب نما کے لوگارتم (logarithm) کے برابر ہوتا ہے۔

مثالیں

$$\int \frac{3x^2}{1+x^3} dx = \log (1+x^3) \quad (1)$$

کیونکہ شمار کنندہ $3x^2$ نسب نما $1+x^3$ کا تفرقی سر ہے۔

کا تفرقی سر ہے۔

$$\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \log (1+e^x). \quad (2)$$

$$\text{cosec } x, \text{ اور } \sec x, \cot x, \tan x \text{ کے تکلی}$$

اوپر دیے ہوئے نتیجے کی مدد سے ہم $\sec x, \cot x, \tan x$ اور $\text{cosec } x$ کے تکلی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\text{I. } \int \tan x \, dx = \int \frac{\sec x \tan x}{\sec x} \, dx = \log \sec x.$$

$$\therefore \int \tan x \, dx = \log \sec x.$$

$$\text{II. } \int \cot x \, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \log \sin x.$$

$$\therefore \int \cot x \, dx = \log \sin x.$$

$$\text{III. } \int \sec x \, dx = \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \, dx = \log (\sec x + \tan x),$$

کیوں کہ شمار کنندہ $\sec^2 x + \sec x \tan x$ ، نسب نما $\sec x + \tan x$ کا تفریق سر ہے۔

اس نتیجے کو دوسری شکل میں رکھنے کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$\sec x + \tan x = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$$

بھریہ نتائج استعمال کرتے ہوئے کہ

$$\sin x = \frac{2 \tan (x/2)}{1 + \tan^2 (x/2)}, \quad \cos x = \frac{1 - \tan^2 (x/2)}{1 + \tan^2 (x/2)}.$$

ہم پاتے ہیں

$$\sec x + \tan x = \frac{1 + \tan (x/2)}{1 - \tan (x/2)} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right).$$

اس طرح

$$\int \sec x \, dx = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right).$$

$$\text{IV. } \int \text{cosec } x \, dx = \int \frac{\text{cosec } x (\text{cosec } x - \cot x)}{\text{cosec } x - \cot x} \, dx$$

$$= \log (\text{cosec } x - \cot x)$$

تکمیل کے طریقے

اد پر III کی طرح ہم پاتے ہیں

$$\operatorname{cosec} x - \cot x = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{1 - \frac{1 - \tan^2(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)}}{\frac{2 \tan(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)}} = \tan \frac{x}{2}$$

$$\int \operatorname{cosec} x \, dx = \log \tan \frac{x}{2}. \quad \text{لہذا}$$

مشقیں

1۔ ذیل کے تکملے حاصل کیجیے

(i) $\frac{x^3}{1+x^4}$,	(ii) $\frac{x^3}{1+x^3}$	(iii) $\frac{x+1}{x^2+1}$
(iv) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \sin^{-1} x$,	(v) $\frac{1}{(1+x^2)} \tan^{-1} x$,	(vi) $\tanh x$.
(vii) $\coth x$,	(viii) $\frac{\cos x}{a+b \sin x}$,	(ix) $\frac{\cot x}{\log \sin x}$
(x) $\frac{\sec^2 x}{1+\tan x}$,	(xi) $\frac{\operatorname{cosec}^2 x}{1+\cot x}$,	(xii) $\frac{1}{x \log x}$,
(xiii) $\frac{x^{e-1} + e^{x-1}}{x^e + e^x}$,	(xiv) $\frac{ax^{n-1}}{bx^n + c}$,	(xv) $\frac{1}{\sqrt{x+x}}$,
(xvi) $\frac{1}{x \log x [\log(\log x)]}$,	(xvii) $\frac{\sin 2x}{a \cos^2 x + b \sin^2 x}$,	
(xviii) $\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$,	(xix) $\frac{\cos 2x}{(\sin x + \cos x)^2}$,	
(xx) $\frac{\sec x \operatorname{cosec} x}{\log(\tan x)}$		

2۔ غیر تابع متغیر (independent variable) کو بدل کر مندرجہ ذیل تفاعلوں کے تکملے

حاصل کیجیے۔

(i) $e^x \tan(e^x)$,	(ii) $x^3 \tan x^3$,	(iii) $\cos x \cot(\sin x)$,
(iv) $\frac{\cot(\log x)}{x}$,	(v) $\frac{\tan(\sin^{-1} x)}{\sqrt{1-x^2}}$,	(vi) $\frac{\cot \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$,
(vii) $\cot(2x+3)$,	(viii) $\tan(3x+4)$,	(ix) $e^x \cot(e^x)$.

3۔ تکمل کیجیے :

(i) $\sec (\tan x) \sec^2 x$.	(ii) $x^{n-1} \operatorname{cosec} x^n$,
(iii) $\sec (ax+b)$,	(iv) $\operatorname{cosec} (ax+b)$,
(v) $\operatorname{cosec} (\operatorname{cosec} x) \cot x \operatorname{cosec} x$,	(vi) $\frac{\operatorname{cosec} (\tan^{-1} x)}{1+x^2}$.

4۔ حاصل کیجیے :

$$\int \frac{dx}{\sin (x-a) \sin (x-b)}.$$

اشارہ: ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \sin (b-a) &= \sin [(x-a)-(x-b)] \\ &= \sin (x-a) \cos (x-b) - \cos (x-a) \sin (x-b) \end{aligned}$$

$$\frac{\sin (b-a)}{\sin (x-a) \sin (x-b)} = [\cot (x-b) - \cot (x-a)]. \quad \text{اس لیے}$$

جوابات

1. (i) $\log (1+x^4)$	(ii) $\frac{1}{2} \log (1+x^2)$
(iii) $\log (1+x^2) + \tan^{-1} x$	(iv) $\log \sin^{-1} x$
(v) $\log \tan^{-1} x$	(vi) $\log \cosh x$
(vii) $\log \sinh x$	(viii) $(1/b) \log (a+b \sin x)$
(ix) $\log \log (\sin x)$	(x) $\log (1+\tan x)$
(xi) $-\log (1+\cot x)$	(xi) $\log \log x$
(xii) $(1/e) \log (x^e + e^x)$	(xiv) $(a/nb) \log (bx^n + c)$
(xv) $2 \log (1+\sqrt{x})$	(xvi) $\log [\log (\log x)]$
(xvii) $[1/(b-a)] \log (a \operatorname{cosec}^2 x + b \sin^2 x)$	

تکمل کے طریقے

- (xviii) $\log (\sin x + \cos x)$ (xix) $\log (\sin x + \cos x)$
- (xx) $\log [\log (\tan x)]$
2. (i) $\log (\sec e^x)$ (ii) $\frac{1}{2} \log (\sec x^2)$ (iii) $\log [\sin (\sin x)]$
- (iv) $\log [\sin (\log x)]$ (v) $\log \sec (\sin^{-1} x)$ (vi) $2 \log (\sin \sqrt{x})$
- (vii) $\frac{1}{2} \log [\sin (2x+3)]$ (viii) $\frac{1}{2} \log [\sec (3x+4)]$ (ix) $\frac{1}{2} \log (\sin e^x)$
3. (i) $\log \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \tan x \right) \right]$ (ii) $\left(\frac{1}{n} \right) \log \left[\tan \left(\frac{1}{2} x^n \right) \right]$
- (iii) $(1/a) \log \tan \left(\frac{1}{4} \pi + \frac{1}{2} (ax+b) \right)$ (iv) $(1/a) \log \left(\frac{ax+b}{2} \right)$
- (v) $-\log \tan \left(\frac{1}{2} \operatorname{cosec} x \right)$ (vi) $\log \tan \left(\frac{1}{2} \tan^{-1} x \right)$
4. $\frac{1}{\sin (a-b)} \log \frac{\sin (x-a)}{\sin (x-b)}$

$$n \neq -1. \text{ جبکہ } \int [f(x)]^n f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1}, \quad - 2.32.$$

اگر $f(x) = t$ رکھیں تو $f'(x) dx = dt$ اس لیے

$$\int [f(x)]^n f'(x) dx = \int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1}, \quad (n \neq -1 \text{ کے لیے})$$

$$= \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1}.$$

یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں تکاملیہ $f(x)$ کی کسی قوت (power) اور تفرقی سر $f'(x)$ کا حاصل ضرب ہے۔ اس کا تکملہ تفاعل کی قوت میں ایک کا اضافہ کر کے حاصل شدہ کو بڑھی ہوئی قوت سے تقسیم کرنے پر ملتا ہے۔

$n = -1$ والی صورت 2.31 § جیسی ہی ہے۔

مثال - تکملہ

$$\int \sin^4 x \cos x dx$$

حاصل کرنے کے لیے ہم $f(x) = \sin x$ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تکملہ

$$\int [f(x)]^n f'(x) dx$$

جیسی صورت کا ہے۔

مشقیں

1۔ ذیل کا تکمل کیجیے۔

(i) $\sqrt{\sin x} \cos x,$	(ii) $\tan^4 x \sec^2 x,$
(iii) $\operatorname{cosec}^2 x \sqrt{\cot x},$	(iv) $\frac{(\tan^{-1} x)^3}{1+x^2},$
(v) $\frac{1}{(\tan^{-1} x)^2 (1+x^2)},$	(vi) $\frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}},$
(vii) $\frac{1}{\sqrt{(\sin^{-1} x)} \sqrt{1-x^2}},$	(viii) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$
(ix) $\frac{x}{\sqrt[3]{(x^3+1)}},$	(x) $x \sqrt{(x^2+1)},$
(xi) $e^x \sqrt{1+e^x},$	(xi) $\sin^3 x \cos x,$
(xiii) $\frac{2x+3}{\sqrt{(x^2+3x-4)}},$	(xiv) $\frac{(x+1)(x+\log x)^4}{2x},$
(xv) $\frac{1}{x(1+\log x)^3},$	(xvi) $\frac{\log x}{x},$
(xvii) $\sqrt{(2+\sec^2 x)} \sec^2 x \tan x,$	(xix) $\sec x \log (\sec x + \tan x).$
(xviii) $(e^x + e^{-x})(e^x - e^{-x}),$	

جوابات

1. (i) $\frac{2}{3} (\sin x)^{3/2}$	(ii) $\frac{1}{5} \tan^5 x$	(iii) $-\frac{8}{3} \cot^{2/3} x.$
(iv) $\frac{1}{4} (\tan^{-1} x)^4$	(v) $-1/\tan^{-1} x$	(vi) $\frac{1}{2} (\sin^{-1} x)^2$
(vii) $2\sqrt{(\sin^{-1} x)}$	(viii) $-\sqrt{(1-x^2)}$	(ix) $\frac{2}{3} (1+x^2)^{2/3}$
(x) $\frac{1}{2} (1+x^2)^{3/2}$	(xi) $\frac{2}{3} (1+e^x)^{3/2}$	(xii) $\frac{1}{4} \sin^4 x$
(xiii) $2\sqrt{(x^2+3x-4)}$	(xiv) $\frac{1}{2} (x+\log x)^3$	(xv) $-\frac{1}{2} (1+\log x)^2$
(xvi) $\frac{1}{2} (\log x)^3$	(xvii) $\frac{1}{2} (2+\sec^2 x)^{3/2}$	(xviii) $\frac{1}{2} (e^x - e^{-x})^2$
(xix) $\frac{1}{2} [\log (\sec x + \tan x)]^2$		

تکمل کے طریقے

$$\int f'(ax+b) dx = \frac{f(ax+b)}{a} \quad - 2.33$$

اگر ہم $ax+b = t$ رکھیں تو

$$adx = dt \Rightarrow dx \Rightarrow dt/a.$$

$$\begin{aligned} \int f'(ax+b) dx &= \int f'(t) \cdot \frac{dt}{a} = \frac{1}{a} \int f'(t) dt \quad \text{اس لیے} \\ &= \frac{1}{a} \cdot f(t) = \frac{1}{a} f(ax+b) \end{aligned}$$

لہذا $ax+b$ کے کسی بھی تفاعل $f(ax+b)$ کا تکملہ x کے اُس تفاعل کے
تکملے میں x کی جگہ $ax+b$ لکھ کر اور پھر حاصل شدہ $f(ax+b)$ کو a سے تقسیم
کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں کہ a 'x' کا ضربیہ (coefficient) ہے۔

مثالیں

1. (i) $\cos x$ کا تکملہ $\sin x$ ہوتا ہے اس لیے $\cos(ax+b)$ کا تکملہ

$$[\sin(ax+b)]/a \text{ ہوتا ہے۔}$$

(ii) x^3 کا تکملہ $x^4/4$ ہوتا ہے، اس لیے $(2x+3)^3$ کا تکملہ

$$\frac{(2x+3)^4}{8} \text{ یعنی } \frac{(2x+3)^4}{8} \text{ ہوتا ہے۔}$$

2. ذیل کا تکمل کیجیے۔

$$(i) \cos^2 x, (ii) \cos^3 x, (iii) \cos x \cos 2x.$$

(i) ہم جانتے ہیں کہ

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\therefore \cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x)$$

$$\therefore \int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int 1 dx + \int \cos 2x dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(x \frac{\sin 2x}{2} \right) = \frac{1}{4} (x \sin x \cos x)$$

(ii) ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \cos 3x &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x \\ \cos^3 x &= \frac{1}{4} (3 \cos x + \cos 3x) \\ \int \cos^3 x \, dx &= \frac{1}{4} \left[\int 3 \cos x \, dx - \int \cos 3x \, dx \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[3 \sin x + \frac{\sin 3x}{3} \right] \\ &= \frac{9 \sin x + \sin 3x}{12} \end{aligned}$$

(iii) ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \cos x \cos 2x &= \frac{1}{2} [\cos 3x + \cos x] \\ \int \cos x \cos 2x \, dx &= \frac{1}{2} \left[\int \cos 3x \, dx + \int \cos x \, dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin 3x}{3} + \sin x \right] \\ &= \frac{\sin 3x + 3 \sin x}{6} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a \sin x + b \cos x} - 3$$

ہم دو نمبر r اور α ایسے معلوم کرتے ہیں کہ

$$a = r \cos \alpha, b = r \sin \alpha$$

ان کے مربعوں (squares) کو جوڑنے پر ہم پاتے ہیں

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

اور ایک کو دوسرے سے تقسیم کرنے پر ملتا ہے

$$\alpha = \tan^{-1} (b/a) \quad \text{یا} \quad \tan \alpha = b/a$$

اس لیے

$$\begin{aligned} a \sin x + b \cos x &= r (\sin x \cos \alpha + \cos x \sin \alpha) \\ &= r \sin (x + \alpha), \end{aligned}$$

تکمل کے طریقے

$$\therefore \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x} = \frac{1}{r} \int \frac{dx}{\sin(x+\alpha)} = \frac{1}{r} \int \operatorname{cosec}(x+\alpha) dx$$

$$= \frac{1}{r} \log \tan \frac{x+\alpha}{2},$$

$$\alpha = \tan^{-1}(b/a), \text{ اور } r = \sqrt{a^2+b^2} \quad \text{جہاں کہ}$$

مشقیں

1۔ ذیل کا تکمل کیجیے۔

- (i) $\cos^3 x$, (ii) $\cos^3 x$, (iii) $\sin 4x \cos 2x$,
(iv) $\sin 5x \sin 3x$, (v) $\cos x \cos 2x \cos 3x$.

2۔ ذیل کا تکمل کیجیے۔

- (i) $\sin^4 x$, (ii) $\cos^4 x$.

3۔ ذیل کا تکمل کیجیے۔

- (i) $1/(ax+b)$, (ii) $\sec^2(2x+3)$, (iii) $\cot(4x+5)$,
(iv) $\cos \frac{x}{2}$, (v) $\sec^2 \frac{x}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2}$, (vi) $\frac{1}{1+\cos x}$,
(vii) $\sqrt{1-\cos x}$, (viii) $\sqrt{1+\sin x}$, (ix) $\sqrt{1+\cos x}$,
(x) $\sqrt{1-\sin x}$, (xi) $\sec(ax+b)$, (xii) $\operatorname{cosec}(ax+b)$,
(xiii) $\frac{1}{3 \sin x + 4 \cos x}$, (xiv) $\frac{1}{5 \cos x - 12 \sin x}$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{4}(x + \sin x \cos x)$ (ii) $\frac{1}{12}(6 \cos x + 3 \cos 2x)$
(iii) $(-1/12)(\cos 6x + 3 \cos 2x)$ (iv) $(1/16)(4 \sin 2x - \sin 8x)$
(v) $(1/48)(12x + 6 \sin 2x + 3 \sin 4x + 2 \sin 6x)$
2. (i) $(1/32)(12x - 8 \sin 2x + \sin 4x)$ (ii) $(1/32)(12x + 8 \sin 2x + \sin 4x)$
3. (i) $\log \frac{(ax+b)}{2}$ (ii) $\frac{1}{2} \tan(2x+3)$
(iii) $\frac{1}{2} \log \sin(4x+5)$ (iv) $2 \sin x/2$

- (vi) $4 \cot x$ (vii) $-2\sqrt{2} \cos x/2$ (ix) $2\sqrt{2} \sin x/s$ (x) $2 \sin \frac{1}{2} x + \cos \frac{1}{2} x$ (xi) $(1/a) \log \tan [\frac{1}{2} (ax+b) + \frac{1}{2}\pi]$ (xii) $(1/a) \log \tan \frac{ax+b}{2}$ (xiii) $(1/5) \log \tan [\frac{1}{2} (x + \tan^{-1} 4/3)]$ (xiv) $\frac{1}{1/3} \log \tan [\frac{1}{2} (x + \tan^{-1} 12/5) + \frac{1}{2}\pi]$

2.4 - چھ اہم تکملے
اب ہم ذیل کے تکملے حاصل کریں گے۔

- (i) $\frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}}$, (ii) $\frac{1}{\sqrt{(a^2+x^2)}}$, (iii) $\frac{1}{\sqrt{(x^2-a^2)}}$,
(iv) $\sqrt{(a^2-x^2)}$, (v) $\sqrt{(a^2+x^2)}$ (vi) $\sqrt{(x^2-a^2)}$.

(i) تکملہ

$$\int \frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}} dx.$$

حاصل کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= a \sin \theta \Rightarrow dx = a \cos \theta d\theta. \\ a^2 - x^2 &= a^2 (1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta. \\ \therefore \int \frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}} dx &= \int \frac{1}{a \cos \theta} \cdot a \cos \theta d\theta \\ &= \int 1 d\theta = \theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}. \end{aligned}$$

ساتھ ہی

(ii) تکملہ

$$\int \frac{1}{\sqrt{(a^2+x^2)}} dx$$

حاصل کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں۔

$$x = a \sinh \theta \Rightarrow dx = a \cosh \theta d\theta.$$

ساتھ ہی

$$a^2 + x^2 = a^2 (1 + \sinh^2 \theta) = a^2 \cosh^2 \theta.$$

مکمل کے طریقے

$$\begin{aligned}\therefore \int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx &= \int_a \frac{1}{\cosh \theta} \cdot a \cosh \theta d\theta \\ &= \int d\theta = \theta = \sinh^{-1} \frac{x}{a} \\ &= \log \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a}\end{aligned}$$

مکملہ (iii)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx.$$

حاصل کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں

$$x = a \cosh \theta \Rightarrow dx = a \sinh \theta d\theta.$$

ساتھ ہی

$$\begin{aligned}x^2 - a^2 &= a^2 (\cosh^2 \theta - 1) = a^2 \sinh^2 \theta. \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \int \frac{1}{a \sinh \theta} \cdot a \sinh \theta d\theta \\ &= \int d\theta = \theta = \cosh^{-1} \frac{x}{a} \\ &= \log \frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a}\end{aligned}$$

مکملہ (iv)

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx.$$

حاصل کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں $x = a \sin \theta$, اور اس طرح ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= a^2 \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{\sin 2\theta}{2} + \theta \right) \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\sin \theta \cos \theta + \theta \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{a^3}{2} \left[\sin \theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta} + \theta \right] \\
 &= \frac{a^3}{2} \left[\frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + \sin^{-1} \frac{x}{a} \right] \\
 &= \frac{x \sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a}.
 \end{aligned}$$

(v) تکمیلہ

$$\int \sqrt{a^2 + x^2} dx.$$

حاصل کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں

$$x = a \sinh \theta \Rightarrow dx = a \cosh \theta d\theta.$$

اس لیے

$$\int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \int a^2 \cosh^2 \theta d\theta$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{cases} \cosh 2\theta = \cosh^2 \theta + \sinh^2 \theta \\ 1 = \cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta. \end{cases} \quad \text{اور}$$

$$\frac{1 + \cosh 2\theta}{2} = \cosh^2 \theta$$

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= \frac{a^2}{2} \int (\cosh 2\theta + 1) d\theta \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{\sinh 2\theta}{2} + \theta \right) \\
 &= \frac{a^2}{2} (\sinh \theta \cosh \theta + \theta) \\
 &= \frac{a^2}{2} \left[\sinh \theta \sqrt{1 + \sinh^2 \theta} + \theta \right] \\
 &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{x}{a} \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}} + \sinh^{-1} \frac{x}{a} \right] \\
 &= \frac{x \sqrt{a^2 + x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sinh^{-1} \frac{x}{a} \\
 &= \frac{x \sqrt{a^2 + x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \log \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a}
 \end{aligned}$$

تکمل کے طریقے

(vi) متکملہ

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx.$$

حاصل کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں

$$x = a \cosh \theta \Rightarrow dx = a \sinh \theta d\theta$$

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \int a^2 \sinh^2 \theta d\theta. \text{ اس لیے}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{cases} \cosh 2\theta = \cosh^2 \theta + \sinh^2 \theta \\ 1 = \cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta. \end{cases}$$

اور

$$\Rightarrow \frac{\cosh 2\theta - 1}{2} = \sinh^2 \theta.$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{a^2}{2} \int (\cosh 2\theta - 1) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{\sinh 2\theta}{2} - \theta \right] \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\sinh \theta \cosh \theta - \theta \right] \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\sqrt{\cosh^2 \theta - 1} \cosh \theta - \theta \right] \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\sqrt{\left(\frac{x^2}{a^2} - 1\right)} \frac{x}{a} - \cosh^{-1} \frac{x}{a} \right] \\ &= \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \cosh^{-1} \frac{x}{a} \\ &= \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \log \frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \end{aligned}$$

لہذا ہمیں ذیل چھ نتائج ملے :-

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a}.$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a}.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \sinh^{-1} \frac{x}{a}$$

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2+x^2} dx &= \frac{x\sqrt{a^2+x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sinh^{-1} \frac{x}{a} \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx &= \cosh^{-1} \frac{x}{a} \\ \int \sqrt{x^2-a^2} dx &= \frac{x\sqrt{x^2-a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \cosh^{-1} \frac{x}{a}\end{aligned}$$

آخری نتیجے میں علامت منفی خاص طور پر قابل غور ہے۔

مثالیں

1۔ ذیل کا مکمل کیجیے۔

$$(i) \frac{1}{\sqrt{a^2-(bx+c)^2}}, (ii) \frac{1}{\sqrt{a^2+(bx+c)^2}}, (iii) \frac{1}{\sqrt{[(bx+c)^2-a^2]}}$$

ہم پاتے ہیں (2-23 § دیکھیے)

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-(bx+c)^2}} &= \frac{1}{b} \sin^{-1} \frac{bx+c}{a} \\ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+(bx+c)^2}} &= \frac{1}{b} \sinh^{-1} \frac{bx+c}{a} \\ \int \frac{dx}{\sqrt{[(bx+c)^2-a^2]}} &= \frac{1}{b} \cosh^{-1} \frac{bx+c}{a}\end{aligned}$$

2۔ مکمل کیجیے۔

$$(i) \frac{1}{\sqrt{2x^2+3x+4}}, (ii) \frac{1}{\sqrt{3x^2+4x+1}}, (iii) \frac{1}{\sqrt{-2x^2+3x+4}}$$

(i) ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}2x^2+3x+4 &= 2\left[x^2+\frac{3}{2}x+2\right] \\ &= 2\left[\left(x+\frac{3}{4}\right)^2+\frac{1}{16}\right] \\ &= 2\left[\left(x+\frac{3}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{23}}{4}\right)^2\right]\end{aligned}$$

مکمل کے طریقے

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{2x^2+3x+4}} dx &= \int \frac{dx}{\sqrt{2} \sqrt{\left[\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{23}}{4}\right)^2\right]}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh^{-1} \frac{x + \frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{23}}{4}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh^{-1} \frac{4x+3}{\sqrt{23}} \end{aligned}$$

(ii) ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} 3x^2+4x+1 &= 3\left[x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}\right] = 3\left[\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] \\ \Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{3x^2+4x+1}} dx &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{\sqrt{\left[\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right]}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cosh^{-1} \frac{x + \frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cosh^{-1} (3x+2) \end{aligned}$$

(iii) ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} -2x^2+3x+4 &= -2\left[x^2 - \frac{3}{2}x - 2\right] \\ &= -2\left[\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{41}}{4}\right)^2\right] \\ &= 2\left[\left(\frac{\sqrt{41}}{4}\right)^2 - \left(x - \frac{3}{4}\right)^2\right] \\ \Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{-2x^2+3x+4}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left[\left(\frac{\sqrt{41}}{4}\right)^2 - \left(x - \frac{3}{4}\right)^2\right]}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x - \frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{41}}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{4x-3}{\sqrt{41}} \end{aligned}$$

مشقیں

1 مکمل کیجیے :-

$$(i) \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+2}}, \quad (ii) \frac{1}{\sqrt{x^2+4x+2}}, \quad (iii) \frac{2}{\sqrt{x^2+x+1}}$$

2۔ تکمل کیجیے :-

(i) $\sqrt{1-x^2}$, (ii) $\sqrt{1+x^2}$, (iii) $\sqrt{x^2-1}$.

3۔ تکمل کیجیے :-

(i) $\sqrt{2x^2+3x+4}$, (ii) $\sqrt{3x^2+4x+1}$,
(iii) $\sqrt{-2x^2+3x+4}$

4۔ تکمل کیجیے :-

(i) $\frac{x^2}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$, (ii) $\frac{2x^2}{\sqrt{(x^2-1)^3}}$, (iii) $\frac{2x+3}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$
(iv) $(x+2)\sqrt{(x^2+1)}$, (v) $(2x+4)\sqrt{(2x^2+3x+1)}$,
(vi) $\frac{2x+5}{\sqrt{(x^2-2x+2)^3}}$

5۔ تکمل کیجیے :-

(i) $\frac{x^2}{\sqrt{(x^2+2x+2)^3}}$, (ii) $\frac{x^2}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$
(iii) $\frac{\cos x}{\sqrt{(2 \sin^2 x + 3 \sin x + 4)^3}}$

جوابات

- (i) $\sinh^{-1}(x+1)$, (ii) $\cosh^{-1}[(x+2)/\sqrt{2}]$,
(iii) $\sinh^{-1}[(2x+1)/\sqrt{3}]$
- (i) $\frac{1}{2}x\sqrt{(1-x^2)} + \frac{1}{2}\sin^{-1}x$, (ii) $\frac{1}{2}x\sqrt{(x^2+1)} + \frac{1}{2}\sinh^{-1}x$,
(iii) $\frac{1}{2}x\sqrt{(x^2-1)} - \frac{1}{2}\cosh^{-1}x$
- (i) $\frac{1}{2}(4x+3)\sqrt{(2x^2+3x+4)} + \frac{9}{8}\sqrt{2}\sinh^{-1}[(4x+3)/\sqrt{23}]$,
(ii) $\frac{1}{2}(3x+2)\sqrt{(3x^2+4x+1)} - \frac{1}{18}\sqrt{3}\cosh^{-1}(3x+2)$,
(iii) $\frac{1}{2}(4x-3)\sqrt{(-2x^2+3x+4)} + \frac{41}{32}\sqrt{2}\sin^{-1}[(4x-3)/\sqrt{41}]$
- (i) $\frac{1}{2}x\sqrt{(x^2+1)} - \frac{1}{2}\sinh^{-1}x$, (ii) $x\sqrt{(x^2-1)} + \cosh^{-1}x$,
(iii) $2\sqrt{(x^2+1)} + 3\sinh^{-1}x$, (iv) $\frac{1}{2}\sqrt{(x^2+1)}(x^2+3x+1) + \sinh^{-1}x$,
(v) $\frac{1}{2}\sqrt{(2x^2+3x+1)}(32x^2+108x+61) - \frac{5\sqrt{2}}{64}\cosh^{-1}(4x+3)$,
(vi) $2\sqrt{(x^2-2x+2)} + 7\sinh^{-1}(x-1)$
- (i) $\frac{1}{2}\sinh^{-1}(x^2+1)$, (ii) $\frac{1}{2}\sinh^{-1}x^4$,
(iii) $(1/\sqrt{2})\sinh^{-1}\frac{4\sin x+3}{\sqrt{23}}$

تکامل کے طریقے

2.5 حصہ سے تکامل

اگر u اور v ، x کے دو تفاعل ہوں، تو ہم پاتے ہیں

$$\frac{d(uv)}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

دونوں جانب تکامل کرنے پر ملتا ہے

$$uv = \int u \frac{dv}{dx} dx + \int v \frac{du}{dx} dx$$

$$(i) \dots \Rightarrow \int u \frac{dv}{dx} dx = uv - \int v \frac{du}{dx} dx.$$

$$\frac{dv}{dx} = \phi(x) \text{ اور } u = f(x) \quad \text{مان لیجیے}$$

$$v = \int \phi(x) dx \text{ اور } \frac{du}{dx} = f'(x) \quad \text{اس لیے}$$

اب (1) کو یوں لکھ سکتے ہیں

$$\int f(x) \phi(x) dx = f(x) \int \phi(x) dx - \int \left[\int \phi(x) dx \right] \cdot f'(x) dx.$$

الفاظ میں اس فارمولے کو یوں لکھ سکتے ہیں :-

دو تفاعلوں کے حاصل ضرب کا مسئلہ

(پہلے تفاعل کا تفرقی سر $\times$ دوسرے کا تکملہ) - (پہلا تفاعل $\times$ دوسرے کا تکملہ) =

مثالیں

1 تکملہ

$$\int x e^x dx.$$

تکمیلی احصاء

حاصل کیجیے
ان کی

$$x = f(x), e^x = \phi(x).$$

$$\therefore \int x e^x dx = x \cdot e^x - \int e^x \cdot 1 dx = x e^x - e^x$$

نوٹ: اگر ہم

$$f(x) = e^x, \phi(x) = x$$

$$\int x e^x dx = \frac{1}{2} x^2 e^x - \frac{1}{2} \int x^2 e^x dx,$$

اس طرح دیا ہوا تکملہ $\int x e^x dx$ نسبتاً زیادہ مشکل تکملہ $\int x^2 e^x dx$ کی ارقام میں (interms of) تبدیل ہو جاتا ہے، زیادہ مشکل اس لیے کہ x کی قوت بڑھ گئی ہے۔

لہذا فیکٹروں (factors) کو صحیح ترتیب سے چننا ضروری ہے۔

2۔ تکملہ

$$\int x^2 \sin x dx.$$

حاصل کیجیے

$$f(x) = x^2 \text{ اور } \phi(x) = \sin x \text{ لینے پر ہم پاتے ہیں}$$

$$\int x^2 \sin x dx = x^2 (-\cos x) - \int (-\cos x) 2x dx.$$

$$(i) \dots\dots\dots = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

اب تکملہ $\int x \cos x dx$ حاصل کرنے کے لیے ہمیں حصہ سے تکمل کا فارمولا پھر استعمال کرنا ہے۔ ہم پاتے ہیں

$$\int x \cos x dx = x \cdot \sin x - \int \sin x \cdot 1 dx$$

$$(2) \dots\dots\dots = x \sin x + \cos x.$$

تکمل کے طریقے

(1) اور (2) سے ہم پاتے ہیں

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2(x \sin x + \cos x).$$

اس طرح ہم نے دیکھا کہ حصہ سے تکمل کا فارمولا کئی بار لگانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

$$\int \sin^{-1} x \, dx$$

3- تکملہ

حاصل کیجیے

یہاں ہم 1 کو ایک فیکٹر لے لیتے ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \sin^{-1} x \, dx &= \int \sin^{-1} x \cdot 1 \, dx \\ &= (\sin^{-1} x) x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \end{aligned}$$

اب

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \int x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \, dx \\ &= -\frac{1}{2} \int (-2x)(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \, dx \quad (\S 2.32) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{1/2}}{\frac{1}{2}} = -\sqrt{1-x^2}. \end{aligned}$$

$$\therefore \int \sin^{-1} x \, dx = x \sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2}$$

مشقیں

ذیل تفاعلوں کا تکمل کیجیے:-

1. (i) $x e^x$ (ii) $x^2 e^x$, (iii) $x^3 e^x$, (iv) $x \sinh x$.
2. (i) $\log x$, (ii) $x \log x$, (iii) $x^2 \log x$, (iv) $x^n \log x$.

3. (i) $x(\log x)^2$, (ii) $(x \log x)^2$ (iii) $\sqrt{x} (\log x)^2$.
4. (i) $\tan^{-1} x$, (ii) $x \tan^{-1} x$, (iii) $\cot^{-1} x$.
(iv) $x \cot^{-1} x$, (v) $x^2 \tan^{-1} x$.
5. (i) $\cos^{-1} x$, (ii) $x \sin^{-1} x$, (iii) $\sec^{-1} x$, (iv) $x \sec^{-1} x$.
6. (i) $x \cos x$, (ii) $x^2 \cos x$, (iii) $x^3 \cos x$, (iv) $x^2 \sin x$,
(v) $x^2 \sin x \cos x$, (vi) $x \cos x \cos 2x$,
(vii) $x \sin x \sec^2 x$, (viii) $x \cos^2 x \sin x$.
7. (i) $\frac{x}{\sin^2 x}$, (ii) $\frac{x}{\cos^2 x}$, (iii) $x \log(1+x)$.

جوابات

1. (i) $(x-1)e^x$, (ii) $(x^2-2x+2)e^x$.
(iii) $(x^2-3x^2+6x-6)e^x$, (iv) $x \cosh x - \sinh x$.
2. (i) $x \log(x/e)$, (ii) $\frac{1}{2} x^2 \log(x^2/e)$.
(iii) $\frac{1}{3} x^3 \log(x^3/e)$, (iv) $[x^{n+1}/(n+1)^2] \log(x^{n+1}/e)$.
3. (i) $\frac{x^3}{4} [2(\log x)^2 - 2 \log x + 1]$.
(ii) $\frac{1}{128} x^4 [32(\log x)^3 - 24(\log x)^2 + 12 \log x - 3]$.
(iii) $\frac{1}{128} [18(\log x)^2 - 24 \log x + 16] x^{3/2}$.
4. (i) $x \tan^{-1} x - \log \sqrt{x^2+1}$, (ii) $\frac{1}{2}(x^2+1) \tan^{-1} x - \frac{1}{2}x$.
(iii) $x \cot^{-1} x + \log \sqrt{x^2+1}$, (iv) $\frac{1}{2}(x^2+1) \cot^{-1} x + \frac{1}{2}x$.
(v) $\frac{1}{2}(x^2-1) \tan^{-1} x - 1/12(x^3-3x)$.
5. (i) $x \cos^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$, (ii) $\frac{1}{2}(2x^2-1) \sin^{-1} x + \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}$.
(iii) $x \sec^{-1} x - \cosh^{-1} x$, (iv) $\frac{1}{2}[x^2 \sec^{-1} x - \sqrt{x^2-1}]$.
6. (i) $x \sin x + \cos x$, (ii) $(x^2-2) \sin x + 2x \cos x$.
(iii) $(x^3-6x) \sin x + 3(x^2-2) \cos x$.
(iv) $\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}(1-2x^2) \sin 2x - \frac{1}{2}x \cos 2x$.
(v) $\frac{1}{2}(1-2x^2) \cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x$.
(vi) $\frac{1}{81}(3x \sin 3x + \cos 3x + \frac{1}{3}x \sin x + \cos x)$.
(vii) $\frac{1}{2}(x \sec^2 x - \tan x)$.
(viii) $\frac{1}{4} \cos^4 x + \frac{1}{128} (12x + 8 \sin 2x + \sin 4x)$.
7. (i) $-x \cot x + \log \sin x$, (ii) $x \tan x - \log \sec x$.
(iii) $\frac{1}{2}(x^2-1) \log(1+x) - \frac{1}{2}(x^2-2x)$.

تکملہ 2.51

$$\int e^x [f(x) + f'(x)] dx.$$

کی قیمت حاصل کرنا

تکمل کے طریقے

حصے سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int e^x f(x) dx = e^x f(x) - \int e^x f'(x) dx$$

$$\Rightarrow \int e^x [f(x) + f'(x)] dx = e^x f(x).$$

تکملہ کی یہ شکل خاصی اہم ہے۔

مثالیں

1۔ ذیل تکملے حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{x e^x}{(x+1)^3} dx, \quad (ii) \int e^x \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} dx.$$

(i) ہم پاتے ہیں

$$(i) \int \frac{x e^x}{(x+1)^3} dx = \int \frac{x+1-1}{(x+1)^3} e^x dx,$$

$$= \int \left[\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^3} \right] e^x dx$$

اب $f(x) = \frac{1}{x+1}$ لے لیں پر $f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$ اور ہم دیکھتے

ہیں کہ تکاملیہ کی شکل

$$e^x [f(x) + f'(x)]$$

طرح کی ہے اور اس لیے اس کا تکملہ

$$= e^x f(x) = \frac{e^x}{x+1}$$

لیکن ہم اسے دوسرے طریقے سے یوں حاصل کر سکتے ہیں
تکملہ $\int \frac{1}{x+1} e^x dx$ کا حصے سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{1}{x+1} e^x dx = \frac{1}{x+1} e^x - \int -\frac{1}{(x+1)^2} e^x dx.$$

$$\Rightarrow \int \left[\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right] e^x dx = \frac{1}{x+1} e^x.$$

اب (ii)

$$e^x \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} \right) = e^x \left\{ \frac{1 + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \right\}$$

$$= e^x \left\{ \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} \right\}$$

لہذا $f(x) = \tan \frac{x}{2}$ لینے پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ملیے کی شکل $e^x [f(x) + f'(x)]$ کی طرح کی ہے۔
اب $e^x \tan \frac{x}{2}$ کا حصہ سے مکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int e^x \tan \frac{x}{2} dx = e^x \tan \frac{x}{2} - \int \frac{1}{2} \sec^2 x dx$$

$$\int e^x \left(\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \right) dx = e^x \tan \frac{x}{2}$$

مشقیں

1 ذیل تفاعلوں کا مکمل کیجیے۔

(i) $\frac{1+x}{(2+x)^2} e^x,$	(ii) $\frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x,$
(iii) $\frac{1+x \log x}{x} e^x,$	(iv) $\frac{2+\sin 2x}{1+\cos 2x} e^x,$
(v) $\frac{2-\sin 2x}{1-\cos 2x} e^x,$	(vi) $\frac{1+\sin 2x}{1+\cos 2x} e^{2x},$
(vii) $\frac{\sqrt{1-\sin x}}{1+\cos x} e^{-\frac{1}{2}x},$	(viii) $\frac{(x^2+1)}{(x+1)^2} e^x,$
(ix) $e^x (\tan x - \log \cos x).$	

تکمل کے طریقے

جوابات

1. (i) $e^x/(2+x)$. (ii) $e^x \tan \frac{x}{2}$. (iii) $e^x \log x$.
 (iv) $e^x \tan x$. (v) $-e^{2x} \cot x$. (vi) $\frac{1}{2}e^{2x} \tan x$.
 (vii) $e^{-2x} \sec x/3$ (viii) $(x-1)e^x/(x+1)$. (ix) $e^x \log \sec x$.

2.52 (i) $e^{ax} \cos (bx+c)$ اور (ii) $e^{ax} \sin (bx+c)$ کے تکمل

ہے۔ سے تکمل کا اصول لگانے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \cos (bx+c) dx &= \frac{e^{ax}}{a} \cos (bx+c) - \int -\frac{e^{ax}}{a} b \sin (bx+c) dx \\ (i) \dots\dots\dots &= \frac{e^{ax}}{a} \cos (bx+c) + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin (bx+c) dx. \end{aligned}$$

اسی طرح ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin (bx+c) dx &= \frac{e^{ax}}{a} \sin (bx+c) - \int \frac{e^{ax}}{a} \cdot b \cos (bx+c) dx \\ (ii) \dots\dots\dots &= \frac{e^{ax}}{a} \sin (bx+c) - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos (bx+c) dx. \end{aligned}$$

اگر $\int e^{ax} \cos (bx+c) dx$

حاصل کرنا ہو تو (i) کے سب سے داہنی طرف کے رکن term کی جگہ پر (ii) کی داہنی جانب رکھتے ہیں اور اگر

$$\int e^{ax} \sin (bx+c) dx$$

حاصل کرنا ہو تو (ii) کے سب سے داہنی طرف کے رکن کی جگہ پر (i) کی داہنی جانب رکھتے ہیں۔

پہلی صورت میں ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}
 & \int e^{ax} \cos (bx+c) dx \\
 &= \frac{e^{ax}}{a} \cos (bx+c) + \frac{b}{a^2} e^{ax} \sin (bx+c) - \frac{b^2}{a^3} \int e^{ax} \cos (bx+c) dx \\
 \Rightarrow & \left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right) \int e^{ax} \cos (bx+c) dx \\
 &= e^{ax} \frac{a \cos (bx+c) + b \sin (bx+c)}{a^2}, \\
 \Rightarrow \int e^{ax} \cos (bx+c) dx &= e^{ax} \frac{a \cos (bx+c) + b \sin (bx+c)}{a^2+b^2}
 \end{aligned}$$

اسی طرح ہم پاتے ہیں

$$\int e^{ax} \sin (bx+c) dx = e^{ax} \frac{a \sin (bx+c) - b \cos (bx+c)}{a^2+b^2}$$

ان نتائج کو ایک دوسری صورت میں رکھنے کے لیے ہم دو نمبر r اور α ایسے معلوم کرتے ہیں کہ

$$a = r \cos \alpha \text{ اور } b = r \sin \alpha.$$

اس سے ملتا ہے

$$r = \sqrt{a^2+b^2}, \alpha = \tan^{-1} (b/a).$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \int e^{ax} \cos (bx+c) dx &= e^{ax} \frac{r \cos (bx+c-\alpha)}{a^2+b^2} \\
 &= e^{ax} \frac{\cos \left(bx+c-\tan^{-1} \frac{b}{a}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}}
 \end{aligned}$$

اسی طرح

$$\int e^{ax} \sin (bx+c) dx = e^{ax} \frac{\sin \left(bx+c-\tan^{-1} \frac{b}{a}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

تکمل کے طریقے

مثالیں

1. حاصل کیجیے :-

$$(i) \int e^{3x} \sin 4x \, dx, \quad (ii) \int e^{4x} \cos 2x \cos 4x \, dx.$$

$$(iii) \int x e^{2x} \cos x \, dx.$$

(i) اوپر، § 2.52 میں ثابت کیے گئے فارمولے سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int e^{3x} \sin 4x \, dx &= \frac{e^{3x}}{\sqrt{3^2+4^2}} \sin \left(4x - \tan^{-1} \frac{4}{3} \right) \\ &= \frac{e^{3x}}{5} \sin \left(4x - \tan^{-1} \frac{4}{3} \right) \end{aligned}$$

(ii) اب

$$\begin{aligned} \cos 2x \cos 4x &= \frac{1}{2} [2 \cos 2x \cos 4x] \\ &= \frac{1}{2} (\cos 6x + \cos 2x) \end{aligned}$$

$$\therefore \int e^{4x} \cos 2x \cos 4x \, dx$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int e^{4x} \cos 6x \, dx + \frac{1}{2} \int e^{4x} \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{4x}}{\sqrt{4^2+6^2}} \cos \left(6x - \tan^{-1} \frac{6}{4} \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{4x}}{\sqrt{4^2+2^2}} \cos \left(2x - \tan^{-1} \frac{2}{4} \right) \\ &= \frac{e^{4x}}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{52}} \cos \left(6x - \tan^{-1} \frac{3}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{20}} \cos \left(2x - \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

(iii) تکملہ

حاصل کرنے کے لیے ہم حصے سے تکمل کا اصول استعمال کرتے ہیں۔ x اور $e^{2x} \cos x$ کو فیکٹر لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x e^{2x} \cos x \, dx &= x \cdot \frac{e^{2x}}{\sqrt{5}} \cos \left(x - \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) \\ &\quad - \int 1 \cdot \frac{e^{2x}}{\sqrt{5}} \cos \left(x - \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) dx. \end{aligned}$$

پھر

$$\int e^{2x} \cos \left(x - \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) dx = \frac{e^{2x}}{\sqrt{5}} \cos \left(x - 2 \tan^{-1} \frac{1}{2} \right)$$

$$\therefore \int x e^{2x} \cos x dx = e^{2x} \left[\frac{x}{\sqrt{5}} \cos \left(x - \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{5} \cos \left(x - 2 \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) \right]$$

مشقیں

1۔ ذیل تکملے حاصل کیجیے :-

(i) $\int e^{4x} \cos 5x dx,$	(ii) $\int e^x \cos^3 x dx.$
(iii) $\int e^{2x} \cos^3 x dx,$	(iv) $\int e^x \sin x \sin 2x \sin 3x dx,$
(v) $\int x^2 e^x \sin x dx,$	(vi) $\int \sinh 2x \sin 2x dx.$

2۔ تکمل کیجیے :-

- (i) $\cos (\log x),$ (ii) $x \sin (2 \log x),$ (iii) $x^3 \sin (a \log x).$

جوابات

- (i) $\frac{e^{4x}}{\sqrt{41}} \cos (5x - \tan^{-1} \frac{5}{4}).$

(ii) $\frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{13}} e^x \cos (2x - \tan^{-1} 2).$

(iii) $\frac{1}{4} e^{2x} \left[\frac{3}{\sqrt{5}} \cos \left(x - \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{13}} \cos \left(3x - \tan^{-1} \frac{3}{2} \right) \right].$

(iv) $\frac{1}{4} e^x \left[\sqrt{\frac{1}{5}} \sin (2x - \tan^{-1} 2) - \sqrt{\frac{1}{13}} \sin (6x - \tan^{-1} 6) + \sqrt{\frac{1}{17}} \sin (4x - \tan^{-1} 4) \right].$

(v) $\sqrt{\frac{1}{2}} e^x \left[x^2 \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right) + \sin \left(x - \frac{3}{2} \pi \right) \right] + x e^x \cos x.$

(vi) $\frac{1}{2} \cosh 2x \sin 2x - \sinh 2x \cos 2x.$
- (i) $\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot x \cos [\log x - \frac{\pi}{4}].$ (ii) $\sqrt{\frac{1}{2}} x^2 \sin (2 \log x - \frac{\pi}{4}).$

(iii) $\frac{x^4}{\sqrt{(16+a^2)}} \sin \left[x \log x - \tan^{-1} \frac{a}{4} \right].$

تکمل کے طریقے

2.6۔ کبھی کبھی تکمل کے یہ دونوں طریقے ایک ہی سوال میں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس عمل کو دو مثالوں سے سمجھائیں گے۔

1۔ حاصل کیجیے :-

$$\int \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

ہم رکھتے ہیں

$$x = \sin \theta \Rightarrow dx = \cos \theta d\theta$$

$$\therefore \int \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\sin \theta \cdot \theta}{\cos \theta} \cos \theta d\theta = \int \theta \sin \theta d\theta.$$

اب $\int \theta \sin \theta d\theta$ حاصل کرنے کے لیے ہم حصے سے تکمل کا فارمولا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے

$$\begin{aligned} \int \theta \sin \theta d\theta &= (-\theta \cos \theta) - \int -\cos \theta d\theta. \\ &= -\theta \cos \theta + \int \cos \theta d\theta = -\theta \cos \theta + \sin \theta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\theta \cos \theta + \sin \theta \\ &= -\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + x. \end{aligned}$$

$$\tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)} \text{ کا تکمل کیجیے :-}$$

ہم رکھتے ہیں

$$x = \cos \theta \Rightarrow dx = -\sin \theta d\theta.$$

$$\tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)} = \tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}\right)} \quad \text{ساتھ ہی}$$

$$= \tan^{-1} \sqrt{\left[\frac{2 \sin^2 (\theta/2)}{2 \cos^2 (\theta/2)}\right]}$$

$$= \tan^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) = \frac{\theta}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx &= \int \frac{\theta}{2} (-\sin \theta) d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \int \theta \sin \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{2} [-\theta \cos \theta + \sin \theta] \quad (\text{اوپر کی مثال کی طرح}) \\ &= -\frac{1}{2} [-x \cos^{-1} x + \sqrt{(1-x^2)}]. \end{aligned}$$

مشقیں

1. ذیل کا تکمل کیجیے :-

1. $x^5 \tan^{-1} x^3$	2. $x \tan^{-1} x / (1+x^2)^{3/2}$
3. $x^3 \cos x^3$	4. $\tan^{-1} [2x/(1-x^2)]$
5. $\frac{e^{m \tan^{-1} x}}{(1+x^2)^{3/2}}$	6. $\frac{e^{m \tan^{-1} x}}{(1+x^2)^3}$
7. $\frac{x e^{m \sin^{-1} x}}{\sqrt{(1-x^2)}}$	8. $\frac{x^3 e^{m \sin^{-1} x}}{\sqrt{(1-x^2)}}$

جوابات

1. $\frac{1}{2} [(x^3+1) \tan^{-1} x^3 - x^3]$	2. $(x - \tan^{-1} x) / \sqrt{(1+x^2)}$
3. $\frac{1}{2} (x^3-2) \sin x^3 + x^3 \cos x^3$	4. $2x \tan^{-1} x - \log(1+x^2)$
5. $\frac{e^{m\theta}}{\sqrt{(1+m^2)}} \cos(\theta - \cot^{-1} m), \theta = \tan^{-1} x$	جہاں
6. $\frac{e^{m\theta}}{2} \left[\frac{1}{m} + \frac{1}{\sqrt{(1+m^2)}} \cos \left(2\theta - \tan^{-1} \frac{2}{m} \right) \right], \theta = \tan^{-1} x$	جہاں
7. $\frac{e^{m\theta}}{\sqrt{(1+m^2)}} \sin(\theta - \cot^{-1} m), \theta = \sin^{-1} x$	جہاں
8. $\frac{e^{m\theta}}{2} \left[\frac{1}{m} - \frac{1}{\sqrt{(m^2+4)}} \cos \left(2\theta - \tan^{-1} \frac{2}{m} \right) \right], \theta = \sin^{-1} x$	جہاں

2.7 - معین تکمل

عوضی اور حصے سے تکمل کے طریقے استعمال کر کے متناہی تکملہ نکالنے کا طریقہ ہم مثالوں سے سمجھائیں گے۔ اس طریقے کی واجبیت صاف ظاہر ہوگی۔

تکمل کے طریقے

جب کسی معین تکملہ

$$\int_a^b f(x) dx$$

میں متغیر x تبدیل کرتے ہیں تو اسی حساب حدیں (limits) بھی بدل دیتے ہیں
نئی حدیں نئے متغیر کی وہ قیمتیں ہوتی ہیں جو کہ نئے متغیر میں x کی جگہ a اور b رکھنے
پر ملتی ہیں۔

مثالیں

1۔ تکملہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx.$$

کی قیمت نکالے

$$(1) \dots \dots \dots \sin x = t \Rightarrow \cos x dx = dt \quad \text{ہم رکھتے ہیں}$$

(1) سے ہم دیکھتے ہیں کہ

$$x = 0 \Rightarrow t = 0 \quad \text{اور} \quad x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1$$

لہذا نئے متغیر t کی حدیں صفر اور 1 ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{1 + \sin^2 x} = \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^2} = \left| \tan^{-1} t \right|_0^1 = \tan^{-1} 1 - \tan^{-1} 0 = \frac{\pi}{4}$$

2۔ تکملہ

$$\int_0^1 x^2 e^{2x} dx.$$

کی قیمت نکالے

حصے سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{2x} dx &= \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \int \frac{2x}{2} \cdot e^{2x} dx = \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \int x e^{2x} dx. \\ \Rightarrow \int_0^1 x^2 e^{2x} dx &= \left| \frac{x^2 e^{2x}}{2} \right|_0^1 - \int_0^1 x e^{2x} dx = \frac{e^2}{2} - \int_0^1 x e^{2x} dx. \end{aligned}$$

کھ

$$\begin{aligned} \int x e^{2x} dx &= \frac{x e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} dx \\ &= \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \\ \Rightarrow \int_0^1 x e^{2x} dx &= \left| \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \right|_0^1 \\ &= \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \\ \therefore \int_0^1 x^2 e^{2x} dx &= \frac{e^2}{2} - \left(\frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 - 1}{4} \end{aligned}$$

3۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} \frac{\sin^{-1} x dx}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \log 2.$$

ہم رکھتے ہیں

$$(1) \dots \dots \dots x = \sin \theta \Rightarrow dx = \cos \theta d\theta.$$

اب (i) سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = 0$ پر $\theta = 0$ اور $x = \sqrt{\frac{1}{2}}$ پر $\theta = \frac{\pi}{4}$ اس لیے دیا ہوا تکملہ

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \theta \sec^3 \theta d\theta.$$

حصے سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \theta \sec^3 \theta d\theta &= \theta \tan \theta - \int 1 \cdot \tan \theta d\theta \\ &= \theta \tan \theta - \log \sec \theta \\ \therefore \int_0^{\frac{\pi}{4}} \theta \sec^3 \theta d\theta &= \left| \theta \tan \theta - \log \sec \theta \right|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot 1 - \log \sqrt{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2. \end{aligned}$$

تکمل کے طریقے

مشقیں

1- ذیل تکملوں کی قیمت نکالے

$$\begin{aligned}
 (i) \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx, \quad (ii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt, \quad (iii) \int_0^1 \frac{(\tan^{-1}x)^2}{1+x^2} dx, \\
 (iv) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt, \quad (v) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt, \quad (vi) \int_0^1 \frac{\sqrt{(\tan^{-1}x)}}{1+x^2} dx, \\
 (vii) \int_0^{\pi} x \cos x dx, \quad (viii) \int_0^{\pi} x \sin^{-1} x dx, \\
 (ix) \int_0^1 x \tan^{-1}x dx^2 \quad (x) \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x-x^2)}}.
 \end{aligned}$$

2- ثبات کیجیے کہ

$$\int_0^1 x(\tan^{-1}x)^2 dx = \frac{\pi}{4} \left(\frac{\pi}{4} - 1 \right) + \frac{1}{2} \log 2$$

جوابات

1. (i) $\log 2$, (ii) $\pi/4$, (iii) $\pi^2/192$, (iv) $1/4$, (v) $2/3$,
 (vi) $\pi^3/12$, (vii) -2 , (viii) $\pi/8$, (ix) $(\pi-2)/4$, (x) $\pi/6$.

2.71 - غیر واجب معین تکملے

غیر واجب معین تکملے نکالتے وقت اکثر ذیل حدود کی ضرورت ہوتی ہے

$$\begin{aligned}
 (i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0, \quad (ii) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^n} = 0, \\
 (iii) \lim_{x \rightarrow 0} (x^n \log x) = 0,
 \end{aligned}$$

* یہ نتائج مصنف کی کتاب Differential Calculus کے باب XIII میں ثبات کیے گئے ہیں۔

تکلی احصاء

80

جہاں n کوئی مثبت کامل عدد ہے۔

مثالیں

1- تکملہ

$$\int_0^1 \log x \, dx$$

کی قیمت نکالنے
ہم جانتے ہیں کہ جب $0 < x$ ہو تو $\log x \rightarrow -\infty$ لہذا $x = 0$ پر تکاملیہ
لا متناہی ہو جاتا ہے۔

پہلے ہم تکملہ

$$\int_h^1 \log x \, dx$$

کی قیمت نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_h^1 \log x \, dx &= \int_h^1 1 \cdot \log x \, dx \\ &= \left[x \log x \right]_h^1 - \int_h^1 1 \cdot dx \\ &= \left[x \log x \right]_h^1 - \left[x \right]_h^1 \\ &= -h \log h - (1-h), \quad (\log 1 = 0) \end{aligned}$$

جب $0 < h$ تو $0 < h \log h$ اور اس لیے داہنی جانب -1 :

اس لیے تکملہ

$$\int_0^1 \log x \, dx$$

کا متناہی وجود ہے اور وہ -1 کے برابر ہے۔

2- ثبات کیجیے

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx = \frac{a}{a^2 + b^2} \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx = \frac{b}{a^2 + b^2}, \quad (a > 0)$$

ہم کہتے ہیں

تکمل کے طریقے

$$I = \int_0^{\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx, \quad J = \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx.$$

مان لیجیے کہ x کوئی مثبت کامل عدد ہے۔
حصہ سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(1) \dots \int_0^x e^{-ax} \cos bx \, dx = \left| \frac{e^{-ax} \sin bx}{b} \right|_0^x + \frac{a}{b} \int_0^x e^{-ax} \sin bx \, dx$$

اب

$$\left| e^{-ax} \frac{\sin bx}{b} \right|_0^x - \frac{\sin bx}{be^{ax}} - 0 = \frac{\sin bx}{be^{ax}},$$

جو کہ x کے ∞ کی طرف مائل ہونے پر خود صفر کی طرف مائل ہوتا ہے، کیوں کہ
 $\sin bx$ تعدادی حیثیت (numerically) سے ایک سے کم ہے۔
اس طرح (1) سے ہم پاتے ہیں کہ جب $x \leftarrow \infty$ تب

$$(2) \dots \dots \dots I = \frac{a}{b} J.$$

پھر ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots \int_0^x e^{-ax} \sin bx \, dx = \left| -\frac{e^{-ax} \cos bx}{b} \right|_0^x - \frac{a}{b} \int_0^x e^{-ax} \cos bx \, dx$$

اب

$$\left| -\frac{e^{-ax} \cos bx}{b} \right|_0^x = -\frac{\cos bx}{be^{ax}} + \frac{1}{b}$$

جو کہ $x \leftarrow \infty$ ہونے پر خود $(1/b)$ کی طرف مائل ہوتا ہے۔
اس لیے (3) سے ہم پاتے ہیں کہ جب $x \leftarrow \infty$ تو

$$(4) \dots \dots \dots J = \frac{1}{b} - \frac{a}{b} I.$$

اب (2) اور (4) کو حل کرنے پر

$$I = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad J = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

مشقیں

ذیل کے غیر واجب تکملوں کی قیمت نکالیے :

- (i) $\int_0^1 \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx,$ (ii) $\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx,$ (iii) $\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx$
 (iv) $\int_0^1 x \log x dx,$ (v) $\int_0^\infty \frac{\log x}{x^3} dx,$
 (vi) $\int_1^\infty \frac{\log x}{x^3} dx,$ (vii) $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{ax-x^3}},$
 (viii) $\int_0^a \sqrt{\left(\frac{a-x}{x}\right)} dx,$ (ix) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx,$
 (x) $\int_0^\infty e^{-ax} \sin nx dx, (a > 0),$
 (xi) $\int_0^\infty e^{-2x} \sin x \sin 3x dx, (xii) \int_{-\infty}^0 e^x \sin x dx.$

جوابات

- (i) $\pi^2/8.$ (ii) 2. (iii) 6. (iv) $-\frac{1}{2}.$
 (v) 1. (vi) $1/4.$ (vii) $\pi.$ (viii) $a\pi/2.$
 (ix) $\pi/2.$ (x) $n/(a^2+n^2).$ (xi) $3/40.$ (xii) $-1/2.$

2.8 - تحویلی فارمولے (Reduction Formulae)

لفظی اعتبار سے کوئی بھی ایسا فارمولا جو کسی تکملے کو ایک آسان تکملے کی ارقام (in terms of) میں بدل دے اُسے پہلے والے تکملے کا تحویلی فارمولا کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر "تحویلی فارمولا" اُسی فارمولے کو کہتے ہیں جس میں تکاملیہ تفاعلوں کی ایک دی ہوئی قسم کا ایک ممبر ہوتا ہے اور جس کی مدد سے اس قسم کے عام ممبر تفاعل کے تکملے کو اُسی قسم کے ایک یا دو تفاعلوں کے ارقام میں نکالا جاسکتا ہے۔

تحویلی فارمولے، عام طور پر جسے تکمل کا فارمولا استعمال کر کے حاصل کیے

تکمل کے طریقے

جاتے ہیں۔
اگلے ابواب میں کافی تعداد میں تحویلی فارمولے نکالے جائیں گے۔ یہاں ہم کچھ
اہم مثالوں پر ہی غور کریں گے۔

مثالیں

1۔ تکملہ

کے لیے ایک تحویلی فارمولا نکالے اور اس کا استعمال کر کے تکملہ

$$\int x^n e^{ax} dx.$$

کی قیمت نکالے۔
حصے سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int x^n e^{ax} dx = x^n \cdot \frac{e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx,$$

جو کہ درکار تحویلی فارمولا ہے۔

ترتیب وار n کی جگہ 3, 2, 1 رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \dots \int x^3 e^{ax} dx = \frac{x^3 e^{ax}}{a} - \frac{3}{a} \int x^2 e^{ax} dx$$

$$(ii) \dots \dots \int x^2 e^{ax} dx = \frac{x^2 e^{ax}}{a} - \frac{2}{a} \int x e^{ax} dx$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{x e^{ax}}{a} - \frac{1}{a} \int e^{ax} dx$$

$$(iii) \dots \dots = \frac{x e^{ax}}{a} - \frac{e^{ax}}{a^2}$$

اب (ii) اور (iii) سے ہم پاتے ہیں

$$(iv) \dots \dots \int x^3 e^{ax} dx = \frac{x^3 e^{ax}}{a} - \frac{2x^2 e^{ax}}{a^2} + \frac{2e^{ax}}{a^3}$$

پھر (i) اور (iv) سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x^3 e^{ax} dx &= \frac{x^3 e^{ax}}{a} - \frac{3x^2 e^{ax}}{a^2} + \frac{6x e^{ax}}{a^3} - \frac{6 e^{ax}}{a^4} \\ &= \frac{e^{ax}}{a^4} (a^3 x^3 - 3a^2 x^2 + 6ax - 6). \end{aligned}$$

2۔ تکملہ

$$, x^m \sin nx dx.$$

کے لیے ایک تویلی فارمولا حاصل کیجیے۔
ہم سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \int x^m \sin nx dx = -\frac{x^m \cos nx}{n} + \frac{m}{n} \int x^{m-1} \cos nx dx$$

پھر

$$(ii) \dots \int x^{m-1} \cos nx dx = \frac{x^{m-1} \sin nx}{n} - \frac{m-1}{n} \int x^{m-2} \sin nx dx$$

یہ قیمت (i) میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x^m \sin nx dx &= -\frac{x^m \cos nx}{n} + \frac{mx^{m-1} \sin nx}{n^2} \\ &\quad - \frac{n(m-1)}{n^3} \int x^{m-2} \sin nx dx. \end{aligned}$$

جو کہ درکار تویلی فارمولا ہے۔

3۔ تکملہ

$$\int x^n e^{-x} dx$$

کے لیے ایک تویلی فارمولا حاصل کیجیے اور اس کی مدد سے ثابت کیجیے کہ لامتناہی تکملہ

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$$

جہاں کہ n کوئی مثبت کامل عدد ہے۔

تکمل کے طریقے

حصے سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}\int_0^t x^n e^{-x} dx &= -x^n e^{-x} \Big|_0^t + n \int_0^t x^{n-1} e^{-x} dx \\ &= -t^n e^{-t} + n \int_0^t x^{n-1} e^{-x} dx\end{aligned}$$

اب

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (-t^n e^{-t}) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t^n}{e^t} \right) = 0$$

$$\therefore \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx$$

جس سے کہ

$$I_n = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$$

لکھنے پر ملتا ہے

$$I_n = n I_{n-1}$$

اب n کی جگہ $n-1, n-2, \dots, 2$ اور 1 لکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$I_{n-1} = (n-1) I_{n-2},$$

$$I_{n-2} = (n-2) I_{n-3},$$

$$I_{n-3} = (n-3) I_{n-4},$$

$$I_1 = 1 \cdot I_0 = I_0.$$

ان سے ہم پاتے ہیں

$$I_n = n! \cdot I_0.$$

اب

$$I_0 = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\int_0^t e^{-x} dx \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \left| -e^{-t} + 1 \right| = 1$$

$$I_n = n!.$$

اس لیے

4. تکملہ

$$\int x^m (\log x)^n dx$$

کے لیے ایک تخیلی فارمولا حاصل کیجیے اور اس کے استعمال سے تکملہ

$$\int_0^1 x^m (\log x)^3 dx.$$

حاصل کیجیے۔
حصے سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x^m (\log x)^n dx &= \frac{x^{m+1}}{m+1} (\log x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^{m+1} (\log x)^{n-1} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^{m+1}}{m+1} (\log x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\log x)^{n-1} dx, \end{aligned}$$

جو کہ درکار تخیلی فارمولا ہے۔

اس میں $m = 4$ رکھنے پر ملتا ہے۔

$$\int x^4 (\log x)^n dx = \frac{x^5}{5} (\log x)^n - \frac{n}{5} \int x^4 (\log x)^{n-1} dx.$$

اب ترتیب وار n کی جگہ 2, 3 اور 1 رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int x^4 (\log x)^3 dx = \frac{x^5}{5} (\log x)^3 - \frac{3}{5} \int x^4 (\log x)^2 dx$$

$$\int x^4 (\log x)^2 dx = \frac{x^5}{5} (\log x)^2 - \frac{2}{5} \int x^4 \log x dx$$

$$\int x^4 \log x dx = \frac{x^5}{5} \log x - \frac{1}{5} \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} \log x - \frac{x^5}{25}$$

ان سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x^4 (\log x)^3 dx &= \frac{x^5}{5} (\log x)^3 - \frac{3x^5}{25} (\log x)^2 \\ &\quad + \frac{6x^5}{125} \log x - \frac{6}{625} x^5. \end{aligned}$$

تکمل کے طریقے

$$\Rightarrow \int_0^1 x^4 (\log x)^3 dx = \left| \frac{x^5}{5} (\log x)^3 - \frac{3x^5}{25} (\log x)^2 + \frac{6x^5}{125} \log x - \frac{6}{625} x^5 \right|_0^1$$

جب $x \leftarrow 0$ تو $x^5 (\log x)^3$, $x^5 (\log x)^2$, اور $x^5 \log x$ سبھی صفر کی طرف مائل ہوتے ہیں

$$\therefore \int_0^1 x^4 (\log x)^3 dx = -\frac{6}{625}$$

مشقیں

1۔ تکملہ $\int x^m \cos nx dx$ کے لیے ایک تخیلی فارمولا حاصل کیجیے اور اس کے استعمال سے تکملہ $\int x^3 \cos 3x dx$ حاصل کیجیے۔

2۔ اگر

$$u_n = \int_0^{\frac{1}{2}\pi} x^n \sin x dx, \quad n > 1,$$

تو ثابت کیجیے کہ

$$u_n + n(n-1)u_{n-2} = n \left(\frac{\pi}{2} \right)^{n-1}$$

3۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int x^m (1-x)^{n-1} dx = \frac{x^{m+1} (1-x)^{n-1}}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int x^m (1-x)^{n-2} dx.$$

اس لیے یہ دکھائیے کہ

$$\int_0^1 x^m (1-x)^{n-1} dx = \frac{(n-1)! m!}{(m+n)!}$$

جہاں m, n مثبت کامل اعداد ہیں۔

تکلی احصاء

4. اگر m, n مثبت کامل اعداد ہوں تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx = \int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{m-1} dx$$

$$= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (m-1)}{n(n+1)(n+2) \cdot \dots \cdot (n+m-1)}$$

جوابات

$$1. \int x^m \cos nx dx = x^{m-1} \frac{nx \sin nx + m \cos nx}{n^2} - \frac{m(m-1)}{n^3} \int x^{m-2} \cos nx dx.$$

$$\int x^3 \cos 3x dx = \frac{1}{27} (9x^2 - 2) \cos 3x + \frac{1}{27} (3x^3 - 2x) \sin 3x.$$

باب 2 پر مشقیں

1. ثابت کیجیے کہ اگر m اور n مختلف کامل اعداد ہوں تو

$$\int_0^\pi \sin mx \sin nx dx = 0, \int_0^\pi \sin^2 mx dx = \frac{\pi}{2}.$$

2. حاصل کیجیے

$$\int e^x (x-2) (2x+3) dx.$$

3. حاصل کیجیے

$$\int x^3 \log (1+x^3) dx.$$

4. ثابت کیجیے کہ اگر n ایک سے بڑا کامل عدد ہو تو

$$\int_0^\infty \frac{dx}{[x + \sqrt{(1+x^2)}]^n} = \frac{n}{n^2-1}.$$

($x = \sinh \theta$ رکھیے)

تکمل کے طریقے

5. حاصل کیجیے

$$\int \frac{\cos^{-1} x}{x^3} dx.$$

6. حاصل کیجیے

$$\int \frac{\sin^{-1}(\log x)}{x^3} dx.$$

7. ثبات کیجیے کہ

$$(i) \int \frac{x}{1+\cos x} dx = x \tan \frac{x}{2} + 2 \log \cos \frac{1}{2} x.$$

$$(ii) \int \frac{x}{1-\cos x} dx = -x \cot \frac{x}{2} + 2 \log \sin \frac{1}{2} x.$$

$$(iii) \int \frac{x}{1+\sin x} dx = -x \tan \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + 2 \log \cos \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - x \right).$$

$$(iv) \int \frac{x}{1-\sin x} dx = x \cot \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + 2 \log \sin \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - x \right).$$

8. ثبات کیجیے کہ

$$\int_a^b \frac{\log x}{x} dx = \frac{1}{2} \log \left(\frac{b}{a} \right) \cdot \log(ab).$$

9. حاصل کیجیے

$$\int_a^b \left[\log \log x + \frac{1}{(\log x)^2} \right] dx.$$

10. ذیل تکملے حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{\cos 2x}{\cos x} dx, \quad (ii) \int \frac{x - \sin x}{1 - \cos x} dx, \quad (iii) \int \sec^3 x dx.$$

11. حاصل کیجیے

$$(i) \int x^2 \tan^{-1} x dx, \quad (ii) \int x^3 \tan^{-1} x^3 dx, \quad (iii) \int \frac{(1-x)e^x}{x^2} dx,$$

$$(iv) \int (\sin x + \cos x)e^{-ax}, \quad (v) \int_0^1 \frac{x^3 \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

$$(vi) \int_0^{\infty} \frac{x (\tan^{-1} x)^2}{(1+x^2)^{3/2}} dx, \quad (vii) \int_0^{\pi} x e^{ax} \sin x dx.$$

$$(viii) \int_0^1 x^2 e^x \sin \pi x dx.$$

$$(ix) \int_0^{\infty} e^{-ax} \cos \beta x \cos \lambda x dx, (a > 0).$$

تکمل کیجیے - 12.

$$(i) \frac{1}{\sqrt{(x+a)} + \sqrt{(x+b)}}, \quad (ii) \frac{\sqrt{(a^2 - x^2)}}{x},$$

$$(iii) \log [x + \sqrt{(x^2 + a^2)}], \quad (iv) x' \log [x + \sqrt{(x^2 + a^2)}].$$

تکمل کیجیے - 13

$$(i) \sqrt{\left(\frac{x}{a+x}\right)}, \quad (ii) \frac{\sin x}{\sin(x-a)},$$

$$(iii) \sqrt{\left(\frac{x+a}{x}\right)}, \quad (iv) \tan^{-1} \frac{3x-x^3}{1-3x^2}.$$

ثابت کیجیے کہ - 14

$$(i) \int e^{ax} \cos^n bx dx$$

$$= \frac{a \cos bx + nb \sin bx}{a^2 + n^2 b^2} e^{ax} \cos^{n-1} bx + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} bx dx,$$

$$(ii) \int e^{ax} \sin^n bx dx$$

$$= \frac{a \sin bx - nb \cos bx}{a^2 + n^2 b^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} bx dx.$$

جوابات

2. $(2x^2 - 5x - 1)e^x.$
3. $\frac{1}{2}(x^4 - 1) \log(1+x^2) - \frac{1}{2}(x^4 - 2x^2).$
5. $[x\sqrt{(1-x^2)} - \cos^{-1}x]/2x^2.$
6. $-[2 \sin(\log x) + \cos(\log x)]/5x^2.$
9. $\beta \log(\log \beta) - \alpha \log(\log \alpha) - [\beta(\log \beta)^{-1} - \alpha(\log \alpha)^{-1}].$
10. (i) $2 \sin x - \log \tan\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\pi\right).$ (ii) $-x \cot\left(\frac{1}{2}x\right).$
- (iii) $\frac{1}{2} \tan x \sec x + \frac{1}{2} \log \tan\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\pi\right).$

11. (i) $\frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x + \frac{1}{3} [\log (x^3+1) - x^3]$.
(ii) $\frac{1}{3} x^3 \tan^{-1} x^3 + \frac{1}{18} [\log (x^3+1) - x^3]$.
(iii) $-e^x/x$. (iv) $e^x \sin x$. (v) $\frac{7}{8}$. (vi) $(\pi-2)$.
(vii) $\frac{1}{8} (5\pi - 4e^{2\pi} - \frac{4}{8})$. (viii) $\pi[e(\pi^4 - 4\pi^2 + 3) - 2\pi^2 + 6]/(1+\pi^2)^3$
12. (i) $\frac{2}{3(a-b)} \left[(x+a)^{\frac{2}{3}} - (x+b)^{\frac{2}{3}} \right]$.
(ii) $\sqrt{(a^2-x^2)} + a \log \frac{a-\sqrt{(a^2-x^2)}}{x}$.
(iii) $x \log [x + \sqrt{(a^2+x^2)}] - \sqrt{(a^2+x^2)}$.
(iv) $\frac{1}{2} x^2 \log [x + \sqrt{(a^2+x^2)}] - \frac{1}{2} [x\sqrt{(a^2+x^2)} - a^2 \sinh^{-1} (x/a)]$.
13. (i) $(a+x) \tan^{-1} \sqrt{(x/a)} - \sqrt{(ax)}$.
(ii) $\sin a \log \sin (x-a) + (x-a) \cos a$
(iii) $a \tan \theta \sec \theta + a \log \tan (\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{2}\pi)$, $x = a \tanh^2 \theta$ **یہاں**.
(iv) $3x \tan^{-1} x - \frac{3}{8} \log (1+x^2)$.
-

5

جبری ناطق تفاعلوں (Algebraic Rational Functions) کا تکمل

3.3۔ اس باب میں ہم ناطق تفاعلوں $f(x)/\varphi(x)$ کے تکمل کے بارے میں پڑھیں گے جہاں $f(x)$ اور $\varphi(x)$ کثیررکنی (polynomial) ہیں۔ ان یجیے

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$\varphi(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

ہم یہ مان سکتے ہیں کہ شمار کنندہ (numerator) $f(x)$ کی ڈگری n ، نسب نما $\varphi(x)$ کی ڈگری m سے کم ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم اُس وقت تک شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کر سکتے ہیں جب تک ہمیں باقی (remainder) ایسا تفاعل نہ مل جائے جس کی ڈگری نسب نما کی ڈگری سے کم ہو۔ اس طرح ہمیں

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{\varphi(x)}$$

ملتا ہے جہاں $f(x)$ کو $\varphi(x)$ سے تقسیم کرنے پر $Q(x)$ خارج قسمت (quotient) اور $R(x)$ باقی ہے۔ $R(x)$ کی ڈگری $\varphi(x)$ کی ڈگری سے کم ہے۔ کثیررکنی (polynomial) ہونے کی وجہ سے $Q(x)$ کا تکمل بہ آسانی ممکن ہے۔

(term by term) ہو سکتا ہے۔

ہم اب دیکھیں گے کہ $R(x)/\varphi(x)$ کا تکمل کیسے کیا جاسکتا ہے، جب کہ $R(x)$ کی ڈگری $\varphi(x)$ کی ڈگری سے کم ہو۔

علم الجبرا سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر کثیر رکنی (polynomial) $\varphi(x)$ کو پہلی اور دوسری ڈگری کے فیکٹروں کے حاصل ضرب کی شکل میں رکھا جاسکتا ہے؛ اس لیے ہم لکھ سکتے ہیں۔

$$\varphi(x) = A (a_1x + b_1)^{p_1} (a_2x + b_2)^{p_2} \dots \times (A_1x^2 + 2B_1x + C_1)^{q_1} (A_2x^2 + 2B_2x + C_2)^{q_2}$$

یہاں $p_1, p_2, \dots, q_1, q_2, \dots$ مثبت کامل اعداد ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی فیکٹر کتنی بار آیا ہے۔ ساتھ ہی، ان میں سے کچھ یا سب نا کے برابر ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں نسب نما $\varphi(x)$ کے چار قسم کے فیکٹر حاصل ہوتے ہیں:-

- (i) ایک ہی بار آئے ہوئے خطی (Linear) فیکٹر
- (ii) کئی بار آئے ہوئے خطی (Linear repeated) فیکٹر
- (iii) ایک ہی بار آئے ہوئے دودرجی (Quadratic) فیکٹر
- (iv) کئی بار آئے ہوئے دودرجی فیکٹر

جزوی کسروں (partial fractions) کے علم سے ہم جانتے ہیں کہ $R(x)/\varphi(x)$ کو کئی اس طرح کی جزوی کسروں کے جوڑ کی طرح رکھا جاسکتا ہے کہ

(i) ایک ہی بار آئے ہوئے ہر خطی فیکٹر $(ax+b)$ سے مطابقت (corresponding)

ایک جزوی کسر

$$\frac{L}{ax+b}$$

(ii) کئی بار آئے ہوئے ہر خطی فیکٹر $(ax+b)^s$ سے مطابقت p کسروں کا جوڑ

$$\frac{L_1}{ax+b} + \frac{L_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{L_p}{(ax+b)^p}$$

کی طرح کا ہو۔

(iii) ایک ہی بار آئے ہوئے ہر دو درجی فیکٹر (جو کہ حقیقی (real) خطی فیکٹروں میں نہ توڑا جاسکے) $Ax^2 + 2Bx + C$ سے مطابقت ایک جزوی کسر

$$\frac{Lx + M}{Ax^2 + 2Bx + C}$$

کی طرح کی ہو۔

(iv) کئی بار آئے ہوئے ہر دو درجی فیکٹر $(Ax^2 + 2Bx + C)^q$ سے مطابقت q کسروں کا جوڑ

$$\frac{L_1x + M_1}{Ax^2 + 2Bx + C} + \frac{L_2x + M_2}{(Ax^2 + 2Bx + C)^2} + \dots + \frac{L_qx + M_q}{(Ax^2 + 2Bx + C)^q}$$

کی طرح کا ہو۔

اوپر آئے ہوئے مستقل L, M وغیرہ نکالنے کا طریقہ الجبرا کی ابتدائی کتابوں میں ملتا ہے جہاں جزوی کسروں کا ذکر کر دیا ہوتا ہے۔ لہذا کسی جبری ناطق تفاعل کے مکمل کے لیے ہمیں اس طرح کی کسروں کا تفاعل دیکھنا ہے:

$$(i) \frac{L}{ax + b},$$

$$(ii) \frac{L}{(ax + b)^r},$$

$$(iii) \frac{Lx + M}{Ax^2 + 2Bx + C},$$

$$(iv) \frac{Lx + M}{(Ax^2 + 2Bx + C)^r}$$

ہم ان پر ایک ایک کر کے غور کریں گے۔

$$\int \frac{L}{ax + b} dx = \frac{L}{a} \log(ax + b). \quad (i)$$

$$r \neq 1. \text{ جبکہ } \int \frac{L}{(ax + b)^r} dx = \frac{L}{a(1-r)} \cdot \frac{1}{(ax + b)^{r-1}}, \quad (ii)$$

(iii) اب $(Lx + M)/(Ax^2 + 2Bx + C)$ کے مکمل کے لیے ہم دو مستقل λ اور μ ایسے معلوم کرتے ہیں کہ

جبری ناطق تفاعلوں کا مکمل

$$(6) \dots \dots \dots Lx + M \equiv \lambda (2Ax + 2B) + \mu,$$

جہاں کہ λ کو ضرب کرنے والا حصہ $2Ax + 2B$ ، $Ax^2 + 2Bx + C$ کا تفرقی سر ہے۔
اب (1) سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} L &= 2A\lambda, \quad M = 2B\lambda + \mu. \\ \Rightarrow \quad \lambda &= \frac{L}{2A}, \quad \mu = \frac{AM - BL}{A}. \\ \therefore \int \frac{Lx + M}{Ax^2 + 2Bx + C} dx \\ &= \lambda \int \frac{2Ax + 2B}{Ax^2 + 2Bx + C} dx + \mu \int \frac{dx}{Ax^2 + 2Bx + C} \\ &= \lambda \log (Ax^2 + 2Bx + C) + \mu \int \frac{dx}{Ax^2 + 2Bx + C} \end{aligned}$$

پھر

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{Ax^2 + 2Bx + C} &= \frac{1}{A} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{2B}{A}x + \frac{C}{A}} \\ &= \frac{1}{A} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{B}{A}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{AC - B^2}}{A}\right)^2} \end{aligned}$$

یہاں $(AC - B^2)$ مثبت ہے ورنہ $Ax^2 + 2Bx + C = 0$ کے دو حقیقی ریشے (real roots) ہو جائیں اور $Ax^2 + 2Bx + C$ خطی فیکٹروں کا حاصل ضرب ہوتا۔

$$\therefore \int \frac{dx}{Ax^2 + 2Bx + C} = \frac{1}{\sqrt{AC - B^2}} \tan^{-1} \frac{Ax + B}{\sqrt{AC - B^2}}$$

اس طرح ہم نے

$$\frac{(Lx + M)}{(Ax^2 + 2Bx + C)}$$

مکمل کر لیا۔
نوٹ:

$1/(x^2 + a^2)$ کا مکمل $(1/a) \tan^{-1} (x/a)$ ہوتا ہے۔

(iv) اب

$$\frac{Lx+M}{(Ax^2+2Bx+C)^2}$$

کی طرح کی کسروں کے تکمیل کا طریقہ § 3.5 میں بتایا جائے گا۔

مشقیں

1. حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{dx}{3x-4}, \quad (ii) \int \frac{dx}{5-2x}, \quad (iii) \int \frac{2dx}{3-2x}$$

2. حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{dx}{(2x-3)^3}, \quad (ii) \int \frac{dx}{(5+3x)^3}, \quad (iii) \int \frac{dx}{(3-2x)^3}$$

3. حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{dx}{x^2+3x+4}, \quad (ii) \int \frac{(x+2)dx}{x^2+2x+3}, \quad (iii) \int \frac{(2x-3)dx}{3x^2+4x+5}$$

4. ثبات کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{(4x^2+3) dx}{8x^2+4x+5} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{1}{2}.$$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{3} \log (3x-4)$. (ii) $-\frac{1}{2} \log (5-2x)$. (iii) $-\log (3-2x)$.
2. (i) $-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(2x-3)^3}$. (ii) $-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5+3x}$. (iii) $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{(3-2x)^3}$.
3. (i) $\frac{2}{\sqrt{7}} \tan^{-1} \frac{2x+3}{\sqrt{7}}$
 (ii) $\frac{1}{2} \log (x^2+2x+3) + \sqrt{\frac{1}{2}} \tan^{-1} [(x+1)/\sqrt{2}]$.
 (iii) $\frac{1}{2} \log (3x^2+4x+5) - \frac{13}{3\sqrt{11}} \tan^{-1} \left(\frac{3x+2}{\sqrt{11}} \right)$

3.2۔ جبکہ صرف نسبت (denominator) میں ایک ہی بار آئے ہوں
خطی فیکٹر ہوں

مثال

حاصل کیجیے

$$\int \frac{x^2 + 5x + 41}{(x+3)(x-1)(2x-1)} dx.$$

ہم پاتے ہیں

$$\frac{x^2 + 5x + 41}{(x+3)(x-1)(2x-1)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{2x-1}.$$

$$\Rightarrow x^2 + 5x + 41 = A(x-1)(2x-1) + B(x+3)(2x-1) + C(x+3)(x-1).$$

اب x کی جگہ ترتیب وار -3 ، 1 اور $\frac{1}{2}$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$A = \frac{5}{4}, B = \frac{47}{4}, C = -25.$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{x^2 + 5x + 41}{(x+3)(x-1)(2x-1)} dx &= \frac{5}{4} \int \frac{dx}{x+3} + \frac{47}{4} \int \frac{dx}{x-1} - 25 \int \frac{dx}{2x-1} \\ &= \frac{5}{4} \log(x+3) + \frac{47}{4} \log(x-1) - \frac{25}{2} \log(2x-1). \end{aligned}$$

مشقیں

1۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{dx}{x^2-1},$$

$$(ii) \int \frac{x^2+1}{x^2-1} dx,$$

$$(iii) \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)},$$

$$(iv) \int \frac{(2x-3) dx}{(x^2-1)(2x+3)},$$

$$(v) \int \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx.$$

$$(vi) \int \frac{x^2 dx}{(x+1)(x-2)(x+3)},$$

$$\begin{aligned}
 (vii) \int \frac{x^2 dx}{(x+1)(x+2)(x+3)} & \quad (viii) \int \frac{x^3+3}{x^3-3x} dx, \\
 (ix) \int \frac{(x^2+1) dx}{(x^2-1)(x^2-4)} & \quad (x) \int \frac{x^5 dx}{x^3-2x^2-5x+6}, \\
 (xi) \int_2^3 \frac{(x^2+1)}{(2x+1)(x^2-1)} dx & \quad (xii) \int_0^1 \frac{dx}{x^2+2x \cos \alpha + 1}, \\
 & \quad (0 \leq \alpha < \pi)
 \end{aligned}$$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{2} \log [(x-1)/(x+1)]$. (ii) $x + \log [(x-1)/(x+1)]$.
- (iii) $\frac{1}{2} \log [(x+1)(x+3)/(x+2)^2]$.
- (iv) $\frac{5}{2} \log (x+1) - \frac{1}{2} \log (x-1) - \frac{1}{2} \log (2x+3)$
- (v) $x + 12 \log [(x+2)^3/(x+1)(x+3)^5]$.
- (vi) $\frac{9}{8} \log (x+3) + \frac{4}{8} \log (x-2) - \frac{1}{8} \log (1+x)$.
- (vii) $\frac{1}{2} \log (x+1) - 4 \log (x+2) + \frac{9}{2} \log (x+3)$.
- (viii) $x - \log x + \frac{1}{2} (1+\sqrt{3}) \log (x-\sqrt{3}) + \frac{1}{2} (1-\sqrt{3}) \log (x+\sqrt{3})$.
- (ix) $\frac{5}{8} \log [(x-2)/(x+2)] - \frac{1}{4} \log [(x-1)/(x+1)]$.
- (x) $\frac{1}{3} x^3 + x^2 + 9x - \frac{1}{3} \log (x-1) - \frac{2}{3} \log (x+2) + \frac{24}{3} \log (x-3)$.
- (xi) $-\log 3 - \frac{5}{6} \log \frac{7}{6} + \frac{7}{6} \log 2$.
- (xii) $\alpha/2 \sin \alpha$, if $\alpha \neq 0$; $\frac{1}{2}$ if $\alpha = 0$.

3.3- جبکہ صرف نسب نما میں ایک ہی بار یا کئی بار آئے ہوئے

خطی فیکٹر ہوں

مثال

حاصل کیجیے :

$$\int \frac{1}{x^3(x-1)^2(x+1)} dx.$$

ہم مان لیتے ہیں کہ

$$\frac{1}{x^3(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-1} + \frac{E}{(x-1)^2} + \frac{F}{x+1}.$$

جبری ناطق تفاعلوں کا مکمل

$$\therefore 1 \equiv Ax^2(x-1)^2(x+1) + Bx(x-1)^2(x+1) + C(x-1)^2(x+1) + Dx^3(x-1)(x+1) + Ex^3(x+1) + Fx^3(x-1)^2$$

اب x کی جگہ 0 اور -1 رکھنے پر ملتا ہے

$$C = 1, E = \frac{1}{2}, F = -\frac{1}{4}.$$

اب A, B اور D پانے کے لیے ہم (i) کے دونوں جانب کے x^1, x^3 اور x^5 کے ضربیوں کی برابری کرنے پر پاتے ہیں

$$0 = A + D + F, \quad 0 = -A + B + E - 2F, \quad 0 = -A - B + C - D + E + F$$

ان مساوات کو حل کر کے ہم پاتے ہیں

$$A = 2, \quad B = 1, \quad D = -\frac{7}{4},$$

$$\therefore \int \frac{1}{x^3(x-1)^2(x+1)} dx = 2 \log x - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{7}{4} \log(x-1) - \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{4} \log(x+1)$$

مشقیں

1۔ ذیل تفاعلوں کا مکمل کیجیے:-

(i) $\frac{x^2+x+1}{(x+1)^2(x+2)},$	(ii) $\frac{x+1}{(x-1)^2(x+2)^2},$
(iii) $\frac{x^2+1}{(x+2)^2(x-1)},$	(iv) $\frac{x^3+2}{(x-1)(x-2)^3},$
(v) $\frac{x^3-4x^2+5x-2}{x^3+4x^2+5x+2},$	(vi) $\frac{(1+x)^3}{(1-x)^3},$
(vii) $\frac{57x^3-25x^2+9x-1}{(x-1)^2(2x-1)(5x-1)},$	

2۔ ذیل معین تکملے حاصل کیجیے:-

(i) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)^2},$	(ii) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)^3(2+x)}$

جوابات

1. (i) $-\frac{1}{x+1} + \log \frac{(x+2)^3}{(x+1)^2}$.
- (iii) $\frac{1}{27} \log \frac{x+2}{x-1} - \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{x+2}$.
- (ii) $\frac{2}{27} \log \frac{x-1}{x+2} - \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{x+2} + \frac{5}{6} \frac{1}{(x+2)^2}$.
- (iv) $4 \log (x-2) - 3 \log (x-1) - \frac{2}{x-2} - \frac{5}{(x-2)^2}$.
- (v) $x + 12(x+1)^{-1} + 28 \log (x+1) - 36 \log (x+2)$.
- (vi) $-x - 12(1-x)^{-1} + 4(1-x)^{-2} - 6 \log (1-x)$.
- (vii) $-10(x-1)^{-1} + 35/6 \log (2x-1) - 2/15 \log (5x-1)$.
2. (i) $1/12 \log (27e^4)$. (ii) $\frac{1}{2} \log (4/e)$.

3.4 - جبکہ صرف نسب نما میں خطی فیکٹر یا ایک ہی بار آئے ہوئے

دو درجہ فیکٹر ہوں
مثال

حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x^2+4)}$$

ہم مان لیتے ہیں کہ

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4}$$

$$(i) \dots \Rightarrow 1 \equiv A(x-1)(x^2+4) + B(x^2+4) + (Cx+D)(x-1)^2$$

اب $x=1$ رکھنے پر ملتا ہے

$$B = \frac{1}{5}$$

اب A , C اور D معلوم کرنے کے لیے ہم x^2 , x^3 اور x کے ضربیوں کی

جبری ناطق تفاضل کا مکمل

برابری کرنے پر پاتے ہیں

$$0 = A + C, \quad 0 = -A + B + D - 2C, \quad 0 = 4A + C - 2D.$$

ان مساواتوں کو حل کرنے پر ملتا ہے۔

$$C = -\frac{2}{25}, \quad A = -\frac{2}{25}, \quad D = -\frac{3}{25}.$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{1}{(x-1)^2(x^2+4)} dx \\ = -\frac{2}{25} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{5} \int \frac{dx}{(x-1)^2} + \frac{1}{25} \int \frac{2x-3}{x^2+4} dx \\ = -\frac{2}{25} \log(x-1) - \frac{1}{5(x-1)} + \frac{1}{25} \log(x^2+4) - \frac{3}{50} \tan^{-1} \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

نوٹ: یہ نوٹ کیجیے کہ نسب نما کے دو درجی فیکٹر x^2+4 کے ریشے $2i$ اور $-2i$ ہیں۔ اب (1) میں $x=2i$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} 1 &= (2iC + D)(2i-1)^2 \\ &= (2iC + D)(-3-4i) \\ &= (8C-3D) + i(-6C-4D) \end{aligned}$$

دونوں طرف حقیقی (real) اور خیالی (imaginary) حصوں کی برابری کرنے پر ملتا ہے

$$8C-3D=1, \quad -6C-4D=0$$

جس سے کہ

$$C = \frac{2}{25}, \quad D = -\frac{3}{25}$$

x کی جگہ دو درجی فیکٹروں کے خیالی ریشے (roots) رکھنے کا یہ طریقہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مشقیں

1. حاصل کیجیے

(i) $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx,$	(ii) $\int \frac{x^4}{(x^2-1)(x^2+4)} dx,$
(iii) $\int \frac{x}{1+x^3} dx,$	(iv) $\int \frac{x^6}{(x^2+1)(x-4)} dx,$
(v) $\int \frac{x^2+1}{x^3+1} dx,$	(vi) $\int \frac{x^2+6x-25}{(x^2+4x)^2-25} dx,$
(vii) $\int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)}$	(viii) $\int \frac{dx}{1-x^6}$
(ix) $\int \frac{(x+a)dx}{x^2(x-a)(x^2+a^2)}$	(x) $\int \frac{x dx}{(x+1)^3(x^2+1)}$
(xi) $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x^2+4)}$	(xii) $\int \frac{x dx}{x^3+x^2+x+1}$
(xiii) $\int \frac{x^3 dx}{x^4+3x^2+2}$	

2. ذیل معین تکلی حاصل کیجیے

(i) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)}$	(ii) $\int_0^2 \frac{4-x}{x(x^2-2x+2)} dx.$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \log(x^2+1).$
- (ii) $x + \frac{1}{10} \log[(x-1)/(x+1)] - \frac{2}{5} \tan^{-1}(x/2).$
- (iii) $\frac{1}{6} \log(x^2-x+1) - \frac{1}{3} \log(x+1) + \sqrt{\frac{1}{3}} \tan^{-1}[(2x-1)/\sqrt{3}].$
- (iv) $\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 15x + \frac{10}{3} \log(x-4) + \frac{2}{3} \log(x^2+1) + \frac{1}{3} \tan^{-1} x.$
- (v) $\frac{2}{3} \log(x+1) + \frac{1}{6} \log(x^2-x+1) + \sqrt{\frac{1}{3}} \tan^{-1}[(2x-1)/\sqrt{3}].$
- (vi) $\frac{1}{2} \log(x+5) - \frac{2}{15} \log(x-1) - \frac{1}{10} \log(x^2+4x+5) + \frac{1}{5} \tan^{-1}(x+2).$
- (vii) $\frac{1}{3} \log(x+1) - \frac{1}{3} \log(x^2+1) - \frac{1}{2}(x+1)^2.$
- (viii) $\frac{1}{6} \log \frac{x+1}{1-x} + \frac{1}{12} \log \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$
 $+ \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\tan^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \tan^{-1} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right)$

$$(ix) \frac{1}{a^2} \log \frac{(x-a)\sqrt{(x^2+a^2)}}{x^2} \div \frac{1}{a^2 x}.$$

$$(x) \frac{1}{2} \log (x+1) - \frac{1}{2} \log (x^2+1) + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + \frac{1}{2} (x+1)^{-2}$$

$$(xi) \frac{1}{8} (x-1)^{-1} + \frac{1}{8} \log (x-2) - \frac{9}{8} \log (x-1) - \frac{1}{8} \log (x^2+4) + \frac{7}{8} \tan^{-1} (\frac{1}{2}x).$$

$$(xii) \frac{1}{2} \log \frac{\sqrt{(x^2+1)}}{x+1} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x.$$

$$(xiii) \log (x^2+2) - \frac{1}{2} \log (x^2+1).$$

$$2. (i) \frac{1}{2}.$$

$$(ii) \frac{1}{2}\pi + \log 2.$$

3.41 - جبکہ کالمیہ میں x کی صرف جفت قوتیں (even powers) ہوں

مثال

مکمل کیجیے

$$\frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^2+3)(x^2+4)}$$

ہم نوٹ کرتے ہیں کہ دی ہوئی کسر x^2 کا تفاعل ہے۔ اس وجہ سے اس کی جزوی کسریں $x^2=y$ رکھ کر زیادہ آسانی سے نکل سکتی ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$\frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^2+3)(x^2+4)} = \frac{(y+1)(y+2)}{(y+3)(y+4)}$$

$$= 1 + \frac{(y+1)(y+2)}{(y+3)(y+4)} - 1$$

$$= 1 + \frac{(y+1)(y+2) - (y+3)(y+4)}{(y+3)(y+4)}$$

مان لیجیے کہ

$$\frac{(y+1)(y+2) - (y+3)(y+4)}{(y+3)(y+4)} = \frac{A}{y+3} + \frac{B}{y+4}.$$

$$\Rightarrow (y+1)(y+2) - (y+3)(y+4) = A(y+4) + B(y+3).$$

دونوں جانب $y = -4$ اور $y = -3$ رکھنے پر ملتا ہے

$$A = 2, B = -6.$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^2+3)(x^2+4)} &= 1 + \frac{2}{x^2+3} - \frac{6}{x^2+4} \\ &= 1 + \frac{2}{x^2+3} - \frac{6}{x^2+4} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int \frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^2+3)(x^2+4)} dx = x + \frac{x}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{3}} - 3 \tan^{-1} \frac{x}{2}.$$

مشقیں

1. ذیل تکلی حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx, \quad (ii) \int \frac{x^2}{x^4+x^2-2} dx.$$

2. حاصل کیجیے

$$\int \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta} d\theta$$

جوابات

$$1. (i) \frac{1}{(a^2-b^2)} \left[a \tan^{-1} \frac{x}{a} - b \tan^{-1} \frac{x}{b} \right]$$

$$(ii) \frac{1}{6} \log [(x-1)/(x+1)] + (\sqrt{2}/3) \tan^{-1} (x/\sqrt{2}).$$

$$2. -\frac{1}{3} \tan^{-1} (\tan \theta) - \frac{2}{3} \tan^{-1} (2 \tan \theta).$$

3.5- تفاعل

$$\frac{Lx+M}{(Ax^2+2Bx+C)^n}$$

تاکمیل کرنا جبکہ n ایک سے بڑا کوئی مثبت کامل عدد ہو۔

$$\int \frac{(Lx+M) dx}{(Ax^2+2Bx+C)^n},$$

تکملہ

جبری ناطق تفاعلوں کا تکمیل

حاصل کرنے کے لیے ہم دو مستقل λ اور μ ایسے معلوم کرتے ہیں کہ

[دیکھیے § 3.1]

$$Lx + M = \lambda(2Ax + 2B) + \mu,$$

جہاں کہ λ کا ضرب $2Ax + 2Bx$ دو درجی $Ax^2 + 2Bx + C$ کا تفرقی سر ہے۔
اس طرح ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} & \int \frac{Lx + M}{(Ax^2 + 2Bx + C)^n} dx \\ &= \lambda \int \frac{2Ax + 2B}{(Ax^2 + 2Bx + C)^n} dx + \mu \int \frac{dx}{(Ax^2 + 2Bx + C)^n} \\ &= \frac{\lambda}{(1-n)} \frac{1}{(Ax^2 + 2Bx + C)^{n-1}} + \mu \int \frac{dx}{(Ax^2 + 2Bx + C)^n}. \end{aligned}$$

اب تکملہ

$$\int \frac{dx}{(Ax^2 + 2Bx + C)^n}$$

حاصل کرنے کے لیے ہم ایک تخیلی فارمولا حاصل کرتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} Ax^2 + 2Bx + C &= A \left[\left(x + \frac{B}{A} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{AC - B^2}}{A} \right)^2 \right] \\ &= A \left[\left(x + \frac{B}{A} \right)^2 + k^2 \right], \end{aligned}$$

جہاں آسانی کے لیے ہم نے

$$k = \sqrt{AC - B^2}/A$$

لکھ دیا ہے۔

ساتھ ہی $y = x + (B/A)$ رکھنے پر ملتا ہے

$$\int \frac{dx}{(Ax^2 + 2Bx + C)^n} = \frac{1}{A^n} \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n}$$

اب تکملہ

$$\int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n}$$

ایک تخیلی فارمولے کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جسے کہ اگلے باب (section) میں حاصل کریں گے۔

3-51 - سیکملہ

$$\int \frac{1}{(y^2 + k^2)^n} dy.$$

کے لیے تخیلی فارمولا

درکار تخیلی فارمولا حاصل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$\int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n} = \int 1 \cdot \frac{1}{(y^2 + k^2)^n} dy,$$

اور حصے سے سیکمل کا اصول استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n} &= \frac{y}{(y^2 + k^2)^n} - \int y \cdot (-n)(y^2 + k^2)^{-n-1} \cdot 2y dy \\ &= \frac{y}{(y^2 + k^2)^n} + 2n \int \frac{y}{(y^2 + k^2)^{n+1}} dy \\ &= \frac{y}{(y^2 + k^2)^n} + 2n \int \frac{y^2 + k^2 - k^2}{(y^2 + k^2)^{n+1}} dy \\ &= \frac{y}{(y^2 + k^2)^n} + 2n \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n} - 2nk^2 \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^{n+1}} \\ \therefore 2nk^2 \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^{n+1}} &= \frac{y}{(y^2 + k^2)^n} + (2n-1) \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n} \\ \Rightarrow \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^{n+1}} &= \frac{y}{2nk^2 (y^2 + k^2)^n} + \frac{2n-1}{2nk^2} \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n}, \end{aligned}$$

اب n کی جگہ $(n-1)$ رکھنے پر ملتا ہے

$$\int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^n} = \frac{y}{2(n-1)k^2 (y^2 + k^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)k^2} \int \frac{dy}{(y^2 + k^2)^{n-1}}$$

جو کہ درکار تخیلی فارمولا ہے، اس کی مدد سے، متواتر تخیل سے، ہم دیا ہوا سیکملہ حاصل کر سکتے ہیں۔

جبری ناطق تفاعلون نکائیں

مثالیں

1- حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^4}$$

ادپر کے تجزیلی فارمولے میں k کی جگہ 1 اور r کی جگہ x لکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{x}{2(n-1)(x^2+1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} \int \frac{dx}{(x^2+1)^{n-1}}$$

اب n کی جگہ ترتیب وار 4, 3 اور 2 لکھنے پر ملتا ہے

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^4} = \frac{x}{6(x^2+1)^3} + \frac{5}{6} \int \frac{dx}{(x^2+1)^3},$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^3} = \frac{x}{4(x^2+1)^2} + \frac{3}{4} \int \frac{dx}{(x^2+1)^2},$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x.$$

ان سے ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^4} = \frac{x}{6(x^2+1)^3} + \frac{5x}{24(x^2+1)^2} + \frac{5x}{16(x^2+1)} + \frac{5}{16} \tan^{-1} x.$$

2- حاصل کیجیے

$$\int \frac{x(2x^2-x+5)}{(x^2+2x+2)^2} dx.$$

یہاں نسب نما میں ایک دو درجی فیکٹر دوبار آیا ہے۔

ان لیجیے

$$\frac{x(2x^2-x+5)}{(x^2+2x+2)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+2x+2} + \frac{Cx+D}{(x^2+2x+2)^2}.$$

$$\Rightarrow x(2x^2-x+5) = (Ax+B)(x^2+2x+2) + Cx+D.$$

دونوں جانب کے x^3 اور x کے ضربیوں اور مستقل جڑوں کی برابری کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$2 = A, -1 = 2A+B, 5 = 2A+2B+C, 0 = 2B+D.$$

ان مساواتوں کو حل کرنے پر ملتا ہے

$$A = 2, B = -5, C = 11, D = 10.$$

$$\therefore \frac{x(2x^2-x+5)}{(x^2+2x+2)^3} = \frac{2x-5}{x^2+2x+2} + \frac{11x+10}{(x^2+2x+2)^3}.$$

اب

$$\frac{2x-5}{x^2+2x+2} = \frac{2x+2-7}{x^2+2x+2} = \frac{2x+2}{x^2+2x+2} - \frac{7}{(x+1)^2+1}$$

$$\therefore \int \frac{2x-5}{x^2+2x+2} dx = \log(x^2+2x+2) - 7 \tan^{-1}(x+1).$$

اب دوسرے حصے $(11x+18)/(x^2+2x+2)^3$ کے تکمل کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$11x+10 = \frac{1}{2} (2x+2) - 1$$

اوپر پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{11x+10}{(x^2+2x+2)^3} dx &= \frac{11}{2} \int \frac{2x+2}{(x^2+2x+2)^3} dx - \int \frac{dx}{[(x+1)^2+1]^3} \\ &= -\frac{11}{2} \frac{1}{(x^2+2x+2)} - \int \frac{dx}{[(x+1)^2+1]^3}. \end{aligned}$$

$$y = x+1. \quad \int \frac{dx}{[(x+1)^2+1]^3} = \int \frac{dy}{(y^2+1)^3}$$

اس کے بعد § 3.51 کے تحویلی فارمولے میں n کی جگہ پر 2 اور k کی جگہ 1 رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{(y^2+1)^3} &= \frac{y}{2(y^2+1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dy}{y^2+1} = \frac{y}{2(y^2+1)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} y \\ &= \frac{x+1}{2(x^2+2x+2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1}(x+1). \end{aligned}$$

$$\therefore \int \frac{x(2x^2 - x + 5)}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx = \log(x^2 + 2x + 2) - \frac{15}{2} \tan^{-1}(x+1) - \frac{11}{2(x^2 + 2x + 2)} - \frac{x+1}{2(x^2 + 2x + 2)}.$$

نوٹ: مکمل

$$\int \frac{dy}{(y^2 + 1)^2}$$

کو عوضی مکمل کے طریقے سے $y = \tan \theta$ رکھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں اس وقت
تحویلی فارمولے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{(y^2 + 1)^2} &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^4 \theta} = \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} (\theta + \sin \theta \cos \theta), \\ &= \frac{1}{2} \left[\tan^{-1} y + \frac{y}{y^2 + 1} \right] \end{aligned}$$

جو کہ وہی نتیجہ ہے جو تحویلی فارمولے کی مدد سے حاصل کیا گیا تھا

مشقیں

I۔ ذیل تکملے حاصل کیجیے

(i) $\int \frac{2x-3}{(x^2+x+1)^2} dx,$	(ii) $\int \frac{x+2}{(x+1)(x^2+1)^2} dx,$
(iii) $\int \frac{x^3-x^2-1}{(x^2+1)^2(x^2-1)} dx,$	(iv) $\int \frac{x^2+1}{(x^2-1)(x^2+2)^2} dx,$
(v) $\int \frac{x(2x^2-x+5)}{(x^2+2x+2)^2} dx$	
(vi) $\int \frac{x^2-21}{(x^2-2x+6)^2} dx,$	(vii) $\int \frac{x^2-2}{(x^2+2)^2} dx.$
(viii) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2(x^2+2)^2} dx.$	

2- حاصل کیجیے

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{2n-3}{2n-2} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^{n-1}}$$

ثبات کیجیے

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^3} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8}$$

جوابات

- (i) $-\frac{1}{x^2+x+1} - \frac{16}{3\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} - \frac{4}{3} \cdot \frac{2x+1}{x^2+x+1}$
(ii) $\frac{1+3x}{4(1+x^2)} + \tan^{-1} x + \frac{1}{8} \log \frac{(x+1)^2}{x^2+1}$
(iii) $-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + \frac{1}{8} \log \frac{(x+1)^3}{(x^2+1)(x-1)}$
(iv) $\frac{1}{12} \cdot \frac{x}{2+x^2} - \frac{5\sqrt{2}}{72} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{1}{9} \log \frac{x-1}{x+1}$
(v) $-\frac{11x-11}{40(x^2-2x+6)} - \frac{5(x-1)+2}{4(x^2-2x+6)^2} - \frac{11\sqrt{5}}{200} \tan^{-1} \frac{x-1}{\sqrt{5}}$
(vi) $-\frac{x}{8(x^2+2)} - \frac{x}{2(x^2+2)^2} - \frac{\sqrt{2}}{16} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{2}}$
(vii) $(10-7\sqrt{2})\pi/4$

3.6- عوضی تکمل کے طریقے سے جبری ناطق تفاعلوں کا تکمل
متغیر بدل کر مناسب نئے متغیر کے ذریعے عوضی تکمل سے بھی اکثر جبری ناطق
تفاعلوں کا تکمل آسانی سے ہو جاتا ہے۔

مثالیں

1- حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)^3}$$

یہاں نسب نما میں کئی بار آیا ہوا درجی فیکٹر ہے۔

جبری ناطق تفاضلوں کا مکمل

رکھنے پر ہم پاتے ہیں $y = x^2 + 1$

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)^3} = \int \frac{dy}{2y^3(y-1)}$$

اس نے 'تکاملیہ میں نسب نما میں محضی فیکٹر ہیں۔
مان لیجیے

$$\frac{1}{y^3(y-1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y^2} + \frac{C}{y^3} + \frac{D}{y-1}.$$

$$\Rightarrow 1 = Ay^3(y-1) + By^2(y-1) + Cy(y-1) + Dy^3.$$

اب $y = 0$ اور $y = 1$ رکھنے پر ملتا ہے

$$C = -1, D = 1.$$

پھر y^3 اور y^2 کے ضریبوں کی برابری پر ملتا ہے

$$0 = A + D$$

$$0 = -A + B,$$

$$\Rightarrow A = -1, B = -1.$$

$$\therefore \int \frac{1}{y^3(y-1)} dy = -\log y + \frac{1}{y} + \frac{1}{2y^2} + \log(y-1),$$

$$y = x^2 + 1. \text{ جہاں}$$

بقیہ عمل بہ آسانی پورا ہو سکتا ہے۔

نوٹ - یہ بہ آسانی دیکھا جاسکتا ہے کہ متغیر تبدیل کرنے پر ملے ہوئے تکاملیہ کو جزوی کسروں میں توڑنا کہیں آسان ہے بہ نسبت اصل تکاملیہ کو جزوی کسروں میں توڑنے کے۔

2۔ حاصل کیجیے

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2}$$

رکھنے پر ہم پاتے ہیں $x = \tan \theta$

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \int \cos^2 \theta d\theta$$

$$\frac{1}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) = \frac{1}{2} (\theta + \sin \theta \cos \theta)$$

جب x صفر سے ∞ تک جاتا ہے تو θ صفر سے $\pi/2$ تک جاتا ہے اس لیے θ کی انتہائیں 0 اور $\pi/2$ ہیں۔

$$\therefore \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{1}{2} \left| \theta + \sin \theta \cos \theta \right|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

3۔ حاصل کیجیے

$$\int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx.$$

ہم لکھتے ہیں

$$\frac{1+x^2}{1+x^4} = \frac{1/x^2+1}{1/x^2+x^2} = \frac{1+1/x^2}{(x-1/x)^2+2}$$

$$y = x - \frac{1}{x} \quad \text{اب}$$

$$\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx = dy$$

$$\therefore \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{dy}{y^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{y}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{x-1/x}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}.$$

4۔ حاصل کیجیے

$$\int \frac{x^2-1}{1+x^2} dx.$$

اب

$$\int \frac{x^2-1}{1+x^4} dx = \int \frac{1-1/x^2}{1/x^2+x^2} dx$$

$$= \int \frac{(1-1/x^2)}{(x+1/x)^2+2} dx.$$

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx = dy \quad \text{پر رکھنے پر} \quad y = x + \frac{1}{x} \quad \text{اب}$$

جبری مناطق تفاعلوں کا مکمل

اس لیے مکملہ

$$= \int \frac{dy}{y^2 - 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \left(\frac{1}{y - \sqrt{2}} - \frac{1}{y + \sqrt{2}} \right) dy$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} \log \frac{y - \sqrt{2}}{y + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \log \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1}$$

مشقیں

1۔ ذیل تفاعلوں کے تکمیل سکائیے :

(i) $\frac{x}{x^4 + x^2 + 1}$;

(ii) $\frac{2}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)}$,

(iii) $\frac{x^3}{(x^2 + 1)^4}$,

(iv) $\frac{1}{x(x^2 + 1)(x^2 + 2)^3}$,

(v) $\frac{1}{x(x^6 + 1)}$,

(vi) $\frac{1}{x(x^4 - 1)^3}$.

(vii) $\frac{1}{x(1 + x^n)}$.

2۔ حاصل کیجیے

(i) $\int \frac{dx}{x^4 + 1}$,

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{x^3}{1 + x^4} dx$,

(iii) $\int \frac{x^3 + 1}{x^4 + x^2 + 1} dx$,

(iv) $\int \frac{dx}{x^4 + x^2 + 1}$,

(v) $\int \frac{x^3 + 3x + 1}{x^4 - x^2 + 1} dx$,

(vi) $\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \sqrt{\tan x} dx$,

(vii) $\int \sqrt{\cot x} dx$.

3۔ تکملہ

$$\int \frac{x^3}{(x^2 + 1)^3} dx$$

نکالنے پہلے (a) $x = \tan \theta$ لے کر اور پھر (b) $u = x^2 + 1$ رکھتے ہوئے اور یہ دکھائیے کہ دونوں طریقوں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔

جوابات

1. (i) $\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$ (ii) $\frac{1}{2} \log \frac{x^2+1}{x^2+3}$
- (iii) $\frac{3x^2+1}{12(x^2+1)^3}$ (iv) $\frac{1}{8} \log \frac{x^2(x^2+2)^3}{(x^2+1)^4} - \frac{1}{4(x^2+2)}$
- (v) $\frac{1}{5} \log \frac{x^5}{x^5+1}$ (vi) $\frac{1}{4} \log \frac{x^4}{x^4-1} - \frac{1}{4(x^4-1)}$
- (vii) $\frac{1}{n} \log \frac{x^n}{1+x^n}$
2. (i) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}$
- (ii) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (iii) $\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{x^2-1}{\sqrt{3}x}$
- (iv) $\frac{1}{2\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{x^2-1}{\sqrt{3}x} - \frac{1}{4} \log \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$
- (v) $\tan^{-1} \frac{x^2-1}{x} + \sqrt{3} \tan^{-1} \frac{2x^2-1}{\sqrt{3}}$
- (vi) $\frac{1}{2}\sqrt{2} \log (\sqrt{2}-1) + \frac{1}{2}\sqrt{2}\pi$
- (vii) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \log \frac{t^2+\sqrt{2}t+1}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{t^2-1}{\sqrt{2}t} \quad t=\sqrt{\cot x}$ جہاں

e^x -3.7 کے جبری ناطق تفاعلوں کا مکمل
 متغیر کی تبدیلی $u = e^x$ کر دینے پر e^x کے کسی جبری ناطق تفاعل کا مکمل بہ آسانی
 کے جبری ناطق تفاعل کے مکمل میں بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ ذیل کی مثالوں سے سمجھایا
 گیا ہے۔

مثالیں

1۔ حاصل کیجیے

$$\int \frac{4e^x + 6e^{-x}}{9e^x - 4e^{-x}} dx.$$

یہاں $u = e^x$ رکھنے پر

$$e^x dx = du.$$

$$\begin{aligned}
\therefore \int \frac{4e^x + 6e^{-x}}{9e^x - 4e^{-x}} dx &= \int \frac{4t + 6/t}{9t - 4/t} \cdot \frac{dt}{t} \\
&= \int \frac{4t^2 + 6}{t(9t^2 - 4)} dt \\
&= -\frac{3}{2} \int \frac{dt}{t} + \frac{35}{12} \int \frac{dt}{3t-2} + \frac{35}{12} \int \frac{dt}{3t+2} \\
&= -\frac{3}{2} \log t + \frac{35}{36} \log (3t-2) + \frac{35}{36} \log (3t+2) \\
&= -\frac{3}{2} \log t + \frac{35}{36} \log (9t^2 - 4) \\
&= -\frac{3}{2} x + \frac{35}{36} \log (9e^{2x} - 4).
\end{aligned}$$

2- حاصل کیجئے

$$\int_0^{\infty} \operatorname{sech} x \, dx.$$

اب

$$\begin{aligned}
\int \operatorname{sech} x \, dx &= \int \frac{2}{e^x + e^{-x}} dx \\
&= \int \frac{2e^x}{1 + e^{2x}} dx.
\end{aligned}$$

یہاں $y = e^x$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}
\int \operatorname{sech} x \, dx &= \int \frac{2dy}{1+y^2} = 2 \tan^{-1} y = 2 \tan^{-1} e^x \\
\therefore \int_0^{\infty} \operatorname{sech} x \, dx &= \left[2 \tan^{-1} (e^x) \right]_0^{\infty} = 2 \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right] = \frac{\pi}{2} \\
\lim_{x \rightarrow \infty} (\tan^{-1} e^x) &= \frac{\pi}{2} \quad \text{کیوں کہ}
\end{aligned}$$

مشقیں

1- حاصل کیجئے

(i) $\int \frac{dx}{e^x + e^{2x}},$	(ii) $\int \frac{dx}{(e^x - 1)^2},$
(iii) $\int \frac{dx}{(1 + e^x)(1 + e^{-x})},$	(iv) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{(e^x - 1)^2} dx,$
(v) $\int_1^{\infty} \operatorname{cosech} x \, dx,$	(vi) $\int \frac{dx}{1 + \cosh x}.$

جوابات

1. (i) $\log(1+e^{-x}) - e^{-x}$. (ii) $(1-e^x)^{-1} - \log(1-e^{-x})$.
 (iii) $-\frac{1}{1+e^x}$. (iv) $2 \log \frac{e-1}{e} + \frac{2e-1}{e^2-e}$.
 (v) $\log[(e+1)/(e-1)]$. (vi) $\tanh \frac{1}{2}x$.

باب 3 پر مشقیں
 ذیل تفاعلوں کا مکمل کیجیے

- (i) $\frac{2x^3+7x^2+4x+2}{2x+3}$ (ii) $\frac{3x^3-4x^2+5x-6}{x^2+x-6}$, -1
 (iii) $\frac{x^2-3x+3}{x^3-4x^2-7x+10}$, (iv) $\frac{17x^2-x-26}{(x^2-1)(x^2-4)}$
 (i) $\frac{3x^2-5x+4}{x^3-2x^2+3x+6}$, (ii) $\frac{1}{(2+x^2)(1-x^2)}$, -2
 (iii) $\frac{x^2-3x}{x^3-1}$, (iv) $\frac{2x^2-x+3}{x^3+1}$
 (i) $\frac{x^3+1}{x^3-3x^2+3x-x}$, (ii) $\frac{(x^2+1)(x^2+2)(x^2+3)}{(x^2+4)(x^2+5)(x^2+6)}$, -3
 (iii) $\frac{1}{x^6+1}$, (iv) $\frac{3x^2+x-2}{(x+1)^2(x^2+1)}$
 (i) $\frac{x^6}{x^3-1}$, (ii) $\frac{1}{x(x^2+a^2)^2}$, -4
 (iii) $\frac{1}{x^{12}(x^3-1)}$, (iv) $\frac{1}{(x-1)^2(x^3+1)}$
 (i) $\frac{1}{x(x-1)^2(x^3+1)}$, (ii) $\frac{x^2+2}{(x^2+1)^2}$, -5
 (iii) $\frac{2x+1}{(x^2+1)^2}$, (iv) $\frac{2x}{(1+x)(1+x^2)^2}$
 (v) $\frac{1}{(x^2-a^2)(x^2+a^2)^2}$, (vi) $\frac{3x+4}{(2x^2-x+2)^2}$.

6 - حاصل کیجیے

$$\int_0^1 \frac{24t^2}{(1+t^2)^4} dt.$$

7 - ثابت کیجیے کہ

$$\int_1^\infty \frac{(x^2+3) dx}{x^3(x^2+1)} = \frac{1}{30} (58-15\pi)$$

8. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)(x^2+c^2)} = \frac{\pi}{2(a+b)(b+c)(c+a)}$$

9. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{1-x^2}{1+x^2+x^4} dx = \frac{1}{2} \log 3.$$

10. مکمل کیجیے

- (i) $\frac{\log(x^2+a^2)}{x^2}$ (ii) $x \log(x^3+1)$ (iii) $\frac{\log(1+x^2+x^4)}{x^2}$
 (iv) $\frac{\log(1+x+x^2)}{(1+x)^2}$ (v) $e^x \log(e^{2x}+5e^x+6)$ (vi) $\frac{\tan^{-1} x}{(1+x)^2}$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{3}(x^3+3x^2-3x)+\frac{5}{3}\log(2x+3).$
 (ii) $\frac{1}{2}(3x^2-14x)+\frac{1}{2}\log(x+3)+\frac{1}{2}\log(x-2).$
 (iii) $\frac{1}{3}\log(x+2)+\frac{1}{3}\log(x-5)-\frac{1}{3}\log(x-1).$
 (iv) $\frac{1}{3}\log[(x-1)^5(x-2)^{10}/(x+1)^4(x+2)^{11}].$
2. (i) $\frac{2}{3}\log(x+1)+\frac{2}{3}\log(x^2-3x+6)-(1/\sqrt{15})\tan^{-1}[(2x-3)/\sqrt{15}].$
 (ii) $(1/3\sqrt{2})\tan^{-1}(x/\sqrt{2})+\frac{1}{3}[\log(1+x)-\log(1-x)].$
 (iii) $\frac{1}{2}\tan^{-1}x+\frac{1}{2}\log(x^2+1)-\frac{1}{2}\log(x-1)-\log(x+1).$
 (iv) $2\log(x+1)+(2/\sqrt{3})\tan^{-1}[(2x-1)/\sqrt{3}].$
3. (i) $\log(x-1)^2-\log x-x/(x-1)^2.$
 (ii) $x-\frac{3}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}+\frac{24}{\sqrt{5}}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{5}}-\frac{30}{\sqrt{6}}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{6}}.$
 (iii) $\frac{1}{3}\tan^{-1}x-\frac{1}{4\sqrt{3}}\log\frac{x^2-\sqrt{3}x+1}{x^2+\sqrt{3}x+1}+\frac{1}{6}\tan^{-1}\frac{x^2-1}{x}.$
 (iv) $\frac{1}{2}\log\frac{x^2+1}{(x+1)^2}+\frac{3}{2}\tan^{-1}x+\frac{5}{2(x+1)}.$
4. (i) $\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}\log(x^3-1).$
 (ii) $\frac{1}{2a^2}\cdot\frac{1}{x^2+a^2}-\frac{1}{2a^4}\log\frac{x^2+a^2}{x^2}.$
 (iii) $\frac{1}{3}\{\log[(x^6-1)/x^6]+x^{-6}+\frac{1}{3}x^{-12}\}.$
 (iv) $\frac{2}{3}\log(x-1)-\frac{1}{3}\log(x+1)-\frac{1}{3}\log(x^2-x+1)$
 $+ (\sqrt{3}/3)\tan^{-1}[(2x-1)/\sqrt{3}]+\frac{1}{3}(3x-4)/(x-1)^2.$

5. (i) $\log [x/(x-1)] + \frac{1}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} (x-1)^{-2}$.

(ii) $\frac{2}{3} \tan^{-1} x + \frac{1}{2} x/(1+x^2)$.

(iii) $\frac{x-2}{4(x^2+1)^2} + \frac{3x}{8(x^2+1)} + \frac{3}{8} \tan^{-1} x$.

(iv) $\frac{1}{2} \frac{x-1}{x^2+1} + \frac{1}{4} \log \frac{x^2+1}{(x+1)^2}$.

(v) $\frac{1}{8a^5} \log -\frac{x-a}{x \cdot a} - \frac{1}{2a^5} \tan^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{4a^4} \cdot \frac{x}{x^2+a^2}$

(vi) $\frac{19x-16}{15(2x^2-x+2)} + \frac{38\sqrt{15}}{225} \tan^{-1} \frac{4x-1}{\sqrt{15}}$

6. 1.

10. (i) $\frac{2}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{x} \log (x^2+a^2)$.

(ii) $\frac{1}{2} x^2 \log (x^3+1) - \frac{1}{2} \log (x+1) + \frac{1}{2} \log (x^2-x+1) + \sqrt{3/2} \tan^{-1} [(2x-1)/\sqrt{3}] - \frac{3}{2} x^3$.

(iii) $e^x \log (e^{2x}+5e^x+6) + 2 \log (e^x+2) + 3 \log (e^x+3) - 2e^x$

(iv) $\frac{(x-1) \tan^{-1} x}{2(x+1)} + \log \sqrt{\left[\frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}} \right]}$

4

مشقاتی (Trigonometric) تفاعلوں کا مکمل

4.1 $\sin^n x$ کا مکمل، جبکہ n مثبت کامل عدد ہو

اگر n مثبت کامل عدد ہو، طاق یا جفت، تو ایک تھوپی فارمولے کی مدد سے $\sin^n x$ کا مکمل نکالا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر n طاق کامل ہو تو $\sin^n x$ کا مکمل اور بھی آسانی سے متغیر کی تبدیلی $t = \cos x$ کر کے نکل آتا ہے۔ اس لیے تھوپی فارمولا بھی استعمال کرنا چاہیے جبکہ n جفت کامل عدد ہو۔

مان لیتے کہ n طاق کامل عدد ہو۔ یعنی $n = 2k + 1$ جہاں k کوئی مثبت عدد ہے۔

$$t = \cos x \text{ رکھنے پر } -\sin x dx = dt.$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \sin^n x dx &= \int \sin^{2k+1} x dx \\ &= \int \sin^{2k} x \sin x dx \\ &= -\int (1 - \cos^2 x)^k (-\sin x) dx \\ &= -\int (1 - t^2)^k dt. \end{aligned}$$

چونکہ k مثبت کامل عدد ہے، اس لیے تکاملیہ $(1 - t^2)^k$ کو دو رکنی فارمولے (Binomial Formule) سے $(k+1)$ ارکان کے جوڑ کی شکل میں رکھا جاسکتا ہے اور پھر ہر رکن کی تکمیل کی جاسکتی ہے۔

$\int \sin^n x dx$ کے لیے تھوپی فارمولا ہم دیکھتے ہیں

$$\int \sin^n x \, dx = \int \sin x \cdot \sin^{n-1} x \, dx.$$

جسے سے تکمل سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \sin^n x \, dx &= -\cos x \sin^{n-1} x - \\ &\quad - (-\cos x)(n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \, dx \\ &\quad - (n-1) \int \sin^n x \, dx. \end{aligned}$$

اب $(n-1) \int \sin^n x \, dx$ کو بائیں جانب لے جانے پر ہم پاتے ہیں۔

$$\begin{aligned} n \int \sin^n x \, dx &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \, dx, \\ (A) \quad \Rightarrow \int \sin^n x \, dx &= \frac{-\cos x \sin^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx \end{aligned}$$

جو کہ درکار تحلیلی فارمولا ہے۔

یہ فارمولا تکملوں

$$\int \sin^{n-2} x \, dx \text{ اور } \int \sin^n x \, dx$$

میں رابطہ قائم کرتا ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے $\sin x$ کی طاق یا جفت کسی بھی قوت کا تکمل مل سکتا ہے لیکن یہ فارمولا تبھی استعمال کرنا چاہیے جبکہ n جفت ہو۔

مثالیں

تکمل کیجیے

$$(i) \sin^5 x \quad (ii) \sin^6 x$$

(i) چونکہ $n = 5$ جو کہ طاق ہے، اس لیے ہم عیوضی تکمل کرتے ہیں۔ $t = \cos x$ رکھنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \int \sin^5 x \, dx &= -\int (1-t^2)^2 \, dt \\ &= -\int (1-2t^2+t^4) \, dt \\ &= -\left[t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5\right] = -\left[\cos x - \frac{2}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x\right]. \end{aligned}$$

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

(ii) چونکہ $n = 6$ جو کہ جفت ہے اس لیے ہم تحویلی فارمولا استعمال کرتے ہیں
 $\sin^6 x$ کے تشکیل کے لیے اوپر کے تحویلی فارموبلے میں n کی جگہ ترتیب وار 6، 4 اور 2 رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \dots \dots \int \sin^6 x \, dx = -\frac{\cos x \sin^5 x}{6} + \frac{5}{6} \int \sin^4 x \, dx$$

$$(ii) \dots \dots \dots \int \sin^4 x \, dx = -\frac{\cos x \sin^3 x}{4} + \frac{3}{4} \int \sin^2 x \, dx,$$

$$\int \sin^2 x \, dx = -\frac{\cos x \sin x}{2} + \frac{1}{2} \int \sin^0 x \, dx$$

$$(iii) \dots \dots \dots = -\frac{\cos x \sin x}{2} + \frac{1}{2} x$$

اب (ii) اور (iii) سے ہم پاتے ہیں

$$(iv) \dots \dots \dots \int \sin^4 x = -\frac{\cos x \sin^3 x}{4} - \frac{3}{8} \cos x \sin x + \frac{3}{8} x.$$

آخر میں (i) اور (iv) سے ہم پاتے ہیں

$$\int \sin^6 x \, dx = -\frac{\cos x \sin^5 x}{6} - \frac{5 \cos x \sin^3 x}{24} - \frac{5 \cos x \sin x}{16} + \frac{5}{16} x$$

مشقیں

حل کیجیے

$$1. (i) \int \sin^2 x \, dx. \quad (ii) \int \sin^3 x \, dx. \quad (iii) \int \sin^4 x \, dx.$$

$$2. (i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \, dx. \quad (ii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 x \, dx. \quad (iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^9 x \, dx.$$

جوابات

$$1. (i) \frac{1}{2} (x - \sin x \cos x). \quad (ii) -\left[\cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x\right]$$

$$(iii) -\frac{1}{2} \cos x \sin^2 x - \frac{3}{8} \cos x \sin x + \frac{3}{8} x$$

2. (i) 16/35.

(ii) $35\pi/256$.

(iii) 128/315.

معین تکملہ - 4-11

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx,$$

حاصل کرنا، جبکہ کوئی مثبت کامل عدد ہو۔
یہ ہم تو کلی فارمولا (A) حاصل کرتے ہیں، یعنی

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{\cos x \cdot \sin^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx.$$

اس سے ملتا ہے

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx &= \left[-\frac{\cos x \cdot \sin^{n-1} x}{n} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \, dx \\ &= 0 + \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \, dx. \end{aligned}$$

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx,$$

اب

لکھنے پر ہم رابطی فارمولا

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

پاتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہم متواتر I_{n-2} کا I_{n-4} سے I_{n-6} کا I_{n-8} سے اور آخر میں n طاق ہو تو I_3 کا I_1 سے یا n جفت ہو تو I_2 کا I_0 سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم پاتے ہیں

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2},$$

$$I_{n-2} = \frac{n-3}{n-2} I_{n-4},$$

$$I_{n-4} = \frac{n-5}{n-4} I_{n-6},$$

مثلاًقی تفاعلوں کا مکمل

$$\begin{cases} I_3 = \frac{2}{3} I_1, & (\text{اگر } n \text{ طاق ہو}) \\ I_2 = \frac{1}{2} I_0, & (\text{اگر } n \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

ان سے ہم پاتے ہیں

$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{2}{3} I_1, & (\text{جب } n \text{ طاق ہو}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{1}{2} I_0, & (\text{جب } n \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

اب

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = \left| -\cos x \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1,$$

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \cdot dx = \frac{\pi}{2}.$$

$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{2}{3}, & (\text{جبکہ } n \text{ طاق ہو}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & (\text{جبکہ } n \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

مثال

حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \, dx, \quad (ii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 x \, dx.$$

ہم پاتے ہیں

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \, dx = \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{35},$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 x \, dx = \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{35\pi}{256}$$

مشقیں

1. حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \, dx, \quad (ii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \, dx, \quad (iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{10} x \, dx$$

2. حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 2x \, dx, \quad (ii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 3x \, dx, \quad (iii) \int_0^{\pi} \sin^5 \left(\frac{1}{2}x\right) \, dx.$$

3. حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\pi} \frac{\sin^4 \theta \, d\theta}{(1 + \cos \theta)^2} \quad (ii) \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \frac{\sqrt{1 - \cos \theta}}{1 + \cos \theta} \, d\theta.$$

جوابات

1. (i) $8/15$.

(ii) $5\pi/32$.

(iii) $63\pi/512$.

2. (i) $3\pi/32$.

(ii) $5\pi/96$.

(iii) $16/15$.

3. (i) $3\pi/2$.

(ii) $8\sqrt{2}/3$.

2.4-cosⁿ x کا تکمل، جبکہ n مثبت کامل عدد ہو

اگر n کوئی مثبت کامل عدد ہو تو cosⁿ x کا تکمل ایک تھوڑی فارمولے کی مدد سے کیا جاسکتا ہے لیکن اگر n طاق کامل عدد ہو تو cosⁿ x کا تکمل ہمیں زیادہ آسانی سے متغیر کی تبدیلی $t = \sin x$ سے کیا جاسکتا ہے۔

مان لیجیے n طاق ہے یعنی $n = 2k + 1$ جہاں k کوئی مثبت کامل عدد $\sin x =$ رکھنے پر $\cos x \, dx = dt$

ہم پاتے ہیں

$$\int \cos^n x \, dx = \int \cos^{2k+1} x \, dx$$

$$= \int \cos^{2k} x \cdot \cos x \, dx$$

$$= \int (1 - \sin^2 x)^k \cdot \cos x \, dx$$

$$= \int (1 - t^2)^k \, dt,$$

جو کہ $(1 - t^2)^k$ کو دو رکنی فارمولے سے کھول کر بہ آسانی حاصل کیا جاسکتا

ہے۔

مثبتاتی تفاعلوں کا مکمل

کے لیے تھوپی فارمولا

ہم لکھتے ہیں

$$\int \cos^n x \, dx = \int \cos x \cdot \cos^{n-1} x \, dx$$

جس سے کہ حصہ سے مکمل پر ملتا ہے

$$\begin{aligned} \int \cos^n x \, dx &= \sin x \cdot \cos^{n-1} x - \int \sin x \cdot (n-1) \cos^{n-2} x \cdot (-\sin x) dx \\ &= \sin x \cdot \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \sin x \cdot \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \, dx - (n-1) \int \cos^n x \, dx \\ &\Rightarrow n \int \cos^n x \, dx = \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \, dx, \\ (B) \dots \dots \Rightarrow \int \cos^n x \, dx &= \frac{\sin x \cdot \cos^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx \end{aligned}$$

جو کہ درکار تھوپی فارمولا ہے۔

معین مکمل $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$ کی قیمت نکالنا

جیسے کہ §4.11 میں دکھایا گیا ہے، ہم دکھا سکتے ہیں کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \dots \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & (\text{جبکہ } n \text{ طاق ہو}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \dots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & (\text{جبکہ } n \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

اب مکملوں

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx \quad \text{اور} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx,$$

کی قیمتوں کا مقابلہ کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ n کی قیمت کے لیے

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx,$$

اس نتیجے کو متغیر $y = \frac{\pi}{2} - x$ رکھنے پر براہ راست ثابت کر سکتے ہیں۔

تکملی احصاء

مشقیں

ذیل کے تکملوں کی قیمت لکھیے

$$(i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x \, dx, (ii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^8 x \, dx, (iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 2t \, dt.$$

جوابات

$$(i) 16/35, (ii) 35\pi/256, (iii) 5\pi/64.$$

ضمنی نتیجہ (Corollary):
معین تکملوں

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx \text{ اور } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$$

کی قیمتوں کی مدد سے ہم براہ راست ذیل معین تکملوں کی قیمت لکھ سکتے ہیں:-

$$(i) \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} \, dx, (ii) \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)^n} \, dx, (iii) \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$$

جہاں n کوئی مثبت کامل عدد ہے۔

$$(i) \text{ ہم } x = \sin \theta \text{ رکھتے ہیں اور یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ جب } x = 0 \text{ تو } \theta = 0$$

اور جب $x = 1$ تو $\theta = \pi/2$ یہ دیکھتے ہیں کہ θ کی حدیں 0 اور $\pi/2$ ہیں۔ اس

متغیری تبدیلی سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n \theta \cos \theta \, d\theta}{\cos \theta} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

مثلاًتی تفاعلوں کا مکمل

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & (\text{جبکہ } n \text{ طاق ہو}) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & (\text{جبکہ } n \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

(ii) ہم $x = \tan \theta$ رکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کہ جب $x = 0$ تو $\theta = 0$ اور جب $x \rightarrow \infty$ تو $\theta \rightarrow \pi/2$ جس سے کئے متغیر θ کی حدیں 0 اور $\pi/2$ ہیں اس متغیری تبدیلی سے ہم پاتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^{2n} \theta} \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} \theta d\theta \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \frac{2n-3}{2n-2} \cdot \frac{2n-5}{2n-4} \cdot \frac{2n-7}{2n-6} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & (\text{اگر } n > 1) \\ \frac{\pi}{2} & (\text{اگر } n = 1) \end{cases}$$

(iii) ہم $x = \tan \theta$ رکھنے پر پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}} &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^{2n+1} \theta} \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-1} \theta d\theta \\ &= \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n-4}{2n-3} \cdots \frac{2}{3} \end{aligned}$$

مشقیں

ذیل معین تکملے حاصل کیجیے

1. $\int_0^1 \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

2. $\int_0^1 \frac{x^6}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

3. $\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^5} dx.$
4. $\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx.$
5. $\int_0^1 \frac{x^2(2-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$
6. $\int_0^1 x^2(1-x^2)^{\frac{2}{3}} dx.$
7. $\int_0^a x^2(a^2-x^2)^{\frac{2}{3}} dx.$
8. $\int_0^a x^4 \sqrt{a^2-x^2} dx,$
9. $\int_0^a \frac{x^4}{\sqrt{a^2-x^2}} dx.$
10. $\int_c^1 \frac{x^7}{\sqrt{1-x^4}} dx.$
11. $\int_0^1 x^5 \sqrt{\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)} dx.$
12. $\int_0^{\infty} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^6}} dx.$
13. $\int_0^1 x^6 \sin^{-1} x dx.$
14. $\int_0^1 x^6 \sin^{-1} x dx.$

جوابات

1. $\frac{8}{15}.$
2. $\frac{5\pi}{32}.$
3. $\frac{35\pi}{256}.$
4. $\frac{8}{15}.$
5. $\frac{5\pi}{16}.$
6. $\frac{\pi}{32}.$
7. $\frac{21\pi}{2048} a^{12}.$
8. $\frac{\pi}{32} a^6.$
9. $\frac{3\pi}{16} a^4.$
10. $\frac{1}{3}$
11. $\frac{3\pi+8}{24}.$
12. $\frac{8}{45}.$
13. $\frac{11\pi}{192}.$
14. $\frac{\pi}{14} - \frac{16}{245}.$

4.3 $\sin^p x \cos^q x$ کا تکمل جبکہ p اور q مثبت کامل عدد ہوں

اس کا تکمل p کے طاق ہونے پر $t = \cos x$ اور q کے طاق ہونے پر $t = \sin x$ رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ اگر p اور q دونوں جفت ہوں تو تکمل ایک تحلیلی فارمولے کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔

مان لیجیے p طاق ہے، یعنی $p = 2k+1$ اب $t = \cos x$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int \sin^{2k+1} x \cos^q x dx = -\int (1-t^2)^k t^q dt;$$

نشانی تفاعلوں کا مکمل

جس کی قیمت $(1-t^2)^k$ کو دو رکنی فارمولے سے کھولنے پر کی جاسکتی ہے۔
 اسی طرح یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ اگر q طاق ہو تو $\sin x = t$ رکھ کر اس تفاعل کا مکمل ہو سکتا ہے۔
 اگر p اور q دونوں ہی طاق ہوں تو دو میں سے کسی طریقے سے تکمیل کر سکتے ہیں۔
 $\int \sin^p x \cos^q x dx$ کے لیے تویلی فارمولا
 ہم لکھتے ہیں

$$\int \sin^p x \cos^q x dx = \int \sin^{p-1} x (\sin x \cos^q x) dx$$

اور حصہ سے تکمیل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \sin^p x \cos^q x dx &= -\frac{\cos^{q+1} x}{q+1} \sin^{p-1} x + \int \frac{\cos^{q+1} x}{q+1} \cdot (p-1) \sin^{p-2} x \cos x dx \\ &= -\frac{\cos^{q+1} x \sin^{p-1} x}{q+1} + \frac{p-1}{q+1} \int \sin^{p-2} x \cos^q x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= -\frac{\cos^{q+1} x \sin^{p-1} x}{q+1} + \frac{p-1}{q+1} \int \sin^{p-2} x \cos^q x dx \\ &\quad - \frac{p-1}{q+1} \int \sin^p x \cos^q x dx \end{aligned}$$

$$\frac{p-1}{q+1} \int \sin^p x \cos^q x dx, \quad \text{اب}$$

کو بائیں جانب منتقل کرنے اور $1 + (p-1)/(q+1)$ یعنی $(p+q)/(q+1)$ سے تقسیم کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(C) \dots \int \sin^p x \cos^q x dx = -\frac{\cos^{q+1} x \sin^{p-1} x}{p+q} + \frac{p-1}{p+q} \int \sin^{p-2} x \cos^q x dx,$$

جو کہ درکار تویلی فارمولا ہے۔

اسی طرح یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ

$$\int \sin^p x \cos^q x dx = \frac{\sin^{p+1} x \cos^{q-1} x}{p+q} + \frac{q-1}{p+q} \int \sin^p x \cos^{q-2} x dx.$$

نوٹ: اگر p طاق ہو تو متغیر کی تبدیلی $\cos x = u$ فائدہ مند ہوتی ہے خواہ q کامل عدد نہ بھی ہو۔

مشقیں

1. تکمل کیجیے

(i) $\sin^3 x \cos^4 x$, (ii) $\sin^4 x \cos^3 x$, (iii) $\tan^3 x \sec^3 x$.

2. حاصل کیجیے

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{3/2} x \cos^3 x dx.$$

3. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin \theta} \cos^5 \theta d\theta = \frac{64}{231}.$$

4. ثابت کیجیے کہ

$$(i) \int \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} dx = \frac{1}{3 \cos^3 x} - \frac{2}{\cos x} \cos x.$$

$$(ii) \int \frac{\cos^5 x}{\sin x} dx = \frac{\sin^4 x}{4} - \sin^2 x + \log \sin x.$$

5. ثابت کیجیے کہ

$$\int \frac{\sin^6 x}{\cos x} dx = -\frac{\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^3 x}{3} - \sin x + \log \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$$

6. ذیل تکملے حاصل کیجیے

(i) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$,
(iii) $\int \sin^4 x \cos^4 x dx$,

(ii) $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$
(iv) $\int \sin^2 x \cos^6 x dx$.

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

جوابات

1. (I) $\frac{1}{7} \cos^7 x - \frac{1}{5} \sin^5 x$. (II) $\frac{1}{5} \sin^5 x - \frac{1}{7} \sin^7 x$. (III) $\frac{1}{3} \sec^3 x - \frac{1}{5} \sec^5 x$.

2. $\frac{8}{45}$

6. (i) $-\frac{1}{4} \sin x \cos^3 x + \frac{1}{8} (x + \sin x \cos x)$.

(II) $\frac{1}{4} \cos^3 x \sin^3 x + \frac{1}{8} \sin^3 x \cos x + \frac{1}{8} (x - \sin x \cos x)$

(III) $-\frac{1}{8} \cos^5 x \sin^3 x - \frac{1}{8} \cos^5 x \sin x + \frac{1}{8} \sin x \cos^3 x$

$+ \frac{5}{8} (x + \sin x \cos x)$.

(IV) $\frac{1}{4} \sin^3 x \cos^5 x + \frac{5}{8} \sin^3 x \cos^3 x + \frac{5}{8} \sin^3 x \cos x$

$+ \frac{5}{8} (x - \sin x \cos x)$.

معین تکملہ 4-31

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx,$$

کی قیمت حاصل کرنا، جبکہ p اور q مثبت کامل عدد ہوں
ہم لکھتے ہیں

$$I_{p,q} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx.$$

اب § 4.3 کے تحویلی فارمولے (C) سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx &= - \left| \frac{\cos^{q+1} x \sin^{p-1} x}{p+q} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &\quad + \frac{p-1}{p+q} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{p-2} x \cos^q x dx \\ &= \frac{p-1}{p+q} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{p-2} x \cos^q x dx. \end{aligned}$$

اپنی علامتوں (notation) میں ہم پاتے ہیں

$$I_{p,q} = \frac{p-1}{p+q} \cdot I_{p-2,q}$$

اس سے p کی جگہ $p-2$ رکھنے پر

$$I_{p-2, q} = \frac{p-3}{p+q-2} \cdot I_{p-4, q}$$

$$I_{p-4, q} = \frac{p-5}{p+q-4} \cdot I_{p-6, q}$$

.....

$$\left. \begin{array}{ll} \text{جب } p \text{ طاق ہو} & I_{3, q} = \frac{2}{3+q} \cdot I_{1, q} \\ \text{جب } p \text{ جفت ہو} & I_{2, q} = \frac{1}{2+q} \cdot I_{0, q} \end{array} \right\} \text{آخر میں}$$

اس طرح

$$I_{p, q} = \begin{cases} \frac{p-1}{p+q} \cdot \frac{p-3}{p+q-2} \cdots \frac{2}{3+q} \cdot I_{1, q} & (\text{جب } p \text{ طاق ہو}) \\ \frac{p-1}{p+q} \cdot \frac{p-3}{p+q-2} \cdots \frac{1}{2+q} \cdot I_{0, q} & (\text{جب } p \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

اب

$$I_{1, q} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^q x \, dx = -\left| \frac{\cos^{q+1} x}{q+1} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{q+1}$$

$$I_{0, q} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0 x \cos^q x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^q x \, dx,$$

جو کہ § 4.21 میں حاصل کیا جا چکا ہے۔

اس طرح اگر p طاق ہو تو ہم پاتے ہیں

$$I_{p, q} = \frac{p-1}{p+q} \cdot \frac{p-3}{p+q-2} \cdots \frac{2}{3+q} \cdot \frac{1}{q+1},$$

جہاں q طاق یا جفت ہو سکتا ہے۔

اگر p جفت اور q طاق ہو تو

$$I_{p, q} = \frac{p-1}{p+q} \cdot \frac{p-3}{p+q-2} \cdot \frac{p-5}{p+q-4} \cdots \frac{1}{2+q} \times \frac{q-1}{q} \cdot \frac{q-3}{q-2} \cdots \frac{2}{3}$$

اگر p جفت ہو اور q بھی جفت ہو تو

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

$$I_{p,q} = \frac{p-1}{p+q} \cdot \frac{p-3}{p+q-2} \cdot \frac{p-5}{p+q-4} \cdots \frac{1}{2+q} \\ \times \frac{q-1}{q} \cdot \frac{q-3}{q-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

اوپر دیے ہوئے تکملے کی قیمت لکھنے کے لیے ہم کو یہ اصول ملتا ہے

$$\int_0^{\pi/2} \sin^p x \cos^q x dx = \frac{(p-1)(p-3)\cdots(q-1)(q-3)\cdots}{(p+q)(p+q-2)\cdots}$$

اور داہنی طرف آخر میں فیکٹر 1 ملتا ہے جبکہ p اور q دونوں جفت ہوں، اس میں فیکٹروں کی تین قسمیں ہیں جو $p-1$ ، $q-1$ اور $p+q$ سے شروع ہو کر دو دو کر کے گھٹتی ہیں اور یا 1 پر ختم ہوتی ہیں یا 2 پر، یہ اس پر منحصر ہے کہ اُس قسم کا پہلا فیکٹر طاق تھا یا جفت۔

مثالیں

ذیل تکملوں کی قیمت لکھیے

$$(i) \int_0^{\pi/2} \sin^5 x \cos^3 x dx, \quad (ii) \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^5 x dx.$$

ہم پاتے ہیں

$$(i) \int_0^{\pi/2} \sin^5 x \cos^3 x dx = \frac{4.2.5.3.1}{11.9.7.5.3.1} = \frac{8}{693},$$

$$(ii) \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^5 x dx = \frac{5.3.1.7.5.3.1}{14.12.10.8.6.4.2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4096}.$$

مشقیں

حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \cos^4 \theta d\theta, \quad (ii) \int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin^4 x dx$$

$$(iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin 3x \, dx, \quad (iv) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 2x \sin^4 4x \, dx$$

جوابات

$$(i) 2/35, \quad (ii) 8/315, \quad (iii) 13/35, \quad (iv) 128/1155.$$

ضمنی نتیجہ:
میں تکملہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^m x \, dx$$

کی قیمت کی مدد سے ہم ذیل تکملوں کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \int_0^{\infty} \frac{x^n}{(1+x^2)^m} \, dx, \quad (ii) \int_0^{\infty} \frac{x^n \, dx}{(1+x^2)^{(m+\frac{1}{2})}}$$

$$(iii) \int_0^{2a} x^m \sqrt{(2ax-x^2)} \, dx,$$

جہاں n, m مثبت کامل عدد ہیں۔

(i) $x = \tan \theta$ رکھنے پر ہم دیکھتے ہیں

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x^n}{(1+x^2)^m} \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n \theta \cos^{2m} \theta}{\cos^n \theta} \cdot \sec^2 \theta \, d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta \cos^{2m-(n+2)} \theta \, d\theta \end{aligned}$$

جس کی قیمت معلوم ہے۔

(ii) $x = \tan \theta$ رکھنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{x^n}{(1+x^2)^{(m+\frac{1}{2})}} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta \cos^{2m-(n+1)} \theta \, d\theta,$$

جس کی قیمت معلوم ہے۔

(iii) ہم لکھتے ہیں

$$\int_0^{2a} x^m \sqrt{(2ax-x^2)} \, dx = \int_0^{2a} x^m \sqrt{[a^2-(a-x)^2]} \, dx.$$

مثلاًتی تفاعلوں کا مکمل

$$\begin{aligned} a-x &= a \cos \theta \\ \therefore dx &= a \sin \theta d\theta. \end{aligned} \quad \text{اب ہم رکھتے ہیں}$$

$$x = a(1 - \cos \theta) = 2a \sin^2(\theta/2). \quad \text{پھر}$$

اب x کے 0 اور $2a$ ہونے پر θ ترتیب وار 0 اور π ہوتا ہے۔
اس لیے دیا ہوا مکمل

$$= \int_0^\pi 2^m a^m \sin^{2m} \frac{\theta}{2} \cdot a \sin \theta \cdot a \sin \theta d\theta$$

$$= (2a)^{m+2} \int_0^\pi \sin^{2m+2} \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{2} d\theta$$

اب ہم $\phi = (\theta/2)$ رکھتے ہیں اور تب تکملہ

$$(2a)^{m+2} \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m+2} \phi \cos^2 \phi d\phi$$

$$= (2a)^{m+2} \cdot 2 \frac{(2m+1)(2m-1)\dots\dots 1}{(2m+4)(2m+2)\dots\dots 2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \pi (2a)^{m+2} \cdot \frac{(2m+1)(2m-1)\dots\dots 1}{(2m+4)(2m+2)\dots\dots 2}$$

$$= \pi \frac{a^{m+2}}{2^m} \cdot \frac{(2m+1)!}{(m+2)!(m)!}$$

مشقیں

ذیل معین تکملے حاصل کیجیے

$$1. \int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^4} dx.$$

$$2. \int_0^\infty \frac{x}{(1+x^2)^3} dx.$$

$$3. \int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^{7/2}} dx.$$

$$4. \int_0^\infty \frac{x^3}{(1+x^2)^{5/2}} dx.$$

$$5. \int_0^\infty \frac{t^4 dt}{(1+t^2)^4}$$

$$6. \int_0^{2a} x^2 \sqrt{(2ax-x^2)} dx.$$

$$7. \int_0^2 x^3 \sqrt{(2x-x^2)} dx.$$

$$8. \int_0^2 x^{5/2} \sqrt{(2-x)} dx.$$

$$9. \int_0^{2a} x^{3/2} (2a-x)^{-\frac{1}{2}} dx.$$

10. $\int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{(4+x^2)^2}$

11. $\int_0^1 x^{2/3} (1-x)^{2/3} dx.$

جوابات

1. $\frac{\pi}{32}.$ 2. $\frac{1}{4}.$ 3. $\frac{2}{15}.$ 4. $\frac{2}{35}.$ 5. $\frac{\pi}{32}.$
6. $\frac{5\pi}{8} a^4.$ 7. $\frac{7\pi}{8}.$ 8. $\frac{5\pi}{8}.$ 9. $\frac{63\pi}{8} a^6.$ 10. $\frac{1}{3}.$
11. $\frac{3\pi}{128}.$

تکلی احصاء $\tan^n x$ اور $\cot^n x$ کا مکمل جبکہ n کوئی مثبت کامل عدد ہو
اب ہم ایسے تھوپی فارمولے نکالیں گے جن کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کی مثبت
کامل اعداد توئوں کا مکمل کیا جاسکتا ہے۔

4.41. $\int \tan^n x dx.$ کے لیے تھوپی فارمولا
ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \tan^n x dx &= \int \tan^{n-2} x \tan^2 x dx \\ &= \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \int \tan^{n-2} x \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx \\ (D) \dots\dots\dots &= \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x dx \end{aligned}$$

جو کہ درکار تھوپی فارمولا ہے۔

4.42. $\int \cot^n x dx.$ کے لیے تھوپی فارمولا
ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \cot^n x dx &= \int \cot^{n-2} x \cdot \cot^2 x dx \\ &= \int \cot^{n-2} x \cdot (\operatorname{cosec}^2 x - 1) dx \\ &= \int \cot^{n-2} x \operatorname{cosec}^2 x dx - \int \cot^{n-2} x dx \\ (E) \dots\dots\dots &= -\frac{\cot^{n-1} x}{n-1} - \int \cot^{n-2} x dx, \end{aligned}$$

مثلاًتی تفاعلوں کا مکمل

جو کہ درکار تحویلی فارمولا ہے۔

مثالیں

حاصل کیجیے

$$1. \int \tan^6 x \, dx. \quad 2. \int \cot^5 x \, dx$$

1. - فارمولا (D) میں ترتیب وار $n = 6$ اور 4 اور 2 رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \int \tan^6 x \, dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x \, dx.$$

$$(ii) \dots \int \tan^4 x \, dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x \, dx.$$

$$(iii) \dots \int \tan^2 x \, dx = \frac{\tan x}{1} - \int \tan^0 x \, dx = \tan x - x.$$

اب (ii) اور (iii) سے ہم پاتے ہیں

$$(iv) \dots \int \tan^4 x \, dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$$

پھر (i) اور (iv) سے ہم پاتے ہیں

$$\int \tan^6 x \, dx = -\frac{\tan^5 x}{5} - \frac{\tan^3 x}{3} + \tan x - x.$$

2. - فارمولا (E) میں ترتیب وار $n = 5$ اور 3 رکھنے پر ملتا ہے۔

$$\int \cot^5 x \, dx = -\frac{\cot^4 x}{4} - \int \cot^3 x \, dx;$$

$$\int \cot^3 x \, dx = -\frac{\cot^2 x}{2} - \int \cot x \, dx;$$

$$= -\frac{\cot^2 x}{2} - \log \sin x.$$

$$\int \cot^5 x \, dx = -\frac{\cot^4 x}{4} + \frac{\cot^2 x}{2} + \log \sin x.$$

مشقیں

حاصل کیجیے

$$(i) \int \tan^3 x \, dx, (ii) \int \cot^5 x \, dx, (iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^3 x \, dx, (iv) \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot^4 x \, dx.$$

جوابات

(i) $\frac{1}{2} \tan^2 x - \log \sec x.$

(ii) $-\frac{1}{5} \cot^5 x + \frac{1}{3} \cot^3 x - \cot x - x.$

iii) $(3\pi - 8)/12.$

(iv) $(3\pi - 8)/12.$

$\sec^n x - 4.5$ تکمیل کرنا جبکہ n مثبت کامل عدد ہو

اگر n مثبت کامل عدد ہو تو ایک تخیلی فارمولے کے ذریعے $\sec^n x$ تکمیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر n جفت مثبت کامل عدد ہو تو $\sec^n x$ تکمیل اور بھی آسانی سے متغیر کی تبدیلی $t = \tan x$ سے کر سکتے ہیں اور یہ تخیلی فارمولے سے بہتر طریقہ ہے۔

مان لیجیے n جفت ہے، یعنی $n = 2k$ جہاں k مثبت کامل عدد ہے۔

$\sec^2 x dx = dt$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \sec^n x dx &= \int \sec^{2k} x dx \\ &= \int \sec^{2k-2} x \sec^2 x dx \\ &= \int (1+t^2)^{k-1} dt, \end{aligned}$$

جس تکمیل $(1+t^2)^{k-1}$ کو دو رکنی فارمولے سے کھولنے پر ہو سکتا ہے۔

$\int \sec^n x dx$ کے لیے تخیلی فارمولا

ہم لکھتے ہیں

$$\int \sec^n x dx = \int \sec^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx.$$

حصے سے تکمیل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \sec^n x dx &= \tan x \cdot \sec^{n-2} x - \int \tan x \cdot (n-2) \sec^{n-3} x \cdot \tan x dx \\ &= \tan x \cdot \sec^{n-2} x - (n-2) \int \sec^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \tan x \cdot \sec^{n-2} x - (n-2) [\int \sec^n x dx - \int \sec^{n-2} x dx] \end{aligned}$$

مشقاتی تقاعلوں کا مکمل

اب $\int \sec^n x \, dx$ (n-2) کو بائیں طرف منتقل کرنے اور $1+(n-2)$ یعنی $(n-1)$ سے تقسیم کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(F) \dots \int \sec^n x \, dx = \frac{\tan x \cdot \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx$$

جو کہ $\sec^{n-2} x$ اور $\sec^2 x$ کے تھکوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے والا فارمولا ہے۔

4.52. $\operatorname{cosec}^n x$ کا مکمل کرنا جبکہ n مثبت کامل عدد ہو
ہم آسانی سے دکھا سکتے ہیں کہ اگر n جفت ہو تو $\operatorname{cosec}^n x$ کا مکمل متغیر کی تبدیلی $t = \cot x$ کے ذریعے کیا جاسکتا ہے اور اگر n طاق ہو تو ایک تھوپی فارمولے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ § 4.51 کی طرح سے نکالا جاسکتا ہے۔

$\int \operatorname{cosec}^n x \, dx$ کے لیے تھوپی فارمولا یہ ہے

$$(G) \int \operatorname{cosec}^n x \, dx = -\frac{\cot x \operatorname{cosec}^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{cosec}^{n-2} x \, dx.$$

مشقیں

1- حاصل کیجیے

(i) $\int \sec^3 x \, dx,$
(iii) $\int \sec^5 x \, dx,$

(ii) $\int \sec^4 x \, dx,$
(iv) $\int \sec^6 x \, dx.$

2- حاصل کیجیے

(i) $\int \operatorname{cosec}^3 x \, dx,$
(iii) $\int \operatorname{cosec}^5 x \, dx.$

(ii) $\int \operatorname{cosec}^4 x \, dx,$

جوابات

- (i) $\frac{1}{2} \tan x \sec x + \frac{1}{2} \log (\sec x + \tan x)$.
 (ii) $\frac{1}{2} \tan x \sec^3 x + \frac{1}{2} \tan x$.
 (iii) $\frac{1}{4} \tan x \sec^3 x + \frac{3}{8} \tan x \sec x + \frac{3}{8} \log (\sec x + \tan x)$.
 (iv) $\frac{1}{5} \tan x \sec^4 x + \frac{4}{15} \tan x \sec^3 x + \frac{8}{15} \tan x$.
 2. (i) $-\frac{1}{2} \cot x \operatorname{cosec} x + \frac{1}{2} \log \tan \left(\frac{1}{2}x\right)$.
 (ii) $-\frac{1}{2} \cot x \operatorname{cosec}^3 x - \frac{2}{3} \cot x$.
 (iii) $-\frac{1}{2} \cot x \operatorname{cosec}^3 x - \frac{3}{8} \cot x \operatorname{cosec} x + \frac{3}{8} \log \tan \left(\frac{1}{2}x\right)$.

نوٹ: چونکہ $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ اور $\operatorname{cosec} x$ کی کامل عدد منفی قوتیں (integral negative powers) ترتیب وار $\sec x$, $\operatorname{cosec} x$, $\cot x$, $\tan x$, $\cos x$ اور $\sin x$ کی کامل عدد مثبت قوتیں (integral positive powers) ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ § 4.1 سے § 4.5 تک کی مدد سے $\cos x$, $\sin x$, $\cot x$, $\tan x$ اور $\sec x$ اور $\operatorname{cosec} x$ کے منفی کامل عدد قوتوں کے تکمیل بھی کر سکتے ہیں۔ ان تفاعلوں کی کسری قوتوں (fractional powers) جیسے کہ

$$\sin^{1/2} x, \tan^{1/5} x$$

کے تکمیل عام طور پر ان ابتدائی فارمولوں سے نہیں حاصل ہو سکتے۔ لیکن ایک خاص صورت میں p اور q کے کسری ہونے پر بھی $\sin^p x \cos^q x$ کا تکمیل کر سکتا ہے۔ ہم اب اسی خاص صورت پر غور کریں گے۔

4.6 - $\sin^p x \cos^q x$ کا تکمیل کرنا، جبکہ $p+q$ منفی جفت کامل عدد ہے۔

مان لیجیے $p+q = -2n$ جہاں n مثبت کامل عدد ہے۔ اس صورت میں متغیر کی تبدیلی

$$t = \tan x \text{ کرنے پر}$$

$$\sec^2 x dx = dt \Rightarrow dx = dt/(1+t^2)$$

ساتھ ہی

مثلاًتی تفاضلوں کا مکمل

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \\ \therefore \int \sin^p x \cos^q x \, dx &= \int \frac{t^p}{(1+t^2)^{p/2}} \cdot \frac{1}{(1+t^2)^{q/2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \int t^p \cdot \frac{1}{(1+t^2)^{(p+q+2)/2}} dt \\ &= \int t^p (1+t^2)^{n-1} dt\end{aligned}$$

جس کا مکمل $(1+t^2)^{n-1}$ کو دو رکنی فارمولے سے کھولنے پر ہو سکتا ہے۔

مثال

حاصل کیجیے

$$\int \sqrt{\cot x} \cdot \sec^4 x \, dx$$

ہم پاتے ہیں

$$\sqrt{\cot x} \cdot \sec^4 x = \sin^{-\frac{1}{2}} x \cos^{-\frac{7}{2}} x,$$

اس طرح سے، $p+q = -4$ ، نفی جفت کامل عدد ہے۔
اب $t = \tan x$ رکھنے پر، $dx = dt/(1+t^2)$ اور ہمیں ملتا ہے

$$\begin{aligned}\int \sqrt{\cot x} \cdot \sec^4 x \, dx &= \int \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot (1+t^2)^2 \cdot \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \int \frac{1+t^2}{\sqrt{t}} dt \\ &= 2\sqrt{t} + \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \\ &= 2\sqrt{\tan x} + \frac{2}{3}\sqrt{\tan^3 x}.\end{aligned}$$

مشقیں

1۔ ثابت کیجیے کہ

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^3 x \cos x} &= -\frac{1}{2 \tan^2 x} + \log \tan x. \\ \int \frac{dx}{\sin^3 x \cos^4 x} &= \frac{\sin x (1+2 \cos^2 x)}{3 \cos^3 x} - 2 \cot 2x.\end{aligned}$$

2۔ حاصل کیجیے -

$$(i) \int \frac{dx}{\sin^{3/2} x \cos^{5/2} x}, \quad (ii) \int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx,$$

$$(iii) \int \frac{(1 - \cos x)^{3/5}}{(1 + \cos x)^{8/5}} dx, \quad (iv) \int \sec^{4/7} x \operatorname{cosec}^{10/7} x dx.$$

3۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{(1 - \cos x)^{2/7}}{(1 + \cos x)^{9/7}} dx, \quad (ii) \int \frac{1}{\sin \theta \cos^3 \theta} d\theta,$$

$$(iii) \int \sec^{9/10} x \operatorname{cosec}^{10/10} x dx, \quad (iv) \int \sec^{3/3} x \operatorname{cosec}^{4/3} x dx.$$

جوابات

2. (i) $\frac{2}{3} \sqrt{\tan^3 x} - 2\sqrt{\cot x}$. (ii) $2\sqrt{\tan x}$.
 (iii) $\frac{5}{15} (\tan \frac{1}{2} x)^{11/5}$. (iv) $-\frac{7}{3} (\cot x)^{3/7}$.
 3. (i) $\frac{7}{11} (\tan \frac{1}{2} x)^{11/7}$. (ii) $\log \tan \theta + \frac{1}{2} \tan^2 \theta$.
 (iii) $-9 (\cot x)^{1/9}$. (iv) $-3 (\cot x)^{1/3}$.

4.61 - تکمیل

$$\int \sin^p x \cos^q x dx,$$

حاصل کرنا جبکہ p یا q یا دونوں منفی کامل عدد ہوں۔

اب ہم تکمیل $\int \sin^p x \cos^q x dx$ کے لیے تویلی فارمولوں کا ایک نظام (system) حاصل کریں گے۔

اس طرح والے کسی بھی تویلی فارمولے کا کارآمد ہونا اس پر منحصر ہے کہ اس میں p ، q کس طرح کے ہیں مثبت یا منفی۔ ان تویلی فارمولوں کی مدد سے $\int \sin^p x \cos^q x dx$ اسی صورت میں نکالا جاسکتا ہے جب p اور q کامل عدد ہوں۔ ان میں سے دو تویلی فارمولے § 4.3 میں پہلے ہی نکالے جا چکے ہیں اور وہ تب کارآمد ہیں جب p اور q دونوں مثبت

کامل اعداد ہوں۔

جسے سے تکمل کے علاوہ تجویلی فارمولے سکالنے کا ہم دوسرا طریقہ بھی بتائیں گے۔
1۔ جیسے § 4.3 میں کیا تھا اسی طرح سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \sin^p x \cos^q x dx &= - \int \sin^{p-1} x (\sin x \cos^q x) dx \\ &= - \frac{\cos^{q+1} x}{q+1} \sin^{p-1} x + \int \frac{\cos^{q+1} x}{q+1} (p-1) \sin^{p-2} x \cos x dx \\ (A) \dots &= - \frac{\cos^{q+1} x \sin^{p-1} x}{q+1} + \frac{p-1}{q+1} \int \sin^{p-2} x \cos^{q+2} x dx \end{aligned}$$

یہ تجویلی فارمولا تب کارآمد ہوتا ہے جب q منفی اور p مثبت ہو۔
II۔ اگر ہم لکھیں

$$\int \sin^p x \cos^q x dx = \int \cos^{q-1} x (\cos x \sin^p x) dx,$$

اور اوپر کی طرح سے جسے سے تکمل کا فارمولا لگائیں تو یہ تجویلی فارمولا ملے گا:-

$$(B) \dots \dots \dots = \frac{\sin^{p+1} x \cos^{q-1} x}{1+p} + \frac{q-1}{1+p} \int \sin^{p+2} x \cos^{q-2} x dx$$

III۔ اگر اوپر کے فارمولا (A) میں ہم $\cos^{q+2} x$ کو $\cos^q x (1 - \sin^2 x)$ لکھ دیں تو § 4.3 کی طرح سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \int \sin^p x \cos^q x dx &= - \frac{\cos^{q+1} x \sin^{p-1} x}{p+q} + \frac{p-1}{p+q} \int \sin^{p-2} x \cos^q x dx \\ \text{اب } p \text{ کی جگہ } p+2 \text{ رکھنے پر اور } \int \sin^p x \cos^q x dx \text{ کو بائیں طرف} \\ \text{منتقل کر کے } (p+1)(p+q+2) \text{ سے تقسیم کرنے پر ہم پاتے ہیں} \end{aligned}$$

$$\int \sin^p x \cos^q x dx = \frac{\cos^{q+1} x \sin^{p+1} x}{p+1} + \frac{p-2+q}{p+1} \int \sin^{p+2} x \cos^q x dx$$

جو کہ p کے منفی ہونے پر فائدہ مندرجہ ثابت ہوتا ہے۔
 IV - اسی طرح سے ہم ایک اور فارمولہ پاسکتے ہیں جو کہ

$$\int \sin^p x \cos^q x dx \quad \text{اور} \quad \int \sin^p x \cos^{q+2} x dx$$

میں رابطہ قائم کرتا ہے اور تب کارآمد ہے جب q منفی ہو۔
 نوٹ: اوپر جو کہا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکملہ

$\int \sin^p x \cos^q x dx$
 کا رابطہ ذیل چھ میں سے کسی بھی تکملے سے قائم ہو سکتا ہے:-

$$\begin{aligned} \int \sin^{p-2} x \cos^q x dx ; & \quad \int \sin^p x \cos^{q-2} x dx ; \\ \int \sin^{p-2} x \cos^{q+2} x dx ; & \quad \int \sin^{p+2} x \cos^{q-2} x dx ; \\ \int \sin^{p+2} x \cos^q x dx ; & \quad \int \sin^p x \cos^{q+2} x dx. \end{aligned}$$

دوسرا طریقہ: بجائے اس کے کہ جتنے سے مکمل کے ذریعے تو خلی فارمولے حاصل کریں
 (جیسا کہ اوپر کیا گیا) ہم ذیل میں بیان کیے گئے طریقے سے بھی تو خلی فارمولے پاسکتے ہیں:-
 (i) پہلے لکھیے

$$P = \sin^{p+1} x \cos^{q+1} x$$

یہاں جن دو سکالوں کے تعلق میں چاہیے ان میں p اور q ترتیب وار $\sin x$ اور $\cos x$ کی کمزورتیں (lesser indices) ہیں۔

(ii) اب (dP/dx) سکالے اور اسے ان دو سکالوں کے خطی مرکب (linear combination) کی شکل میں لکھیے جن کے تعلق میں رابطہ چاہیے ہے۔

(iii) آخر میں مکمل کر کے تو خلی فارمولہ حاصل کر لیجیے۔

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

مثال

مکملوں

$$\int \sin^{p-2} x \cos^q x \, dx \text{ اور } \int \sin^p x \cos^q x \, dx$$

میں رابطہ قائم کیجیے۔

یہاں $\lambda = p-2$ اور $\mu = q$ ، اس لیے ہم لکھتے ہیں

$$P = \sin^{p-1} x \cos^{q+1} x.$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dx} = (p-1) \sin^{p-2} x \cos^{q+1} x - (q+1) \sin^p x \cos^q x.$$

اب $\cos^q x (1 - \sin^2 x)$ کو $\cos^{q+2} x$ لکھ کر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dx} &= (p-1) \sin^{p-2} x \cos^q x (1 - \sin^2 x) - (q+1) \sin^p x \cos^q x \\ &= (p-1) \sin^{p-2} x \cos^q x - (p+q) \sin^p x \cos^q x \end{aligned}$$

مکمل کرنے پر ہمیں ملتا ہے

$$\begin{aligned} P &= (p-1) \int \sin^{p-2} x \cos^q x \, dx - (p+q) \int \sin^p x \cos^q x \, dx. \\ \Rightarrow \int \sin^p x \cos^q x \, dx &= -\frac{\sin^{p-1} x \cos^{q+1} x}{p+q} + \frac{p-1}{p+q} \int \sin^{p-2} x \cos^q x \, dx. \end{aligned}$$

اسی طرح سے باقی تخیلی فارمولے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔

مشقیں

نہایت کیجیے کہ

- (i) $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} \, dx = \frac{\sin^2 x}{3 \cos^3 x} - \frac{2}{3} \sec x.$
- (ii) $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^5 x} \, dx = \frac{\sin^3 x}{3 \cos^4 x} - \frac{3 \sin x}{8 \cos^2 x} + \frac{3}{8} \log \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$

$$(iii) \int \frac{\cos^6 x}{\sin^4 x} dx = -\frac{\cos^4 x}{3 \sin^3 x} + \frac{4 \cos^2 x}{3 \sin x} + \frac{8 \sin x}{3}$$

4.7 - $R(\cos x, \sin x)$ کا تکمیل جہاں $R(\cos x, \sin x)$ اور $\sin x$ کا کوئی ناطق تفاعل ہے۔
مثلاً

$$\frac{1}{4+5 \cos x}, \frac{1}{3+4 \cos x+5 \sin x}, \frac{2 \sin x+3 \cos x}{4+5 \cos^2 x+6 \sin x}.$$

متغیر کی تبدیلی $t = \tan(x/2)$ کی مدد سے $\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل $R(\cos x, \sin x)$ کا تکمیل " کے ناطق تفاعل کے تکمیل میں بدل جاتا ہے جسے باب 3 میں بتائے گئے طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔
در اصل $t = \tan(x/2)$ رکھیں

$$dt = \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx \Rightarrow dx = \frac{2t}{1+t^2},$$

ساتھ ہی

$$\sin x = \frac{2 \tan(x/2)}{1+\tan^2(x/2)} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{1-\tan^2(x/2)}{1+\tan^2(x/2)} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

$$\therefore R(\cos x, \sin x)dx = \int R\left[\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right] \frac{2t}{1+t^2} dt$$

اب تکاملیہ t کا ناطق تفاعل ہے۔

مثالیں

1. حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{a+b \cos x}.$$

منشیاتی تفاعلوں کا مکمل

$t = \tan x/2$ رکھنے پر ملتا ہے

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a+b \cos x} &= \int \frac{2dt}{(1+t^2) \left[a+b \frac{1-t^2}{1+t^2} \right]} \\ &= \int \frac{2dt}{(a+b) + (a-b)t^2} \\ &= \frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{t^2 + (a+b)/(a-b)}, \quad (a \neq b, \text{ اگر}) \end{aligned}$$

اب $(a+b)/(a-b)$ کو $(a+b)^2/(a^2-b^2)$ لکھنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ
 $(a+b)/(a-b)$ مثبت ہوگا۔ اگر $a^2 > b^2$ ہو اور $(a+b)/(a-b)$ منفی ہوگا
 اگر $a^2 < b^2$ ہو۔

پہلی صورت۔ مان لیجیے

$$a^2 > b^2 \Rightarrow [(a+b)/(a-b)] > 0$$

ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a+b \cos x} &= \frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{t^2 + \left[\sqrt{\left(\frac{a+b}{a-b} \right)} \right]^2} \\ &= \frac{2}{a-b} \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan^{-1} \left[t \sqrt{\left(\frac{a-b}{a+b} \right)} \right] \\ &= \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\left(\frac{a-b}{a+b} \right)} \tan \frac{x}{2} \right] \end{aligned}$$

دوسری صورت۔ مان لیجیے

$$a^2 < b^2 \Rightarrow [(a+b)/(a-b)] < 0$$

ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{t^2 - (b+a)/(b-a)}$$

$$= \frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{t^2 - \left[\sqrt{\left(\frac{b+a}{b-a} \right)^2} \right]^2} = \frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{t^2 - \alpha^2},$$

جہاں کہ $\alpha = \sqrt{\{(b+a)/(b-a)\}}$ اب

$$\int \frac{dt}{t^2 - \alpha^2} = \frac{1}{2\alpha} \int \left(\frac{1}{t-\alpha} - \frac{1}{t+\alpha} \right) dt = \frac{1}{2\alpha} \log \frac{t-\alpha}{t+\alpha}$$

$$\int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{2}{a-b} \cdot \frac{1}{2\alpha} \log \frac{t-\alpha}{t+\alpha}$$

$$= - \frac{1}{\sqrt{(b^2 - a^2)} \log} \frac{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{(b+a)}{(b-a)}}}{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{(b+a)}{(b-a)}}}$$

تیسری صورت - مان لیجیے

$$a^2 = b^2 \Rightarrow b = a \text{ یا } b = -a$$

اگر $b = a$ ہو تو ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{1}{a} \int \frac{dx}{1+\cos x}$$

$$= \frac{1}{2a} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{a} \tan \frac{x}{2}$$

اگر $b = -a$ ہو تو ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{1}{a} \int \frac{dx}{1-\cos x}$$

$$= \frac{1}{2a} \int \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{a} \cot \frac{x}{2}$$

2- حاصل کیجیے

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{dx}{5+7 \cos x + \sin x}$$

مثبتاتی تفاضلوں کا مکمل

$t = \tan(x/2)$ پر رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5+7 \cos x + \sin x} &= \int \frac{2dt}{(1+t^2) \left[5+7 \frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} \right]} \\ &= \int \frac{dt}{-t^2+t+6} \\ &= \int \frac{dt}{(3-t)(t+2)} \\ &= \frac{1}{5} \int \left(\frac{1}{3-t} + \frac{1}{2+t} \right) dt \\ &= \frac{1}{5} \left[-\log(3-t) + \log(2+t) \right] \end{aligned}$$

اب $x = \pi/2$ پر $t = 1$ ہے اور $x = -\pi/2$ پر $t = -1$ ہے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{5+7 \cos x + \sin x} &= \frac{1}{5} \left[\log \frac{(2+t)}{(3-t)} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{5} (\log 3/2 - \log 1/4) = 1/5 \log 6. \end{aligned}$$

مشقیں

1۔ ذیل تکملے حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{5+4 \cos x} \quad (ii) \int_0^{\pi} \frac{dx}{2+\cos x} \quad (iii) \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{5+3 \cos \theta}$$

2۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{dx}{a+b \sin x}, \quad (ii) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{4+5 \sin x}, \quad (iii) \int \frac{\operatorname{cosec} x \, dx}{2+\operatorname{cosec} x}$$

3۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1+2 \cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}} \log(2+\sqrt{3}).$$

4. ثنابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{3+2 \sin x + \cos x} = \frac{\pi}{4}$$

5. ثنابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+2 \sin x + \cos x} = \frac{1}{2} \log 3$$

6. ثنابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}, \quad (a^2 > b^2) \text{ اگر}$$

7. ثنابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\alpha} \frac{d\theta}{\cos \alpha + \cos \theta} = \operatorname{cosec} \alpha \log \sec \alpha.$$

8. ثنابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{a^2-2a \cos x+1} = \begin{cases} \frac{\pi}{1-a^2} & (a < 1) \text{ اگر} \\ \frac{\pi}{a^2-1} & (a > 1) \text{ اگر} \end{cases}$$

9. ثنابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{(2+\cos x)^2} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

جوابات

1. (i) $2/3 \tan^{-1} \frac{1}{2}$. (ii) $\pi/\sqrt{3}$. (iii) $\frac{\pi}{4}$

2. (i) $\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} - \tan^{-1} \frac{a \tan (x/2)+b}{\sqrt{a^2-b^2}} \quad (a^2 > b^2 \text{ اگر})$
 $\frac{2}{\sqrt{b^2-a^2}} \log \frac{a \tan (x/2)+b-\sqrt{b^2-a^2}}{a \tan (x/2)+b+\sqrt{b^2-a^2}} \quad (a^2 < b^2 \text{ اگر})$
 $-\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \quad (b = a \text{ اگر}) \quad \frac{1}{a} \cot \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \quad (b = -a \text{ اگر})$

مثنائی تفاعلوں کا مکمل

$$(ii) \frac{1}{3} \log 2 \quad (iii) \frac{1}{\sqrt{3}} \log \frac{\sin \frac{1}{2}x + (2-\sqrt{3}) \cos \frac{1}{2}x}{\sin \frac{1}{2}x + (2+\sqrt{3}) \cos \frac{1}{2}x}$$

4.71- دوسرے اہم متغیر کے استحالے (transformations)

اصولاً تو استحالہ $t = \tan(x/2)$ کی مدد سے $\sin x$ اور $\cos x$ کے کسی بھی ناطق تفاعل R کا مکمل ممکن ہے لیکن یہ استحالہ ہمیشہ آسانی نہیں پیدا کرتا کیونکہ حاصل شدہ t کے ناطق تفاعل کے نسب نما کی ڈگری عموماً بڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوسرے استحالے جیسے $t = \sin x$ ، $t = \cos x$ ، $t = \tan x$ زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم کچھ مثالیں حل کر کے دکھائیں گے کہ عموماً کس طرح کے تفاعلوں سے سابقہ رہتا ہے۔

مثالیں

1- حاصل کیجیے

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x \, dx}{(1 + \sin x)(2 + \sin x)}$$

$t = \sin x$ رکھنے پر $dt = \cos x \, dx$ ساتھ ہی $x = 0$ پر $t = 0$ اور $x = \pi/2$ پر $t = 1$ ہے۔

اس لیے مکمل

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \frac{dt}{(1+t)(2+t)} \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{2+t} \right) dt \\ &= \left| \log \frac{1+t}{2+t} \right|_0^1 = \log \frac{2}{3} - \log \frac{1}{2} = \log \frac{4}{3} \end{aligned}$$

2- حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{\sin x (a + b \cos x)}$$

اس طرح $-\sin x \, dx = dt$ رکھنے پر $t = \cos x$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin x(a+b \cos x)} &= - \int \frac{dt}{\sin^2 x(a+b \cos x)} \\ &= - \int \frac{dt}{(1-t)(1+t)(a+bt)} \\ &= - \int \left(\frac{1}{2(a+b)} \cdot \frac{1}{1-t} + \frac{1}{2(a-b)} \cdot \frac{1}{1+t} + \frac{b}{b^2-a^2} \cdot \frac{1}{a+bt} \right) dt \\ &= \frac{1}{2(a+b)} \log(1-t) - \frac{1}{2(a-b)} \log(1+t) + \frac{b}{a^2-b^2} \log(a+bt) \\ &= \frac{1}{2(a+b)} \log(1-\cos x) - \frac{1}{2(a-b)} \log(1+\cos x) \\ &\quad + \frac{b}{a^2-b^2} \log(a+b \cos x) \\ &= \frac{1}{a+b} \log \sin \frac{x}{2} - \frac{1}{(a-b)} \log \cos \frac{x}{2} \\ &\quad + \frac{b}{a^2-b^2} \log(a+b \cos x) + C \end{aligned}$$

جہاں مستقل C کی قیمت $-b \log 2/(a^2-b^2)$ ہے جسے عموماً نہیں لکھتے (مستقل بنونے کی وجہ سے)

3. حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{a^3 \sin^3 x + b^3 \cos^3 x}$$

ہم لکھتے ہیں

$$\int \frac{dx}{a^3 \sin^3 x + b^3 \cos^3 x} = \int \frac{\sec^3 x \, dx}{b^3 + a^3 \tan^3 x}$$

اب $t = \tan x$ رکھنے پر دیا ہوا تکرار

$$\begin{aligned} &= \int \frac{dt}{b^3 + a^3 t^3} = \frac{1}{a^3} \int \frac{dt}{(t^3 + b^3/a^3)} \\ &= \frac{1}{a^3} \int \frac{a}{b} \tan^{-1} \left(\frac{at}{b} \right) = \frac{1}{ab} \tan^{-1} \left(\frac{a \tan x}{b} \right) \end{aligned}$$

4۔ حاصل کیجیے

$\int \frac{\sin x \cos x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx.$
 شمار کنندہ اور نسب نما کو $\cos^2 x$ سے تقسیم کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{\sin x \cos x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx = \int \frac{\tan x dx}{a^2 + b^2 \tan^2 x}.$$

اب $t = \tan^2 x$ رکھنے پر مکمل

$$\begin{aligned} &= \int 2(1+t)(a^2 + b^2 t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{a^2 + b^2} \cdot \frac{1}{1+t} + \frac{b^2}{b^2 - a^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 t} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{a^2 - b^2} \log(1+t) + \frac{b^2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{1}{b^2} \log(a^2 + b^2 t) \right] \\ &= \frac{1}{2(a^2 - b^2)} \log \frac{\sec^2 x}{a^2 + b^2 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{2(a_2 - b_2)} \log(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x). \end{aligned}$$

نوٹ: یہ مکمل حاصل کرنے کے لیے $t = \cos^2 x$ یا $t = \sin^2 x$ بھی رکھ سکتے تھے۔

مشقیں

ذیل تکیے حاصل کیجیے۔

-1

$$\begin{aligned} (i) \int \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx, & \quad (ii) \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{\sin^2 \theta \cos \theta}{1 + e^2 \sin^2 \theta} d\theta, \\ (iii) \int \frac{dx}{\sin x + \sin 2x}, & \quad (iv) \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{\sin x \cos x}{\cos^2 x + 3 \cos x + 2} dx. \end{aligned}$$

-2

$$(i) \int \frac{2 - \sin x}{\sin x(1 - \cos x)} dx, \quad (ii) \int \frac{\sec x}{1 + \operatorname{cosec} x} dx,$$

$$(iii) \int \frac{dx}{1+\cos^2 x}, \quad (iv) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2+\sin^2 x} \quad (v) \int \frac{d\theta}{5+4 \cos 2\theta},$$

-3

$$(i) \int \frac{dx}{1-\cos^4 x}, \quad (ii) \int \frac{dx}{(2 \sin x + \cos x)^2},$$

$$(iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+4 \sin^2 x}, \quad (iv) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx,$$

$$(v) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{a^2 - b^2 \cos^2 x}, \quad (a^2 > b^2),$$

$$(vi) \int \frac{dx}{3 \sin x + \sin^3 x}.$$

4۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta + \cos \theta}{9+16 \sin 2\theta} d\theta = \frac{1}{20} \log 3.$$

جوابات

- (i) $\tan^{-1}(\sin x)$. (ii) $(e - \tan^{-1} e)/e^3$.
 (iii) $\frac{1}{2} \log [\sin x(1+\cos x)/(1+2 \cos x)^2]$. (iv) $\log(9/8)$.
- (i) $\log \tan \frac{1}{2} x + \cot \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{1}{2} x$.
 (ii) $\frac{1}{2} \log [(1+\sin x)/(1-\sin x)] + \frac{1}{2}(1+\sin x)$.
 (iii) $\sqrt{\frac{1}{2}} \tan^{-1}(\tan x/\sqrt{2})$. (iv) $\sqrt{6\pi}/12$. (v) $\frac{1}{2} \tan^{-1}(\frac{1}{2} \tan \theta)$.
- (i) $-\frac{1}{2} \cot x + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{1}{2}} \tan x)$.
 (ii) $-\frac{\cos x/2}{(2 \sin x + \cos x)}$ (iii) $\frac{\pi}{2\sqrt{5}}$
 (iv) $\frac{1}{(a^2-b^2)} \log \frac{a}{b}$ (اگر $a^2 \neq b^2$) $\frac{1}{2a^2}$ (اگر $a^2 = b^2$)
 (v) $\pi/2a\sqrt{(a^2-b^2)}$.
 (vi) $\frac{1}{6} \log \frac{t-1}{t+1} + \frac{1}{12} \log \frac{2+t}{2-t}$ ($t = \cos x$ ، جہاں)

تکمل کرنا: $(a \cos x + b \sin x)/(c \cos x + d \sin x) - 4.81$

یہ دیکھتے ہوئے کہ نسب نما $c \cos x + d \sin x$ کا تفرقی سر $-c \sin x + d \cos x$

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

ہے۔ ہم دو مستقل λ اور μ ایسے معلوم کرتے ہیں کہ

$$a \cos x + b \sin x \equiv \lambda (-c \sin x + d \cos x) + \mu (c \cos x + d \sin x)$$

دونوں طرف کے $\cos x$ اور $\sin x$ کے ضربیوں کی برابری کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{cases} a = d\lambda + \mu, \\ b = -c\lambda + d\mu \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{ad-bc}{d^2+c^2}, \mu = \frac{ac-bd}{d^2+c^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{a \cos x + b \sin x}{c \cos x + d \sin x} dx &= \lambda \int \frac{-c \sin x + d \cos x}{c \cos x + d \sin x} dx + \mu \int \frac{dx}{c \cos x + d \sin x} \\ &= \lambda \log (c \cos x + d \sin x) + \mu x. \end{aligned}$$

4.82۔ $(a \cos x + b \sin x + c) / (d \cos x + e \sin x + f)$ کا تکمیل کرنا:

ہم تین مستقل λ ، μ اور ν ایسے معلوم کرتے ہیں کہ

$$a \cos x + b \sin x + c = \lambda (d \cos x + e \sin x + f) + \mu (-d \sin x + e \cos x) + \nu.$$

یہ مستقل ذیل مساواتوں سے ملتے ہیں۔

$$a = d\lambda + e\mu, b = e\lambda - d\mu, c = f\lambda + \nu.$$

اب λ ، μ اور ν کی ایسی قیمتوں کے لیے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{a \cos x + b \sin x + c}{d \cos x + e \sin x + f} dx &= \int \lambda dx + \mu \int \frac{-d \sin x + e \cos x}{d \cos x + e \sin x + f} dx \\ &\quad + \nu \int \frac{dx}{d \cos x + e \sin x + f} \\ &= \lambda x + \mu \log (d \cos x + e \sin x + f) \\ &\quad + \nu \int \frac{dx}{d \cos x + e \sin x + f} \end{aligned}$$

اور تکملہ

$$\int \frac{dx}{d \cos x + e \sin x + f}$$

استعمال $t = \tan(x/2)$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مشقیں

ذیل تکملے حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \cot x},$$

$$(ii) \int \frac{2 \sin x + 3 \cos x}{3 \sin x + 4 \cos x} dx,$$

$$(iii) \int \frac{dx}{a + b \tan x},$$

$$(iv) \int \frac{3 \cos x + 4 \sin x}{4 \cos x + 5 \sin x} dx,$$

$$(v) \int \frac{\cos x + 2 \sin x + 3}{4 \cos x + 5 \sin x + 6} dx,$$

$$(vi) \int \frac{5 \cos x + 6}{2 \cos x + \sin x + 3} dx.$$

جوابات

$$(i) \pi/4.$$

$$(ii) \frac{1}{5}x + \frac{1}{5} \log(3 \sin x + 4 \cos x).$$

$$(iii) [ax + b \log(a \cos x + b \sin x)]/(a^2 + b^2).$$

$$(iv) [3x - \log(4 \cos x + 5 \sin x)]/41.$$

$$(v) \frac{14}{41}x - \frac{3}{41} \log(4 \cos x + 5 \sin x + 6) + \frac{39}{41} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \log \frac{2 \sin \frac{1}{2}x + (5 - \sqrt{5}) \cos \frac{1}{2}x}{2 \sin \frac{1}{2}x + (5 + \sqrt{5}) \cos \frac{1}{2}x}.$$

$$(vi) 2x + \log(2 \cos x + \sin x + 3).$$

49. معین تکملوں کی دو خصوصیات

اب ہم معین تکملوں کی دو خصوصیات ثابت کریں گے جن سے کچھ قسموں کے معین تکملے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

4.91- پہلی خصوصیت. اگر $\varphi(x)$ کوئی بھی تفاعل ہو تو

$$\int_0^a \varphi(x) dx = \int_0^{\frac{a}{2}} \varphi(x) dx + \int_0^{\frac{a}{2}} \varphi(a-x) dx$$

ہم کو § 1.6 سے ملتا ہے

$$\int_0^a \varphi(x) dx = \int_0^{\frac{a}{2}} \varphi(x) dx + \int_{\frac{a}{2}}^a \varphi(x) dx$$

اب سب سے داہنی طرف کے تکملے کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$y = a - x \Rightarrow dx = -dy$$

ساتھ ہی ' $x = \frac{a}{2}$ پر $y = \frac{a}{2}$ اور $x = a$ پر $y = 0$ ہے۔

$$\therefore \int_{\frac{a}{2}}^a \varphi(x) dx = - \int_{\frac{a}{2}}^0 \varphi(a-y) dy = \int_0^{\frac{a}{2}} \varphi(a-x) dx$$

$$(A) \therefore \int_0^a \varphi(x) dx = - \int_0^{\frac{a}{2}} \varphi(x) dx + \int_0^{\frac{a}{2}} \varphi(a-x) dx$$

ضمنی نتیجہ Cor 1
ہمیں (A) سے ملتا ہے کہ

$$\varphi(a-x) = \varphi(x) \text{ اگر } \Rightarrow \int_0^a \varphi(x) dx = 2 \int_0^{\frac{a}{2}} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(a-x) = -\varphi(x) \text{ اگر } \Rightarrow \int_0^a \varphi(x) dx = 0.$$

ضمنی نتیجہ 2 پہلے ضمنی نتیجہ میں حاصل کیے گئے نتائج ذیل تکملے

$$\int_0^{2\pi} \sin^p x \cos^q x dx \text{ اور } \int_0^{\pi} \sin^p x \cos^q x dx$$

نکالنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں (جہاں p, q مثبت کامل عدد ہیں)

(i) مسئلہ

$$\int_0^{\pi} \sin^p x \cos^q x dx$$

حاصل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$\varphi(x) = \sin^p x \cos^q x$$

$$\begin{aligned} \varphi(\pi-x) &= \sin^p(\pi-x) \cos^q(\pi-x) \\ &= \sin^p x (-\cos x)^q = (-1)^q \sin^p x \cos^q x \end{aligned}$$

جو کہ $\varphi(x)$ ہوگا اگر q جفت ہو اور $-\varphi(x)$ ہوگا اگر q طاق ہو۔
لہذا

$$q \text{ طاق} \Rightarrow \int_0^{\pi} \sin^p x \cos^q x dx = 0$$

$$q \text{ جفت} \Rightarrow \int_0^{\pi} \sin^p x \cos^q x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx$$

(ii) پھر مان لیجئے کہ

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sin^p x \cos^q x \\ \therefore \varphi(2\pi-x) &= \sin^p(2\pi-x) \cos^q(2\pi-x) \\ &= (-1)^p \sin^p x \cos^q x \end{aligned}$$

جو کہ $\varphi(x)$ ہوگا اگر p جفت ہو اور $-\varphi(x)$ ہوگا اگر p طاق ہو۔
لہذا

$$p \text{ طاق} \Rightarrow \int_0^{2\pi} \sin^p x \cos^q x dx = 0$$

$$p \text{ جفت} \Rightarrow \int_0^{2\pi} \sin^p x \cos^q x dx = 2 \int_0^{\pi} \sin^p x \cos^q x dx$$

$$= \begin{cases} 0 & (\text{اگر } q \text{ طاق ہو}) \\ 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx & (\text{اگر } q \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

لہذا اگر p یا q یا دونوں طاق ہوں تو

$$\int_0^{2\pi} \sin^p x \cos^q x dx = 0$$

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

اور اگر دونوں جفت ہوں تو

$$\int_0^{\pi} \sin^p x \cos^q x dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^p x \cos^q x dx$$

مشقیں

1- حاصل کیجیے

- (i) $\int_0^{\pi} \sin^4 x \cos^6 x dx$, (ii) $\int_0^{\pi} \sin^4 x \cos^8 x dx$,
 (iii) $\int_0^{2\pi} \sin^4 x \cos^6 x dx$, (iv) $\int_0^{2\pi} \sin^4 x \cos^8 x dx$,
 (v) $\int_0^{\pi} \sin^3 x dx$, (vi) $\int_0^{\pi} \sin^4 x dx$,
 (vii) $\int_0^{2\pi} \cos^3 x dx$, (viii) $\int_0^{2\pi} \cos^4 x dx$.

2- ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \theta \sin^3 \theta \cos \theta d\theta = -\frac{4}{9}$$

3- ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^4 3\phi \sin^3 6\phi d\phi = \frac{5}{96}\pi.$$

4- ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \sin^3 \theta (1+2 \cos \theta) (1+\cos \theta)^3 d\theta = \frac{8}{3}$$

5- ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \log \tan x dx = 0.$$

جوابات

1. (i) 0. (ii) $3\pi/256$. (iii) 0. (iv) $3\pi/128$.
(v) $4/3$. (vi) $3\pi/8$. (vii) 0. (viii) $3\pi/4$.

4.92 - دوسری خصوصیت. اگر $\varphi(x)$ کوئی بھی تفاعل ہو تو

$$\int_0^a \varphi(x) dx = \int_0^a \varphi(a-x) dx.$$

ہم رکھتے ہیں

$$a-x = y \Rightarrow dx = -dy.$$

$$x = 0 \Rightarrow y = a, x = a \Rightarrow y = 0 \quad \text{ساتھ ہی}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^a \varphi(a-x) dx &= -\int_a^0 \varphi(y) dy \\ &= \int_0^a \varphi(y) dy = \int_0^a \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

مثالیں

1- حاصل کیجیے

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

مان لیجیے

$$\varphi(x) = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$$

$$\begin{aligned} \therefore \varphi\left(\frac{1}{2}\pi - x\right) &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} \\ &= \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} \end{aligned}$$

چونكه

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx,$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = I \quad (\text{كهريجي})$$

$$\therefore 2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \cdot dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\pi}{4}.$$

2- ثابتي كيجهي كه

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \log(1 + \sqrt{2}).$$

مان ليجهي

$$\varphi(x) = \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x}$$

$$\therefore \varphi\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\cos^2 x}{\cos x + \sin x}$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\cos x + \sin x} dx = I \quad (\text{كهريجي})$$

$$\therefore 2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x + \sin x} dx.$$

اب $t = \tan(x/2)$ ركهنه پرايم ديكتيه هي كه

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos x + \sin x} = 2 \int_0^1 \frac{dt}{1 + 2t - t^2}$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{dt}{2 - (t-1)^2}$$

$$= 2 \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^1 \left[\frac{1}{\sqrt{2} - (t-1)} + \frac{1}{\sqrt{2} + (t-1)} \right] dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \log \frac{\sqrt{2} + (t-1)}{\sqrt{2} - (t-1)} \right|_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[0 - \log \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right]$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \log \frac{1}{(\sqrt{2}+1)^2} = \frac{2}{\sqrt{2}} \log (\sqrt{2}+1).$$

$$\therefore I = \frac{1}{\sqrt{2}} \log (\sqrt{2}+1).$$

3۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{\pi}{2} \log 2.$$

مان لیجیے کہ $\varphi(x) = \log \sin x$ تو $\varphi(\frac{\pi}{2} - x) = \log \cos x$.

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \cos x \, dx = I \quad (\text{کہہ لیجیے})$$

$$\therefore 2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\log \sin x + \log \cos x) \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x \cos x \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \frac{\sin 2x}{2} \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin 2x \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log 2 \, dx$$

$$(i) \dots \dots = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin 2x \, dx - \frac{\pi}{2} \log 2.$$

اب $y = 2x$ رکھ کر ہم پاتے ہیں

$$(ii) \dots \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \log \sin y \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \log \sin x \, dx$$

$$\varphi(\pi - x) = \log \sin (\pi - x) = \log \sin x = \varphi(x) \quad \text{اب}$$

اس لیے § 4.91 کے پہلے ضمنی نتیجہ سے ہم پاتے ہیں

$$(iv) \dots \int \log \sin x \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x \, dx = 2I.$$

مشقاتی تفاضلوں کا مکمل

پھر (ii) اور (iii) سے ملتا ہے

$$(iii) \dots \dots \dots \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin 2x \, dx = 1.$$

آخر میں (i) اور (iv) سے ہم پاتے ہیں

$$2I = I - \frac{\pi}{2} \log 2$$

$$\Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \log 2 = \frac{\pi}{2} \log \frac{1}{2}$$

مشقیں

حاصل کیجیے

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} \, dx.$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - \cos x}{1 + \sin x \cos x} \, dx.$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x \, dx}{1 + \sin x \cos x}.$
4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx.$
5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx.$
6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log (1 + \tan \theta) \, d\theta.$
7. $\int_0^1 \frac{\log (1+x)}{1+x^2} \, dx.$
8. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \tan x \, dx.$
9. $\int_0^{\pi} x \cos^4 x \, dx.$
10. $\int_0^{\pi} x \sin x \cos^4 x \, dx.$
11. $\int_0^{\pi} x \sin^3 x \, dx.$
12. $\int_0^{\pi} x \sin^3 x \cos^4 x \, dx.$
13. $\int_0^{\pi} x \log \sin x \, dx.$
14. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log (\tan x + \cot x) \, dx.$
15. $\int_0^{\infty} \log \left(x + \frac{1}{x} \right) \frac{dx}{1+x^2}.$
16. $\int_0^{\pi} \log (1 + \cos \theta) \, d\theta$
17. $\int_0^{\pi} \frac{x \, dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}.$
18. $\int_0^{\pi} \frac{x \, dx}{1 + e \sin x}$
19. $\int_0^{\pi} x \sin^6 x \cos^4 x \, dx.$

1. $\frac{\pi}{4}$.
2. 0.
3. $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.
4. $\frac{\pi^2}{4}$.
5. $\frac{\pi(\pi-2)}{2}$.
6. $\frac{\pi}{8} \log 2$.
7. $\frac{\pi}{8} \log 2$.
8. 0.
9. $\frac{3}{16} \pi^2$.
10. $\frac{\pi}{5}$.
11. $\frac{2\pi}{3}$.
12. $\frac{\pi^2}{32}$.
13. $\frac{1}{2} \pi^2 \log \frac{1}{2}$.
14. $\pi \log 2$.
15. $\pi \log 2$.
16. $\pi \log \frac{1}{2}$.
17. $\frac{\pi^2}{2ab}$.
18. $\frac{\pi \cos^{-1} e}{\sqrt{1-e^2}} \left(e^2 < 1 \right)$.
19. $\frac{3\pi^2}{512}$.

10.4 - $\int \cos^m x \cos nx \, dx$ کے لیے تجویزی فارمولا
حصہ تہ مکمل کے فارمولے سے ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \int \cos^m x \cos nx \, dx = \cos^m x \cdot \frac{\sin nx}{n} + \frac{m}{n} \int \cos^{m-1} x \sin x \sin nx \, dx,$$

اب

$$\cos(n-1)x = \cos nx \cos x + \sin nx \sin x.$$

$\sin nx \sin x$ کے بجائے $\cos(n-1)x - \cos nx \cos x$ کی راہی جانب رکھنے پر

$$\begin{aligned} \int \cos^m x \cos nx \, dx &= \frac{\cos^m x \sin nx}{n} \\ &+ \frac{m}{n} \cos^{m-1} x \cos(n-1)x \, dx - \frac{m}{n} \int \cos^m x \cos nx \, dx \\ \Rightarrow \left(1 + \frac{m}{n}\right) \int \cos^m x \cos nx \, dx &= \frac{\cos^m x \sin nx}{n} + \frac{m}{n} \int \cos^{m-1} x \cos(n-1)x \, dx \end{aligned}$$

مشتقاتی تفاضلوں کا مکمل

$$\Rightarrow \int \cos^m x \cos nx \, dx = \frac{\cos^m x \sin nx}{m+n} + \frac{m}{m+n} \int \cos^{m-1} x \cos (n-1)x \, dx$$

جو کہ درکار تحویلی فارمولا ہے۔

نوٹ 1۔ اسی طرح سے ہم $\int \cos^m x \sin nx \, dx$ کے لیے تحویلی فارمولا پاسکتے ہیں۔

نوٹ 2۔ اگر (i) کی داہنی جانب $\sin x \sin nx$ کی جگہ پر

نہ رکھتے بلکہ $\sin nx$ کو پہلا اور $\cos^{m-1} x \sin x$ کو دوسرا ٹیکہ لیتے ہوئے اس کا حصہ سے مکمل کرتے تو ہمیں ذیل تحویلی فارمولا ملتا:

$$\int \cos^m x \cos nx \, dx = \frac{n \sin nx \cos x - m \cos nx \sin x}{n^2 - m^2} \cos^{m-1} x - \frac{m(m-1)}{n^2 - m^2} \int \cos^{m-2} x \cos nx \, dx$$

4.11 تکملہ

$$\int_0^\infty e^{-ax} \sin^n x \, dx.$$

حاصل کرنا

حصہ سے مکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \int e^{-ax} \sin^n x \, dx = -\frac{e^{-ax}}{a} \sin^n x + \frac{n}{a} \int e^{-ax} \sin^{n-1} x \cos x \, dx$$

پھر حصہ سے مکمل کرنے پر ملتا ہے

$$\int e^{-ax} \sin^{n-1} x \cos x \, dx = -\frac{e^{-ax}}{a} \sin^{n-1} x \cos x$$

$$+ \int \frac{e^{-ax}}{a} [(n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x - \sin^n x] dx.$$

اب $\cos^2 x$ کو $1 - \sin^2 x$ پر داہنی جانب کی قیمت

$$-\frac{e^{-ax}}{a} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{a} \int e^{-ax} \sin^{n-2} x dx - \frac{n}{a} \int e^{-ax} \sin^n x dx$$

ہو جاتی ہے۔ یہ قیمت (i) میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int e^{-ax} \sin^n x dx = -\frac{e^{-ax}}{a} \sin^n x - \frac{ne^{-ax}}{a^2} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{-ax} \sin^{n-2} x dx - \frac{n^2}{a^2} \int e^{-ax} \sin^n x dx$$

اب $\frac{n^2}{a^2} \int e^{-ax} \sin^n x dx$ کو بائیں جانب منتقل کر کے $(a^2 + n^2)/a^2$ سے تقسیم کرنے اور حدیں 0 اور ∞ لیتے ہوئے ہم پاتے ہیں

$$\int_0^\infty e^{-ax} \sin^n x dx = - \left[\frac{a \sin^n x + n \sin^{n-1} x \cos x}{n^2 + a^2} e^{-ax} \right]_0^\infty + \frac{n(n-1)}{a^2 + n^2} \int_0^\infty e^{-ax} \sin^{n-2} x dx$$

جب $x \leftarrow \infty$ تو $e^{-ax} \leftarrow 0$ اور تب

$$\frac{a \sin^n x + n \sin^{n-1} x \cos x}{n^2 + a^2}$$

متناہی رہتا ہے، اس لیے جس رکن میں تکملہ کا نشان نہیں ہے وہ $x \leftarrow \infty$ ہونے پر صفر کی طرف مائل ہوتا ہے اور $x = 0$ پر بھی وہ صفر ہے۔ اب اگر

$$I_n = \int_0^\infty e^{-ax} \sin^n x dx$$

رکھیں تو ہم پاتے ہیں

$$I_n = \frac{n(n-1)}{a^2 + n^2} I_{n-2}$$

اس سے ہم پاتے ہیں

مثلاتی تفاعلوں کا مکمل

$$I_{n-2} = \frac{(n-2)(n-3)}{a^2 + (n-2)^2} I_{n-4},$$

$$I_{n-4} = \frac{(n-4)(n-5)}{a^2 + (n-4)^2} I_{n-6},$$

$$\left. \begin{aligned} I_3 &= \frac{3 \cdot 2}{a^2 + 3^2} I_1 \quad (\text{اگر } n \text{ طاق ہو}) \\ I_2 &= \frac{2 \cdot 1}{a^2 + 2^2} I_0 \quad (\text{اگر } n \text{ جفت ہو}) \end{aligned} \right\} \text{آخر میں}$$

$$I_1 = \int_0^\infty e^{-ax} \sin x \, dx \quad \text{اب}$$

$$= \frac{1}{1+a^2} \quad (\text{کی مثال 2 دیکھیے})$$

ساتھ ہی

$$I_0 = \int_0^\infty e^{-ax} \sin^0 x \, dx = \int_0^\infty e^{-ax} \, dx = \frac{1}{a}$$

$$\therefore I_n = \begin{cases} \frac{n(n-1)(n-2) \dots \dots \dots 3 \cdot 2}{(a^2 + n^2)[a^2 + (n-2)^2] \dots (a^2 + 3^2)} \cdot \frac{1}{(a^2 + 1)} & (\text{اگر } n \text{ طاق ہو}) \\ \frac{n(n-1)(n-2) \dots \dots \dots 2 \cdot 1}{[a^2 + n^2][a^2 + (n-2)^2] \dots [a^2 + 2^2]} & (\text{اگر } n \text{ جفت ہو}) \end{cases}$$

مشقیں

1- ثابت کیجیے کہ اگر

$$I_{m,n} = \int \cos^m x \sin nx \, dx,$$

ہو تو

$$(m+n) I_{m,n} = -\cos^m x \cos nx + m I_{m-1,n-1}.$$

اس لیے یا اور کسی طریقے سے مکمل

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin 3x \, dx.$$

حاصل کیجیے۔

2۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \cos nx \, dx = m \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{m-1} x \cos (n-1) x \, dx,$$

اور پھر $m > n$ ہونے پر اس سے بائیں جانب کا تکملہ حاصل کیجیے۔
خاص طور پر یہ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \cos nx \, dx = \frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

3۔ اگر

$$f(p, q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^p x \cos qx \, dx$$

ہو تو ذیل تویلی فارمولا حاصل کیجیے :-

$$f(p, q) = \frac{p(p-1)}{p^2 - q^2} f(p-2, q) = \frac{p}{p+q} f(p-1, q-1).$$

4۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int \sin^m x \cos nx \, dx = \frac{m \cos x \cos nx + n \sin x \sin mx}{n^2 - m^2} \sin^{m-1} x - \frac{m(m-1)}{n^2 - m^2} \int \sin^{m-2} x \cos nx \, dx$$

5۔ اگر

$$u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^n \sin mx \, dx,$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$u_n = \frac{n \pi^{n-1}}{m^2 2^{n-1}} - \frac{n(n-1)}{m^2} u_{n-2}, \text{ اگر } m, \text{ اگر } 4r+1, \text{ کی شکل کا ہو۔}$$

مثلاًتی تفاضلوں کا مکمل

6۔ اگر

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^n \sin (2p+1) x \, dx,$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$(2p+1)^2 I_n + n(n-1) I_{n-2} = (-1)^p \cdot n \cdot (\pi/2)^{n-1}$$

جہاں p, n مثبت کامل عدد ہوں۔

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^4 \sin 3x \, dx. \quad \text{تکملہ}$$

حاصل کیجیے۔

7۔ بتائیے کہ تکملہ

$$\int x^m \cos nx \, dx$$

کیسے حاصل کریں گے۔

8۔ تکملہ

$$\int e^{ax} \cos^n x \, dx$$

کے لیے تخیلی فارمولا حاصل کیجیے، جب کہ n مثبت کامل عدد ہو۔

9۔ تکملہ

$$I_m = \int_0^{\infty} e^{-x} \sin^m x \, dx \quad n \geq 2$$

کے لیے ذیل تخیلی فارمولا

$$(1+m^2) I_m = m(m-1) I_{m-2}.$$

ثابت کیجیے۔

اس سے I_4 کی قیمت نکالیے۔

10۔ حاصل کیجیے

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{-3x} \cos^4 x \, dx.$$

جوابات

1. $1/3$.

2. $-\frac{\pi}{2^{m+1}} \cdot \frac{m}{\left(\frac{m+n}{2}\right)! \cdot \left(\frac{m-n}{2}\right)!}$ (اگر $m-n$ جفت ہو)

$2^{m-1} \frac{m}{\left(\frac{m+n}{2}\right)! \cdot \left(\frac{m-n}{2}\right)!} \cdot \frac{(m+n-1)!!}{(m-n-1)!!}$ (اگر $m-n$ طاق ہو)

6. $(16+24\pi-9\pi^2)/162$

8. $\int e^{ax} \cos^n x \, dx = \frac{a \cos x + n \sin x}{a^2 + n^2} e^{ax} \cos^{n-1} x + \frac{n(n-1)}{a^2 + n^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} x \, dx.$

9. $24/85$

10. $\frac{16}{325} \sinh \frac{3\pi}{5}$

باب 4 پر مشقیں

1- ثابت کیجیے

(i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2a(a+b)},$

(ii) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{a^2 \cosh^2 x + b^2 \sinh^2 x} = \frac{1}{ab} \tan^{-1} \frac{b}{a}$

2- حاصل کیجیے

(i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta},$ (ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta)^2}$

(iii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin 4x \, dx,$ (iv) $\int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx.$

3- حاصل کیجیے

(i) $\int \frac{\cos 7\theta - \cos 8\theta}{\cos 2\theta - \cos 3\theta} d\theta,$ (ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \cos x}{1 + \cos 2x} dx.$

مثلاًتی تفاعلون کا مکمل

4۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1 + \cos \alpha \sin 2\alpha} = \begin{cases} \alpha / \sin \alpha, & (0 < \alpha < \pi \text{ اگر}) \\ 1, & (\alpha = 0 \text{ اگر}) \end{cases}$$

5۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 - \sin x \cos \lambda} = (\pi - \lambda) \operatorname{cosec} \lambda, (0 < \lambda < \pi).$$

6۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta \cos^3 \theta d\theta}{\sqrt{1 + a^2 \cos^2 \theta}} = \frac{\sqrt{1 + a^2}}{2a^2} - \frac{\sinh^{-1} a}{2a^2}$$

7۔ ثابت کیجیے کہ اگر $a^2 > b^2$ ہو تو

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{(a + b \cos x)^2} = \frac{\pi a}{(a^2 - b^2)^{3/2}}.$$

8۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + 2 \cos x}{(2 + \cos x)^2} dx, \quad (ii) \int_0^{\pi} \frac{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}{a^4 \sin^2 x + b^4 \cos^2 x} dx.$$

$$(iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cosh^2 x - \cos^2 x}, \quad (iv) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x dx}{\sin^4 x + \cos^4 x}$$

9۔ ذیل تفاعلون کے مکمل نکالیے :

$$(i) \sqrt{1 + \sin x},$$

$$(ii) \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \sin x}},$$

$$(iii) \sqrt{1 + \sec x},$$

$$(iv) \sqrt{\sec x - 1},$$

$$(v) \frac{1}{\sin^4 x + \cos^4 x},$$

$$(vi) \sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}.$$

10۔ مکمل کیجیے

$$(i) \sec^2 x \log (1 + \sin^2 x),$$

$$(ii) \frac{\sin x \log (\sin x + \cos x)}{\cos^2 x}$$

$$(iii) \cos 2x \log (1 + \tan x),$$

$$(iv) \frac{\cosh x + \sinh x \sin x}{1 + \cos x}$$

11۔ حاصل کیجیے۔

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x} \tan x \, dx.$$

12۔ اگر $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^n \theta \, d\theta$ ہو تو ثابت کیجیے کہ کسی بھی مثبت کامل عدد n کے لیے

$$n(I_{n-1} + I_{n+1}) = 1$$

13۔ اگر

$$U_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^n x \, dx,$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$U_n + U_{n-2} = \frac{1}{n-1}$$

اور اس سے u_n کی قیمت نکالیے۔

14۔ اگر

$$u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \sin^n \theta \, d\theta$$

اور $n > 1$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$u_n = -\frac{n-1}{n} u_{n-2} + \frac{1}{n^2}$$

اور دکھائیے کہ

$$u_8 = \frac{149}{225}.$$

15۔ اگر

$$u_n = \int \cos n\theta \operatorname{cosec} \theta \, d\theta$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

مشقاتی تفاعلوں کا مکمل

$$u_n - u_{n-2} = \frac{2 \cos (n-1) \theta}{n-1}$$

اس سے یا کسی اور طریقے سے ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin 3\theta \sin 5\theta}{\sin \theta} d\theta = \frac{1}{105}$$

16۔ وہ تحویلی فارمولہ نکالیے جو کہ

$$I_{m,n} = \int \cos^m x \sin^n x dx$$

کا $I_{m,n-2}$ اور $I_{m-2,n}$ سے رابطہ قائم کرے۔ اس سے ذیل نتیجہ نکالیے

$$(m+n)(m+n-2) I_{m,n-2} = \{(n-1) \sin^2 x - (m-1) \cos^2 x\} \cos^{m-1} x \sin^{n-1} x + (m-1)(n-1) I_{m-2,n-2}$$

17۔ ذیل تحویلی فارمولے نکالیے:

$$(i) \int \sec^m \theta \operatorname{cosec}^n \theta d\theta$$

$$(ii) \int \tanh^n x dx.$$

18۔ اگر

$$u_n = \int \frac{dx}{\cosh^n x}$$

تو ثابت کیجیے کہ

$$(n-1) u_n = \frac{\tanh x}{\cosh^{n-2} x} + (n-2) u_{n-2}$$

اگر $n = 5$ ہو تو تکملہ u_5 حاصل کیجیے

19۔ ثابت کیجیے کہ اگر

$$u_n = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos nx}{1 - \cos x} dx$$

ہو اور $0 \leq n$ کا عدد ہو تو

$$u_{n+2} + u_n = 2u_{n+1}$$

ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 n\theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{n\pi}{2}$$

20۔ ثابت کیجیے کہ اگر n مثبت کا عدد ہو تو

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos(n-1)x - \cos nx}{1 - \cos x} dx = 2\pi$$

اس سے یہ نکالیے کہ

$$\int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin \frac{1}{2} nx}{\sin \frac{1}{2} x} \right)^2 dx = 2n\pi.$$

21۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin n\theta}{\sin \theta} d\theta = \begin{cases} 0 & \text{اگر } n \text{ جفت مثبت ہو} \\ \pi & \text{اگر } n \text{ طاق مثبت ہو} \end{cases}$$

کسی تحویلی فارمولے سے یا کسی اور طریقے سے ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 n\theta}{\sin \theta} d\theta = \pi -$$

ہوگا۔ اگر n مثبت کا عدد ہو۔

22۔ جب

$$u_n = \int_0^{\pi} \frac{x \sin nx}{\sin x} dx$$

تو $u_n - u_{n-2}$ کی قیمت نکال کر یا کسی اور طریقے سے u_n کے لیے تحویلی فارمولا نکالیے۔

منشیاتی تفاعلوں کا مکمل

ثابت کیجیے کہ اگر n مثبت طاق عدد ہو تو

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin nx}{\sin x} dx = \frac{\pi^2}{4}$$

اور اگر n جفت ہو تو

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin nx}{\sin x} dx$$

کی قیمت n کو لا انتہا بڑھانے پر $-\pi^2/2$ کی طرف مائل ہوتی ہے۔
23۔ اگر

$$I_n = \int_0^{\pi/2} (a \cos \theta + b \sin \theta)^n d\theta$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$I_n = \frac{1}{n} \left[ab(a^{n-2} + b^{n-2}) + (n-1)(a^2 + b^2)I_{n-2} \right]$$

اب I_5, I_4 حاصل کیجیے

$$a \cos \theta + b \sin \theta = r \sin(\alpha + \theta) \text{ یہاں}$$

24۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin 2\theta}, (ii) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a \cos^2 \theta + 2h \sin \theta \cos \theta + b \sin^2 \theta}, (ab - h^2) > 0$$

$$(iii) \int_0^2 \frac{dx}{(1 + \cos \alpha \cos x)^2}, 0 < \alpha < \pi; (iv) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(1 + e \cos x)^2}, e < 1$$

$$(v) \int_0^{4\pi} \frac{\sec^2 x dx}{\tan x - \tan \alpha}, \alpha > \frac{\pi}{4}$$

25۔ ذیل معین تکملے حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\pi/2} x \cot x dx,$$

$$(ii) \int_0^{\pi/2} x^2 \operatorname{cosec}^2 x dx$$

$$(iii) \int_0^{\pi/2} \frac{x^2 \cos x}{\sin^3 x} dx.$$

26۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\pi/2} \frac{x dx}{\cos x (\cos x + \sin x)}$$

$$(ii) \int_0^{\pi/2} \frac{x^2 (\sin 2x - \cos 2x)}{(1 + \sin 2x) \cos^2 x} dx.$$

27- حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x} dx,$$

$$(ii) \int_0^{\pi} \frac{x^2 \cos x}{(1+\sin x)^2} dx.$$

28- حاصل کیجیے

$$(i) \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{x \sin 2x}{\sin x + \cos x} dx,$$

$$(ii) \int_0^{\pi} \frac{x^2 \sin x dx}{(2x-\pi)(1+\cos^2 x)},$$

$$(iii) \int_0^{\pi} \frac{x^3 \cos^4 x \sin^2 x}{\pi^3 - 3\pi x + 3x^2} dx, \quad (iv) \int^{\pi} x \sin^6 x \cos^4 x dx.$$

$$(v) \int_0^{\pi} \frac{x^2 \sin 2x \sin (\frac{1}{2}\pi \cos x)}{2x - \pi} dx.$$

29- ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \sin 2nx \cot x dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\sin 2nx}{\sin x} = 2[\cos x + \cos 3x + \dots + \cos (2n-1)x] : \text{اشارہ}$$

30- ثابت کیجیے کہ

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \varphi(\sin 2x) \sin x dx &= \int_0^{\frac{1}{2}\pi} (\sin 2x) \cos x dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \varphi(\cos 2x) \cos x dx. \end{aligned}$$

جوابات

2. (i) $\pi/2ab$.

(ii) $\pi(a^2+b^2)/4a^2b^2$.

(iii) $1/3$.

(iv) $\frac{1}{2}[x + \log(\sin x + \cos x)]$.

3. (i) $\theta + \frac{2}{\pi} \sin 5\theta$.

(ii) $\frac{1}{2}[(\sqrt{2}-1) + \log(\sqrt{2}+1)]$.

8. (i) $1/2$.

(ii) $\frac{2\pi}{a^2+b^2}$.

(iii) $\frac{\pi}{\sinh 2\alpha}$, ($\alpha \neq 0$, اگر)

(iv) $\frac{\pi}{4}$.

9. (i) $-2\sqrt{1-\sin x}$.

(ii) $-2\sqrt{1-\sin x} - \sqrt{2} \log \tan(\frac{1}{2}\pi + \frac{1}{2}x)$.

$$(iii) 2 \tan^{-1} \sqrt{\sec x - 1}. \quad (iv) -2 \coth^{-1} \{\sqrt{(1 + \sec x)}\}.$$

$$(v) \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{\tan x - \cot x}{\sqrt{2}} \right)$$

$$(vi) \sqrt{2} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{\tan x} - \sqrt{\cot x}}{\sqrt{2}} \right).$$

$$10. (i) \tan x \log (1 + \sin^2 x) - 2x - \sqrt{2} \tan^{-1} (\cot x / \sqrt{2})$$

$$(ii) \sec x \log (\sin x + \cos x) + \log \frac{\sin \frac{1}{2}x + \cos \frac{1}{2}x}{\cos \frac{1}{2}x - \sin \frac{1}{2}x} \\ + \sqrt{2} \log \frac{\sin \frac{1}{2}x - (\sqrt{2} + 1) \cos \frac{1}{2}x}{\sin \frac{1}{2}x + (\sqrt{2} - 1) \cos \frac{1}{2}x}$$

$$(iii) \frac{1}{2} \sin 2x \log (1 + \tan x) - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \log \sin (x + \frac{1}{2}\pi).$$

$$(iv) \cosh x \tan \frac{1}{2}$$

$$11. \frac{1}{2}(\pi/\sqrt{3} - \log 2).$$

$$13. \frac{1}{2} \log (4/e).$$

$$17. (i) \int \sec^m \theta \operatorname{cosec}^n \theta d\theta = -\frac{1}{n-1} \sec^{m-1} \theta \operatorname{cosec}^{n-1} \theta \\ + \frac{m+n-2}{n-1} \int \sec^m \theta \operatorname{cosec}^{n-2} \theta d\theta.$$

$$(ii) \int \tanh^n x dx = -[1/(n-1)] \tanh^{n-1} x + \int \tanh^{n-2} x dx.$$

$$18. \frac{1}{7} \frac{\tanh x}{\cosh^2 x} + \frac{3}{8} \cdot \frac{\tanh x}{\cosh x} + \frac{3}{4} \tan^{-1} (e^x).$$

$$22. u_n = \frac{2}{(n-1)^2} [(n-1)x \sin (n-1)x + \cos (n-1)x - 1] + u_{n-1}$$

$$23. I_4 = ab(a^2 + b^2) + \frac{1}{4} \pi (a^2 + b^2)^2 \pi. \\ I_5 = ab(a^3 + b^3) + \frac{1}{4} \pi (a+b)(a^2 + b^2)[ab + 2(a^2 + b^2)].$$

$$24. (i) \frac{2\pi}{\sqrt[3]{3}}.$$

$$(ii) \frac{2\pi}{\sqrt{(ab-h^2)}}.$$

$$(iii) \frac{2\pi}{\sin^3 \alpha}$$

$$(iv) \frac{2\pi}{(1-e^2)^{3/2}}.$$

$$(v) \log \frac{\sin (\alpha - \frac{1}{4}\pi)}{\sin \alpha} - \frac{\pi}{4} \tan \alpha.$$

$$25. (i) \frac{\pi}{2} \log 2.$$

$$(ii) \pi \log 2.$$

$$(iii) -\frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{4} \pi \log 2.$$

$$26. (i) \frac{\pi}{2} \log 2.$$

$$(ii) \frac{\pi^2}{12} - \frac{\pi}{2} \log 2.$$

27 (i) π . (ii) $\pi(2-\pi)$.

28 (i) $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \log(\sqrt{2}-1)$ (ii) $\frac{\pi^2}{4}$.

(iii) $\frac{\pi^2}{32}$ (iv) $\frac{3\pi^2}{312}$

5

غیر ناطق تفاعلوں (Irrational Functions) کا تکمیل

5.1 - ایسے تفاعل کا تکمیل کرنا جو x اور خطی سرڈ $(ax+b)^{1/n}$ (linear surd)

دونوں کا تفاعل ہو، جہاں n کوئی مثبت کامل عدد ہے۔

عوضی $x^n = ax+b$ سے دیا ہوا تکملہ، کے ناطق تفاعل کے تکملے میں بدل جاتا ہے جسے باب 3 میں بتائے گئے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے x اور

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{1/n}$$

دونوں کے کسی تفاعل کا تکملہ بھی استعمال

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^n$$

کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
ذیل کی مثالوں سے یہ عمل سمجھ میں آجائے گا۔

تکلی احصاء مثالیں

180

1- حاصل کیجیے

$$\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{x+2}} dx$$

ہم رکھتے ہیں

$$\begin{aligned} x+2 &= y^3 \Rightarrow dx = 3y^2 dy \\ \therefore \int \frac{x^2}{\sqrt[3]{x+2}} dx &= \int \frac{(y^3-2)^2 \cdot 3y^2 dy}{y} \\ &= 3 \int (y^7 - 4y^4 + 4y) dy \\ &= 3 \left\{ \frac{y^8}{8} - \frac{4}{5} y^5 + 2y^2 \right\} \\ &= 3 \left\{ \frac{(x+2)^{8/3}}{8} - \frac{4}{5} (x+2)^{5/3} + 2(x+2)^{2/3} \right\} \\ &= 3(x+2)^{2/3} \left\{ \frac{(x+2)^2}{8} - \frac{4(x+2)}{5} + 2 \right\} \\ &= \frac{3}{40} (x+2)^{2/3} (5x^2 - 12x + 36) \end{aligned}$$

2- حاصل کیجیے

$$\int \frac{1}{\sqrt{(1+x)} - \sqrt[3]{1+x}} dx$$

ہم رکھتے ہیں

$$\begin{aligned} 1+x &= y^6 \Rightarrow dx = 6y^5 dy \\ \therefore \int \frac{dx}{\sqrt{(1+x)} + \sqrt[3]{1+x}} &= \int \frac{6y^5}{y^3 + y^2} dy = 6 \int \frac{y^3}{y+1} dy \\ &= 6 \int \left(y^2 - y + 1 - \frac{1}{y+1} \right) dy \\ &= 6 \left[\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + y - \log(y+1) \right] \\ &= 2\sqrt{(1+x)} - 3\sqrt[3]{1+x} + 6\sqrt[6]{1+x} \\ &\quad - 6 \log [1 + \sqrt[6]{1+x}]. \end{aligned}$$

غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

3۔ حاصل کیجیے

$$\int \sqrt{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)} \frac{dx}{x}$$

ہم رکھتے ہیں

$$\frac{1-x}{1+x} = y^2 \Rightarrow x = \frac{1-y^2}{1+y^2} \Rightarrow dx = -\frac{4y dy}{(1+y^2)^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \sqrt{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)} \frac{dx}{x} &= -4 \int \frac{y^2}{(1-y^2)(1+y^2)} dy \\ &= -2 \int \left(\frac{1}{1-y^2} - \frac{1}{1+y^2} \right) dy \\ &= -2 \int \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{1+y} \right) - \frac{1}{1+y^2} \right] dy \\ &= \log \frac{1-y}{1+y} + 2 \tan^{-1} y \\ &= \log \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} + 2 \tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)} \end{aligned}$$

مشقیں

1۔ ذیل تفاعلوں کے مکمل حاصل کیجیے

$$\begin{aligned} (i) & x \sqrt[3]{a+bx}, & (ii) & \frac{x^2}{\sqrt[3]{x+2}}, \\ (iii) & \frac{x}{(x+2)\sqrt{x+1}}, & (iv) & \frac{\sqrt{x}}{x-1} \end{aligned}$$

-2-

$$\begin{aligned} (i) & \frac{1}{x + \sqrt[3]{x}}, & (ii) & \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt[3]{x^2}}{1 + \sqrt[3]{x}}, \\ (iii) & \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x}}, & (iv) & \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x-1}}. \end{aligned}$$

- 3

$$(i) \frac{x^2}{\sqrt{(2x+3)}}, \quad (ii) \frac{x^2}{(x+3)\sqrt{(3x+4)}}$$

$$(iii) \frac{1}{(x^2+x^2)\sqrt{(1+x)}}, \quad (iv) \frac{x+1}{(x+2)(x+3)^{3/2}}$$

$$(v) \left(\frac{x+2}{2x+3}\right)^{1/2} \cdot \frac{1}{x}, \quad (vi) \sqrt{\left(\frac{1+x^2}{x^2-x^4}\right)}$$

4۔ حل کیجیے

$$(i) \int_0^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{(1+x)}}, \quad (ii) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2\sqrt{(1+x)}}$$

$$(iii) \int_8^{15} \frac{dx}{(x-3)\sqrt{(x+1)}}, \quad (iv) \int_3^8 \frac{2-3x}{x\sqrt{(1+x)}} dx.$$

جوابات

- (i) $3(4b^2x^3+abx-3a^3) \div (a+bx)/28b^3$. (ii) $\frac{2}{48}(x+2)^{2/3}(5x^2-12x+36)$

(iii) $2\sqrt{(x+1)}-4 \tan^{-1} \sqrt{(x+1)}$. (iv) $2\sqrt{x}+\log [(\sqrt{x}-1)/(\sqrt{x}+1)]$.
- (i) $\frac{5}{4} \log (1+\sqrt[4]{x^3})$.

(ii) $6 [\tan^{-1} y - y + \frac{1}{2}y^3 - \frac{3}{8}y^5 + \frac{1}{4}y^7 - \frac{1}{6}y^9], x = y^6$. جہاں

(iii) $2\sqrt{(1+x)}-3\sqrt[3]{(1+x)}+6\sqrt[4]{(1+x)}-6 \log [1+\sqrt[4]{(1+x)}]$.

(iv) $2 \log \frac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt[4]{x}+1} + 4\sqrt[4]{x} + \frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3}$.
- (i) $\frac{1}{8} (x^3-2x+6)\sqrt{(2x+3)}$.

(ii) $\frac{2}{27} (3x-35)\sqrt{(3x+4)} + \frac{18}{\sqrt{5}} \tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{3x+4}{5}\right)}$.

(iii) $-\left(\frac{3x+1}{x}\right) \frac{1}{\sqrt{(1+x)}} + \frac{3}{2} \log \frac{\sqrt{(1+x)}+1}{\sqrt{(1+x)}-1}$.

(iv) $-\frac{4}{\sqrt{(x+3)}} + \log \frac{\sqrt{(x+3)}+1}{\sqrt{(x+3)}-1}$.

(v) $\frac{1}{\sqrt{2}} \log \frac{1+\sqrt{2}y}{1-\sqrt{2}y} - \sqrt{\frac{2}{3}} \log \frac{\sqrt{3}y+\sqrt{2}}{\sqrt{3}y-\sqrt{2}}, y = \sqrt{\left(\frac{x+2}{2x-3}\right)}$ جہاں

غیر ملحق تفاضل کا مکمل

$$(vi) \tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)} + \frac{1}{2} \log \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}$$

$$4. (i) 2 \log (\sqrt{2}+1).$$

$$(ii) \sqrt{2} - \log (\sqrt{2}+1)$$

$$(iii) (\log 5 - \log 3)/2$$

$$(iv) 2 \log (3/2e^3).$$

متکمل 5.2

$$(i) \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx; \quad (ii) \int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$$

حاصل کرنا
اگر مثبت ہو، تو ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{\left[a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right)\right]} \\ &= \sqrt{a} \sqrt{\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a^2}\right]} \end{aligned}$$

(i) مان لیجیے کہ a اور $4ac-b^2$ دونوں مثبت ہیں۔ اب ہم لکھتے ہیں

$$(4ac-b^2)/4a^2 = k^2$$

اور $y = x + b/2a$ رکھنے پر ملتا ہے

$$\begin{aligned} \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx &= \sqrt{a} \int \sqrt{y^2+k^2} dy \\ &= \sqrt{a} \left[\frac{y\sqrt{y^2+k^2}}{2} + \frac{k^2}{2} \sinh^{-1} \frac{y}{k} \right] \end{aligned}$$

اور

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int \frac{dy}{\sqrt{y^2+k^2}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \sinh^{-1} \frac{y}{k}$$

(ii) مان لیجیے a مثبت اور $4ac-b^2$ منفی ہے۔ ہم لکھتے ہیں

$$(4ac-b^2)/4a^2 = -r^2$$

اور $y = x + b/2a$ رکھنے پر ملتا ہے۔

$$\int \sqrt{ax^2+bx+c} dx = \sqrt{a} \int \sqrt{y^2-r^2} dy$$

$$= \sqrt{a} \left[\frac{y \sqrt{(t^2 - t^2)}}{2} - \frac{t^2}{2} \cosh^{-1} \frac{y}{t} \right]$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int \frac{dy}{\sqrt{(y^2-t^2)}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cosh^{-1} \frac{y}{t} \text{ اور}$$

(iii) مان لیجیے کہ a منفی ہے

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{(-a)} \sqrt{\left[-x^2 - \frac{bx}{a} - \frac{c}{a}\right]} \\ &= \sqrt{(-a)} \sqrt{\left[\frac{b^2-4ac}{4a^2} - \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2\right]} \\ &= \sqrt{(-a)} \sqrt{\left[\left(\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2 - \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2\right]} \end{aligned}$$

ہم نے مان لیا ہے کہ $b^2 > 4ac$ کیونکہ اگر $b^2 < 4ac$ ہوتا تو خذ کے تحت بڑے بریکٹ کے اندر کا حصہ ہمیشہ منفی ہوتا۔
پہلے کی طرح سے ہم لکھتے ہیں

$$(b^2-4ac)/4a^2 = t^2$$

اور $y = x + b/2a$ لینے پر اس بار ملتا ہے

$$\begin{aligned} \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx &= \sqrt{(-a)} \int \sqrt{(t^2-y^2)} dy \\ &= \sqrt{(-a)} \left[\frac{y \sqrt{(t^2-y^2)}}{2} + \frac{t^2}{2} \sin^{-1} \frac{y}{t} \right] \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{\sqrt{(-a)}} \int \frac{dy}{\sqrt{(t^2-y^2)}} = \frac{1}{\sqrt{(-a)}} \sin^{-1} \frac{y}{t} \text{ اور}$$

مشقیں

1- تکمیل کیجیے

$$(i) \int \frac{1}{\sqrt{2x^2+3x+4}} dx \quad (ii) \int \sqrt{2x^2+3x+4} dx$$

غیر ملکی تفاعلوں کا مکمل

$$(iii) \frac{4}{\sqrt{(3x^2-4x+1)}}, \quad (iv) \sqrt{(3x^2-4x+1)}.$$

-2

$$(i) \frac{1}{\sqrt{(1+2x-3x^2)}}, \quad (ii) \sqrt{(1+2x-3x^2)},$$

$$(iii) \frac{1}{\sqrt{(5x-6-x^2)}}$$

جوابات

$$1. (i) \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh^{-1} \frac{4x+3}{\sqrt{23}}, \quad (ii) \frac{4x+3}{8} \sqrt{(2x^2+3x+4)} + \frac{23\sqrt{2}}{32} \sinh^{-1} \frac{4x+3}{\sqrt{23}},$$

$$(iii) \frac{4}{\sqrt{3}} \cosh^{-1} (3x-2), \quad (iv) \frac{3x-2}{6} \sqrt{(3x^2-4x+1)} - \frac{\sqrt{3}}{18} \cosh^{-1} (3x-2).$$

$$2. (i) \sqrt{\frac{1}{2}} \sin^{-1} [(3x-1)/2], \quad (ii) \frac{3x-1}{6} \sqrt{(1+2x-3x^2)} + \frac{2\sqrt{3}}{9} \sin^{-1} \left(\frac{3x-1}{2} \right)$$

$$(iii) \sin^{-1} (2x-5)$$

5.3 تفاعلوں

$$(i) \frac{Ax+B}{\sqrt{(ax^2+bx+c)}}, \quad (ii) (Ax+B) \sqrt{(ax^2+bx+c)}$$

کا تکمیل کرنا ہم دو مستقل λ اور μ ایسے معلوم کرتے ہیں کہ

$$Ax+B=\lambda(2ax+b)+\mu$$

جہاں $2ax+b$ تفاعل ax^2+bx+c کا تفرقی سر ہے۔ λ اور μ ذیل سے ملتے ہیں:

$$A=2a\lambda, \quad B=b\lambda+\mu,$$

$$\lambda = \frac{A}{2a}, \quad \mu = \frac{2aB - Ab}{2a}$$

(i) ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx &= \int \frac{\lambda(2ax+b)+\mu}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \\ &= \lambda \int (ax^2+bx+c)^{-\frac{1}{2}} (2ax+b) dx + \mu \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \\ &= 2\lambda (ax^2+bx+c)^{\frac{1}{2}} + \mu \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \end{aligned}$$

اور اس آخر والے تکملہ پر § 5.2 میں غور کیا جا چکا ہے۔
(ii) پھر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int (Ax+B)\sqrt{ax^2+bx+c} dx \\ &= \lambda \int (2ax+b)\sqrt{ax^2+bx+c} dx + \mu \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx \\ &= \frac{2\lambda}{3} (ax^2+bx+c)^{\frac{3}{2}} + \mu \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx, \end{aligned}$$

اور اس آخر والے تکملہ پر § 5.2 میں غور کیا جا چکا ہے۔

مشقیں

1. حاصل کیجیے

$$\begin{aligned} (i) \int x\sqrt{1+x-x^2} dx, \quad (ii) \int \frac{x}{\sqrt{8+x-x^2}} dx, \\ (iii) \int \frac{2x+3}{\sqrt{4x^2+5x+6}} dx, \quad (iv) \int \frac{x}{\sqrt{3x^2+2x+1}} dx. \end{aligned}$$

2. حاصل کیجیے

$$\begin{aligned} (i) \int \frac{x^2-2x+3}{\sqrt{x^2+1}} dx, \quad (ii) \int \frac{x^3-3}{\sqrt{x^2+2}} dx, \\ (iii) \int (2x-5)\sqrt{2+3x-x^2} dx. \end{aligned}$$

جوابات

$$1. (i) \frac{1}{24} (8x^3 - 2x - 11) \sqrt{(1+x-x^2)} + \frac{5}{16} \sin^{-1} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

$$(ii) -\sqrt{(8+x-x^2)} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2x-1}{\sqrt{33}}$$

$$(iii) \frac{\sqrt{(4x^2+5x+6)}}{2} + \frac{7}{8} \sinh^{-1} \frac{8x+5}{\sqrt{71}}.$$

$$(iv) \frac{\sqrt{(3x^2+2x+1)}}{3} - \frac{1}{3\sqrt{3}} \sinh^{-1} \frac{3x+1}{\sqrt{2}}.$$

$$2. (i) \frac{1}{2}(x-4)\sqrt{(x^2+1)} + \frac{8}{3} \sinh^{-1} x.$$

$$(ii) \frac{1}{2}(x^2-4)\sqrt{(x^2+2)} - 3 \sinh^{-1} (x/\sqrt{2}).$$

$$(iii) \frac{1}{6} (4x^2 - 18x + 1) \sqrt{(2+3x-x^2)} - \frac{17}{4} \sin^{-1} \frac{2x-3}{\sqrt{17}}.$$

5.4 - مکملہ

$$\int \frac{x^n}{\sqrt{(ax^2+bx+c)}} dx,$$

کے لیے تحویلی فارمولا حاصل کرنا جبکہ n مثبت کامل عدد ہو
مان نیچے کہ

$$I_n = \int \frac{x^n}{\sqrt{(ax^2+bx+c)}} dx.$$

اب ہم I_n کا I_{n-1} اور I_{n-2} سے رابطہ قائم کرتا ہوا تحویلی فارمولا حاصل کریں گے۔

ہم نوٹ کرتے ہیں کہ $2ax+b$ ، ax^2+bx+c کا تفرقی سر ہے۔
پہلے ہم دیکھتے ہیں

$$x^n = \frac{2ax+b-c}{2a} \cdot x^{n-1}$$

$$(i) \dots \dots I_n = \frac{1}{2a} \int \frac{(2ax+b)x^{n-1}}{\sqrt{(ax^2+bx+c)}} dx - \frac{b}{2a} \int \frac{x^{n-1}}{\sqrt{(ax^2+bx+c)}} dx.$$

دائیں طرف کے I_n کے قریب والے تکرار کا حصہ سے مکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} & \int \frac{2ax+b}{\sqrt{(ax^2+bx+c)}} x^{n-1} dx \\ &= 2\sqrt{(ax^2+bx+c)} x^{n-1} - 2 \int (n-1) x^{n-2} \sqrt{(ax^2+bx+c)} dx \\ &= 2\sqrt{(ax^2+bx+c)} x^{n-1} - 2(n-1) \int \frac{x^{n-2}(ax^2+bx+c)}{\sqrt{(ax^2+bx+c)}} dx \end{aligned}$$

$$(ii) \dots \dots = 2\sqrt{(ax^2+bx+c)} x^{n-1} - 2a(n-1)I_n - 2b(n-1)I_{n-1} - 2c(n-1)I_{n-2}$$

اب (i) اور (ii) سے ملتا ہے

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{a} \sqrt{(ax^2+bx+c)} x^{n-1} - (n-1)I_n - \frac{b(n-1)}{a}I_{n-1} \\ &\quad - \frac{c(n-1)}{a}I_{n-2} - \frac{b}{2a}I_{n-1}. \end{aligned}$$

اب $(n-1)I_n$ کو بائیں طرف منتقل کر کے n سے تقسیم کرنے پر ملتا ہے

$$(A) \dots I_n = \frac{\sqrt{(ax^2+bx+c)} x^{n-1}}{an} - \frac{b(2n-1)}{2an}I_{n-1} - \frac{c(n-1)}{an}I_{n-2}$$

جو کہ درکار تویلی فارمولا ہے۔

چونکہ I_1 اور I_0 پہلے ہی حاصل کیے جا چکے ہیں اس لیے اس تویلی فارمولے کے متواتر استعمال سے ہم I_2, I_3, I_4 وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں۔

مثال

حاصل کیجیے

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{(x^2-2x+2)}} dx.$$

غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

تحویلی فارمولا (A) میں $a = 1$, $b = 1$, اور $c = 2$ رکھنے پر ملتا ہے

$$\int \frac{x^n}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx = \frac{\sqrt{x^2-2x+2}}{n} \cdot x^{n-1} + \frac{2n-1}{n} \int \frac{x^{n-1}}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx - \frac{2(n-1)}{n} \int \frac{x^{n-2}}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx.$$

اب $n = 3$ اور $n = 2$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx = \frac{\sqrt{x^2-2x+2}}{3} x^3 + \frac{5}{3} \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx - \frac{4}{3} \int \frac{x}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx$$

$$(ii) \dots \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx = \frac{\sqrt{x^2-2x+2}}{2} x + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+2}} - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+2}}$$

اب

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx = \frac{1}{2} \int \left[\frac{2x-2}{\sqrt{x^2-2x+2}} + \frac{2}{\sqrt{[(x-1)^2+1]}} \right] dx$$

$$(iii) \dots = (x^2-2x+2)^{\frac{1}{2}} + \sinh^{-1}(x-1)$$

اور

$$(iv) \dots \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+2}} = \sinh^{-1}(x-1).$$

ساداتوں (i), (ii), (iii) اور (iv) کے اس نظام سے ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-2x+2}} dx = \frac{2x^3+5x+15}{6} \sqrt{x^2-2x+2} + \frac{5}{6} \sinh^{-1}(x-1)$$

نوٹ: کبھی کبھی $x^n/\sqrt{ax^2+bx+c}$ کا مکمل بہ آسانی ایک دوسرے طریقے سے کیا جاسکتا ہے جسے ہم اب بیان کریں گے۔
یہ طریقہ زیادہ عام مکمل

$$\int \frac{\varphi(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$$

کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، جہاں کہ x , $\varphi(x)$ کا کوئی کثیر رکنی (polynomial) φ ،
یہ طریقہ ذیل نتیجے پر منحصر ہے:-

اگر $\varphi(x)$ ڈگری n کا کثیر رکنی ہو، تو $(n-1)$ ڈگری کے ایک ایسے کثیر رکنی
 $f(x)$ اور ایک ایسے مستقل A کا وجود ہوتا ہے کہ

$$\int \frac{\varphi(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = f(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + A \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

دونوں طرف تفرق کرنے اور پھر $\sqrt{ax^2+bx+c}$ سے ضرب کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi(x) = f'(x)(ax^2+bx+c) + \frac{1}{2}(2ax+b)f(x) + A.$$

اس مساوات میں دونوں طرف کے حصے ڈگری n کے کثیر رکنی ہیں۔ دونوں جانب
مستقل جزو اور x , x^2 , x^3 وغیرہ کے ضربوں کی برابری کرنے پر ہمیں $n-1$ سطری
مساواتیں ملتی ہیں جن سے کثیر رکنی $f(x)$ کے n ضریب اور مستقل A یکتا طور پر حاصل
ہو جاتے ہیں۔ اس طرح $f(x)$ اور A مکمل طور پر مل جاتے ہیں۔
یہ طریقہ ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھائیں گے۔

مثال

حاصل کیجیے

$$\int \frac{x^3+5x^2-3x+4}{\sqrt{x^2+x+1}} dx.$$

یہاں $\varphi(x) = x^3+5x^2-3x+4$ تیسری ڈگری کا کثیر رکنی ہے۔ ہم لکھتے ہیں

$$\int \frac{x^3+5x^2-3x+4}{\sqrt{x^2+x+1}} dx = (Ax^2+Bx+C)\sqrt{x^2+x+1} + D \int \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx.$$

غیر ناظمی تفاعلوں کا مکمل

تفرق کر کے $\sqrt{x^2+x+1}$ سے ضرب دینے پر ہم پاتے ہیں

$$x^3+5x^2-3x+4 = (2Ax+B)(x^2+x+1) + \frac{1}{3}(Ax^2+Bx+C)(2x+1) + D.$$

پھر دونوں طرف x کی یکساں قوتوں کے ضریبوں کی برابری کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔

$$1 = 3A, \quad 5 = \frac{2}{3}A + 2B, \quad -3 = 2A + \frac{1}{3}B + C, \quad 4 = B + \frac{1}{3}C + D.$$

ان سے ہم پاتے ہیں

$$A = 1/3; B = 25/12; C = -163/24; D = 85/16.$$

ساتھ ہی

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{[(x+\frac{1}{2})^2 + (\sqrt{3}/2)^2]}}$$

$$= \sinh^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$$

$$\int \frac{x^3+5x^2-3x+4}{\sqrt{x^2+x+1}} dx = \left(\frac{x^2}{3} + \frac{25}{12}x - \frac{163}{24} \right) \sqrt{x^2+x+1} + \frac{85}{16} \sinh^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$$

مشقیں

1۔ ذیل تفاعلوں کے تکملے معلوم کیجیے

$$(i) \frac{x^3+4x^2-6x+3}{\sqrt{(5+6x-x^2)}}$$

$$(ii) \frac{x^4}{\sqrt{(3+2x+x^2)}}$$

$$(iii) \frac{x^3}{\sqrt{(ax^2+2bx+c)}}$$

2۔ تکملہ

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{(x^2+2x+2)}}$$

کو دو مختلف طریقوں سے حاصل کیجیے۔

جوابات

1. (i) $\frac{1}{4}(2x^3 + 27x + 227) \sqrt{5 + 6x - x^2} - 139 \sin^{-1} [(3-x)/\sqrt{14}]$.

(ii) $\frac{1}{4} (3x^3 - 7x^2 + 4x + 30) \sqrt{3 + 2x + x^2} - \frac{9}{2} \sinh^{-1} [(x+1)/\sqrt{2}]$.

(iii) $\frac{1}{6a^3} (2a^3x^3 - 5abx + 15b^2 - 4ac) \sqrt{ax^3 + 2bx + c}$
 $+ \frac{3abc - 5b^2}{2a^3} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^3 + 2bx + c}}$

2. $\frac{1}{4}(2x^3 - 5x + 7) \sqrt{x^3 + 2x + 2} + \frac{1}{4} \sinh^{-1} (x+1)$.

تکملہ 5.5

$$\int \frac{dx}{(Ax+B)\sqrt{ax^3+bx+c}}$$

حاصل کرنا

موضی $Ax+B = 1/t$ کے ذریعے دیا ہوا تکملہ ایسے تکملہ میں بدل جاتا ہے جس پر § 5.2 میں غور کیا جا چکا ہے۔

ہم پاتے ہیں

$$dx = -\frac{1}{At^2} dt,$$

$$x = \left(\frac{1}{t} - B\right) \frac{1}{A} = \frac{1-Bt}{At}$$

لہذا ہم پاتے ہیں

$$\int \frac{dx}{(Ax+B)\sqrt{ax^3+bx+c}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{[(aB^2 - bAB + cA^3)t^3 + (bA - 2aBt + a)]}}$$

اور اس طرح کے تکملہ پر § 5.2 میں غور ہو چکا ہے۔

مثال

حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{(2x^2+3x+4)}}$$

غیرناطق تفاعلوں کا مکمل

اب ہم $x + 1 = 1/y$ رکھنے پر پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{(2x^2+3x+4)}} &= - \int \frac{dy}{\sqrt{(3y^2-y+2)}} \\ &= - \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dy}{\sqrt{[(y-1/6)^2 + (\sqrt{23}/6)^2]}} \\ &= - \frac{1}{\sqrt{3}} \sinh^{-1} \frac{6y-1}{\sqrt{23}} \\ &= - \frac{1}{\sqrt{3}} \sinh^{-1} \left[\frac{5-x}{\sqrt{23}(x+1)} \right] \end{aligned}$$

نوٹ: اگر r مثبت کامل عدد ہو تو مکمل

$$\int \frac{dx}{(Ax+B)^r \sqrt{(ax^2+bx+c)}}$$

عوضی $1/t = Ax+B$ کے ذریعے بھی نکالا جاسکتا ہے۔
مشقیں

زیل تکملے حاصل کیجیے

1. (i) $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{(1-2x+3x^2)}}$, (ii) $\int \frac{dx}{(3+2x)\sqrt{(x^2+x+1)}}$
- (iii) $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{(x^2-1)}}$, (iv) $\int \frac{(x+1)dx}{(2+x)\sqrt{(2x^2-3x+1)}}$
2. (i) $\int \frac{1+2x}{(1+3x)\sqrt{(x^2+2x+5)}} dx$, (ii) $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} dx$,
- (iii) $\int \frac{x^2+2x-1}{(x+2)\sqrt{(2x^2+3x-4)}} dx$, (iv) $\int \frac{\sqrt{(1+x+x^2)}}{1+x} dx$,
3. (i) $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{[(x-a)(b-x)]}}$, (ii) $\int \frac{(x^2+1) dx}{x\sqrt{(4x^2+1)}}$,
- (iii) $\int \frac{x^3}{(x-1)\sqrt{(x^2-x+1)}} dx$, (iv) $\int \frac{dx}{(x+2)^2\sqrt{(3x+4x-5)}}$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{3} \sinh^{-1} \left[\frac{5x+1}{\sqrt{2(2-x)}} \right]$.
 (ii) $-\frac{1}{\sqrt{7}} \sinh^{-1} \left[\frac{1-4x}{\sqrt{3(3+2x)}} \right]$. (iii) $\sqrt{\left(\frac{x-1}{x+1} \right)}$.
 (iv) $\frac{1}{\sqrt{2}} \cosh^{-1} (4x-3) + \frac{1}{\sqrt{15}} \cosh^{-1} \left(\frac{8-11x}{2+x} \right)$
2. (i) $\frac{2}{3} \sinh^{-1} \frac{x+1}{2} - \frac{1}{3\sqrt{40}} \sinh^{-1} \left(\frac{7+x}{1+3x} \right)$
 (ii) $\sqrt{(x^2+1)} - \operatorname{cosech}^{-1} x$.
 (iii) $\frac{1}{2} \sqrt{(2x^2+3x-4)} - \frac{5}{4\sqrt{2}} \cosh^{-1} \frac{4x+3}{\sqrt{41}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{5x+14}{\sqrt{41}(x+2)}$.
 (iv) $\sqrt{(x^2+x+1)} - \frac{1}{2} \sinh^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} - \sinh^{-1} \left\{ \frac{1-x}{\sqrt{3(1+x)}} \right\}$.
3. (i) $\frac{2}{a-b} \sqrt{\left(\frac{b-x}{x-a} \right)}$ (ii) $\frac{1}{4} \cdot \sqrt{(4x^2+1)} - \sinh^{-1} \left(\frac{1}{2x} \right)$.
 (iii) $\frac{1}{4} (2x+7) \sqrt{(x^2-x+1)} + \frac{11}{8} \sinh^{-1} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} - \sinh^{-1} \left[\frac{x+1}{\sqrt{3(x-1)}} \right]$
 (iv) $\frac{\sqrt{(3x^2+4x-5)}}{x+2} + 4 \sin^{-1} \frac{4x+9}{\sqrt{19(x+2)}}$

تکمیلہ -5-6

$$\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)\sqrt{(Ax^2+Bx+C)}}$$

حاصل کرنا

اس صورت میں مناسب عوضی

$$\frac{Ax^2+Bx+C}{ax^2+bx+c} = y^2.$$

ہے۔ اب ایک مثال سے یہ طریقہ سمجھائیں گے۔

غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

مثال

حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

ہم رکھتے ہیں

$$\frac{1-x^2}{1+x^2} = y^2 \Rightarrow x^2 = \frac{1-y^2}{1+y^2}$$

$$\Rightarrow 2x dx = -\frac{4y dy}{(1+y^2)^2}$$

ساتھ ہی

$$1+x^2 = \frac{2}{1+y^2} \text{ اور } 1-x^2 = \frac{2y^2}{1+y^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \sqrt{\frac{1-x^2}{1+x^2}} \end{aligned}$$

مشقیں

ذیل تکلیف حاصل کیجیے:-

1. (i) $\int \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{(x^2+1)}}$ (ii) $\int \frac{dx}{(2x^2+3)\sqrt{(3x^2-4)}}$
- (iii) $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{(x^2+1)}}$ (iv) $\int \frac{(x+1) dx}{(x^2+4)\sqrt{(x^2+9)}}$
2. (i) $\int \frac{(x^2+2x+3) dx}{(x^2+1)\sqrt{(x^2-2)}}$ (ii) $\int \frac{(x^3+x^2+x+1)dx}{(x^3+2)\sqrt{(x^3-3)}}$
- (iii) $\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2+a^2)\sqrt{(x^2+b^2)}}$ (iv) $\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{(1-x^2)}}$
($a^2 < b^2$)

جوابات

1. (i) $-\frac{1}{\sqrt{2}} \sinh^{-1} \sqrt{\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)}$. (ii) $\frac{1}{\sqrt{51}} \sinh^{-1} \sqrt{\left(\frac{9x^2-12}{8x^2+12}\right)}$.
- (iii) $\frac{\sqrt{(1+x^2)}}{x}$. (iv) $\frac{\sqrt{5}}{10} \log \frac{\sqrt{(x^2+9)}-\sqrt{5}}{\sqrt{(x^2+9)}+\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{5}}{10} \tan^{-1} \frac{\sqrt{5}x}{2\sqrt{(x^2+9)}}$.
2. (i) $\cosh^{-1} \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{x^2-2}{3}\right)} + \frac{2}{\sqrt{3}} \sinh^{-1} \sqrt{\left(\frac{x^2-2}{2x^2+2}\right)}$.
- (ii) $\sqrt{(x^2-3)} - \frac{1}{\sqrt{5}} \tan^{-1} \sqrt{\left(\frac{x^2-3}{5}\right)} + \cosh^{-1} \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{10}} \sinh^{-1} \sqrt{\left(\frac{2x^2-6}{3x^2+6}\right)}$.
- (iii) $\frac{1}{a\sqrt{(b^2-a^2)}} \cos^{-1} \left(\frac{a}{b}\right)$. (iv) $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$.

5.7- مثلثاتی استحالوں (trigonometric transformations) کے ذریعہ جبری غیرناطق تفاعلوں کا مکمل :

کچھ حالات میں، جبری غیرناطق تفاعلوں کے مکمل میں مثلثاتی استحالوں سے بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں پہلے بھی 2.4 § میں آچکی ہیں۔ ایسے تفاعلوں کے مکمل میں جن میں

$$\sqrt{(x^2-a^2)} \text{ یا } \sqrt{(a^2+x^2)} \text{ یا } \sqrt{(a^2-x^2)}$$

ہوتے ہوں، ان کے مکمل کے لیے ترتیب وار استحالے

$$r = a \sec \theta \quad x = a \tan \theta \quad x = a \sin \theta$$

کارآمد ہوتے ہیں۔

غیر نا طق تفاعلوں کا مکمل

جن تفاعلوں میں

$$\sqrt{x^2 - a^2} \quad \text{یا} \quad \sqrt{a^2 + x^2}$$

ہوتے ہیں ان کے مکمل کے لیے ترتیب وار استحالے

$$x = a \cosh \theta \quad \text{اور} \quad x = a \sinh \theta,$$

بھی کارآمد ہوتے ہیں۔

مثالیں

1. حاصل کیجیے

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx.$$

$x = \sin \theta$ رکھنے پر دیا ہوا مکملہ

$$= \int \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta = -\cot \theta = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$$

2. حاصل کیجیے

$$\int_0^1 x \sqrt{\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)} dx.$$

ہم رکھتے ہیں

$$x^2 = \cos \theta \Rightarrow 2x dx = -\sin \theta d\theta.$$

اب $x = 0$ پر $\theta = \pi/2$ اور $x = 1$ پر $\theta = 0$ ۔ لہذا دیا ہوا مکملہ

$$= -\int_{\pi/2}^0 \sqrt{\left(\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}\right)} \frac{\sin \theta}{2} d\theta$$

$$= -\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta$$

$$= -\int_0^{\pi/2} \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1-\cos \theta) d\theta = \frac{\pi-2}{4}$$

3۔ حاصل کیجیے

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}}$$

$x = \tan \theta$ رکھنے پر دیا ہوا آئندہ

$$= \int \cos \theta d\theta = \sin \theta = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

مشقیں

1۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx,$$

$$(ii) \int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}}$$

$$(iii) \int \frac{1}{(2ax+x^2)^{3/2}} dx,$$

$$(iv) \int \frac{dx}{(x^2+2x+10)^{3/2}},$$

- 2

$$(i) \int x \sqrt{\left(\frac{1-x}{1+x} \right)} dx,$$

$$(ii) \int \frac{\sqrt{(x^2-a^2)}}{x} dx,$$

$$(iii) \int_a^\beta \frac{dx}{\sqrt{[(x-a)(\beta-x)]}}, (\beta > a),$$

$$(iv) \int \frac{dx}{(x^2-a^2)^{3/2}},$$

$$(v) \int \frac{(1+x \cos \alpha) dx}{(1+2x \cos \alpha + x^2)^{3/2}}.$$

3۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(1-2x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2} \log(2+\sqrt{3})$$

جوابات

$$1. (i) - \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$$

$$(ii) \frac{1}{4} \sqrt{4+x^2},$$

$$(iii) - \frac{1}{a^3} \cdot \frac{a+x}{\sqrt{2ax+x^2}}$$

$$(iv) \frac{1}{9} \cdot \frac{x+1}{\sqrt{(x^2+2x+10)}}.$$

غیر ناطق تفاعلوں کا تکمل

2. (i) $\frac{1}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{2} (x-2) \sqrt{1-x^2}$.

(ii) $a\sqrt{x^2-a^2} - a \cos^{-1} (a/x)$.

(iii) π .

(iv) $-\frac{x}{a^2\sqrt{x^2-a^2}}$.

(v) $\frac{x}{\sqrt{x^2+2x \cos \alpha + 1}}$

5.8 - تفاعل $x^m(a+bx^n)^r$ کا تکمل کرنا جبکہ p, n, m سبھی ناطق

(rational) نمبر ہوں۔ ہم ان مختلف صورتوں پر غور کریں گے جن میں کہ $x^m(a+bx^n)^p$ کا تکمل ابتدائی تفاعلوں کے ارکان میں کی جاسکتی ہے۔

I اگر p مثبت کامل عدد ہو، تو دو رکنی فارمولے سے تکالیف کو $(p+1)$ ارکان کے جوڑ کی شکل میں رکھ کر ہر رکن کا تکمل کر سکتے ہیں۔

II مان لیجیے p منفی کامل عدد ہے، $-q$ کہہ لیجیے جہاں q مثبت کامل عدد ہے۔ اب ہم m اور n کو یوں لکھتے ہیں کہ ان کا نسب نما ایک ہی ہو۔ مان لیجیے

$$m = \frac{r}{s}, \quad n = \frac{t}{s}$$

جہاں s مثبت ہے اور r, t مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں۔ اب عوضی $x^{1/s} = y$ کرنے پر، $x = y^s$ ، اس لیے

$$\begin{aligned} \therefore \int x^m(a+bx^n)^p dx &= \int x^{r/s} (a+bx^{t/s})^p dx \\ &= \int \frac{y^r \cdot s y^{s-1}}{(a+by^t)^q} dy = s \int \frac{y^{r+s-1}}{(a+by^t)^q} dy, \end{aligned}$$

جو کہ باب 3 میں بتائے گئے طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے کیوں کہ اس میں تکالیف y کا ناطق تفاعل ہے۔

III مان لیجیے p ایک ناطق نمبر ہے، یعنی r/s جہاں s مثبت ہے۔ عوضی $(a+bx^n)^{y^s} = y$ کرنے پر $a+bx^n = y^s$

$$\begin{aligned} \therefore \int x^m (a+bx^n)^{r/s} dx &= \int \frac{x^m \cdot y^r \cdot sy^{s-1}}{nbx^{n-1}} dy \\ &= \frac{s}{nb} \int \left(\frac{y^s - a}{b} \right)^{\frac{m-n+1}{n}} y^{r+s-1} dy \\ &= \frac{s}{nb} \int \left(\frac{y^s - a}{b} \right)^{\frac{m+1}{n}-1} y^{r+s-1} dy \end{aligned}$$

اد پر کی پہلی اور دوسری صورتوں (اور) سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ
کے کامل عدد ہونے پر (مثبت یا منفی) یہ تکملہ حاصل ہو سکتا ہے۔
IV ہم دیکھتے ہیں

$$\begin{aligned} x^m (a+bx^n)^p &= x^m [x^n (b+ax^{-n})]^p \\ &= x^{m+np} (b+ax^{-n})^p \end{aligned}$$

اب اد پر صورت III میں حاصل نتیجے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر $\frac{m+np+1}{n}$ یعنی $\frac{m+1}{n} +$ عدد صحیح ہو تو $x^m (a+bx^n)^p$ کا تکملہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ $\int x^m (a+bx^n)^p dx$ اس وقت بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جب کہ $\frac{m+1}{n} + p$ کامل عدد ہو، مثبت یا منفی۔

اد پر کی بحث سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر
(i) p کامل عدد ہو۔

یا (ii) $(m+1)/n$ کامل عدد ہو۔

یا (iii) $m+1)/n + p$ کامل عدد ہو۔

تو تکملہ

خیزنا طق تفاعلوں کا تکمل

$$\int x^m (a+bx^n)^p dx$$

حاصل کر سکتے ہیں

نوٹ : یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب p یا $(m+1)/n$ مثبت کامل عدد ہو یا $(m+1)/n + p$ نفی کامل عدد ہو تو تکمل بہت آسان ہوتا ہے کیوں کہ ایسی صورتوں میں تکاملیہ کو متناہی تعداد میں ارکان کے جوڑ کی طرح رکھ سکتے ہیں اور ہر رکن کا تکمل ہو سکتا ہے۔ جب p یا $(m+1)/n$ نفی کامل عدد ہوں یا $(m+1)/n + p$ مثبت کامل عدد ہو، تب تکمل نسبتاً مشکل ہے کیوں کہ ان صورتوں میں تکاملیہ کو جزوی کسروں میں توڑنا پڑتا ہے § 5.9 میں کچھ تحویلی فارمولے حاصل کیے جائیں گے جو کہ ایسی صورت میں کارآمد ہوتے ہیں۔

مثالیں

1۔ حاصل کیجیے

$$\int \sqrt{x} (2 + \sqrt[3]{x})^2 dx.$$

ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x} (2 + \sqrt[3]{x})^2 dx &= \int \sqrt{x} \left[4 + x^{\frac{2}{3}} + 4x^{\frac{1}{3}} \right] dx \\ &= \int \left(4x^{\frac{1}{2}} + 4x^{\frac{7}{6}} + 4x^{\frac{5}{6}} \right) dx \\ &= \frac{8}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{24}{13} x^{\frac{13}{6}} + \frac{24}{11} x^{\frac{11}{6}} \end{aligned}$$

2۔ حاصل کیجیے

$$\int \sqrt{x} (1 + \sqrt[3]{x})^{-2} dx.$$

یہاں $p = -2$ نفی عدد صحیح ہے۔

چونکہ $m = \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ ، $n = \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ ، اس لیے ہم رکھتے ہیں

$$x^{\frac{1}{6}} = y \text{ so that } x = y^6$$

$$\therefore \int \sqrt{x(1+\sqrt[3]{x})^{-2}} dx = \int \frac{y^3 \cdot 6y^5}{(1+y^2)^2} dx = 6 \int \frac{y^8}{(1+y^2)^2} dy.$$

اب

$$\begin{aligned} \frac{y^8}{(1+y^2)^2} &= y^4 - 2y^2 + 3 - \frac{4y^2+3}{(1+y^2)^2} \\ &= y^4 - 2y^2 + 3 - \frac{4(y^2+1)-1}{(1+y^2)^2} \\ &= y^4 - 2y^2 + 3 - \frac{4}{1+y^2} + \frac{1}{(1+y^2)^2}. \end{aligned}$$

اس لیے

$$\int \frac{y^8}{(1+y^2)^2} dy = \frac{1}{5} y^5 - \frac{2}{3} y^3 + 3y - 4 \tan^{-1} y + \int \frac{1}{(1+y^2)^2} dy.$$

دائیں طرف کے تیسرے کو نکالنے کے لیے ہم رکھتے ہیں $y = \tan \theta$ اور ہمیں ملتا ہے

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+y^2)^2} dy &= \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} (\theta + \sin \theta \cos \theta) = \frac{1}{2} \left[\tan^{-1} y + \frac{y}{1+y^2} \right]. \end{aligned}$$

$$\therefore \int \sqrt{x(1+\sqrt[3]{x})^{-2}} dx = 6 \left[\frac{1}{5} y^5 - \frac{2}{3} y^3 + 3y - \frac{7}{2} \tan^{-1} y + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{1+y^2} \right].$$

جہاں کہ $y = \sqrt[6]{x}$ حاصل کیجیے

$$\int x^4 (1+x^{\frac{5}{2}})^{\frac{1}{2}} dx.$$

- غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

یہاں $m=4$, $n=\frac{5}{2}$, اس لیے $(m+1)/n=2$ جو کہ مثبت کامل عدد ہے۔
ہم رکھتے ہیں

$$1+x^{\frac{5}{2}}=y^2, \quad \therefore \frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}} dx = 2y dy.$$

$$\begin{aligned} \int x^4(1+x^{\frac{5}{2}})^{\frac{1}{2}} dx &= \int x^4 \cdot y \cdot \frac{4y}{5x^{\frac{3}{2}}} dy \\ &= \frac{4}{5} \int y^2 x^{\frac{5}{2}} dy = \frac{4}{5} \int y^2(y^2-1) dy = \frac{4y^3(3y^2-5)}{75} \end{aligned}$$

$$y^2 = 1+x^{\frac{5}{2}}$$

4- حاصل کیجیے

$$\int \frac{1}{\sqrt[5]{x(1+x^5)}} dx.$$

ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{\sqrt[5]{x(1+x^5)}} = x^{-\frac{1}{5}}(1+x^5)^{-\frac{1}{5}}$$

$$\frac{m+1}{n} + p = \frac{-\frac{1}{5}+1}{5} - \frac{5}{4} = -1 \quad \text{یہاں}$$

جو کہ منفی کامل عدد ہے ہم لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} x^{-\frac{1}{5}}(1+x^5)^{-\frac{1}{5}} &= x^{-\frac{1}{5}} x^{-1\frac{5}{4}} (1+x^5)^{-\frac{1}{5}} \\ &= x^{-4}(1+x^5)^{-\frac{1}{5}}. \end{aligned}$$

اب $1+x^5=y^4$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int x^{-4}(1+x^5)^{-\frac{1}{5}} dx = -\frac{4}{3} \int \frac{1}{y^2} dy = \frac{4}{3y} = \frac{4}{3} \frac{1}{(1+x^5)^{\frac{1}{4}}}.$$

5۔ حاصل کیجیے

$$\int \sqrt{x(1+x^3)}^{\frac{1}{2}} dx.$$

یہاں

$$(m+1)/n+p=1$$

جو کہ مثبت کامل عدد ہے۔ ہم لکھتے ہیں

$$\sqrt{x(1+x^3)}^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x} \cdot x^{\frac{3}{2}} (1+x^{-3})^{\frac{1}{2}} = x^2 (1+x^{-3})^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{اب } y = 1+x^{-3} \text{ رکھنے پر}$$

$$\int x^2 (1+x^{-3})^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{2}{3} \int \frac{y^{\frac{1}{2}}}{(y-1)^{\frac{3}{2}}} dy.$$

اب

$$\frac{y^{\frac{1}{2}}}{(y-1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y^{\frac{1}{2}}}{(y+1)^{\frac{3}{2}}(y-1)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{4(y+1)} + \frac{1}{4(y+1)^3} + \frac{1}{4(y-1)} + \frac{1}{4(y-1)^3}.$$

$$\therefore \int \frac{y^{\frac{1}{2}}}{(y-1)^{\frac{3}{2}}} dy = \frac{1}{4} \log \frac{y-1}{y+1} - \frac{1}{4} \left[\frac{1}{y+1} + \frac{1}{y-1} \right]$$

اس طرح تکمیل پورا ہو گیا

مشقیں

ذیل کا تکمیل کیجیے

1.

(i) $\frac{x^3}{\sqrt{(1+x^3)}}$	(ii) $\frac{x^4}{\sqrt{(1+x^3)}}$	(iii) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{(a^2-x^3)}}$
(iv) $\frac{1}{x^3 \sqrt{(x^3+a^3)}}$	(v) $x^2(1+x^3)^{\frac{1}{2}}$	(vi) $(1-x^4)^{-\frac{1}{2}}$
(vii) $x(1+x^3)^{\frac{1}{2}}$	(viii) $\frac{x^2}{\sqrt{(1-x^3)}}$	

غیر ناظم تفاعلوں کا مکمل

$$(i) \frac{x^4}{\sqrt{(4+9x^3)}}, \quad (ii) x^3(x^3-1)^{-\frac{1}{3}} \quad 2.$$

$$(iii) x^3(1+x^3)^{\frac{2}{3}}, \quad (iv) \frac{1}{x^3(1+x^3)^{\frac{2}{3}}}.$$

3- حاصل کیجیے

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x^2 \sqrt{(1-x^3)}}$$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{3}(x^3-2)\sqrt{(1+x^3)}$. (ii) $\frac{1}{3} \sinh^{-1} x^3$.
- (iii) $\frac{1}{3} \sin^{-1} (x/a)^{3/2}$
- (iv) $-(8x^4-4a^2x^3+3a^4)\sqrt{(a^3+x^3)}/15a^3x^3$.
- (v) $\frac{1}{12} (4x^3-3)(1+x^3)^{\frac{5}{3}}$.
- (vi) $-\frac{1}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{y^2-1}{\sqrt{2}y} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \frac{y^3-\sqrt{2}y+1}{y^3+\sqrt{2}y+1}$,
where $y = \sqrt[3]{(1-x^4)}/x$.
- (vii) $-\frac{y}{3(y^3-1)} + \frac{1}{9} \log \frac{\sqrt{(y^3+y+1)}}{y-1} + \frac{\sqrt{3}}{9} \tan^{-1} \frac{2y+1}{\sqrt{3}}$,
where $y = \sqrt[3]{(1+x^3)}/x$.
- (viii) $-\frac{5}{6} \cdot \frac{y}{(y^3+1)^3} - \frac{5}{24} \cdot \frac{y}{(y^3+1)^2} - \frac{5}{16} \left[\tan^{-1} y + \frac{y}{1+y^2} \right]$,
where $y = \sqrt{(1-x^2)}/x$.
2. (i) $\frac{4}{9} \left(\frac{y}{(y^3-9)^2} - \frac{1}{6} \cdot \frac{y}{y^3-9} - \frac{1}{36} \log \frac{y-3}{y+3} \right)$,
where $y = \sqrt{(4+9x^3)}/x$.
- (ii) $\frac{1}{20} (5x^3+6x^3+9)(x^3-1)^{\frac{3}{2}}$
- (iii) $(1+x^3)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{(1+x^3)^2}{13} - \frac{2(1+x^3)}{11} + \frac{1}{9} \right)$.
- (iv) $(8x^4+4x^3-1)/3x^3\sqrt{(1+x^3)}$.
3. $2\sqrt{3}$.

5-9 تکمیل

$$\int x^m(a+bx^n)^p dx.$$

کے لیے تحویلی فارمولا نکالنا
ہم دیکھیں گے کہ اس کا ذیل کے چھ میں سے کسی تکملہ سے بھی رابطہ قائم

ہو سکتا ہے:

$$\begin{aligned} (A) \int x^m(a+bx^n)^{p-1} dx. & \quad (B) \int x^m(a+bx^n)^{p+1} dx. \\ (C) \int x^{m-n}(a+bx^n)^p dx. & \quad (D) \int x^{m+n}(a+bx^n)^p dx. \\ (E) \int x^{m-n}(a+bx^n)^{p+1} dx. & \quad (F) \int x^{m+n}(a+bx^n)^{p-1} dx. \end{aligned}$$

ان توبلی فارمولوں کو حاصل کرنے کے ہم دو طریقے بتائیں گے۔
حصہ سے تکمل کا فارمولا لگانے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x^m(a+bx^n)^p dx &= \frac{x^{m+1}}{m+1} (a+bx^n)^p - \frac{nbp}{m+1} \int x^{m+1}(a+bx^n)^{p-1} x^{n-1} dx \\ (F) \dots \dots \dots &= \frac{x^{m+1}}{m+1} (a+bx^n)^p - \frac{nbp}{m+1} \int x^{m+n}(a+bx^n)^{p-1} dx, \end{aligned}$$

جو کہ توبلی فارمولا (F) ہے اور تب مفید ہوتا ہے جب p مثبت ہو
ہم کہتے ہیں

$$\begin{aligned} x^{m+n}(a+bx^n)^{p-1} &= \frac{x^m}{b} (a+bx^n-a)(a+bx^n)^{p-1} \\ &= \frac{x^m(a+bx^n)^p}{b} - \frac{a}{b} x^m(a+bx^n)^{p-1}. \end{aligned}$$

اس قیمت کو (F) کے داہنی طرف کے سکا ملیہ کی جگہ رکھ کر منتقل کرنے پر ہم
پاتے ہیں

$$\begin{aligned} (A) \int x^m(a+bx^n)^p dx &= \frac{x^{m+1}(a+bx^n)^p}{np+m+1} + \frac{a x^m}{np+m+1} \int x^m(a+bx^n)^{p-1} dx, \end{aligned}$$

جو کہ توبلی فارمولا (A) ہے۔
پھر (F) میں m کی جگہ $m-n$ اور p کی جگہ $p+1$ رکھنے اور منتقل کرنے
پر ہم پاتے ہیں

$$(E) \int x^m (a + bx^n)^p dx = \frac{x^{m-n+1} (a + bx^n)^{p+1}}{nb(p+1)} - \frac{m-n+1}{nb(p+1)} \int x^{m-n} (a + bx^n)^{p+1} dx,$$

جو کہ اس وقت کارآمد ہے جب منفی ہو۔
اب (A) میں p کی جگہ $p+1$ رکھنے اور مکمل منتقل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(B) \int x^m (a + bx^n)^p dx = -\frac{x^{m+1} (a + bx^n)^{p+1}}{an(p+1)} + \frac{n(p+1) + m + 1}{an(p+1)} \int x^m (a + bx^n)^{p+1} dx,$$

جو کہ تخیلی فارمولا (B) ہے۔
اب تخیلی فارمولے (C) اور (D) حاصل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} & \left[xp_{a(u x q + v) u x} \int \frac{1+d}{(1+u-w)q} - \right. \\ & \quad \left. xp_{a(u x q + v) u - w x} \int \frac{1+d}{(1+u-w)v} - \frac{1+d}{1+a(u x q + v)_{1+u-w x}} \right] \frac{qu}{1} = \\ & \left[xp_{a(u x q + v) (u x q + v)_{1-w x}} \int \frac{1+d}{1+u-w} - \right. \\ & \quad \left. \frac{1+d}{1+a(u x q + v)_{1+u-w x}} \right] \frac{qu}{1} = \\ & \left[xp_{1+a(u x q + v) u - w x} \int \frac{1+d}{(1+u-w)} - \frac{1+d}{1+a(u x q + v)_{1+u-w x}} \right] \frac{qu}{1} = \\ & \quad xp_{a(u x q + v)_{1-u x q u} 1+u-w x} \int \frac{qu}{1} = xp_{a(u x q + v) u x} \int \end{aligned}$$

اب سب سے داہنی طرف کے مکمل کو بائیں طرف منتقل کرنے اور

$$1 + \frac{(m-n+1)}{n(p+1)}$$

سے تقسیم کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(C) \int x^m(a+bx^n)^p dx$$

$$= \frac{x^{m+n+1}(a+bx^n)^{p+1}}{b(np+m+1)} - \frac{a(m-n+1)}{b(np+m+1)} \int x^{m-n}(a+bx^n)^p dx,$$

جو کہ تحویلی فارمولا (C) ہے۔
اب فارمولے (C) میں 'm' کی جگہ m+n لکھنے پر اور (C) کے دونوں
سیکے منتقل کرنے پر ہمیں ذیل تحویلی فارمولا ملتا ہے

$$(D) \int x^m(a+bx^n)^p dx$$

$$= \frac{x^{m+1}(a+bx^n)^{p+1}}{a(m+1)} - \frac{b(np+m+n+1)}{a(m+1)} \int x^{m+n}(a+bx^n)^p dx,$$

جو کہ تحویلی فارمولا (D) ہے۔

دوسرا طریقہ

ان چھ تحویلی فارمولوں میں سے کسی کو بھی حاصل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$P = x^\lambda + 1(a+bx^n)^\mu + 1$$

جہاں λ اور μ اُن دو تفاعلوں میں x اور $(a+bx^n)$ کی کتر قیمتیں ہیں
جن کے تکملوں میں رابطہ چاہیے ہے۔

dP/dx معلوم کیجیے اور اُسے دونوں تکامیلوں کے خلی مرکب

کی طرح لکھیے۔ اب تکمل کرنے پر رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔

مثال: مثال کے طور پر ہم ذیل دو تکملوں

$$\int x^m(a+bx^n)^{p-1} dx \text{ اور } \int x^m(a+bx^n)^p dx$$

میں رابطہ قائم کرتے ہیں۔

غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

$$\lambda = m, \mu = p-1.$$

یہاں

$$P = x^{m+1}(a+bx^n)^p.$$

اس لیے

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dx} &= (m+1)x^m(a+bx^n)^p + pnbx^{m+n}(a+bx^n)^{p-1} \\ &= (m+1)x^m(a+bx^n)^p + pnx^m(a+bx^n-a)(a+bx^n)^{p-1} \\ &= (m+1)x^m(a+bx^n)^p + pnx^m(a+bx^n)^p - pna x^m(a+bx^n)^{p-1} \\ &= (m+1+pn)x^m(a+bx^n)^p - pna x^m(a+bx^n)^{p-1} \end{aligned}$$

تکمیل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} P &= (m+1+pn) \int x^m(a+bx^n)^p dx - pna \int x^m(a+bx^n)^{p-1} dx \\ \Rightarrow \int x^m(a+bx^n)^p dx &= \frac{x^{m+1}(a+bx^n)^p}{m+1+pn} \\ &\quad + \frac{apn}{m+1+pn} \int x^m(a+bx^n)^{p-1} dx, \end{aligned}$$

جو کہ درکار تخیلی فارمولا ہے۔

ایک ضروری نوٹ: طالب علم کے لیے یہ یاد رکھنا چاہیے ہوگا کہ x^m کی قوت m میں صرف دوڑکنی $(a+bx^n)$ میں آنے والے x^n کی قوت n کا ہی اضافہ یا کمی ممکن ہے اور دوڑکنی $(a+bx^n)$ کی قوت p میں صرف 1 ہی گھٹ یا بڑھ سکتا ہے۔

مثال

اگر m مثبت کامل عدد ہو تو

$$\int x^m \sqrt{2ax-x^2} dx.$$

کے لیے ایک تخیلی فارمولا حاصل کیجیے۔ اس کی مدد سے مکملہ

$$\int_0^{2a} x^3 \sqrt{(2ax-x^2)} dx.$$

کی قیمت نکالے۔
ہم پاتے ہیں

$$x^m(2ax-x^2)^{\frac{1}{2}} = x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}}$$

چونکہ دوسری 2a x میں x کی قوت 1 ہے، اس لیے ہم

$$\left[x^{m-\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} dx \text{ یعنی } \right] x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} dx \text{ کا } \int x^{m+\frac{1}{2}-1}(2a-x)^{\frac{1}{2}} dx$$

سے رابطہ قائم کریں گے۔ ہم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} P &= x^{m-\frac{1}{2}+1}(2a-x)^{\frac{1}{2}+1} = x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{3}{2}} \\ \Rightarrow \frac{dP}{dx} &= (m+\frac{1}{2})x^{m-\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} \\ &= (m+\frac{1}{2})x^{m-\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} \\ &= (2m+1)ax^{m-\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} - (m+\frac{1}{2})x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad - \frac{3}{2}x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} \\ &= (2m+1)ax^{m-\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} - (m+2)x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

میکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$P = (2m+1)a \int x^{m-\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} dx - (m+2) \int x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}} dx.$$

منتقلی وغیرہ کے بعد ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \int x^m \sqrt{(2ax-x^2)} dx &= -\frac{x^{m+\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{3}{2}}}{m+2} \\ &\quad + \frac{(2m+1)a}{m+2} \int x^{m-1} \sqrt{(2ax-x^2)} dx. \end{aligned}$$

صفر اور 2a کو حدیں لینے پر ملتا ہے

غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

$$I_m = \int_0^{2a} x^m \sqrt{(2ax-x^2)} dx = \frac{(2m+1)a}{m+2} \int_0^{2a} x^{m-1} \sqrt{(2ax-x^2)} dx$$

$$= \frac{(2m+1)a}{m+2} I_{m-1}.$$

$$\therefore I_3 = \frac{7a}{5} I_2, \quad I_2 = \frac{5a}{4} I_1, \quad I_1 = \frac{3a}{2} I_0.$$

ساتھ ہی

$$I_0 = \int_0^{2a} \sqrt{(2ax-x^2)} dx = \int_0^{2a} \sqrt{[a^2-(x-a)^2]} dx$$

$$= \left| \frac{(x-a)}{2} \sqrt{[a^2-(x-a)^2]} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x-a}{a} \right|_0^{2a}$$

$$= \pi a^2/2$$

$$\therefore I_3 = \frac{7}{8} \pi a^5.$$

مشقیں

1۔ اگر n مثبت کامل عدد ہو تو

$$\int (a^2+x^2)^{n/2} dx$$

کے لیے تویلی فارمولا حاصل کیجیے اور اس کی مدد سے

$$\int (a^2+x^2)^{5/2} dx$$

حاصل کیجیے۔

$$u_n = \int x^n \sqrt{(a^2-x^2)} dx$$

2۔ اگر

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$u_n = -\frac{x^{n+1} (a^2-x^2)^{3/2}}{n+2} + \frac{n-1}{n+2} a^2 u_{n-2}.$$

حاصل کیجیے

$$\int_0^a x^4 \sqrt{(a^2-x^2)} dx.$$

3- ذیل تفاعلوں کے تکملوں کے لیے مناسب تحویلی فارمولے حاصل کیجیے۔

$$\frac{1}{x^n \sqrt{x^2-1}} \text{ اور } \frac{x^n}{\sqrt{2ax-x^2}}$$

اور $n = 3$ کے لیے ان کا تکمل کیجیے۔
4- اگر

$$I_n = \int x^n \sqrt{a-x} dx$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$(2n+3) I_n = 2anI_{n-1} - 2x^n (a-x)^{3/2}$$

حاصل کیجیے

$$\int_0^a x^2 \sqrt{ax-x^2} dx$$

جوابات

$$1. \int (a^2+x^2)^{n/2} dx = \frac{x(a^2+x^2)^{n/2}}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (a^2+x^2)^{\frac{n-1}{2}} dx.$$

$$\int (a^2+x^2)^{5/2} dx = \frac{1}{48} x(8x^4+26a^2x^2+33a^4) \sqrt{(a^2+x^2)} + \frac{5}{128} a^6 \sinh^{-1}(x/a).$$

$$2. \pi a^6/32.$$

$$3. nI_n = \frac{x^n(2a-x)}{\sqrt{2ax-x^2}} + (2n-1) aI_{n-1};$$

$$I_3 = \frac{2x^4+ax^3+5a^2x^2-30a^3x}{6\sqrt{2ax-x^2}} + \frac{5a^3}{2} \sin^{-1} \frac{x-a}{a}.$$

$$(n-1) I_n = \sqrt{(x^2-1)}/x^{n-1} + (n-2) I_{n-2};$$

$$I_3 = \sqrt{(x^2-1)}/2x^3 + \frac{1}{2} \sec^{-1} x;$$

$$4. 5\pi a^4/128.$$

غیر ناطق تفاعلوں کا تکمل

5-10. عام تجویز (General Consideration.) x اور $\sqrt{ax^2+bx+c}$ کے

کسی ناطق تفاعل $R\{x, \sqrt{ax^2+bx+c}\}$ کا تکمل کرنا۔

ہم یہ دکھائیں گے کہ x اور $\sqrt{ax^2+bx+c}$ کے کسی ناطق تفاعل کے تکمل کو نئے متغیر کے ناطق تفاعل کے تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ

$$\sqrt{ax^2+bx+c} =$$

$$\begin{aligned} (i) & \left\{ \sqrt{a} \sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a}\right)^2} \right\}, \quad (a > 0, 4ac-b^2 > 0 \text{ اگر}) \\ (ii) & \left\{ \sqrt{a} \sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2} \right\}, \quad (a > 0, 4ac-b^2 < 0 \text{ اگر}) \\ (iii) & \left\{ \sqrt{-a} \sqrt{\left(\sqrt{\frac{b^2-4ac}{2a}}\right)^2 - \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} \right\} \quad (a < 0, b^2-4ac > 0 \text{ اگر}) \end{aligned}$$

پہلی صورت : صورت (i) میں ہم رکھتے ہیں $\sqrt{(4ac-b^2)/2a} = \lambda$

$$\int R\left\{x, \sqrt{a} \sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \lambda^2}\right\} dx$$

ہم رکھتے ہیں

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\lambda}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right) \Rightarrow dx = \frac{\lambda}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$$

$$\sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \lambda^2} = \frac{\lambda}{2} \left(t + \frac{1}{t}\right) \quad \text{اور}$$

اس لیے دیا ہوا تکمل

$$= \int R\left\{\frac{\lambda}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right) - \frac{b}{2a}, \frac{\sqrt{a}\lambda}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right)\right\} \frac{\lambda}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt,$$

جو کہ ۱ کے ایک ناطق تفاعل کا مکملہ ہے۔

دوسری صورت : صورت (ii) میں استحالة

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\lambda}{2} \left(1 + \frac{1}{t} \right) \quad \lambda = \frac{\sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a} \quad \text{جہاں}$$

سے دیا ہوا مکملہ ۱ کے ناطق تفاعل کے مکملہ میں بدل جاتا ہے۔

تیسری صورت : صورت (iii) میں استحالة

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{2\lambda}{1 + 1/t}, \quad \lambda = \frac{\sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a} \quad \text{جہاں}$$

سے دیا ہوا مکملہ درکار شکل میں بدل جاتا ہے۔

لہذا ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اصولاً x اور $\sqrt{(ax^2 + bx + c)}$ کا ہر ناطق تفاعل ہمیشہ ابتدائی تفاعلوں کے مکملوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔

اس سیکشن میں جو استحالے بتائے گئے وہ عملی طور پر زیادہ کارآمد نہیں ہوتے کیوں کہ اس سے ملنے والے ناطق تکاملیہ میں نسب نما کی ڈگری بہت ہوتی ہے۔

باب 5 پر مشقیں

1۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{x \, dx}{\sqrt{(x+1)}}, \quad (ii) \int \frac{2x^2+3}{\sqrt{(3-2x-x^2)}} \, dx, \quad (iii) \int \frac{dx}{(x-1) \sqrt{(x^2+2x+3)}}$$

$$(iv) \int \frac{dx}{(1+x)^2 \sqrt{x}}, \quad (v) \int \sqrt{[(x-3)(4-x)]} \, dx, \quad (vi) \int \frac{\sqrt{(1+x+x^2)}}{x+1} \, dx.$$

2۔ حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2-1)}}, \quad (ii) \int x^3 \sqrt{(a+bx^2)} \, dx, \quad (iii) \int \frac{dx}{x \sqrt{|x(x-a)|}}$$

غیرناطق تفاضلوں کا مکمل

$$(iv) \int \left(\frac{x}{x^2-1} \right)^{\frac{1}{2}} dx, (v) \int \frac{2a+x}{a+x} \sqrt{\left(\frac{a-x}{a+x} \right)} dx, (vi) \int x^3 \sqrt{\left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)} dx$$

$$(vii) \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x-\cos \alpha) \sqrt{(x^2-1)}}, \quad (\pi > \alpha > 0 \text{ جہاں})$$

3. ثابت کیجیے کہ

$$\int_1^2 \frac{dx}{(x+1) \sqrt{(x^2-1)}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

4. حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{x dx}{(a-x)^2 \sqrt{(2ax-x^2)}}, (ii) \int \frac{1-\sqrt{(1-x^2)}}{x \sqrt{(1-x^2)}} dx.$$

5. ثابت نہ کیجیے کہ

$$\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^4 \sqrt{(a^2+x^2)}} = \frac{2-\sqrt{2}}{3a^4}, \quad (a > 0. \text{ جبکہ})$$

6. ثابت کیجیے کہ

$$\int \sqrt{x(1+x^2)} dx = \frac{1}{3} \{ \sqrt{x^3(1+x^2)} + \cosh^{-1} \sqrt{(1+x^2)} \}.$$

7. عوضی $x=1/\sqrt{(t^2+1)}$ سے یا کسی اور طریقے سے ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(9+25x^2) \sqrt{(1+x^2)}} = \frac{1}{12} \tan^{-1} \frac{4}{3}.$$

8. ثابت کیجیے کہ

$$\int \frac{dx}{(x^2+6x+5)^{3/2}} = -\frac{x+3}{4\sqrt{(x^2+6x+5)}}.$$

9. ثابت کیجیے کہ مکمل

$$\int_0^4 x^3 \sqrt{(4x-x^2)} dx$$

کی قیمت تقریباً 88 ہے۔
10. ثابت کیجیے کہ

$$(i) \int_0^a \frac{dx}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{2} \pi. \quad (ii) \int_0^a \frac{a \, dx}{[x + \sqrt{a^2 - x^2}]^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \log (1 + \sqrt{2}).$$

11. حاصل کیجیے

$$\int [x + \sqrt{1 + x^2}]^n dx$$

12. حاصل کیجیے

$$(i) \int \sqrt{\left(\frac{e^x + a}{e^x - a}\right)} dx, \quad (ii) \int \sqrt{\left(\frac{x + a}{x + b}\right)} \frac{dx}{x + c}.$$

13. مکمل کیجیے

$$(i) \frac{1 - x^3}{(1 + x^2)\sqrt{1 + x^4}} \quad (ii) \frac{x^4 - 1}{x^3 \sqrt{(x^4 + x^2 + 1)}}$$

جوابات

$$1. (i) \frac{2}{3}(x-2)\sqrt{1+x}, \quad (ii) 9\sin^{-1}[(x+1)/2] + (3-x)\sqrt{3-2x-x^2}.$$

$$(iii) -\sqrt{\frac{1}{2}} \sinh^{-1}[(x+2)\sqrt{2/(x-1)}], \quad (iv) \tan^{-1}\sqrt{x + \sqrt{x/(1+x)}}.$$

$$(v) \frac{1}{2}(2x-7)\sqrt{(x-3)(4-x)} + \frac{1}{2} \sin^{-1}(2x-7).$$

$$(vi) \sqrt{(x^2+x+1)} - \sinh^{-1}[(1-x)/\sqrt{3(1+x)}] - \frac{1}{2} \sinh^{-1}[(2x+1)/\sqrt{3}].$$

$$2. (i) \frac{1}{2} \log [(1+y)/(1-y)] - \frac{1}{2} \tan^{-1} y, \text{ where } x^4 y^4 = x^4 - 1$$

$$(ii) (3bx^3 - 2a)(a + bx^3)^{2/3} / 15b^2 \quad (iii) 2\sqrt{(x-a)/a}\sqrt{x}.$$

$$(iv) \frac{1}{8} \log \frac{y^2 + y + 1}{y^2 - 2y + 1} - \frac{\sqrt{3}}{4} \tan^{-1} \frac{2y+1}{\sqrt{3}}, \quad x^4 y^3 = x^4 - 1 \quad \text{جہاں}$$

$$(v) \sqrt{(a^2 - x^2)} - 2a\sqrt{[(a-x)/(a+x)]}.$$

$$(vi) \frac{1}{2} \tan^{-1} y - y(1+3y^2)/2(1+y^2)^2, \quad \sqrt{(1+x^2)} = y\sqrt{(1-x^2)}$$

$$(vii) (\pi - \alpha)/\sin \alpha.$$

غیر ناطق تفاضلوں کا مکمل

- 10 (i) $\frac{1}{a} \left[\frac{\sqrt{(2ax-x^2)}}{a-x} - \log \frac{\sqrt{(2a-x)+\sqrt{x}}}{\sqrt{(2a-x)-\sqrt{x}}} \right]$ (ii) $\sqrt{[\log x + \operatorname{sech}^{-1} x]}$
11. $\frac{[x+\sqrt{(1+x^2)}]^{n+1}}{2(n+1)} + \frac{[x+\sqrt{(1+x^2)}]^{n-1}}{2(n-1)}$
- 12 (i) $\cosh^{-1}(e^x/a) + \sec^{-1}(e^x/a)$,
(ii) $\cosh^{-1} \frac{2x+a+b}{a-b} + \sqrt{\left(\frac{c-a}{c-b} \right)} \cosh^{-1} \frac{2(c+b)(c-a) + (a+b-2c)(x+c)}{(a-b)(c+x)}$
13. (i) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{2x}}{1+x^2} \right)$ (ii) $\frac{\sqrt{(x^4+x^2+1)}}{x}$

متفرق مشتق

1 حاصل کیجیے

- (i) $\int_1^2 \frac{dx}{x(1+x^4)}$ (ii) $\int \frac{x^2 dx}{x^4-x^2-12}$ (iii) $\int \frac{x^6 dx}{(1+x^2)^3}$
- (iv) $\int \frac{x^5 dx}{(a^2-x^2)^2}$ (v) $\int \frac{x^2}{(1-x^2)^3} dx$ (vi) $\int \frac{(x^2+x^2+2)dx}{x(x-1)^2(x^2+1)}$

2. ذیل کا مکمل کیجیے:-

- (i) $e^{mx} \sin^3 x$, (ii) $\frac{1}{1-\sin x \cos x}$,
(iii) $\frac{\cos 2x}{3+\cos x+\sin x}$, (iv) $\frac{1}{\cos 2\alpha - \cos x}$.

3. a کو 1 اور 3 لیتے ہوئے مکمل

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 \cos x + \sin x + a}$$

کی قیمت حاصل کیجیے۔

4. (i) ثابت کیجیے کہ اگر $0 < \alpha < \pi$ ہو تو

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x \cos \alpha + 1} = \frac{\alpha}{\sin \alpha},$$

(ii) α کی یکساں قیمتوں کے لیے تکملوں

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x \cos \alpha + 1}, \quad \int_0^{\infty} \frac{(x^2 + 1) dx}{x^2 + 2x \cos \alpha + 1}$$

کی قیمت نکالیے۔

5. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt{2-x}} = \sqrt{2} - \log(\sqrt{2} + 1).$$

6. تکملہ

$$\int_0^4 x^2(4x - x^2)^{1/3} dx.$$

کی قیمت نکالیے۔

7. ثابت کیجیے کہ

$$\int \frac{x^2 dx}{(x \sin x + \cos x)^2} = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x}.$$

(اشارہ: لکھیے

$$\frac{x^2 dx}{(x \sin x + \cos x)^2} = \frac{x \cos x}{(x \sin x + \cos x)^2} - x \sec x,$$

اور یہ یاد رکھتے ہوئے حصہ سے تکمل کیجیے کہ $[x \sin x + \cos x]$ کا تفرقی سر

($x \cos x$ ہے)

8. ثابت کیجیے کہ

$$\int \sqrt{\left[\frac{1 - \cos \theta}{\cos \theta (1 + \cos \theta)(2 + \cos \theta)} \right]} d\theta = \operatorname{cosec}^{-1} \left(2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

غیر ناقل تفاعلوں کا مکمل

9۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int \frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx = -\cosh^{-1}(\cos x + \sin x).$$

10۔ حاصل کیجیے

$$\int (\tan x + \sec x)^4 \sec^2 x dx.$$

11۔ غیر حاصل ضربیوں (indeterminate co-efficients) کے طریقے کی مدد سے مکمل

$$\int \frac{30x^3 + 30x^2 + 12x + 21x^2 - 15x - 1}{\sqrt{4 + 2x + 3x^2}} dx.$$

حاصل کیجیے۔

12۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a d\theta}{a^2 + \sin^2 \theta} = 2\sqrt{a^2 + 1}.$$

13۔ اگر $a > b > 0$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{a^2 + b^2 - 2ab \cos x} = \frac{\pi}{a^2 - b^2}.$$

اس تہمذ کی قیمت کیا ہوگی اگر $b > a > 0$ ہو؟

14۔ ثابت کیجیے کہ اگر $c > a > 0$ ہو تو

$$\int_0^a \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{(c^2 - x^2)} dx = \frac{\pi[c - \sqrt{c^2 - a^2}]}{2c}.$$

15۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)(2+x)\sqrt{x(1-x)}} = \pi\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

یہاں $x = \sin^2$ رکھیے

16. ثابت کیجیے کہ اگر $a > b > 0$ ہو تو

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x \, dx}{a^2 - 2ab \cos x + b^2} = \frac{\pi}{2a^2}.$$

اس مسئلہ کی قیمت کیا ہوگی اگر $b > a > 0$ ہو؟
17. حاصل کیجیے

$$(i) \int \frac{x^4 \, dx}{(1+x^2)^3}, \quad (ii) \int \frac{x \, dx}{(x^2-1)^2}$$

$$(iii) \int \frac{dx}{(x^2-a^2)^3}, \quad (iv) \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)^2(x^2+b^2)}.$$

18. حاصل کیجیے

$$\int_{-1}^{+1} (1-x^2)^m (1-x)^n \, dx.$$

$$19. (1+e \cos x)(1-e \cos x) = 1-e^2. \text{ رکھ کر}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{dx}{(1+e \cos x)^2}$$

کی قیمت حاصل کیجیے۔
20. حاصل کیجیے

$$\int \frac{\sin x}{\sin 4x} \, dx.$$

21. حاصل کیجیے

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 4\theta}{\sin \theta} \, d\theta.$$

22. غرضی $\sqrt{1+x^4} = (1+x^2) \cos \theta$ سے یا کسی اور طریقے سے ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{1-x^2}{1+x^2} \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}} = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$$

غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

23. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} \log \frac{1}{2}$$

اور اس سے نکالے کہ

$$\int_0^1 \frac{x^2 \log x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{2} + \log \frac{1}{2} \right)$$

24. حاصل کیجیے

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi x - 4x^2) \log (1 + \tan x) \, dx.$$

25. حاصل کیجیے

$$\int_0^{\pi} \theta \sin \theta \cosh (\cos \theta) \, d\theta.$$

26. حاصل کیجیے

$$\int \frac{\sin 2\theta}{a + b \tan \theta} \, d\theta.$$

27. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \theta^2 \log \sin \theta \, d\theta = \frac{3\pi}{2} \int_0^{\pi} \theta^2 \log (\sqrt{2} \sin \theta) \, d\theta.$$

(§ 4.92 دیکھیے)

28. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 x^{n-1} (\log x)^n \, dx = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}}$$

جبکہ n مثبت کامل عدد ہو اور n مثبت نمبر ہو۔

29. حاصل کیجیے

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x})^{-4} \, dx.$$

30. اگر $y^2 = ax^2 + 2bx + c$ اور $\int \frac{x^n}{y} dx$ کی قیمت معلوم کیجیے کہ

$$(n+1)au_{n+1} + (2n+1)bu_n + ncu_{n-1} = x^n y$$

اور اس سے نکالیے کہ

$$au_1 = y - bu_0; 2a^2u_2 = y(ax - 3b) - (ac - 3b^2)u_0.$$

31. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \cot^{-1}(1-x+x^2) dx = \frac{\pi}{2} - \log 2$$

32. ثابت کیجیے کہ

$$(i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \log \sin \theta d\theta = \log \frac{2}{e}$$

$$(ii) \int_0^{\pi} \cos 2x \log \sin x dx = -\frac{1}{2} \pi.$$

33. عوضی $x+1+1/x$ کی مدد سے مکمل

$$\int \frac{x-1}{x+1} \frac{dx}{\sqrt{x(x^2+x+1)}}$$

حاصل کیجیے۔

34. حاصل کیجیے

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2\theta}{\sqrt{(1+\sin \theta \sin 2\beta)}} d\theta.$$

(جبکہ $0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$)

35. اگر

$$u_n = \int (\sin x + \cos x)^n dx,$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$nu_n = (\sin x + \cos x)^{n-1} (\sin x - \cos x) + 2(n-1)u_{n-2}.$$

36- اگر

$$I_{(m,n)} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos nx \, dx, \quad J_{(m,n)} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \sin nx \, dx, \quad m > 1$$

تو ثبات کیجیے کہ

$$(m+n) I_{(m,n)} = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - m J_{(m-1,n-1)}$$

اور $I_{(m,n)}$ کو $I_{(m-2,n-2)}$ کے ارتقا میں رکھیے۔

37- اگر

$$I_m = \int_0^{\infty} x^m e^{-x} \cos x \, dx,$$

$$J_m = \int_0^{\infty} x^m e^{-x} \sin x \, dx,$$

تو I_m اور J_m کو I_{m-1} اور J_{m-1} کے ارتقا رکھنے والا رشتہ (relation) معلوم کیجیے اور اس سے ثبات کیجیے کہ اگر $m > 1$ کا مل عدد ہو تو

$$I_m - m I_{m-1} + \frac{1}{2} m(m-1) I_{m-2} = 0.$$

38- یہ دکھائیے کہ

$$\sin x / (a + b \cos x)^{n-1}$$

کا تفرق کر کے کس طرح

$$\int \frac{dx}{(a + b \cos x)^n}$$

کے لیے تحویلی فارمولا حاصل کر سکتے ہیں۔

39- اگر m, n مثبت کامل اعداد ہوں اور

$$I_{(m,n)} = \int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx.$$

تو ثبات کیجیے کہ

$$(m+n+1) \cdot I_{(m,n)} = n I_{(m,n-1)}$$

اور اس سے نکالے کہ

$$I_{(m, n)} = \frac{m! n!}{(m+n+1)!}$$

40۔ اگر m, n مثبت کامل اعداد ہوں تو عوضی $x = a + (b-a)y$ سے ثابت کیجئے کہ

$$\int_a^b (x-a)^m (b-x)^n dx = \frac{m! n! \cdot (b-a)^{m+n+1}}{(m+n+1)!}$$

41۔ اگر

$$I_{(m, n)} = \int \frac{x^m dx}{(x^2+1)^n}$$

تو ثابت کیجئے کہ

$$(2n-2) I_{(m, n)} = -x^{m-1} (x^2+1)^{-n+1} + (m-1) I_{(m-2, n-1)}$$

42۔ اگر

$$I_n = \int (a \cos^2 x + 2h \cos x \sin x + b \sin^2 x)^{-n} dx,$$

تو ثابت کیجئے کہ

$$4n(n+1)(ab-h^2) I_{n+2} - 2n(2n+1)(a+b) I_{n+1} + 4n^2 I_n = -D_x^2 I_n$$

43۔ اگر

$$\varphi(n) = \int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} \log x dx,$$

تو ثابت کیجئے کہ

$$\varphi(n+2) - (2n+1) \varphi(n+1) + n^2 \varphi(n) = 0.$$

44۔ عوضی $\cos \theta = (a \cos x + b)(a + b \cos x)^{-1}$ سے ثابت کیجئے کہ

$$\int_0^\pi (a + b \cos x)^{-n} dx = \frac{1}{(a^2 - b^2)^{n-1/2}} \int_0^\pi (a - b \cos \theta)^{n-1} d\theta.$$

اس کی مدد سے حاصل کیجئے

غیر ملکی تفاعلوں کا مکمل

$$\int_0^{\pi} (5 + 4 \cos x)^{-3} dx$$

اگر $a^2 > b^2$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{(a + b \cos x)^3} = \frac{\pi (2a^2 + b^2)}{(2(a^2 - b^2)^{3/2})}$$

جوابات

1. (i) $\frac{1}{4} \log \frac{32}{17}$. (ii) $\frac{1}{7} \left[\log \frac{x-2}{x+2} + \sqrt{3} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{3}} \right]$
 (iii) $\frac{1}{2} \log (1+x^2) + (1+x^2)^{-1} - \frac{1}{2} (1+x^2)^{-2}$. (iv) $a^2 \log (a^2 - x^2) + x^2 (2a^2 - x^2) / 2(a^2 - x^2)$.
 (v) $\frac{1}{16} \left[\frac{4x}{(1-x^2)^2} - \frac{2x}{1-x^2} + \log \frac{1-x}{1+x} \right]$.
 (vi) $-2 \log x - \frac{2}{3} \log (x-1) - \frac{1}{2} \log (1+x^2) - 2(x-1)^{-1} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x$
2. (i) $\frac{e^{m\theta}}{4} \left[\frac{3}{\sqrt{(m^2+1)}} \sin (x - \cot^{-1} m) - \frac{1}{\sqrt{(m^2+9)}} \sin \left(3x - \tan^{-1} \frac{3}{m} \right) \right]$
 (ii) $\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left[\frac{2 \tan x - 1}{\sqrt{3}} \right]$ (iii) $(\sin x + \cos x) - 3 \log (3 + \sin x + \cos x)$
 (iv) $\frac{1}{\sin 2\alpha} \log \frac{\sin (\frac{1}{2}x - \alpha)}{\sin (\frac{1}{2}x + \alpha)}$
3. $\frac{1}{2} \log 3; \tan^{-1} \frac{1}{2}$. 4. (ii) $\frac{\pi}{2} \sec \left(\frac{\pi}{8} \right), \frac{\pi}{2} \sec \left(\frac{\pi}{8} \right)$. 6. $i0\pi$.
10. $\frac{2}{17} (\tan x + \sec x)^3 + \frac{1}{2} (\tan x + \sec x)^3$
11. $(2x^4 + x^2 - 3x^2 + 4x - 1) \sqrt{(3x^2 + 2x + 4)} - \frac{16}{\sqrt{3}} \sinh^{-1} \frac{3x+1}{\sqrt{11}}$
13. $\pi/(b^2 - a^2)$. 16. $\pi/2b^2$.
17. (i) $x + \frac{1}{2}x(1+x^2)^{-1} - \frac{1}{2} \tan^{-1} x$.
 (ii) $\frac{1}{18} \log \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2} - \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{9} \cdot \frac{2x+1}{x^2+x+1} - \frac{1}{3\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$
 (iii) $\frac{1}{9a^6} \left[\log \frac{a^2+ax+x^2}{(x-a)^2} - \frac{x}{x-a} + \frac{2ax+x^2}{a^2+ax+x} \sqrt{3} \tan^{-1} \frac{2x+a}{\sqrt{3a}} \right]$
 (iv) $\pi(2a+b)/4a^3b(a+b)^2$.

$$18 \quad 2^{2m+n+1} (m+n)! \cdot (m!)/(2m+n+1)!$$

$$19 \quad [2 \tan^{-1} \sqrt{(1-e)(1+e)} - e\sqrt{(1-e^2)}] \cdot (1-e^2)^{1/2}.$$

$$20 \quad \frac{1}{2} \log \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) + (1/4 \sqrt{2}) \log \left\{ (1+\sqrt{2} \sin x)/(1-\sqrt{2} \sin x) \right\}$$

$$21 \quad 4/3. \quad 24 \quad \pi^3 \log 2/192. \quad 25 \quad \frac{\pi}{2} (e-e^{-1}).$$

$$26 \quad -\frac{2ab^2}{(a^2-b^2)^3} \log (a \cos \theta - b \sin \theta) + \frac{b(a^2-b^2)}{(a^2+b^2)^2} \theta - \frac{(a \cos \theta + b \sin \theta) \cos \theta}{a^2+b^2}.$$

$$29 \quad 1/3. \quad 33 \quad -2 \operatorname{cosec}^{-1} (x^{1/2} + x^{-1/2}).$$

$$34. \quad -\frac{4}{\pi} \tan \beta \sec \beta \quad (0 < \beta < \frac{1}{2}\pi \text{ اگر } \beta); \quad -\frac{4}{\pi} \cot \beta \operatorname{cosec} \beta \quad (\frac{1}{2}\pi < \beta < \pi \text{ اگر } \beta);$$

(اگر β صفر یا π ہے تو 0)

$$36 \quad I_{(m, n)} = \frac{1}{m+n} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{m}{(m+n)(m+n-2)} \cos \frac{(n-1)\pi}{2} \\ - \frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-2)} I_{(m-2, n-2)}.$$

$$37 \quad I_m = \frac{1}{2} m(I_{m-1} - J_{m-1}), \quad J_m = \frac{1}{2} m(I_{m-1} + J_{m-1}).$$

$$38 \quad (n-1)(a^2-b^2) u_n = -b \sin x (a+b \cos x)^{n-1} + (2n-3) a u_{n-1} - (n-2) u_{n-2}$$

$$u_n = \int dx / (a+b \cos x)^n \quad \text{جہاں}$$

$$44 \quad 11\pi/81$$

مستغرق مشتق 2

1- ثابت کیجیے کہ

$$(i) \quad \int_0^\pi x \varphi(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \varphi(\sin x) dx,$$

$$(ii) \quad \int_a^{\pi-a} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_a^{\pi-a} f(\sin x) dx$$

2- ثابت کیجیے کہ

$$(i) \quad \int_{-a}^a f(x)^2 dx = 2 \int_0^a f(x)^2 dx, \quad (ii) \quad \int_{-a}^a x f(x)^2 dx = 0$$

غیر ناطق تفاعلوں کا مکمل

3. اگر m کی ہر کامل عدد قیمت کے لیے $f(x+mp) = f(x)$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{np} f(x) dx = n \int_0^p f(x) dx$$

جہاں n مثبت یا منفی کامل عدد ہے۔

4. اگر n مثبت کامل عدد ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{n\pi} f(\cos^2 x) dx = n \int_0^{\pi} f(\cos^2 x) dx$$

5. ثابت کیجیے کہ

$$(i) \int_0^{b-c} f(x+c) dx = \int_c^b f(x) dx. (ii) \int_a^b f(a+b-x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

6. اگر $f(x) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{m=1}^n (a_m \cos mx + b_m \sin mx)$ اور $m \leq n$ ہو تو ثابت

کیجیے کہ

$$\pi a_0 = \int_0^{2\pi} f(x) dx ; \pi a_m = \int_0^{2\pi} f(x) \cos mx dx,$$

$$\pi b_m = \int_0^{2\pi} f(x) \sin mx dx.$$

7. اگر m, n مثبت کامل اعداد ہوں اور $m > n$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \cos nx (\cos x)^n dx = 0.$$

8. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sin \frac{1}{2}x} dx = \pi \quad (\text{اگر } n \text{ مثبت عدد صحیح ہو})$$

$$[\frac{1}{2} \sin(n+\frac{1}{2})x \operatorname{cosec} \frac{1}{2}x = \frac{1}{2} + \cos x + \dots + \cos nx].$$

9. اگر p, q مثبت کامل اعداد ہوں تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^\pi \cos px \sin qx \, dx = \begin{cases} 2q/(q^2-p^2) & \text{اگر } (q-p) \text{ طاق ہو} \\ 0 & \text{اگر } (q-p) \text{ جفت ہو} \end{cases}$$

10. ثبات کیجیے کہ اگر

$$u_n = \int_0^1 x^n \tan^{-1} x \, dx$$

تو

$$(n+1)u_n + (n-1)u_{n-2} = -1/n.$$

$$u_n \text{ حاصل کیجیے اور دکھائیے کہ اگر } \lim_{n \rightarrow \infty} 4mu_{4m} \leftarrow \frac{1}{2} \log 2 \leftarrow m$$

11- اگر

$$I_n = \int_{-1}^{+1} (1-x^2)^n \cos mx \, dx$$

ثبات کیجیے کہ اگر $n > 2$ ہو تو

$$m^2 I_n = 2n(2n-1) I_n - 4n(n-1) I_{n-2}.$$

12. ثبات کیجیے کہ

$$\int f^n(x) g(x) \, dx = f^{n-1}(x) g(x) - f^{n-2}(x) g'(x) + \dots + (-1)^n \int f(x) g^n(x) \, dx$$

13- اگر

$$I_n = \int_0^\pi (\pi x - x^2)^n \cos mx \, dx$$

اور n ایک سے بڑا کامل عدد ہو تو

$$m^2 I_n - 2n(2n-1) I_{n-1} + n(n-1) \pi^2 I_{n-2} = 0$$

ثبات کیجیے کہ

$$\int_0^\pi (\pi x - x^2)^3 \cos 2x \, dx = \frac{3}{4} \pi (\pi^2 - 15).$$

14. ثبات کیجیے کہ

$$\int \sin n\theta \sec \theta \, d\theta = -2 \cos(n-1)\theta / (n-1) - \int \sin(n-2)\theta \sec \theta \, d\theta.$$

غیر مناطق تفاعلوں کا مکمل

15 - ثابت کیجیے کہ

- (i) $\int_{-a}^{+a} f(x) f(-x) dx = 2 \int_0^a f(x) f(-x) dx,$
(ii) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+4x^2)\sqrt{1+3x^2}} = \frac{\pi}{6},$
(iii) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{1+x+x^2}} = \log 3.$

16 - اگر

$$I_{m, n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin nx dx.$$

ہو تو $I_{m, n}$ کے لیے تحلیلی فارمولا حاصل کیجیے۔ اس سے یہ نکالیے کہ

$$I_{m, n} = \frac{1}{2^{m+1}} \left[2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \dots + \frac{2^m}{m} \right].$$

17 - اگر n کا کل عدد ہو اور

$$S_n = \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x} dx, V_n = \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^2 dx,$$

ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$S_{n+1} - S_n = 0, V_{n+1} - V_n = S_{n+1}.$$

18 - ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 x^{2p-1} \log(1+x) dx = \frac{1}{2p} \left[\frac{1}{1.2} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{(2p-1)2p} \right].$$

19 - ثابت کیجیے کہ

$$\int \frac{dx}{x^m \sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{\sqrt{2ax-x^2}}{(2m-1)ax^m} + \frac{m-1}{(2m-1)a} \int \frac{dx}{x^{m-1} \sqrt{2ax-x^2}}$$

20 - اگر

$$I_m = \int \frac{x^m}{(a+2bx+cx^2)^n} dx,$$

تثابت کیجئے کہ

$$I_m = -\frac{x^{m+1}}{c(2n-m-1)(a+2bx+cx^2)^{n-1}} + \frac{2b(m-n)}{c(2n-m-1)} I_{m-1} + \frac{a(m-1)}{c(2n-m-1)} I_{m-2}$$

21۔ ذیل تکلی حاصل کیجئے

$$\begin{aligned} (i) \int_0^1 \frac{\sin^{-1} x}{x} dx, \quad (ii) \int \frac{1+\cos x}{\sin x \cos x} dx, \quad (iii) \int \frac{x}{1+\sin x} dx, \\ (iv) \int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} dx, \quad (v) \int \left(\frac{\tan x^{-1}}{x} \right)^2 dx, \quad (vi) \int \frac{dx}{x\sqrt{(x^2-1)}}, \\ (vii) \int \frac{dx}{(2 \sin x + \cos x)^2}, \quad (viii) \int \log[\sqrt{(x-a)} + \sqrt{(x-b)}] dx, \\ (ix) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \theta d\theta}{\sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta}, \quad (x) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin 5x dx. \end{aligned}$$

22۔ ثابت کیجئے کہ

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{(1-x^2)}}{1-x^2 \sin^2 \alpha} dx = \frac{\pi}{4 \cos^2 \frac{1}{2} \alpha}$$

23۔ ثابت کیجئے کہ

$$\begin{aligned} (i) \int \operatorname{sech}^2 x dx &= \frac{1}{2} \sec^{-1} \cosh x + \frac{1}{2} \operatorname{sech} x \tanh x. \\ (ii) \int \frac{1}{(e^x-1)^2} dx &= x - \log(e^x-1) - \frac{1}{e^x-1} \end{aligned}$$

24۔ ثابت کیجئے کہ

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \sin nx dx = \frac{1}{n-1} \quad (n > 1 \text{ کا ل عدد ہو اور } 1)$$

25۔ ثابت کیجئے کہ

$$(i) \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{x \cos x \sin x}{(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x)^2} dx = \frac{\pi}{4ab^2(a+b)}$$

$$\text{اور پھر دیکھئے} \quad \frac{x \cos x \sin x}{(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x)^2} = x \cdot \frac{\tan x \sec^2 x}{(a^2 + b^2 \tan^2 x)^2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{پہلے لکھئے} \\ \text{تکمل کیجئے۔} \end{array} \right)$$

غیر ناقلی تفاعلوں کا مکمل

$$(ii) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \varphi}{a - b \cos \varphi} d\varphi = 2\pi \left\{ a - \sqrt{(a^2 - b^2)} \right\} / b^2, (a > b).$$

26. حاصل کیجیے

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{a + b \cos x + c \sin x}, [a > \sqrt{(b^2 + c^2)} > 0].$$

جوابات

21. (i) $\frac{\pi}{8} \log 2.$

(ii) $\log (\tan x \tan \frac{x}{2}).$

(iii) $x(\tan \frac{x}{2} - 1)/(\tan \frac{x}{2} + 1) + 2 \log (\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}).$ (iv) $x \tan \frac{x}{2}$

(v) $x^{-1} - \tan (x^{-1}).$ (vi) $(2/n) \tan^{-1} \sqrt{(x^n - 1)}.$ (vii) $-\cos (x/2)(2 \sin x + \cos x).$

(viii) $x \log [\sqrt{(x-a)} + \sqrt{(x-b)}] - \frac{1}{2} \sqrt{(x-a)(x-b)}$

$-\frac{1}{2}(a+b) \cosh^{-1} \{[2x-(a+b)]/(a+b)\}.$

(ix) $\pi/6$

(x) $1/4.$

26. $2\pi/\sqrt{(a^2 - b^2 - c^2)}.$

6

معین تکملہ بطور مجموعہ کی انتہا

(Limit of a Sum)

6.1- اب ہم ہم نے تکمل کو تفرق کا معکوس (inverse) عمل مانا ہے۔ معین تکملہ

$$\int_a^b f(x) dx$$

کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ یہ

$$F(b) - F(a)$$

کے برابر ہے، جہاں $F(x)$ ایسا تفاعل ہے کہ

$$F'(x) = f(x).$$

رقبوں، قوس کی لمبائی، گردشی ٹھوس شکلوں کے حجم اور سطح وغیرہ نکالنے میں تکمل کا استعمال بھی معین تکملہ کے اسی مفہوم (معکوس تفرق) پر منحصر ہے۔
اب یہ دیکھیں گے کہ معین تکملہ ایسے ارکان کے جوڑ کی انتہا کی حیثیت سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جہاں ارکان کی تعداد لا انتہا بڑھ رہی ہو اور ہر رکن صفر کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ معین تکملہ کا یہ مفہوم زیادہ اہم اور کہیں زیادہ کارآمد ہے اور اسی نظریے کی بنا پر ہی تکمل کا اس قدر وسیع استعمال ہے۔ اصولاً بھی اسی مفہوم سے اس مضمون میں نہایت وسیع اور بہترین ترقیاں ہوئیں لیکن ان ترقیوں کے بارے میں اس معیار کی ابتدائی کتاب میں نہیں پڑھا جاسکتا۔ یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ طالب علم کو اس مفہوم سے باخبر کر دیا جائے۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ

اس کتاب میں اس نظریے کو کم جگہ میں لکھا گیا ہے۔ پڑھنے والے کو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اہمیت کم ہے۔

6.2 مکملی احصاء کا بنیادی مسئلہ (Fundamental Theorem) معین تکملہ

بطور مجموعہ کی انتہا:

مان لیجیے وقفہ $[a, b]$ کو n برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے اور مان لیجیے ہر حصہ کی لمبائی h ہو، اس طرح $nh = b - a$ تب


$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} h[f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+nh)]$$

جہاں $n \rightarrow \infty$ اور $h \rightarrow 0$ اس طرح سے کہ $nh = b - a$ وقفہ $[a, b]$ کو n برابر حصوں میں بانٹنے پر جو نقاط تقسیم (points of division) حاصل ہوئے ہیں وہ

$$a, a+h, a+2h, \dots, a+(r-1)h, \dots, a+(n-1)h, a+nh$$

ہیں، جہاں h ہر حصہ کی لمبائی ہے۔

مان لیجیے کہ x کے a سے h تک بڑھنے کا تفاعل $f(x)$ ایک کیفی صعودی



(monotonically increasing) ہے۔ ہم

منحنی $y = f(x)$ کا گراف بناتے ہیں۔ مان لیجیے

کہ G اور H اس منحنی پر وہ نقطے ہیں جن کے

فصلے (abscissae) a اور b ہیں۔

GA (perpendicular) محور پر عمود

اور HB ڈالیے۔

مان لیجیے کہ وقفہ $[a, b]$ کو n برابر

تصویر 9

حصوں میں بانٹنے پر r دیں پٹی کے تقاطع تقسیم M اور N ہیں جس سے کہ

$$OM = a + (r-1)h, \quad ON = a + rh$$

$$MP = f[a + (r-1)h], \quad NQ = f(a + rh)$$

ہم کہتے ہیں

$$S_n = h [f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+nh)].$$

اب مستطیل (rectangles) MQ اور NP کو پورا کر لیجیے۔
قطعہ $GABH$ کے اندر NP کی طرح کے سبھی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ

$$\begin{aligned} &= h \sum_{r=1}^{r=n} f[a + (r-1)h] \\ &= h [f(a) + f(a+h) + \dots + f(a+(n-1)h)] \\ &= S_n - h[f(a+nh) - f(a)] \end{aligned}$$

$$(i) \dots = S_n - h[f(b) - f(a)], \quad (nh = b - a \text{ کیونکہ})$$

قطعہ $GABH$ کے باہر تک جانے والے MQ کی طرح کے مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ

$$\begin{aligned} &= \sum_{r=1}^{r=n} h f(a+rh) \\ &= h [f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+nh)] \\ (ii) \dots &= S_n \end{aligned}$$

$$(iii) \dots \int_a^b f(x) dx = \text{قطعہ } GABH \text{ کا رقبہ}$$

تصویر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قطعہ $GABH$ کا رقبہ اوپر (i) اور (ii) میں لکھے ہوئے مجموعوں کے درمیان ہے۔
لہذا ہم پاتے ہیں

$$(iv) \dots S_n - h[f(b) - f(a)] < \int_a^b f(x) dx < S_n$$

$$(v) \dots \Rightarrow 0 < S_n - \int_a^b f(x) dx < h[f(b) - f(a)].$$

اب مان لیجیے $0 < h$ یعنی ہر چٹی پتلی ہوتی جائے تو داہنی جانب بھی صفر کی طرف مائل ہوتی ہے۔ لہذا

$$\lim \left[S_n - \int_a^b f(x) dx \right] = 0$$

$$\Rightarrow \lim S_n = \int_a^b f(x) dx$$

اس طرح اس صورت میں یہ نتیجہ ثابت ہو گیا جب کہ x کے a سے b تک بڑھنے پر $f(x)$ ایک کیفی صعودی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نتیجہ اس صورت میں بھی صحیح ہو گا جب کہ x کے a سے b تک بڑھنے پر $f(x)$ ایک کیفی نزولی ہو۔ تب (iv) اور (v) میں غیر مساوی علامت (inequalities) الٹ (reverse) جائیں گے۔

نوٹ 1: اوپر دیا گیا ثبوت جو میٹریائی ہے۔ تحلیلی ثبوت (analytical proof) اس کتاب کے معیار سے باہر ہے۔
نوٹ 2: اس مسئلے کے نتیجے کو مختصراً یوں لکھ سکتے ہیں۔
جب $0 < h$ اور $n \rightarrow \infty$ اس طرح سے کہ $nh = b - a$ رہے تو

$$\int_a^b f(x) dx = \lim \sum_{r=1}^n hf(a+rh),$$

نوٹ 3: یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ چونکہ

$$\sum hf(a+rh)$$

میں ہر رکن صفر کی طرف مائل ہو رہا ہے اس لیے متناہی تعداد میں ایسے ارکان جوڑنے یا نظر انداز کرنے سے انتہا (limit) پر فرق نہیں پڑتا۔

مثالیں

1. مجموعہ کی انتہا کی حیثیت سے
 $\int_a^b x^2 dx$ حاصل کیجیے۔

یہاں $f(x) = x^2$

$$\therefore \int_a^b x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} h[f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+nh)]$$

جہاں $h \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ اس طرح کہ $b-a = nh$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} h[(a+h)^2 + (a+2h)^2 + \dots + (a+nh)^2] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} h[na^2 + 2ah(1+2+\dots+n) + h^2(1^2+2^2+\dots+n^2)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} h[na^2 + n(n+1)ah + \frac{1}{3}n(n+1)(2n+1)h^2] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [nha^2 + nh(nh+h)a + \frac{1}{3}nh(nh+h)(2nh+h)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(b-a)a^2 + (b-a)(b-a+h)a + \frac{1}{3}(b-a)(b-a+h)(2(b-a+h))] \\ &= (b-a)a^2 + (b-a)^2 a + \frac{1}{3}(b-a)^3 \\ &= \frac{1}{3}(b^3 - a^3). \end{aligned}$$

2. مجموعہ کی انتہا کی حیثیت سے

$$\int_a^b e^x dx$$

حاصل کیجیے۔

یہاں $f(x) = e^x$

$$\int_a^b e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} h[e^{a+h} + e^{a+2h} + \dots + e^{a+nh}]$$

جہاں $h \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ اس طرح کہ $b-a = nh$

معین تکملہ بطور مجموعہ کی انتہا

$$\begin{aligned}
 &= \lim \frac{he^{a+h} (1 - e^{nh})}{1 - e^h} \\
 &= \lim \left[e^a \cdot (1 - e^{b-a})e^h \cdot \frac{h}{1 - e^h} \right] \\
 &= (e^a - e^b) \cdot \lim e^h \cdot \lim \frac{h}{1 - e^h} \\
 &= (e^a - e^b)(-1) = e^b - e^a,
 \end{aligned}$$

کیونکہ $\lim_{h \rightarrow 0} \{h/(1 - e^h)\} = -1$ اگر

3۔ معین تکملہ کی تعریف مجموعہ کی انتہا لیتے ہوئے

$$\int_a^b \cos x \, dx$$

حاصل کیجیے۔

یہاں $f(x) = \cos x$ اس لیے

$$\int_a^b \cos x \, dx = \lim h [\cos(a+h) + \cos(a+2h) + \dots + \cos(a+nh)].$$

مان لیجیے

$$S = \cos(a+h) + \cos(a+2h) + \dots + \cos(a+nh).$$

دونوں جانب $2 \sin \frac{1}{2}h$ سے ضرب دینے پر ہم پاتے ہیں

$$2 \sin \frac{1}{2}h \cdot S = 2 \sin \frac{1}{2}h \cos(a+h) + 2 \sin \frac{1}{2}h \cos(a+2h) + \dots + 2 \sin \frac{1}{2}h \cos(a+nh)$$

$$= \sin(a + \frac{3}{2}h) - \sin(a + \frac{1}{2}h) + \sin(a + \frac{5}{2}h) - \sin(a + \frac{3}{2}h)$$

$$+ \dots + \sin[a + \frac{1}{2}(2n+1)h] - \sin[a + \frac{1}{2}(2n-1)h]$$

$$= \sin[a + \frac{1}{2}(2n+1)h] - \sin[a + \frac{1}{2}h]$$

$$= \sin[b + \frac{1}{2}h] - \sin[a + \frac{1}{2}h], \quad (nh = b - a. \text{ کیونکہ})$$

اس طرح

$$\begin{aligned}\int_a^b \cos x dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h[\sin(b + \frac{1}{2}h) - \sin(a + \frac{1}{2}h)]}{2 \sin \frac{1}{2}h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}h}{\sin \frac{1}{2}h} [\sin(b + \frac{1}{2}h) - \sin(a + \frac{1}{2}h)] \\ &= 1 \cdot (\sin b - \sin a) = \sin b - \sin a.\end{aligned}$$

مشقیں

ذیل معین تکلوں کی قیمت بطور مجموعہ کی انتہا حاصل کیجئے۔

1. (i) $\int_a^b x dx$, (ii) $\int_2^3 x^3 dx$.
2. (i) $\int_a^b \sin x dx$, (ii) $\int_a^b \sin^2 x dx$.
3. (i) $\int_a^b \frac{1}{\sqrt{x}} dx$, (ii) $\int_a^b \frac{1}{x^2} dx$.
4. (i) $\int_a^b \sinh x dx$, (ii) $\int_a^b \cosh 2x dx$.

جوابات

1. (i) $\frac{1}{2}(b^2 - a^2)$, (ii) $65/4$.
2. (i) $\cos a - \cos b$,
(ii) $\frac{1}{2}(b-a) + (\sin a \cos a - \sin b \cos b)$.
3. (i) $2(\sqrt{b} - \sqrt{a})$, (ii) $(b-a)/ab$.
4. (i) $\cosh b - \cosh a$, (ii) $\sinh b \cosh b - \sinh a \cosh a$.

6.3 - سلسلوں کا مجموعہ نکالنا (Summation of Series)

کچھ قسم کے سلسلوں کے مجموعوں کی انتہائیں معین تکلوں کی شکل میں رکھی جاسکتی

ہیں اور ان کا مجموعہ اس طرح سے نکالا جاسکتا ہے۔ ہم ایسے سلسلوں کی خصوصیات پر غور کریں گے جن کے مجموعوں کی انتہا کو اس طرح رکھا جاسکے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ان سے متعلق معین تکمیل کیسے حاصل کیے جائیں۔ یہ بھی دکھایا جائے گا کہ ہمیشہ ایسے سلسلوں کو اس طرح تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں کہ ان سے متعلق معین مکملوں میں زیریں اور صعودی حدیں 0 اور 1 ہوں۔

ہم جانتے ہیں کہ جب $h \rightarrow 0$ اور $n \rightarrow \infty$ اس طرح کہ $nh = b - a$ ہو، تو

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} h [f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+rh) + \dots + f(a+nh)].$$

اب h کی جگہ $(b-a)/n$ لکھنے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر $n \rightarrow \infty$ تب

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= (b-a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ f \left[a + (b-a) \frac{1}{n} \right] + f \left[a + (b-a) \frac{2}{n} \right] + \dots \right. \\ &\quad \left. + f \left[a + (b-a) \frac{r}{n} \right] + \dots + f \left[a + (b-a) \frac{n}{n} \right] \right\} \\ &= (b-a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n f \left[a + (b-a) \frac{r}{n} \right]. \end{aligned}$$

اب § 9-2 سے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب $n \rightarrow \infty$ تو

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n f \left[a + (b-a) \frac{r}{n} \right] = \int_0^1 f \left[a + (b-a)x \right] dx$$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f \left[a + (b-a)x \right] dx.$$

جوڑ $(1/n) \sum f[a + (b-a)(r/n)]$ کا عام جزو $(1/n) f[a + (b-a)(r/n)]$ کا
یسا تفاعل ہے کہ r کی جگہ 1، 2، 3، ... n رکھنے پر سلسلے کے مختلف ارکان ملتے
ہیں اور ساتھ ہی (r/n) کی جگہ x لکھنے پر نیا سکا لیہ $f[a + (b-a)x]$ مل جاتا ہے۔
ساتھ ہی ہر رکن کا ایک فیکٹر $(1/n)$ ہے۔

اد پر کی بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس سلسلے کے مجموعہ کی انتہا کو معین تکملہ کی شکل میں رکھا جاسکتا ہو، اس کا عام جزو $1/n$ اور r/n کے کسی تفاعل $\varphi(r/n)$ کا حاصل ضرب ہوتا ہے، جس سے کہ r کی جگہ $1, 2, 3, \dots, n$ لکھ کر سلسلے کے ارکان ملتے ہیں۔ تب عام رکن میں r/n کی جگہ x لکھنے پر اور 0 اور 1 کو حدیں لینے پر سلسلے سے متعلق معین تکملہ حاصل ہو جاتا ہے۔
لہذا یہ اہم بات یاد رکھنی چاہیے کہ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{r=1}^n \frac{1}{n} \varphi\left(\frac{r}{n}\right) \right] = \int_0^1 \varphi(x) dx.$$

نوٹ: یہاں ارکان کی تعداد n ہے لیکن چونکہ ہر رکن صفر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے متناہی تعداد میں ارکان کو جوڑنے یا نظر انداز کرنے پر انتہا نہیں بدلتی۔

مثالیں

1۔ اگر $n \rightarrow \infty$ تو سلسلہ

$$\frac{n^3}{(n^3+1)^{3/2}} + \frac{n^3}{(n^3+2^3)^{3/2}} + \dots + \frac{n^3}{[n^3+(n-1)^3]^{3/2}}$$

کی انتہا معلوم کیجیے۔
یہاں r والے رکن

$$= \frac{n^3}{(n^3+r^3)^{3/2}} = \frac{1}{n} \left\{ \frac{1}{\left[1+\left(\frac{r}{n}\right)^3\right]^{3/2}} \right\}$$

جو کہ $1/n$ اور تفاعل $1/\left[1+\left(\frac{r}{n}\right)^3\right]^{3/2}$ کا حاصل ضرب ہے۔

محین مکمل بطور مجموع کی انتہا

اس لیے اوپر بتائے گئے اصول سے درکار انتہا

$$= \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

اب $x = \tan \theta$ رکھ کر یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ اس تکمیل کی قیمت $1/\sqrt{2}$

ہے۔ اگر $n \rightarrow \infty$ تو سلسلہ

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^3}} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{(n+4)^3}} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{(n+8)^3}} + \dots + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{(n+4(n-1))^3}}$$

کی انتہا معلوم کیجیے
یہاں r واں رکن

$$= \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{(n+4(r-1))^3}} = \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{\left[1 + \frac{4(r-1)}{n}\right]^3}}$$

چونکہ r دیں رکن میں r آتا ہے اس لیے ہم $(r+1)$ واں رکن لیتے ہیں
($r+1$) واں رکن

$$= \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{\left(1 + \frac{4r}{n}\right)^3}}$$

اس میں r/n کی جگہ x رکھنے پر دیکھتے ہیں کہ درکار انتہا

$$= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+4x)^3}} = \int_0^1 (1+4x)^{-3/2} dx = \frac{1}{10} (5 - \sqrt{5}).$$

3. ذیل کی قیمت حاصل کیجیے:-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)(n+2)\dots(n+n)]^{1/n}}{n}$$

مان لیجیے کہ

$$y = \frac{[(n+1)(n+2)\dots(2n)]^{1/n}}{n}$$

ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}\log y &= \frac{1}{n} \left\{ \log (n+1) + \log (n+2) + \dots + \log 2n \right\} - \log n \\ &= \frac{1}{n} \left\{ [\log (n+1) - \log n] + [\log (n+2) - \log n] + \dots + [\log (2n) - \log n] \right\} \\ &= \frac{1}{n} \left\{ \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \log \left(1 + \frac{2}{n} \right) + \dots + \log \left(1 + \frac{n}{n} \right) \right\} \\ &\quad \text{r داں مرکز} \\ &= \frac{1}{n} \log \left(1 + \frac{r}{n} \right).\end{aligned}$$

اس لیے جب $n \rightarrow \infty$ ، تو ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}\lim \log y &= \int_0^1 \log (1+x) dx \\ &= \left[x \log (1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx \\ &= \log 2 - \left[x - \log (1+x) \right]_0^1 \\ &= \log 2 - (1 - \log 2) \\ &= 2 \log 2 - 1 = \log 4 - \log e = \log (4/e),\end{aligned}$$

اس لیے

$$\lim y = 4/e.$$

مشقیں
اگر $n \rightarrow \infty$ ، تو ذیل سلسلوں کی انتہائیں معلوم کیجیے

-1

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{n+n}.$$

معین مکملہ بطور مجموعہ کی انتہا

$$\frac{1}{n} + \frac{n^2}{(n+1)^3} + \frac{n^2}{(n+2)^3} + \dots + \frac{1}{8n}. \quad -2$$

$$\frac{1}{\sqrt{n^3}} + \frac{1}{\sqrt{(n^2-1)^3}} + \frac{1}{\sqrt{(n^2-2^2)^3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{[n^2-(n-1)^2]^3}}. \quad -3.$$

$$\frac{\sqrt{n}}{(3+4\sqrt{n})^3} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}(3\sqrt{2}+4\sqrt{n})^3} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{3}(3\sqrt{3}+4\sqrt{n})^3} + \dots + \frac{1}{49n}. \quad -4.$$

$$\frac{n+1}{n^2+1^2} + \frac{n+2}{n^2+2^2} + \frac{n+3}{n^2+3^2} + \dots + \frac{1}{n}. \quad -5.$$

$$\frac{1}{\sqrt{(2n-1^2)}} + \frac{1}{\sqrt{(4n-2^2)}} + \frac{1}{\sqrt{(6n-3^2)}} + \dots + \frac{1}{n}. \quad -6$$

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{4n}. \quad -7$$

8- ثابت کیجیے کہ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \frac{n}{n^2+3^2} + \dots + \frac{1}{2n} \right] = \frac{\pi}{4}$$

اگر $n \leftarrow \infty$ تو ذیل کی انتہائیں معلوم کیجیے

$$\sum_{r=1}^n \frac{\sqrt{n}}{(9n+40r)^{3/2}} \quad -10$$

$$\sum_{r=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{(n^2-r^2)}} \quad -9$$

$$\sum_{r=1}^n \frac{n^3}{(n^2+r^2)(n^2+2r^2)} \quad -12$$

$$\sum_{r=1}^n \frac{r^3}{r^4+n^4} \quad -11$$

$$\sum_{r=1}^n \frac{n}{(n+r)\sqrt{r(2n+r)}} \quad -14.$$

$$\sum_{r=1}^{n-1} \frac{1}{n} \sqrt{\left(\frac{n+r}{n-r} \right)}. \quad -13$$

$$\sum_{r=1}^{3n} \frac{n^2}{(3n+r)^3} - 17 \quad \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n \sin^2 \frac{r\pi}{2n} - 16 \quad \sum_{r=1}^n \frac{r}{n^2} \sec^2 \frac{r^2}{n^2} - 15$$

18۔ اگر $n \rightarrow \infty$ ، تو ذیل کی انتہا معلوم کیجیے۔

$$\left[\frac{(n^2+1^2)(n^2+2^2)(n^2+3^2) \dots (n^2+n^2)}{n^{2n}} \right]^{1/n}$$

19۔ اگر $n \rightarrow \infty$ ، تو

$$\frac{(n!)^{1/n}}{n}$$

کی انتہا معلوم کیجیے۔

20۔ ثابت کیجیے کہ $n \rightarrow \infty$ ہونے پر ذیل کی انتہا $e^{\pi^2/48}$ ہوگی۔

$$\left[1 + \left(\frac{1}{n} \right)^4 \right] \left[1 + \left(\frac{2}{n} \right)^4 \right] \left[1 + \left(\frac{3}{n} \right)^4 \right] \dots \left[2 \right]^{1/n}$$

21۔ ثابت کیجیے کہ $n \rightarrow \infty$ ہونے پر

$$\left[\phi(a) \cdot \phi\left(a + \frac{h}{n}\right) \cdot \phi\left(a + \frac{2h}{n}\right) \dots \phi\left(a + \frac{nh}{n}\right) \right]^{1/n}$$

کی انتہا e ہوگی، جہاں کہ

$$\frac{1}{h} \int_a^{a+h} \log \phi(x) dx.$$

اس سے ذیل کی انتہا نکالیے

$$\left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2} \right) \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2} \right) \right]^{1/n}$$

22۔ اگر $n \rightarrow \infty$ ہو لیکن ہمیشہ $na = 1$ رہے تو

$$\prod_{r=1}^n [1 + (ra)^2]^{1/r}$$

کی انتہائی قیمت معلوم کیجیے۔

جوابات

1. $\log 2$ 2. $3/8$ 3. $\pi/2$ 4. $1/14$.
 5. $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \log 2$ 6. $\frac{\pi}{2}$ 7. $\log 4$ 9. $\pi/2$.
 10. $1/105$ 11. $\frac{1}{2} \log 2$ 12. $\sqrt{2} \tan^{-1} \sqrt{2} - \frac{\pi}{4}$
 13. $\frac{\pi}{2} + 1$ 14. $\frac{\pi}{2}$ 15. $\frac{1}{2} \tan 1$.
 16. $(2k) 1/(2^{2k})(k-1)^2$ 17. $1/24$ 18. $4e^{\pi/\sqrt{3}} e^{-3}$
 19. $1/e$ 21. $2e^{\frac{(\pi-4)}{2}}$ 22. $e^{\pi^2/24}$.
-

استعمال

7

ہموار قطعوں کے رقبے

(Areas of Plane Regions)

ترتیب (Quadrature)

7-1۔ ہم نے § 1-6 میں دیکھا کہ منحنی $x, y = f(x)$ - محور اور دو عرضوں $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان گھرے ہوئے رقبہ کو معین مکملہ

$$\int_a^b f(x) dx.$$

سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ منحنی $x = f(y)$ ، y - محور اور دو فصولوں $y = c$ اور $y = d$ کے درمیان گھرے ہوئے رقبہ کو معین مکملہ

$$\int_c^d f(y) dy.$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

کبھی کبھی وہ رقبے جو ان دونوں طرح سے گھرے نہیں ہیں انھیں بھی ان دونوں طرح کے رقبوں کے مرکب (combination) کی طرح لکھ سکتے ہیں۔

ہموار قطعہ کا رقبہ نکالنے کے عمل کو ترتیب (Quadrature) کہتے ہیں

اب ہم کچھ مثالوں پر غور کریں گے۔

نوٹ: جس قطعہ کا رقبہ نکالنا ہے وہ جس منحنی سے متعلق ہے اس کی ترسیم

(tracing) ہمیشہ ضروری ہوتی ہے۔ ترسیم سے رقبہ کو ایک معین تکلی یا معین تکلوں کے مرکب کے طور سے لکھ سکتے ہیں۔

اس باب اور اگلے ابواب میں جہاں ہم قوس کی لمبائی اور گردش ٹھوس شکلوں کے حجم اور سطح نکالنا سیکھیں گے اُس کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم تقاطعوں کی ترسیم کے ابتدائی اصول اچھی طرح سیکھ لیں اور خاص کر ذیل کے سختی تو بہت اچھی طرح دیکھ لیں کیونکہ آگے ابواب میں ان سے اکثر سابقہ رہے گا۔

کارٹیزی مساواتیں (Cartesian Equations)

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	(Ellipse)	علیس
$y^2 = 4ax,$	(Parabola)	مکانی
$y^2(a-x) = x^3.$	(Cisoid)	سیسائڈ
$x^3 + y^3 = 3axy.$	(Folium)	فولیم
$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$	(Astroid)	اسٹرائڈ
$x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$ یا		
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$	(Hyperbola)	زائد
$y = c \cosh (x/c).$	(Catenary)	کیٹنری (زنجیرہ)
$(x^2 + y^2) x = a^2(x^2 - y^2)$	(Strophoid)	اسٹروفائڈ
$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2).$	(Lemniscate)	لیمنسکیٹ
$x = a(\theta - \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$	(Cycloid)	سائیکلائڈ

مضف کی کتاب Differential Calculus کے ابواب Some important curve اور Curve

Tracing' رکھ سکتے ہیں۔

اکثر سائیکلائڈ کی مساوات کو ذیل کی شکلوں میں بھی لکھتے ہیں:

$$x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 + \cos \theta) \quad \text{..I}$$

$$x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta) \quad \text{..II}$$


مختلف مساواتوں والے یہ سائیکلائڈ، محاور (axes) کی نسبت سے مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔

$$x = a(\cos t + \frac{1}{2} \log \tan^2 \frac{1}{2} t), \quad y = a \sin t \quad (\text{Tractrix})$$

قطبی مساواتیں

$r = a(1 \pm \cos \theta)$	: (Cardioid)	سکاردوائڈ
$r = ae^{e\theta}$	: (Equiangular Spiral)	مساوی زاویہ اسپائرل
$r = a \sin 3\theta$	: (Three leaved Rose)	تین پتیہ گلاب
$r = a \sin 2\theta$	: (Four leaved Rose)	چار پتیہ گلاب
$r^2 = a^2 \cos 2\theta$	: (Lemniscate)	لیمنسکیٹ
$l/r = 1 + e \cos \theta$	: (Conic)	مخروطی

مثالیں



تصویر 10

1- علیس $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

علیس دونوں محاور کی نسبت سے متشکل (symmetric) ہے۔ اس لیے دونوں محاور سے چار ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کے

رقبے برابر ہیں۔ ہم حصہ OAB کا رقبہ معلوم کریں گے جو کہ پہلے ربع (quadrant) میں ہے اور پھر اس رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر علیس کا رقبہ حاصل کر لیں گے۔
 علیس کی مساوات حل کر کے y کو x کے تفاعل کی حیثیت سے نکالنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر (x, y) قوس AB پر کوئی نقطہ ہو تو

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$


اس لیے

$$\begin{aligned} \text{رقبہ } OAB &= \int_0^a y \, dx = \frac{b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx \\ &= \frac{b}{a} \left[\frac{x \sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \right]_0^a \\ &= \frac{b}{a} \left[\frac{a^2}{2} - \frac{\pi}{2} \right] = \frac{\pi}{4} ab \end{aligned}$$

اس لیے علیس کا رقبہ πab

2- ثابت کیجیے کہ منحنی $ay^3 = x^2(2a-x)$ (در نصف قطر (radius) a والے دائرہ کے رقبوں کا تناسب 5 اور 4 کا ہے۔

منحنی ایک لوپ (loop) کی شکل میں ہے جو $x = 0$ اور $x = 2a$ کے درمیان ہے اور x -محور کے گرد متماثل ہے۔



تصویر 11

منحنی کا رقبہ $= \frac{2}{a^3} \int_0^{2a} x^{5/2} \sqrt{2a-x} \, dx$
 اس تکرار کو حاصل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں

$$x = 2a \sin^2 \theta$$

جب $x = 0$ ہے تو $\theta = 0$ اور جب $x = 2a$ ہے تو $\theta = \frac{\pi}{2}$ ، اس لیے

$$\text{درکار رقبہ} = \frac{2}{a^3} \int_0^{\pi/2} (2a)^{5/2} \sin^5 \theta \cdot \sqrt{2a} \cdot \cos \theta \cdot 4a \sin \theta \cos \theta \, d\theta$$

$$= 64a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta \cos^3 \theta d\theta$$


$$= 64a^3 \frac{5.3.1.1}{8.6.4.2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{5a^3\pi}{4} = \frac{5}{4} \times \text{(نصف قطر } a \text{ والے دائرہ کا رقبہ)}$$

3۔ وہ رقبہ حاصل کیجیے جو کہ سائیکلائڈ

$$x = a(\theta - \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$$

کے ایک محراب (arch) اور x -محور کے درمیان ہے۔



سائیکلائڈ کے پہلے محراب بننے میں θ صفر سے 2π تک جاتا ہے۔ نقطہ $A = (2a\pi, 0)$ اب درکار رقبہ

$$= \int_0^{2\pi} y dx$$

ہم پاتے ہیں

$$dx = a(1 - \cos \theta) d\theta$$

اس لیے

$$\text{درکار رقبہ} = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos \theta) \cdot a(1 - \cos \theta) d\theta$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} \left(1 - 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta$$

$$= a^2 \left[\theta - 2 \sin \theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{2\pi}$$

$$= 3a^2 \pi.$$

نوٹ: سیکلے

$$\int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos \theta)^2 d\theta$$

کو دوسری طرح سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پاتے ہیں

اب

$$\int_0^a \sqrt{2ax-x^2} dx = \int_0^a \sqrt{a^2-(a-x)^2} dx$$

اس تکملہ کو حاصل کرنے کے لیے $a-x = a \sin \theta$ لکھنے پر ملتا ہے

$$\int_0^a \sqrt{2ax-x^2} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (a \cos \theta) (-a \cos \theta) d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^2 \theta d\theta = a^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi a^2}{4}$$

$$\int_0^a \sqrt{ax} dx = \left| \sqrt{a} \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right|_0^a$$


ساتھ ہی

$$= \frac{2a^{\frac{3}{2}}}{3}$$

اس لیے درکار رتبہ

$$= a^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right)$$

5۔ منحنی $x(x^2+y^2) = a(x^2-y^2)$ اور اس کے لامتناہی مماس (asymptote) کے درمیان گھرا رقبہ معلوم کیجیے۔ اس کے لوپ کا رقبہ بھی معلوم کیجیے۔



تصویر 14

منحنی x - محور کے گرد متشکل ہے۔ اس کا لوپ خطوط $x=0$ اور $x=a$ کے درمیان ہے۔ خط $x=-a$ منحنی کا لامتناہی مماس ہے۔

ہم پاتے ہیں

$$y = \pm x \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$$

ہموارتوں کے رتبے

اب توس OLA پر کسی نقطہ کے لیے

$$y = x \sqrt{\left(\frac{a-x}{a+x}\right)}$$

اور توس OMB پر کسی نقطہ کے لیے

$$y = -x \sqrt{\left(\frac{a-x}{a+x}\right)}$$

لوپ کا رقبہ

$$(1) \dots\dots\dots = 2 \int_0^a y dx = 2 \int_0^a x \sqrt{\left(\frac{a-x}{a+x}\right)} dx$$

منحنی اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کا رقبہ

$$(2) \dots\dots\dots = 2 \int_{-a}^0 y dx = 2 \int_{-a}^0 -x \sqrt{\left(\frac{a-x}{a+x}\right)} dx$$

مسئلہ (1) حاصل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں $x = a \sin \theta$ اور ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} 2 \int_0^a x \sqrt{\left(\frac{a-x}{a+x}\right)} dx &= 2 \int_0^a \frac{x(a-x)}{\sqrt{(a^2-x^2)}} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^3 (\sin \theta - \sin^3 \theta) d\theta \\ &= 2a^3 \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{4-\pi}{2} a^3 \end{aligned}$$

مسئلہ (2) حاصل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں $x = -a \sin \theta$ اور پاتے ہیں

$$\begin{aligned} 2 \int_{-a}^0 -x \sqrt{\left(\frac{a-x}{a+x}\right)} dx &= -2 \int_{-a}^0 \frac{x(a-x)}{\sqrt{(a^2-x^2)}} d\theta \\ &= -2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^3 (\sin \theta + \sin^3 \theta) d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^3 (\sin \theta + \sin^3 \theta) d\theta \\ &= \frac{4+\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

نوٹ: منحنی اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کے قطعہ (جو ∞ تک پھیلا ہے) کا رقبہ 'نا واجب تکملہ'۔

$$2 \int_{-a}^0 x \sqrt{[(a-x)/(a+x)]} dx$$

کے برابر ہے جس میں تکاملیہ $x = -a$ پر ∞ ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ تکملہ کی قیمت متناہی ہے اس لیے درکار رقبہ بھی متناہی ہے۔

7.2- زائد (hyperbola) کی تربیع (Quadrature)

اگر زائد


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کا راس A (vertex) ہو، مرکز O ہو اور $P(x, y)$ اس پر کوئی نقطہ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$x = a \cosh \frac{2S}{ab}, \quad y = b \sinh \frac{2S}{ab}$$

جہاں کہ S رقبہ قطعہ (sectorial area) OPA ہے۔

مان بیجیے کہ P, PM کا عرض (ordinate) ہے۔



ہماری تلوں کے رقبے

ہم پاتے ہیں

$$S = OAP \text{ رقبہ}$$

$$= (OMP \text{ رقبہ}) - (AMP \text{ رقبہ})$$

$$= \frac{1}{2} xy - (AMP \text{ رقبہ})$$

توس (arc) AP پر کسی نقطہ $P(x, y)$ کے لیے ہم پاتے ہیں

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

ساتھ ہی $OA = a$ اس لیے

$$AMP \text{ رقبہ} = \int_a^x y \, dx$$

$$= \frac{b}{a} \int_a^x \sqrt{x^2 - a^2} \, dx$$

$$= \frac{b}{a} \left[\frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \cosh^{-1} \frac{x}{a} \right]_a^x$$

$$= \frac{b}{a} \left[\frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \cosh^{-1} \frac{x}{a} \right]$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} x \cdot \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{b}{a} \left\{ \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \cosh^{-1} \frac{x}{a} \right\}$$

$$= \frac{ab}{2} \cosh^{-1} \frac{x}{a}$$

$$\Rightarrow x = a \cosh \frac{2S}{ab}$$

اس لیے

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} = b \sinh \frac{2S}{ab}.$$

مشقیں

1. ثبات کیجیے کہ منحنی

$$x^4 = a^2 (x^2 - y^2)$$

کے لوپ کا رقبہ $2a^2/3$ ہے۔
2. ثابت کیجیے کہ منحنی

$$5ay^2 = x(x-a)^2$$

کے لوپ کا رقبہ $8a^2/15\sqrt{3}$ ہے۔

3. محور اور منحنی $xy^2 = 4(2-x)$ سے گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

4. ثابت کیجیے کہ مکافوں

$$y^2 = 4a(x+a), y^2 = -4a(x-a)$$

کے درمیان گھرا ہوا رقبہ $16a^2/3$ ہے۔

5. منحنی $x^2y^2 = a^2(y^2 - x^2)$ اور اس کے لامتناہی مماسوں کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

6. یہ ثابت کیجیے کہ منحنی $y = 1 - y(1-y)x^2$ اور اس کے لامتناہی مماسوں کے درمیان کے لامتناہی قطعہ کا رقبہ 2π ہے۔

7. منحنی $x^4y^2 = x^4(a^2 - x^2)$ کے لوپ کا رقبہ نکالیے۔

8. ثابت کیجیے کہ منحنی $y^2 = x^2(4 - x^2)$ کے ایک لوپ کا رقبہ $16/3$ ہے۔

9. منحنی $y^2(2a-x) = x^3$ اور اس کے لامتناہی مماسوں کے درمیان لامتناہی قطعہ کا رقبہ نکالیے

10. منحنیوں $x^2 = 4ay$ اور $x^2 + 4a^2 = 8a^2/y$ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ نکالیے۔

11. اس منحنی نما مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے جو پہلے ربع میں ہے، جس کا راس

(vertex) مبدأ (origin) ہے، اور جو منحنیوں $y^2 = 4ax$ ، $x^2 = 4ay$ اور $x^2 + y^2 = 5a^2$ کے

کے درمیان گھرا ہوا ہے۔

12. محور اور منحنی $xy^2 = a^2(a-x)$ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

13. ثابت کیجیے کہ منحنیوں $xy^2 = a^2(a-x)$ اور $(a-x)y^2 = a^2x$ کے

ہموار قطعوں کے رقبے

257

درمیان گھرا ہوا رقبہ $(\pi-2)a^2$ ہے۔

14. سائیکلائڈ $x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ اور اس کے قاعدے۔

(base) کے درمیان کا رقبہ معلوم کیجیے۔

15. ثابت کیجیے کہ منحنی $a^2x^2 = y^2(2a-y)$ کا کل رقبہ πa^2 ہے۔

16. مساوات $x = a \cos^3 \theta$, $y = b \sin^3 \theta$ والے منحنی کا رقبہ معلوم کیجیے۔

17. منحنیوں $x^2 + y^2 = 9$ اور $y^2 = 8x$ کے درمیان گھرا ہوا قطعوں میں

سے چھوٹے قطعہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

18. منحنی $y^2(a+x) = (a-x)^3$ اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کا

رقبہ نکالیے۔

19. منحنی $y^2x + (x+a)^2(x+2a) = 0$ کے لوپ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

20. منحنی $x^2(x^2+y^2) = a^2(x^2-y^2)$ کا کل رقبہ معلوم کیجیے۔

21. منحنی $y^2 = x(x-2)^2/(4-x)$ کی ترسیم کیجیے۔ اس کے لوپ کا رقبہ معلوم

کیجیے اور اس منحنی اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کا رقبہ بھی نکالیے۔

22. یہ دکھائیے کہ منحنی $a^2y^2 = x^2(a^2-x^2)$ کا رقبہ $8a^2/15$ ہے۔

23. ثابت کیجیے کہ منحنی $ay^2 = (x-a)(x-5a)^2$ کے لوپ کا رقبہ $256a^2/15$

ہے۔

24. ثابت کیجیے کہ منحنی $a^2y^2 = x^2(2a-x)(x-a)$ کے لوپ کا رقبہ $3a^2\pi/8$ ہے۔

25. ثابت کیجیے کہ منحنی $y^2(a+x) = x^2(3a-x)$ کے لوپ کا رقبہ وہی ہے

جو منحنی اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کا رقبہ ہے۔

26. ثابت کیجیے کہ منحنی $y^2 = x^2/(4-x)(1-2x)$ کی دو شاخوں (branches)

اور اس کے لامتناہی مماسوں کے درمیان کا کل رقبہ 6π ہے۔

27. ثابت کیجیے کہ منحنی $c^2y^2 = (x-a)(x-h)^2$ کے لوپ کا رقبہ $8(b-a)^{3/2}/15c$

ہے۔

28۔ منحنی $y = \tanh x$ کی ترسیم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ پہلے ربع میں منحنی اور اس کے لامتناہی مماس $y = 1$ کے درمیان کا رقبہ $\log 2$ ہے۔



جوابات

3. 4π .	5. $4a^2$.	7. $\pi a^2/8$.	9. $3a^2\pi$.
10. $\frac{2}{3}(3\pi-2)a^2$.	11. $\frac{1}{3}[4+15\sin^{-1}\frac{1}{3}]a^2$.	12. πa^2 .	14. $3d^2\pi$.
16. $\frac{2}{3}\pi ab$.	17. $2\left(\frac{\sqrt{2}}{3}+\frac{9\pi}{4}-\frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{1}{3}\right)$	18. $3a^2\pi$.	
19. $\frac{1}{2}a^2(4-\pi)$.	20. $a^2(\pi-2)$.	21. $2(4-\pi), 2(\pi+4)$	

7.3 رقبہ قطع (Sectorial Area)

اگر کسی منحنی کی قطبی مساوات $r = f(\theta)$ (polar equation) ہو، تو منحنی اور دو نصف قطری سمتیوں (radii vectors) $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ سے گھرے ہوئے قطع کا رقبہ $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$ ہوتا ہے۔

مان لیجیے $\angle XO A = \alpha$ اور $\angle XO B = \beta$ اور مان لیجیے کہ $P(r, \theta)$ منحنی پر کوئی نقطہ ہے۔ ہم قطع AOP کے رقبہ کو A سے ظاہر کرتے ہیں اس طرح A، θ کا تفاعل ہے۔



مان لیجیے کہ $Q(r + \Delta r, \theta + \Delta \theta)$ منحنی پر کوئی دوسرا نقطہ ہے جو P کے اتنا قریب ہے کہ جب منحنی پر کوئی نقطہ P سے Q تک جاتا ہے تو نصف قطری سمتیہ یا تو لگاتار بڑھتا ہے (جیسے تصویر 16 میں) یا لگاتار گھٹتا ہے (جیسے تصویر 17 میں)۔ θ میں $\Delta \theta$ کا اضافہ ہونے پر رقبہ A میں رقبہ POQ کا اضافہ ہوتا ہے جسے ہم ΔA سے ظاہر کرتے ہیں۔

اب O کو مرکز اور OP اور OQ کو نصف قطر (radii) لے کر دائروں کے قوس کھینچیے جو کہ OQ اور OP کو ترتیب وار M اور L پر کاٹیں۔ اب ظاہر ہے کہ ΔA دائری قطوں (circular sectors) OPM اور OQL کے درمیان ہے۔
دائری قطع OPM کا رقبہ $\frac{1}{2} r^2 \Delta \theta$ اور دائری قطع OQL کا رقبہ $\frac{1}{2} (r + \Delta r)^2 \Delta \theta$

ہوگا۔
تصویر 16 کے لیے ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{2} r^2 \Delta \theta < \Delta A < \frac{1}{2} (r + \Delta r)^2 \Delta \theta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} r^2 < \frac{\Delta A}{\Delta \theta} < \frac{1}{2} (r + \Delta r)^2$$

مان لیجیے کہ $P + Q$ جس سے کہ $\Delta \theta$ اور Δr دونوں مائل بر صفر ہوتے ہیں تو انتہا لینے پر ہم پاتے ہیں۔

$$\frac{dA}{d\theta} = \frac{1}{2} r^2$$

تصویر 17 کے لیے ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{2} (r + \Delta r)^2 \Delta \theta < \Delta A < \frac{1}{2} r^2 \Delta \theta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (r + \Delta r)^2 < \frac{\Delta A}{\Delta \theta} < \frac{1}{2} r^2$$

اس صورت میں بھی ہم پاتے ہیں

$$\frac{dA}{d\theta} = \frac{1}{2} r^2$$

اب


$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dA}{d\theta} \cdot d\theta = A \Big|_{\alpha}^{\beta}$$

$$= (A \text{ پر } \theta = \beta \text{ کی قیمت}) - (A \text{ پر } \theta = \alpha \text{ کی قیمت})$$

$$= \text{قطع } AOB \text{ کا رقبہ} - 0 = \text{قطع } AOB \text{ کا رقبہ}$$

مثالیں


1- کارڈوائڈ $r = a(1 - \cos \theta)$ کا رقبہ نکالے
منحنی ابتدائی خط (initial line) کے گرد مشاکل ہے۔



تصویر 18

$$\begin{aligned} \text{درکار رقبہ} &= 2 \int_0^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta \\ &= a^2 \int_0^{\pi} (1 - \cos \theta)^2 d\theta \\ &= 4a^2 \int_0^{\pi} \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \phi d\phi, \left(\frac{\theta}{2} = \phi \text{ جہاں } \right) \\ &= 8a^2 \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3a^2\pi}{2} \end{aligned}$$

2- منحنی $x^5 + y^5 = 5ax^2y^3$ کے لوپ کا رقبہ نکالے



تصویر 19

لوپ کا رقبہ اس قطع کا رقبہ ہوگا جو منحنی
در نصف قطری سمتوں $\theta = 0$ اور $\theta = \pi/2$
سے گھرا ہوا ہے۔ دراصل لوپ کا رقبہ نصف قطری
سمتیہ کے $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/2$ تک جانے
پر بنتا ہے۔

ہمارے قطعوں کے رقبے

منحنی کی قطبی مساوات

$$r = \frac{5a \cos^3 \theta \sin^2 \theta}{\cos^5 \theta + \sin^5 \theta}$$

ہے۔ اس لیے لوپ کا درکار رقبہ

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{25a^3 \cos^4 \theta \sin^4 \theta}{(\cos^5 \theta + \sin^5 \theta)^2} d\theta$$

(شمار کنندہ و نسب نما کی $\cos^{10} \theta$ سے تقسیم پر)


$$= \frac{25a^3}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^4 \theta \sec^2 \theta}{(1 + \tan^5 \theta)^2} d\theta$$

$$= \frac{25a^3}{2} \int_1^{\infty} \frac{1}{t^3} \cdot \frac{dt}{t^2} \quad (1 + \tan^5 \theta = t \text{ جہاں})$$

$$= \frac{5a^3}{2} - \frac{1}{t} \Big|_1^{\infty} = \frac{5a^3}{2}$$

3- علیوں $x^2 + 2y^2 = a^2$ اور $2x^2 + y^2 = a^2$ کے درمیان مشترک رقبہ

نکالے۔



تصویر 20

دی ہوئی مساواتوں کو اگر یوں لکھیں

$$(1) \dots\dots\dots \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}a^2} = 1$$

$$(2) \dots\dots\dots \frac{x^2}{\frac{1}{2}a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

تو ہم دیکھتے ہیں کہ (1) کا محور اکبر (major axis)

x-محور پر ہے اور (2) کا محور اکبر y-محور پر

ہے۔ ساتھ ہی درکار رقبہ، قطعہ $OA'PB$ کا

چار گنا ہے۔ جہاں کہ P نقطہ تقاطع (point of intersection) ہے۔ دونوں مساواتیں

حل کرنے پر نقطہ P کے مختصات (co-ordinates) $(a/\sqrt{3}, a/\sqrt{3})$ ملتے ہیں۔

لہذا $\angle XOP = \pi/4$ اور خط OP کی مساوات $y = x$ ہے۔ اگر ہم x اور y کو باہم بدل دیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک علیپس کی مساوات دوسرے علیپس کی مساوات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس لیے قطعہ $OA'PB$ کا رقبہ $OA'P$ کے رقبہ کا دوگنا ہے۔ اب ہم یہ مان سکتے ہیں کہ رقبہ $OA'P$ منحنی $A'P$ اور دو نصف قطری سمتیوں $\theta = 0$ اور $\theta = \pi/4$ سے گھرا ہوا قطعہ کا رقبہ ہے۔

اب $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ رکھ کر قطبی مساوات میں بدلنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ علیپس (2) کی مساوات (جس کا کہ $A'P$ ایک حصہ ہے)

$$r^2 = 2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta$$

ہے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} \text{رقبہ } OA'P &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{a^2}{2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{a^2 \sec^2 \theta}{2 + \tan^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{u^2 dt}{2 + t^2} \quad (t = \tan \theta \text{ جہاں}) \\ &= \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \tan^{-1} \frac{t}{\sqrt{2}} \right|_0^1 = \frac{a^2}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

اس لیے درکار رقبہ

$$\begin{aligned} &= 8 \times \frac{a^2}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= 2\sqrt{2} a^2 \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$


نوٹ ہے۔ x محور پر عرض PM کھینچ کر اور دونوں قطعوں

MPA اور $OBPM$

پر § 6-1 والا فارمولا لگا کر بھی یہ رقبہ معلوم کر سکتے ہیں۔

4۔ ثابت کیجیے کہ فولیم $x^3 + y^3 = 3axy$ اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کا رقبہ اس کے لوپ کے رقبہ کے برابر ہے۔

لامتناہی مماس کی مساوات $x + y + a = 0$ ہے۔ منحنی اور لامتناہی مماس کے قطبی مساوات ترتیب وار



$$r = \frac{3a \sin \theta \cos \theta}{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}$$

$$r = \frac{a}{\sin \theta - \cos \theta} \quad \text{اور}$$

ہیں۔ لوپ کا رقبہ

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{9a^2 \sin^3 \theta \cos^3 \theta}{(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)^2} d\theta$$

(نسب نما و شمار کنندہ کی $\cos^3 \theta$ سے تقسیم پر) تصویر 21

$$= \frac{9}{2} a^2 \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^2 \theta \sec^2 \theta}{(1 + \tan^3 \theta)^2} d\theta$$

$$= \frac{3a^2}{2} \int_0^{\infty} \frac{dt}{t^2}, \quad 1 + \tan^3 \theta = t. \quad \text{جہاں}$$

$$= \frac{3a^2}{2} \left[-\frac{1}{t} \right]_1^{\infty} = \frac{3a^2}{2}.$$

اب ہم منحنی اور لامتناہی مماس کے درمیان کا رقبہ نکالیں گے۔

لامتناہی مماس کے متوازی (parallel) کھینچی گئی نقطہ دار سطر OX سے زاویہ $3\pi/4$ (angle) بنتی ہے۔ ہم 0 سے کوئی ایسا خط کھینچتے ہیں جس کا سمتیہ زاویہ $3\pi/4$ اور π کے درمیان ہو۔ مان لیتے یہ خط، منحنی اور لامتناہی مماس کو ترتیب وار

P اور Q پر کاٹتا ہے۔

پہلے ہم منحنی اور لامتناہی مماس کے درمیان، دوسرے رقبہ والا رقبہ نکالیں گے۔

یہ رقبہ سطح $OBPQAO$ کے رقبہ کی انتہا ہے جب کہ OA, OP سے چل کر نقطہ دار
خط یکجہ جائے۔

$$\begin{aligned} \triangle OAQ \text{ کا رقبہ} &= \frac{1}{2} \int_0^\pi r^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{a^2}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} d\theta \\ &\text{منحنی اور خط } OP \text{ کے درمیان کا رقبہ} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{9a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)^2} d\theta \end{aligned}$$

اس لیے

$$OBQPAO \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \int_0^\pi \left[\frac{a^2}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} - \frac{9a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)^2} \right] d\theta.$$

اب

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)^2} d\theta &= \int \frac{\tan^2 \theta \sec^2 \theta}{(1 + \tan^3 \theta)^2} d\theta \\ &= \int \frac{dt}{3t^2} \quad (t = 1 + \tan^3 \theta \text{ جہاں}) \\ &= -\frac{1}{3t} = -\frac{1}{3(1 + \tan^3 \theta)}. \end{aligned}$$

ساتھ ہی

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} d\theta &= \int \frac{\sec^2 \theta}{(1 + \tan \theta)^2} d\theta \\ &= \int \frac{dt}{t^2} \quad (t = 1 + \tan \theta \text{ جہاں}) \\ &= -\frac{1}{t} = -\frac{1}{1 + \tan \theta}. \end{aligned}$$

اس لیے

$$\begin{aligned} OBQPAO \text{ رقبہ} &= \frac{a^2}{2} \left[-\frac{1}{1 + \tan \theta} + \frac{3}{1 + \tan^3 \theta} \right]_0^\pi \\ &= \frac{a^2}{2} \left[2 - \left(-\frac{1}{1 + \tan \theta} + \frac{3}{1 + \tan^3 \theta} \right) \right]. \end{aligned}$$

ہموار قطوں کے رقبے

ہمیں اس کی انتہا معلوم کرنا ہے جب کہ $\theta \leftarrow 3\pi/4$ ہو۔

اب

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+\tan \theta} - \frac{3}{1+\tan^3 \theta} &= \frac{\tan^3 \theta - \tan \theta - 2}{1+\tan^3 \theta} \\ &= \frac{(\tan \theta + 1)(\tan^2 \theta - \tan \theta - 2)}{(\tan \theta + 1)(\tan^3 \theta - \tan \theta + 1)} \\ &= \frac{\tan \theta - 2}{\tan^3 \theta - \tan \theta + 1} \end{aligned}$$

جو کہ 1- کی طرف مائل ہوتا ہے جب کہ $\theta \leftarrow 3\pi/4$ ہو یعنی جب $\tan \theta \leftarrow -1$ ہو۔
اس لیے رقبہ

$$= (a^2/2)(2-1) = a^2/2$$

نقطہ $x = y$ کے گرد منحنی کے متشاکل ہونے کے باعث چوتھے ربع میں بھی منحنی اور
لاستناہی مماس کے درمیان کا رقبہ $a^2/2$ ہے۔ تیسرے ربع والا رقبہ مثلثی رقبہ ہونے
کے باعث $a^2/2$ ہے۔ اس لیے منحنی اور اس کے لاستناہی مماس کے درمیان کا رقبہ

$$= \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 = \frac{3}{2}a^2$$

جس سے کہ نتیجہ ثابت ہو گیا۔

5۔ منحنی $x^4 + 3x^2y^2 + 2y^4 = a^2x$ کے لوپ کا رقبہ معلوم کیجیے

یہ منحنی بالمتقابل ربعوں (opposite quadrants) میں متشاکل ہے اور دونوں محاور


$x = 0$ اور $y = 0$ مبدا (origin) پر اس کے مماس (tangents) ہیں۔ اس کا
کوئی لاستناہی مماس (asymptote) نہیں۔

قطبی مختصات (polar co-ordinates) میں تبدیلی پر ہم پاتے ہیں

$$r^2 = \frac{a^2 \cos \theta \sin \theta}{\cos^4 \theta + 3 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 2 \sin^4 \theta}$$

اب θ کے صفر سے $\pi/2$ تک بڑھنے پر نقطہ (r, θ) منحنی کا لوپ $OAPBO$ بناتا ہے۔

اس لیے لوپ کا رقبہ



تصویر 22

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} r^2 d\theta \\ &= \frac{a^3}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta \cos \theta}{\cos^4 \theta + 3 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 2 \sin^4 \theta} d\theta \\ &\quad \text{(نسب نما و شمار کنندہ کی } \cos^4 \theta \text{ سے تقسیم پر)} \\ &= \frac{a^3}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\tan \theta \sec^2 \theta d\theta}{1 + 3 \tan^2 \theta + 2 \tan^4 \theta} \end{aligned}$$

اب $t = \tan^2 \theta$ رکھنے پر درکار رقبہ

$$\begin{aligned} &= \frac{a^3}{4} \int_0^{\infty} \frac{dt}{1 + 3t + 2t^2} \\ &= \frac{a^3}{4} \int_0^{\infty} \frac{dt}{(2t+1)(t+1)} \\ &= \frac{a^3}{4} \int_0^{\infty} \left(-\frac{1}{t+1} + \frac{2}{2t+1} \right) dt \\ &= \frac{a^3}{4} \left[\log \frac{2t+1}{t+1} \right]_0^{\infty} = \frac{a^3}{4} \log 2. \end{aligned}$$

کیونکہ $t \rightarrow \infty$ ہونے پر

$$\log \frac{2t+1}{t+1} = \log \frac{2+1/t}{1+1/t} \rightarrow \log 2$$

مشقیں

- 1۔ منحنی $r = a \sin 2\theta$ کے لوپ کا رقبہ نکالیے۔
- 2۔ منحنی $r = a \sin 3\theta$ کے لوپ کا رقبہ نکالیے۔
- 3۔ مکان $r = a + b \cos \theta$ کا رقبہ نکالیے ($a > b$)

4- ثابت کیجیے کہ منحنی $x^3 + y^3 = 3axy$ کے لوپ کا رقبہ منحنی $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ کے لوپ کے رقبہ کا دوگنا ہے۔

5- منحنی $r = a \cos \theta$ کے پہلے ربع والے لوپ کا رقبہ نکالیے۔
6- ثابت کیجیے کہ کارڈائوئڈ (cardioids)

$$r = a(1 + \cos \theta), r = a(1 - \cos \theta)$$

کے درمیان مشترک رقبہ $a^2(3\pi - 8)/2$ ہے۔

7- ثابت کیجیے کہ منحنی $r \cos \theta = a \cos 2\theta$ کے لوپ کا رقبہ $a^2(4 - \pi)/2$ ہے۔

8- دائروں $r = 2a \cos \theta, r = a\sqrt{2}$ کے درمیان مشترک (common) رقبہ معلوم کیجیے۔

9- منحنی $x^4 + y^4 = 2a^2xy$ کے لوپ کا رقبہ نکالیے۔

10- منحنی $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 + b^2y^2$ کا کل رقبہ نکالیے۔

11- ثابت کیجیے کہ منحنی $x^5 + y^5 = a^5x^2y^3$ کے لوپ کا رقبہ $\pi a^5/12$ ہے۔

12- ثابت کیجیے کہ منحنی $(x^2 + y^2)^3 - 4axy^2 = 0$ کے پہلے ربع والے لوپ کا رقبہ

$$\pi a^3/4$$

13- ثابت کیجیے کہ منحنی $(x+y)(x^2+y^2) = 2axy$ کے لوپ کا رقبہ $a^2(1 - \pi/4)$ ہے۔

یہ بھی دکھائیے کہ منحنی اور اس کے لامتناہی مماس کے لوپ کا رقبہ

$$a^2(1 + \pi/4)$$

14- فولیم $x^3 + y^3 = 3axy$ کے لوپ کے رقبہ کو خط $x + y = 2a$ جس تناسب

(ratio) میں تقسیم کرتا وہ تناسب معلوم کیجیے۔

15- ثابت کیجیے کہ دوسرے ربع میں منحنی $x^5 + y^5 = 5ax^2y^3$ اور اس کے لامتناہی

ماس کے درمیان کا رقبہ a^5 ہے۔

16- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = \sqrt{3} \cos 3\theta + \sin 3\theta$ کے لوپ کا رقبہ $\pi/8$ ہے۔

17- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = \frac{1}{2} + \cos 2\theta$ کے بڑے اور چھوٹے لوپوں کے رقبوں کا

تناسب $(4\pi + 3\sqrt{3})/(2\pi - 3\sqrt{3})$

18- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = a(1 + 2 \cos \theta)$ کے دو لوپوں کے درمیان گھرا ہوا رقبہ

$$-\frac{a^2}{2}(\pi + 3\sqrt{3})$$

19- علیحدگی $r = 1 + e \cos \theta$ کا رقبہ نکالیے۔

20- ثابت کیجیے کہ منحنی $r^2 \cos \theta = a^2 \sin 3\theta$ کے پہلے ربع والے لوپ کا رقبہ

$$-\frac{a^2}{4} \log (e^2/4)$$

21- منحنی $r = a\theta/(\theta + 1)$ کی ترسیم کیجیے جب کہ θ صفر سے 2π تک بڑھے۔

ثابت کیجیے کہ اس منحنی اور ابتدائی خط کے درمیان کا رقبہ

$$\frac{a^2}{2} [2\pi - (2\pi + 1) - 2 \log (2\pi + 1) + 1]$$

22- کارڈوائڈ $r = a(1 - \cos \theta)$ اور اس کے ڈھیرے مماس (double tangent)

$x = a/4$ کے درمیان کا رقبہ نکالیے۔

جوابات

1. $\pi a^2/8$.

2. $\pi a^2/12$.

3. $\pi(2a^2 + b^2)/2$.

8. $a^2(\pi - 1)$

9. $\pi a^2/4$.

10. $\pi(a^2 + b^2)/2$.

14. $2 : 1$.

19. $\pi/2(1 - e^2)^{3/2}$.

22. $a^2 \left[\frac{15}{16} \sqrt{3} - \frac{\pi}{2} \right]$

7.4- کسی بند منحنی (closed curve) سے گھرا ہوا رقبہ

ہم جانتے ہیں کہ معین تکملہ

$$\int_a^b y dx$$

منحنی $y = f(x)$ محور اور دو عرضوں $x = a$ اور $x = b$ سے گھرا ہوا ہے

ہموار قطوں کے رقبے

رقبہ کو ظاہر کرتا ہے جو رقبہ اس طور سے گھرا ہوا نہیں ہوتا اُسے پہلے ایسے قطوں کے مرکب (combination) سے ظاہر کرتے ہیں جو یوں گھرے ہوئے ہوں اور پھر اُس پورے قطع کا رقبہ ان چھوٹے قطوں کے رقبوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مکملوں

$$\int_c^d x dy, \frac{1}{2} \int_a^b r^2 du.$$

پر بھی اسی قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں۔

اب ہم ایسے فارمولوں پر غور کریں گے جن کی مدد سے کسی بند منحنی سے گھرا ہوا رقبہ معلوم ہو سکے خواہ منحنی کیسا بھی ہو بشرطیکہ وہ خود کو نہ کاٹے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں کہ محوروں کی نسبت سے منحنی کا کیا مقام ہے۔

پیرامیٹری مساوات (parametric equations)

$$x = f(t), y = \varphi(t)$$

والے بند منحنی پر غور کیجیے۔ یہاں "t" پیرامیٹر ہے۔

ہم مان لیتے ہیں کہ منحنی خود کو نہیں کاٹتا اور مان لیجیے کہ جب پیرامیٹر t_1 سے t_2

تک بڑھتا ہے تو نقطہ $P(x, y)$

خلافاً ساعت وار (Anti-clockwise)

چل کر پورے منحنی

بناتا ہے۔ چونکہ منحنی بند ہے اس

لیے منحنی پر پیرامیٹر کی قیمت


t_1 اور t_2 رکھنے پر وہی نقطہ

ملتا ہے۔ مان لیجیے وہ نقطہ C

ہے۔

یہ دکھایا جائے گا کہ ایسے منحنی سے گھرا ہوا رقبہ

$$= \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$



تصویر 23

مان لیجیے کہ منحنی کے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ فصلہ والے نقطے ترتیب وار A اور B ہیں۔

مان لیجیے کہ منحنی ایسا ہے کہ y محور کے متوازی $parallel$ اور نقطوں A اور B کے عرضوں $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان کوئی بھی خط منحنی کو دو اور صرف دو نقطوں P_1 اور P_2 پر کاٹتی ہے۔ P_1 قوس ACB پر اور P_2 قوس BP_2A پر ہے۔

$$(\text{رقبہ } AGHBCAG) - (\text{رقبہ } AGHBP_2AG) = \text{قطعہ کا رقبہ}$$

$$= \int_a^b MP_2 dx - \int_a^b MP_1 dx$$

$$= - \int_b^a MP_2 dx - \int_a^b MP_1 dx.$$

اب ہم ان تہوں کو متغیر کی ارقام میں رکھیں گے۔
مان لیجیے کہ t_0 اور t_1 نقطوں A اور B پر پیرامیٹر کی قیمتیں ہیں۔ جب $P(x, y)$ قوس BP_2A پر B سے A کو جاتا ہے تو پیرامیٹر t_0 سے t_1 تک بڑھتا ہے۔ جب $P(x, y)$ قوس AC پر A سے C کو جاتا ہے تو پیرامیٹر t_1 سے t_2 تک بڑھتا ہے۔ جب $P(x, y)$ قوس CB پر C سے B کو جاتا ہے تو پیرامیٹر t_2 سے t_0 تک بڑھتا ہے۔

$$\therefore \int_b^a MP_2 dx = \int_{t_0}^{t_1} y \frac{dx}{dt} dt,$$

اور

$$\begin{aligned} \int_a^b MP_1 dx &= \int_a^{OL} MP_1 dx + \int_{OL}^b MP_1 dx \\ &= \int_{t_1}^{t_0} y \frac{dx}{dt} dt + \int_{t_1}^{t_2} y \frac{dx}{dt} dt \end{aligned}$$

$$\therefore \text{قطعہ کا رقبہ} = - \int_{t_0}^{t_1} y \frac{dx}{dt} dt - \int_{t_1}^{t_2} y \frac{dx}{dt} dt - \int_{t_2}^{t_0} y \frac{dx}{dt} dt$$

$$= - \int_{t_1}^{t_0} y \frac{dx}{dt} dt - \int_{t_0}^{t_2} y \frac{dx}{dt} dt - \int_{t_2}^{t_1} y \frac{dx}{dt} dt$$

$$(i) \dots\dots = - \int_{t_1}^{t_2} y \frac{dx}{dt} dt.$$

اسی طرح یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسی قطع کا رقبہ


$$(ii) \dots\dots\dots = \int_{t_1}^{t_2} x \frac{dy}{dt} dt$$

ان دونوں کو جوڑ کر آدھا کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قطع کا رقبہ

$$(iii) \dots\dots\dots = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

یہ نتیجہ اس منحنی کے لیے بھی صحیح ہے جسے محوروں کے متوازی کوئی خط دو سے زیادہ نقطوں پر کاٹے، لیکن اس وسعت (extension) کی تفصیل یہاں نہیں دی جائے گی۔

نوٹ 1: تشاکل (symmetry) کی وجہ سے (i) اور (ii) کے بجائے فارمولا (iii) جموایا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔
نوٹ 2: مان بیچے کہ منحنی خود کو ایک بار کاٹتا ہے جیسا کہ تصویر 24 میں دکھایا گیا ہے۔



تصویر 24

مان بیچے کہ جیسے جیسے $P(x, y)$ منحنی OAB پر چل کر واپس ہوتا ہے دیسے t_1, t_2 سے t_1 تک بدلتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی مان بیچے کہ جیسے جیسے $P(x, y)$ منحنی OCD پر O سے چل کر وہیں واپس آتا ہے دیسے t_1, t_2 سے t_2 تک بدلتا ہے۔

توس $OABO$ کو خلاف ساعت وار طے کیا جاتا ہے اور توس OCD کو خلاف

مساحت دار طے کیا جاتا ہے۔

لوپ $OABO$ کا رقبہ

$$= \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_1'} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

لوپ $OCDO$ کا رقبہ

$$= -\frac{1}{2} \int_{t_1'}^{t_2} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

$$(OABO \text{ رقبہ}) - (OCDO \text{ رقبہ}) = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

اس فارمولے سے دونوں رقبوں کا فرق ملتا ہے، نہ کہ کل رقبہ۔
کل رقبہ پانے کے لیے، ہمیں ہر رقبہ علاحدہ علاحدہ نکال کر ان کو جوڑنا چاہیے۔
نوٹ 3: معین تکملہ

$$\frac{1}{2} \int \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

کو اکثر مختصراً ایسے لکھ دیتے ہیں :-

$$\frac{1}{2} \int (xdy - ydx)$$

مثالیں

1۔ علیس $x = a \cos t, y = b \sin t$ کا رقبہ نکالیے

ہم پاتے ہیں

$$x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} = ab (\cos^2 t + \sin^2 t) = ab$$

اس لیے درکار رقبہ

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab dt = \pi ab$$

ہم ارقطوں کے رقبے

2- منحنی

$$x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, y = \frac{t-t^3}{1+t^2} \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

کی ترسیم کیجیے اور اس کے لوپ کا رقبہ نکالیے۔

1، کا اسقاط (elimination) کر کے منحنی کی ترسیم ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم 1 کے -1 سے 1 تک بڑھنے پر جو حصہ بنتا ہے۔ اس کی براہ راست ترسیم کریں گے۔

ہم پاتے ہیں

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{4t}{(1+t^2)^2}, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{t^4 - 4t^2 - 1}{(t^2+1)^2}$$

$$\text{مثبت } dx/dt \quad \Leftrightarrow \quad \text{منفی } t$$

$$\text{منفی } dx/dt \quad \Leftrightarrow \quad \text{مثبت } t$$

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ

1 کے -1 سے 0 تک بڑھنے پر x بڑھتا ہے۔

اور 0 کے 1 سے 1 تک بڑھنے پر x گھٹتا ہے۔

اب dy/dt کی علامت میں تبدیلی دیکھنے کے لیے مساوات

$$t^4 + 4t^2 - 1 = 0$$

پر غور کیجیے۔ اس سے ملتا ہے

$$t^2 = \sqrt{5}-2, -\sqrt{5}-2$$

اس لیے

$$\begin{aligned} (t^4 + 4t^2 - 1) &= [t^2 - (\sqrt{5}-2)][t^2 - (-\sqrt{5}-2)] \\ &= [t^2 - (\sqrt{5}-2)][t^2 + (\sqrt{5}+2)] \end{aligned}$$

جن منحنیوں کی پیرامیٹری مساوات دی ہوتی ہیں ان کی ترسیم میں یہ طریقہ کار آمد ہوتا ہے۔
اس طریقے سے خاص طور پر اسٹرائٹ اور سائیکلائڈ بہت آسانی سے ترسیم ہو سکتے ہیں۔

$$t^2 = \sqrt{5-2}$$

$$t = \pm \sqrt{(\sqrt{5-2})} = \pm .4 \dots$$

اس لیے ہم پاتے ہیں

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{(t^2 + \sqrt{5} + 2)(t + .4 \dots)(t - .4 \dots)}{(t^2 + 1)^2}$$

اس لیے اگر

$$-1 < t < .4 \text{ تک } \frac{dy}{dt} < 0 \text{ یعنی } y \text{ گھٹتا ہے۔}$$

$$.4 < t < 1 \text{ سے بڑھتا ہے } \frac{dy}{dt} > 0 \text{ یعنی } y \text{ بڑھتا ہے۔}$$

$$t > 1 \text{ سے بڑھتا ہے } \frac{dy}{dt} < 0 \text{ یعنی } y \text{ گھٹتا ہے۔}$$

لہذا

$$t \text{ کے } -1 \text{ سے } .4 \text{ تک بدلتے پر } \frac{dy}{dt} < 0 \text{ یعنی } y \text{ گھٹتا ہے۔}$$


$$t \text{ کے } .4 \text{ سے } 1 \text{ تک بدلتے پر } \frac{dy}{dt} > 0 \text{ یعنی } y \text{ بڑھتا ہے۔}$$

$$t \text{ کے } 1 \text{ سے } .4 \text{ تک بدلتے پر } \frac{dy}{dt} < 0 \text{ یعنی } y \text{ گھٹتا ہے۔}$$

ساتھ ہی

$$t = -1 \Rightarrow x = 0, y = 0, \frac{dy}{dx} = -1$$

$$t = 1 \Rightarrow x = 0, y = 0, \frac{dy}{dx} = 1$$



تصویر 25

اس طرح لوپ کی ترسیم ہوگئی۔

$$x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} = \frac{1-t^2-t^4+t^6}{(1+t^2)^3} = \frac{(1+t^2)(1-t^2)^2}{(1+t^2)^3} = \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^3} dt.$$

$$\begin{aligned} \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^3} &= 1 - \frac{4t^2}{(1+t^2)^3} \\ &= 1 - \frac{4(t^2+1-1)}{(t^2+1)^3} = 1 - \frac{4}{t^2+1} + \frac{4}{(t^2+1)^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{درکار رقبہ} &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 1 \cdot dt - 2 \int_{-1}^1 \frac{dt}{t^2+1} + 2 \int_{-1}^1 \frac{dt}{(t^2+1)^3} \\ &= 1 - \pi + 2 \int_{-1}^1 \frac{dt}{(t^2+1)^3}. \end{aligned}$$

دائیں طرف کا تکملہ حاصل کرنے کے لیے $t = \tan \theta$ رکھیں تو

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{dt}{(1+t^2)^3} &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta + \sin \theta \cos \theta \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} \pi + 1 \right\} \end{aligned}$$

اس لیے

$$\text{رقبہ} = 1 - \pi + \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) = 2 - \frac{\pi}{2}$$

نوٹ: دیے ہوئے پیرامیٹری مساوات سے t اسقاط (eliminate) کرنے پر ہم کو منحنی کی کارٹیزی مساوات

$$x(x^2 + y^2) = x^3 - y^3$$

ملتی ہے۔ اس کی مدد سے بھی منحنی کی ترسیم بہ آسانی ہو سکتی ہے (7.1 § کی مثال 5 کی تصویر دیکھیے)

مشقیں

1- منحنی

$$x = a(1-t^2), y = at(1-t^2), \quad -1 \leq t \leq 1$$

کی ترسیم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ اس کے لوپ کا رقبہ $8a^2/15$ ہے۔
2۔ کی ہر قیمت کے لیے منحنی

$$x = t - t^3, y = 1 - t^3$$

کی ترسیم کیجیے کہ اس میں بننے والے لوپ کا رقبہ $16/35$ ہے۔
3۔ ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x = (t-1)e^{-t}, y = tx$$

کا ایک لوپ ہے اور اس کا رقبہ معلوم کیجیے۔

$$4۔ \text{منحنی } x = a \cos^3 t, y = b \sin^3 t \text{ کا رقبہ نکالیے۔}$$

منحنی $x = a \sin 2t, y = a \sin t$ کی ترسیم کیجیے اور اس کے ایک لوپ کا رقبہ نکالیے۔

$$6۔ \text{منحنی } x = a \cos t + b \sin t + c, y = a' \cos t + b' \sin t + c'.$$

کا رقبہ نکالیے۔

7۔ منحنی

$$x = a(3 \cos \theta - \cos^3 \theta)$$

$$y = a(3 \sin \theta - \sin^3 \theta)$$

کی ترسیم کیجیے اور اس کا رقبہ معلوم کیجیے۔
8۔ منحنی

$$x = a(3 \sin \theta - \sin^3 \theta), y = a \cos^3 \theta$$

کا رقبہ معلوم نکالیے۔

9۔ ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x = a \sin 2\theta (1 + \cos 2\theta)$$

$$y = a \cos 2\theta (1 - \cos 2\theta)$$

سے گھرا ہوا رقبہ $a^2 \pi$ ہے۔

10۔ منحنی

$$x = a(\sin \theta + \frac{1}{3} \sin 3\theta).$$

$$y = a(\cos \theta - \frac{1}{3} \cos 3\theta)$$

کی ترسیم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ اس کا رقبہ $\frac{8}{3} a^2 \pi$ ہے۔

جوابات

3. $1/e$. 4. $3\pi ab/8$. 5. $4a^2/3$. 6. $\pi(ab' - a'b)$.
7. $39a^2\pi/8$. 8. $15a^2\pi/8$.

7.5۔ معین تکملوں اور رقبوں کا تخمینہ لگانے کے لیے

سمسن کا اصول (Simpson's rule)

رقبہ نکالنے کا جو طریقہ اوپر بتایا گیا ہے اُس کے لیے ضروری ہے کہ

- (i) منحنی کی مساوات $y = f(x)$ معلوم ہو
(ii) ایسا فنکشن حاصل کرنا ممکن ہو جس کا تفرقی سر $f(x)$ ہوا یعنی دیے ہوئے
فنکشن کا غیر متعین (indefinite) تکملہ نکالنا ممکن ہو۔
عملاً، منحنی کی ترسیم کچھ محدود تعداد میں الگ الگ نقطوں کی مدد سے کرتے ہیں
اس لیے ہم اُس کی مساوات نہیں جانتے۔ پھر اگرچہ اُس کی مساوات معلوم بھی ہو تو
ضروری نہیں کہ درکار غیر معین تکملہ نکالنا ہمیشہ ممکن ہی ہو۔
مثال کے طور پر مان لیجیے

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{x} \sin x \, dx$$

کی قیمت درکار ہے۔

چونکہ $\sqrt{\sin x}$ کا غیر معین تکملہ ابتدائی تفاعلوں سے نہیں مل سکتا، اس لیے ہم معین تکملہ کی صحیح قیمت نہیں نکال سکتے۔ لیکن سمن کے اصول (Simpson's rule) اور دوسرے اصولوں سے اس کی قیمت کا تخمینہ حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہاں صرف سمن کے اصول پر غور کریں گے۔

لیما (Lemma) مکانی

$$y = l + mx + nx^2$$

پر غور کیجیے اور اس پر تین نقطے P_1, P_2, P_3 اور ایسے بیچے کہ P_1 اور P_3 پر کے عرض P_1A_1 اور P_3A_3 کے عرض P_2A_2 سے برابر دوری پر ہوں۔

$$A_1A_2 = A_2A_3 = h \quad \text{مان لیجیے کہ}$$


$$OA_3 = a + h \text{ اور } OA_1 = a - h \text{ تاکہ } OA_2 = a$$

اب قطع $P_1A_1A_2P_3P_2$ کا رقبہ

$$= \int_{a-h}^{a+h} (l + mx + nx^2) dx$$

$$= \left[lx + \frac{m}{2} x^2 + \frac{n}{3} x^3 \right]_{a-h}^{a+h}$$

$$(i) \dots = 2h(l + ma + na^2 + \frac{1}{3}nh^2)$$



تصویر 26

اس رقبہ کو ہم P_1, P_2, P_3 اور کے y_1, y_2, y_3 کی ارقام میں رکھیں گے۔ ہم پاتے ہیں

$$(ii) \dots y_1 = P_1A_1 = l + m(a-h) + n(a-h)^2,$$

$$(iii) \dots y_2 = P_2A_2 = l + ma + na^2,$$

$$(iv) \dots y_3 = P_3A_3 = l + m(a+h) + n(a+h)^2.$$

$$\therefore y_1 + y_3 = 2(l + ma + na^2 + nh^2) = 2(y_2 + nh^2)$$

$$(v) \dots \Rightarrow \frac{y_1 + y_3 - 2y_2}{2} = nh^2$$


اب (i), (iii) اور (v) سے ہم دیکھتے ہیں کہ قطع کا رتبہ

$$= 2h \left[y_2 + \frac{y_1 + y_3 - 2y_2}{6} \right] = \frac{1}{3}h (y_1 + y_3 + 4y_2)$$

سمسن کا اصول حاصل کرنا

اب قطع $P_1 A_1 B P_{2n+1}$ پر غور کیجیے جو کہ منحنی $y = f(x)$ ، X -محور اور دو عرضوں $P_1 A$ اور $P_{2n+1} B$ سے گھرا ہوا ہے۔

ہم وقفہ AB کو $2n$ برابر حصوں میں بانٹتے ہیں جہاں کہ " ایک کافی بڑا مثبت کامل عدد ہے۔ مان لیجیے کہ AB کے ان نقاط تقسیم سے متعلق منحنی پر نقطے $P_1, P_2, \dots, P_{2n+1}$ ہیں۔ ہم منحنی کے قوس $P_1 P_2 P_3$ کے بجائے ان نقطوں سے گزرنے والا



تصویر 27

مکانی لے لیتے ہیں۔ چونکہ یہ نقطے ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اس لیے ہم مان سکتے ہیں کہ دیے ہوئے منحنی کے قوس $P_1 P_2 P_3$ سے محدود (bounded) رقبہ تقریباً اُس رقبہ کے برابر ہے جو کہ P_1, P_2, P_3 سے ہو کر جانے والے مکافیہ قوس سے محدود ہے۔ قوسوں $P_3 P_4 P_5, P_5 P_6 P_7, \dots, P_{2n-1} P_{2n} P_{2n+1}$ کی جگہ بھی اسی طرح کے مکافیہ قوس لینے ہوتے ہیں۔

ادپر کے لیما کے نتیجے کا استعمال ترتیب دار عرضوں $y_1, y_3, y_5, \dots$

.....، y_{2n-1} ، y_{2n+1} کے درمیان والے رقبوں پر کرنے پر کل رقبہ کی قیمت کا تخمینہ

$$= \frac{1}{2}h[(y_1 + 4y_2 + y_3) + (y_3 + 4y_4 + y_5) + (y_5 + 4y_6 + y_7) + \dots + (y_{2n-1} + 4y_{2n} + y_{2n+1})]$$

$$= \frac{1}{2}h[(y_1 + y_{2n+1}) + 2(y_2 + y_3 + \dots + y_{2n-1}) + 4(y_3 + y_4 + \dots + y_{2n})]$$

آتا ہے۔ یہ سمن کا اصول ہے جسے یوں بتا سکتے ہیں :-

کسی رقبہ کی (یا کسی معین تکملہ) کی قیمت کا تخمینہ لگانے کے لیے اس رقبہ کو برابر دوری پر عرض کھینچ کر جفت تعداد پٹیوں میں بانٹیں اور دو پڑوسی عرضوں کے درمیان فاصلے کی تہائی کو اس جوڑ سے ضرب دیجیے جو کہ ذیل کا جوڑ ہو :-

(i) پہلا اور آخری عرض

(ii) اور سبھی طاق عرضوں کا گنا

(iii) اور سبھی جفت عرضوں کا چار گنا

مثال

1۔ معین تکملہ

$$\int_1^2 \frac{dx}{x}$$

کی قیمت سمن اصول کی مدد سے گیارہ معین لے کر نکالے اور اس طرح $\log 2$ کی قیمت کا تخمینہ لگائیے۔

ہم پاتے ہیں

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = \log 2$$

ہم وقفہ [1, 2] کو دس برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہوار تپوں کے رتبے

مان لیجئے کہ

$$f(x) = 1/x$$

ہم پاتے ہیں

$$y_1 = f(1.0) = 1.00000 ;$$

$$y_2 = f(1.1) = .90909,$$

$$y_3 = f(1.2) = .83333 ;$$

$$y_4 = f(1.3) = .76923,$$

$$y_5 = f(1.4) = .71429 ;$$

$$y_6 = f(1.5) = .66667,$$

$$y_7 = f(1.6) = .62500 ;$$

$$y_8 = f(1.7) = .58824,$$

$$y_9 = f(1.8) = .55556 ;$$

$$y_{10} = f(1.9) = .52632,$$

$$y_{11} = f(2.0) = .50000 ;$$

$$1.50000 = S_1 - \text{پہلے اور آخری معینوں کا جوڑ}$$

$$2.72818 = S_2 = \text{سبھی طاق معینوں کا جوڑ}$$

$$3.45955 = S_3 = \text{سبھی جفت معینوں کا جوڑ}$$

اس لیے

$$\log 2 = \frac{1}{3} (S_1 + 2S_2 + 4S_3)$$

$$= \frac{1}{3} (20.79456) = .69315$$

در اصل لوگارتھی فہرست دیکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\log 2 = .693147$$

مشقیں

1. اس منحنی کا رقبہ معلوم کیجئے جس کے لیے 2، انچ کی دوریوں پر عرضوں کی

قیمتیں ترتیب وار

$$3.8, 3.5, 3.2, 2.8, 3.3, 3.6, 4$$

انچ ہوں۔

2- ایک منحنی نقطوں

(1, 2), (1.5, 2.4), (2, 2.7), (2.5, 2.8), (3, 3), (3.5, 2.6), (4, 2.1)
سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی منحنی پر محور اور عرضوں $x = 0, x = 1$ کے درمیان
گھرے ہوئے رقبہ کا تخمینہ لگائیے۔
3- ایک ریل گاڑی جوڑکی تھی چلنا شروع کرتی ہے اور مختلف اوقات پر اس
کی رفتار ذیل کی جدول میں دی ہوئی ہے۔ وقت تب سے گنا گیا جب سے گاڑی
چلنا شروع ہوئی اور رفتار میل فی گھنٹہ میں ہے۔

منٹ: 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

رفتار: 0 2 5 11 20 32 29 25 18 10

20 منٹ میں گاڑی نے جو فاصلہ طے کیا اس کا تخمینہ لگائیے۔
4- ایک ندی کی چوڑائی 80 فٹ ہے۔ اس کے ایک کنارے سے مختلف فاصلوں
x پر ندی کی گہرائیاں d یہ ہیں:-

x : 0 10 20 30 40 50 60 70 80

d : 0 4 7 9 12 15 14 8 3

متقاطع سیکشن (cross-section) کے رقبہ کا تخمینہ لگائیے۔

5- نوعرضوں کو لیتے ہوئے سمن کے اصول سے

$$\int_2^{10} \frac{dx}{1+x}$$

کی قیمت کا تخمینہ لگائیے۔

6- سمن کے اصول سے $h = 0.1$ لے کر π کی قیمت کا تخمینہ فارمولے

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}$$

کی مدد سے حاصل کیجیے۔

ہمارے قطوں کے رتبے

7۔ پانچ عضوں کو لے کر مکملہ

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \frac{dx}{x}$$

سے π کی قیمت کا تخمینہ لگائیے۔

8۔ چار برابر کے وقفے لے کر $\int_4^8 \frac{dx}{x}$ کی قیمت نکالے۔

9۔ مکمل کے لیے سمن کا اصول بتائیے، اس اصول سے پانچ عضوں کی مدد سے مکملہ

$$\int_1^2 \sqrt{x-1/x} dx$$

کی قیمت دو اعشاریہ تک صحیح نکالے۔

10۔ یہ دیا ہوا ہے کہ

$$e^0 = 1, e^1 = 2.72, e^2 = 7.39, e^3 = 20.09, e^4 = 54.60$$

اب سمن کے اصول کی جانچ کے لیے مکملہ

$$\int_0^4 e^x dx$$

کی قیمت کا تخمینہ لگائیے اور اس کی بالکل صحیح قیمت سے اس کا موازنہ کیجیے (compare)۔

11۔ اگر x کی قیمتیں $a, a+h, a+2h, a+3h$ لے کر ایک تیسری ڈگری

کے کثیر رکنی (polynomial) y کی قیمتوں کو ترتیب وار y_1, y_2, y_3 اور y_4 سے ظاہر کریں تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_a^{a+3h} y dx = \frac{3}{8} h (y_1 + 3y_2 + 3y_3 + y_4)$$

اس سے مکملہ

$$\int_0^{0.3} (1-8x^2)^{1/2} dx$$

کی قیمت کا تخمینہ نکالے۔

12- برابر دوری پر تین عرضوں کے لیے سمسن کا اصول حاصل کیجیے۔ یعنی

اگر درمیانی عرض سے کنارے والے عرضوں y_1 اور y_3 کی دوریاں ترتیب وار h اور k ہوں تو ثابت کیجیے کہ فارمولا

$$\frac{1}{6} (h+k)(y_1+4y_2+y_3) + \frac{1}{6} (h^3-k^3) \left(\frac{y_1-y_2}{h} + \frac{y_2-y_3}{k} \right)$$

جوابات

1. 4.03	2. 7.78	3. 232/45
4. 710	5. 1.299	8. 693.
9. 0.84	10. 53.87, 54.60	11. 0.29159.

باب 7 پر مشقیں

1- ایک سائیکلائڈ کے کسی نقطہ کے مختصات (co-ordinates)

$$x = a(\theta + \sin \theta), y = a(1 + \cos \theta)$$

ہیں اور $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ والے نقطے ترتیب وار P اور Q ہیں۔ سائیکلائڈ کے PQ اور مبدا (origin) سے Q, P کو ملانے والے خطوط کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

2- منحنی $r = a(\theta + \sin \theta)$ اور ابتدائی خط سے 90° ڈگری زاویہ بنانے والے خط کے درمیان گھرے ہوئے کترین (smallest) قطع کا رقبہ نکالیے۔

3- ثابت کیجیے کہ منحنی $x^4 - 2xya^2 + a^2y^2 = 0$ کے ہر لوپ کا رقبہ $\frac{2}{3}a^2$ ہے۔

4- منحنی $r \cos \theta = a \sin 3\theta$ کی ترسیم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ اس کے ایک لوپ

ہمارے قطوں کے رقبے

کا رقبہ $\frac{3}{8} a^2 (9\sqrt{3}-4\pi)$ ہے۔

5- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = a(\sec \theta + \tan \theta)$ اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کا رقبہ $(\pi/2 + 2)a^2$ ہے۔ یہ بھی ثابت کیجیے کہ اس کے لوپ کا رقبہ $(2 - \pi/2)a^2$ ہے۔

6- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = a(1 + 2 \sin \frac{1}{2} \theta)$ کے تین لوپ ہیں اور ہر لوپ کا رقبہ نکالیے۔

7- مکانی $2a = r(1 + \cos \theta)$ کا رڈائلٹ $r = 2a(1 + \cos \theta)$ کو جن دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ان کے رقبوں کا تناسب نکالیے۔
8- ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x^4 - 3ax^3 + a^2(2x^2 + y^2) = 0$$

کا رقبہ $\frac{3}{8}\pi a^2$ ہے۔
9- ثابت کیجیے کہ منحنی

$$4y^2 + x^2(x^2 - 6x + 8) = 0$$

کا رقبہ $3\pi/2$ ہے۔

10- منحنی $ay^2 = x(x-a)^2$ کے لوپ کو خط $x+2y=a$ جن دو حصوں میں بانٹتا ہے ان کے رقبوں کا تناسب نکالیے۔

11- مکانی $x^2 = 4ay + 4a^2$ اور خط $3x+4y=0$ کے درمیان کا رقبہ نکالیے۔

12- پہلے ربع میں منحنیوں

$$r = 2a \cos \theta \text{ اور } r = a \sin \theta, \quad r = a(1 + \cos \theta)$$

کے درمیان گھرا ہوا رقبہ نکالیے۔

13- لینسکیٹ $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ کا قطب O ہے اور اس کے دونوں لوپوں کا مشترک مماس (common tangent) PQ ہے۔ خطوط OP, PQ اور OQ کے درمیان گھرا ہوا رقبہ معلوم کیجیے۔

تکملی احصار

14- یہ دکھائیے کہ علیحدوں

$$a^2x^2 + b^2y^2 = 1, b^2x^2 + a^2y^2 = 1, (0 < a < b)$$

میں مشترک قطعہ کا رقبہ $(a/b) \cdot 4/ab \tan^{-1}$ ہے۔

15- ثابت کیجیے کہ منحنی

$$r = ae^{\theta} \sin \theta$$

کے لوپوں کے رقبے ترتیب وار ایک جیومیٹریائی سلسلہ بناتے ہیں جس کا مشترک

تناسب (common ratio) $e^{2\pi}$ ہے۔

16- ثابت کیجیے کہ منحنیوں

$$r = a \sin \theta, r = a \sin 2\theta$$

میں مشترک قطعہ کا رقبہ $(4\pi - 3\sqrt{3})a^2/16$ ہے۔

17- منحنی $r = a \log \theta$ کی ترسیم کیجیے جب کہ θ صفر سے ایک تک بڑھتا ہو۔

ثابت کیجیے کہ اس کے اور لامتناہی مماس کے درمیان کے قطعہ کا رقبہ a^2 ہوگا۔

18- ثابت کیجیے کہ ٹریکٹریس (tractrix)

$$x = a (\cos t + \frac{1}{2} \log \tan^2 \frac{1}{2}t), y = a \sin t$$

کی چاروں لامتناہی شاخوں کے درمیان کا کل رقبہ πa^2 ہوتا ہے۔

19- ثابت کیجیے کہ کسی بند منحنی

$$f\left(\frac{x}{m}, \frac{y}{n}\right) = 0.$$

کا رقبہ منحنی $f(x, y) = 0$ کے رقبے کا mn گنا ہوتا ہے۔

اس نتیجہ کی مدد سے ذیل کے منحنیوں کے رقبے نکالو۔

$$(i) (m^2x^2 + n^2y^2)^3 = a^2x^2 + b^2y^2.$$

$$(ii) (m^2x^2 + n^2y^2)^5 = (a^2x^2 + b^2y^2)^3$$

$$(iii) (x^2 + 2y^2)^5 = axy^4.$$

جوابات

1. $(\pi+3) a^3$.
 2. $a^2(\pi^3+6\pi+48)/48$
 6. $a^2(3\pi+8)_1 - \frac{a^2}{2}(3\pi-8), \frac{a^2}{2} - (3\pi-8)$
 7. $(9\pi+16)/(9\pi-16)$.
 10. $53a^3/960, 153a^2/320$.
 11. $125a^2/24$.
 12. $a^2[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}\tan^{-1} 2]$.
 13. $a^2(3\sqrt{3}-4)/8$.
 19. (i) $(a^3n^3+b^3m^3)\pi/2m^2n^2$.
 - (ii) $4(a^3n^3+b^3m^3)/3m^4n^4$.
 - (iii) $7\sqrt{2\pi a^3}/2^{12}$.
-

8

قوسی اصلاح (Rectification) ہموار منحنیوں کی لمبائیاں

8.1- تمہید (Introduction) اس باب میں ہم ایسے ہموار منحنیوں کے قوسوں (arcs) کی لمبائیاں نکالنا سیکھیں گے جن کی کارٹیزی (Cartesian) یا قطبی (Polar) مساواتیں معلوم ہوں۔ اس عمل کو قوسی اصلاح (Rectification) کہتے ہیں۔

پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ کسی رقبہ کے لیے فارمولا حاصل کرنے کی غرض سے ہم نے پہلے ایسا فارمولا ثابت کیا تھا جس سے رقبہ تفاعل (area function) کا مشتق (Derivative) مل جائے۔ مثلاً ہم نے دکھایا تھا کہ

$$dA/d\theta = r^2/2 \text{ اور } dA/dx = y$$

منحنیوں کی لمبائیاں معلوم کرنے کے لیے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔

قوسوں کے تفرقی سرور کے فارمولے مصنف کی کتاب Differential Calculus میں ثابت کیے گئے ہیں۔ یہاں ہم صرف اُن کا حوالہ ہی دیں گے، دوبارہ ثابت نہ کریں گے۔

$$8.2- \text{کارٹیزی مساواتیں } y = f(x)$$

منحنی $y = f(x)$ پر فصلہ a (abscissae) اور b والے دو نقطوں کے درمیان

قوس کی لمبائی

$$\int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$$

ہوتی ہے۔

مان لیجیے منحنی $y = f(x)$ پر A اور B دو ایسے نقطے ہیں جن کے فاصلہ ترتیب وار a اور b ہیں۔

اگر کسی ثابت نقطہ A (fixed point) اور متغیر نقطہ P (variable point) کے درمیان کے قوس کی لمبائی کو s کہیں، جو کہ m کے فاصلہ x کا تفاعل ہوگا، تو ہم پاتے ہیں

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

$$\int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \frac{ds}{dx} dx = \left| s \right|_a^b$$

$$= (s \text{ پر } x = a \text{ کی قیمت}) - (s \text{ پر } x = b \text{ کی قیمت})$$

$$= (AB \text{ قوس}) - 0 = AB$$

اس سے نتیجہ ثابت ہو گیا۔

8-3۔ قوسوں کی لمبائیوں کے دوسرے فارمولے۔ مصنف کی کتاب

Differential Calculus میں ذیل فارمولے حاصل کیے گئے تھے۔

$$\frac{ds}{dy} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2};$$

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}.$$

$$\frac{ds}{d\theta} = \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2};$$

ان سے ہمیں قوسوں کی لمبائیاں نکالنے کے ذیل فارمولے ملتے ہیں:-

8-31۔ کارٹیزی مساواتیں: $x = f(y)$; منحنی $x = f(y)$ پر عرض c اور d والے

نقطوں کے درمیان قوس کی لمبائی

$$\int_c^d \sqrt{\left[1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2\right]} dy = \int_c^d \sqrt{[1 + f'^2(y)]} dy.$$

ہوتی ہے۔

8-32۔ پیرامیٹری کارٹینری $x = f(t), y = \varphi(t)$ منحنی $x = f(t), y = \varphi(t)$

کے پیرامیٹر کی قیمتوں α اور β والے نقطوں کے درمیان قوس کی لمبائی

$$\int_\alpha^\beta \sqrt{\left[\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2\right]} dt = \int_\alpha^\beta \sqrt{[f'^2(t) + \varphi'^2(t)]} dt.$$

ہوتی ہے۔

8-33۔ قطبی مساواتیں $r = f(\theta)$ منحنی $r = f(\theta)$ کے سمتیہ زاویوں α اور

β والے نقطوں کے درمیان قوس کی لمبائی

$$\int_\alpha^\beta \sqrt{\left[r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right]} d\theta = \int_\alpha^\beta \sqrt{[f^2(\theta) + f'^2(\theta)]} d\theta.$$

ہوتی ہے۔

مثالیں

1۔ مکانی $x^2 = 4ay$ کے راس (vertex) سے وتر خاص (latus rectum) کے


قوس کی لمبائی نکالو۔ وتر خاص کے سرے L کا فاصلہ $2a$ ہے۔

اب

$$y = \frac{x^2}{4a} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x}{2a}.$$

اس لیے درکار لمبائی


$$= \int_0^{2a} \sqrt{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]} dx$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2a} \int_0^{2a} \sqrt{4a^2 + x^2} dx \\
&= \frac{1}{2a} \left[\frac{x\sqrt{x^2 + 4a^2}}{2} + 2a^2 \sinh^{-1} \frac{x}{2a} \right]_0^{2a} \\
&= \frac{1}{2a} [2\sqrt{2a^2} + 2a^2 \sinh^{-1} 1] \\
&= a[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})],
\end{aligned}$$

$$\sinh^{-1} x = \log [x + \sqrt{1 + x^2}] \quad \text{کیونکہ}$$

2۔ منحنی $9ay^2 = (x-2a)(x-5a)^2$ کے لوپ کا محیط (perimeter) نکال لے۔
 اس کا لوپ $x = 2a$ اور $x = 5a$ کے درمیان ہے منحنی x -محور کے گرد
 متشکل ہے لہذا لوپ کا محیط x -محور کے اوپر والے لوپ کے حصہ کا دوگنا ہے۔



تصویر 29

x -محور کے اوپر لوپ کے کسی بھی نقطہ کے لیے


$$\begin{aligned}
y &= -\frac{(x-5a)\sqrt{x-2a}}{3\sqrt{a}} \\
\frac{dy}{dx} &= -\frac{\sqrt{x-2a} + \frac{x-5a}{2\sqrt{x-2a}}}{3\sqrt{a}} = -\frac{x-3a}{2\sqrt{a}\sqrt{x-2a}}
\end{aligned}$$

اس لیے درکار محیط

$$= 2 \int_{2a}^{5a} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_{2a}^{5a} \sqrt{\left[1 + \frac{(x-3a)^2}{4a(x-2a)}\right]} dx \\
 &= 2 \int_{2a}^{5a} \frac{x-a}{2\sqrt{a}\sqrt{(x-2a)}} dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{2a}^{5a} \frac{x-2a+a}{\sqrt{(x-2a)}} dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a}} \left[\frac{2}{3} (x-2a)^{3/2} + 2a \sqrt{(x-2a)} \right]_{2a}^{5a} \\
 &= 4\sqrt{3a}.
 \end{aligned}$$

3۔ منحنی $x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ کی قوسی اصلاح کیجیے۔
 کسی نقطہ کے منحنی کے ایک ہر A' سے دوسرے ہر A تک چلنے پر $-\pi, \theta$ سے π تک بڑھتا ہے۔ اس 0 کے لیے θ صفر ہے۔ چونکہ قوس OY کے گرد متشاکل ہے اس لیے
 $AOA' \text{ قوس} = 2 \cdot (OA \text{ قوس})$
 ہم پاتے ہیں



$$\frac{dx}{d\theta} = a(1 + \cos \theta), \frac{dy}{d\theta} = a \sin \theta.$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} &= \sqrt{[2a^2(1 + \cos \theta)]} \\
 &= \sqrt{4a^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = 2a \cos \frac{\theta}{2}
 \end{aligned}$$


اس لیے درکار قوس

$$= 2 \int_0^\pi 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 2 \left[4a \sin \frac{\theta}{2} \right]_0^\pi = 8a.$$

نوٹ۔ یہاں ہم $\sqrt{[4a^2 \cos^2 (\theta/2)]} = 2a \cos (\theta/2)$ لیتے ہیں نہ کہ $-2a \cos (\theta/2)$

کیونکہ 0 کے صفر سے π تک بڑھنے پر $\cos(\theta/2)$ مثبت رہتا ہے

4۔ کارڈائڈ $r = a(1 - \cos \theta)$ کا محیط نکالے



منحنی ابتدائی خط کے گرد متشاکل ہے
اس لیے اس کا محیط اس قوس کی لمبائی کا
دگنا ہے جو ابتدائی خط کے اوپر ہے۔

اب
 $\frac{dr}{d\theta} = a \sin \theta$

$$\therefore \sqrt{\left[r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right]} = \sqrt{[a^2(1 - \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta]} \\ = \sqrt{[2a^2(1 - \cos \theta)]} = 2a \sin(\theta/2)$$

اس لیے درکار محیط

$$= 2 \int_0^\pi 2a \sin \frac{\theta}{2} d\theta = 2 \left| -4a \cos \frac{\theta}{2} \right|_0^\pi = 8a.$$

مشقیں

1۔ منحنی $y = \log \sec x$ کے $x = 0$ سے $x = \pi/3$ تک کے درمیان
والے قوس کی لمبائی نکالے۔

2۔ منحنی $y = \log \tanh(x/2)$ کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے درمیان والے
قوس کی لمبائی نکالے۔

3۔ مکافی $y^2 = 4ax$ کے اس قوس کی لمبائی نکالے جو کہ اس کے وتر خاص سے
راس کی طرف کھتا ہے۔

4۔ زنجیرہ $y = c \cosh(x/c)$ کے راس $(0, c)$ سے کسی نقطہ (x, y) تک
کے قوس کی لمبائی نکالے۔

5- ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x = a \sin 2\theta (1 + \cos 2\theta),$$

$$y = a \cos 2\theta (1 - \cos 2\theta),$$

کے مبدأ (0, 0) سے نقطہ (x, y) تک کے قوس کی لمبائی $\frac{4}{3}a \sin 3\theta$ ہے۔
6 (a) - اسٹراپٹ

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

$$x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$$

یعنی $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$ کی مکمل لمبائی معلوم کیجیے۔
(b) یہ ثابت کیجیے کہ منحنی $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ کے نقطہ (0, a) سے (x, y) تک کی لمبائی s ذیل ہے۔

$$s = \frac{2}{3} \sqrt{ax^2}$$

7- منحنی

$$x = a (\cos \theta + \theta \sin \theta), y = a (\sin \theta - \theta \cos \theta)$$

کے $\theta = 0$ اور $\theta = \alpha$ والے نقطوں کے درمیان قوس کی لمبائی نکالیے۔
8- ثابت کیجیے کہ $\theta = 2\pi/3$ والا نقطہ منحنی $r = a(1 - \cos \theta)$ کے اوپری حصہ کے قوس کو دو برابر حصوں میں بانٹتا ہے۔
9- $\theta = 0$ پر $s = 0$ لیتے ہوئے منحنی $r = ae^{\theta \cot \alpha}$ کے کسی قوس کی لمبائی نکالیے۔

$$10- \text{منحنی } r = a \cos^3 (\theta/3) \text{ کی لمبائی نکالیے۔}$$

$$11- \text{منحنی } r = a (\theta^2 - 1) \text{ کے لوپ کی لمبائی نکالیے۔}$$

$$12- \text{ثابت کیجیے کہ منحنی } 3ay^2 = x(x-a)^2 \text{ کے لوپ کی لمبائی } 4a/\sqrt{3}$$

ہے۔

13۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $x^2(a^2 - x^2) = 8a^2y^3$ کی کل لمبائی $\pi a\sqrt{2}$ ہے۔

14۔ منحنی $x = t^2 \cos t, y = t^2 \sin t$ کے مبدا (origin) سے کسی نقطہ تک کے قوس کی لمبائی نکالیے۔

15۔ منحنی $y = -\log(1 - x^2)$ کی ترسیم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ مبدا سے فصلہ x والے نقطہ تک کے قوس کی لمبائی

$$-\log \left[\frac{(1+x)(1-x)}{(1-x)} \right] - x$$

16۔ منحنی $y = \log \left[\frac{(e^x - 1)}{(e^x + 1)} \right]$ کے $x = 1$ سے $x = 2$ تک کے قوس کی لمبائی نکالیے۔

17۔ منحنی $y = x(2-x)$ کے $x = 0$ سے $x = 2$ تک کے قوس کی

لمبائی نکالیے۔ 18۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $x = t^2, y = t - \frac{1}{3}t^3$ کے لوپ کی لمبائی $4\sqrt{3}$ ہے۔

19۔ ثابت کیجیے کہ زائد کمائی (hyperbolic spiral) $r\theta = a$ کے $r = a$ اور $r = 2a$ والے نقطوں کے درمیان قوس کی لمبائی

$$a \left\{ \sqrt{5} - \sqrt{2} + \log \frac{2 + \sqrt{8}}{1 + \sqrt{5}} \right\}$$

20۔ مکانی $1/r = 1 + \cos \theta$ کے دترخاض سے کیے ہوئے قوس کی لمبائی نکالیے۔

21۔ ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x = a(3 \sin \theta - \sin^3 \theta), y = a \cos^3 \theta$$

کے نقطہ $(0, a)$ سے نقطہ (x, y) تک کے قوس کی لمبائی $\frac{2}{3}a(\theta + \sin \theta \cos \theta)$ ہے۔ 22۔ منحنی

$$x = e^\theta \sin \theta, y = e^\theta \cos \theta$$

کے $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/2$ تک کے قوس کی لمبائی نکالیے۔

23۔ ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x = e^{\theta} (\sin \theta/2 + 2 \cos \theta/2), y = e^{\theta} (\cos \theta/2 - 2 \sin \theta/2)$$

کے $\theta = 0$ سے $\theta = \pi$ تک کے قوس کی لمبائی $5(e^{\pi} - 1)/2$ ہے۔
24۔ اگر منحنی

$$x = a(\theta + \sin \theta \cos \theta), y = a(1 + \sin \theta)^2$$

کے $\theta = -\pi/2$ سے نقطہ θ تک کے قوس کی لمبائی 's' ہو تو ثابت کیجیے کہ y^3, y^2 کی طرح بدلتا ہے۔
25۔ منحنی

$$x = a(\theta - \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$$

کی ترسیم کیجیے جب کہ θ صفر سے 2π تک بڑھتا ہو اور ثابت کیجیے کہ نقطہ $\theta = \pi/3$ سے 1 اور 3 کے تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔

جوابات

1. $\log(2 + \sqrt{3})$.
2. $\log[(e^2 + 1)/e]$.
3. $2a[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]$.
4. $c \sinh(x/c)$.
6. $6a$.
7. $\frac{1}{2}a\pi^2$.
9. $a \sec \alpha (e^{\theta \cot \alpha} - 1)$.
10. $\frac{8}{3}a\pi$.
11. $8a/3$.
14. $\frac{1}{3}[(4 + t^2)^{3/2} - 8]$.
16. $\log(e + e^{-1})$.
17. $\frac{1}{2} \log(2 + \sqrt{5}) + \sqrt{5}$.
20. $l[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]$.
22. $\sqrt{2}(e^{\pi/2} - 1)$.

منحنی کی نجی مساوات (Intrinsic Equation) - 8.4

تعریف: کسی منحنی کے ایک ثابت نقطہ A (fixed point) سے ایک متغیر نقطہ (variable point) تک کے قوس کی لمبائی کو اگر s کہیں اور A اور P پر کھینچے گئے


ماسوں (tangents) کے درمیان زاویہ کو اگر ψ کہیں، تو s اور ψ کے درمیان رشتہ (relation) کو اس منحنی کی نجی مساوات (Intrinsic Equation) کہتے ہیں۔

s اور ψ نجی مختصات (intrinsic co-ordinates) کہلاتے ہیں۔
 ”نجی نام، اس لیے دیا گیا ہے کہ کسی بھی نقطہ کے لیے ψ اور s اس منحنی کی شکل پر منحصر ہیں نہ کہ اس پر کہ ہوا سطح میں منحنی کس مقام پر ہے۔ لہذا ان کا منحنی سے ذاتی (inherent) رشتہ ہے۔

اگر منحنی ہوا سطح میں اپنی جگہ بدل دے تب بھی منحنی کے کسی نقطہ کے نجی مختصات نہیں بدلتے۔ کارٹیزی یا قطبی مختصات میں یہ خوبی نہیں۔

8.41 کارٹیزی مساوات سے نجی مساوات حاصل کرنا

مان لیجیے $y = f(x)$ کسی دیے ہوئے منحنی کی کارٹیزی مساوات ہے۔



ہم مان لیتے ہیں کہ ثابت نقطہ A کا
 فصلہ a ہے اور A پر کھینچا گیا مماس
 x - محور کے متوازی ہے۔ مان لیجیے کہ
 $P(x, y)$ منحنی پر کوئی متغیر نقطہ ہے
 اور مان لیجیے کہ قوس $s = AP$ مان لیجیے
 کہ P پر کھینچا گیا مماس x - محور سے زاویہ ψ
 بناتا ہے۔ ہم پاتے ہیں


$$(i) \dots\dots\dots s = \int_a^x \sqrt{1+f'^2(x)} dx,$$

$$(ii) \dots\dots\dots \tan \psi = f'(x).$$

اب (i) اور (ii) سے x اسقاط (Eliminate) کرنے پر درکار نجی مساوات مل جاتی ہے۔

مثالیں

1- راس $(0, a)$ (vertex) کو ثابت نقطہ لیتے ہوئے زنجیر $y = a \cosh(x/a)$ کی نجی مسادات حاصل کیجیے



نقطہ $A = (0, a)$ پر مماس X -محور کے متوازی ہے۔ ہم پاتے ہیں

$$s = \int_0^x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$= \int_0^x \cosh \frac{x}{a} dx$$

$$(i) \dots\dots\dots = \left| a \sinh \frac{x}{a} \right|_0^x = a \sinh \frac{x}{a}$$

ساتھ ہی

$$(ii) \dots\dots\dots \tan \psi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{x}{a}$$

اب (i) اور (ii) سے ہم پاتے ہیں

$$s = a \tan \psi$$


جو کہ دیے ہوئے منحنی کی نجی مسادات ہے۔

2- مبدا (origin) کو ثابت نقطہ لیتے ہوئے مکانی $y^2 = 4ax$ کی نجی مسادات نکالو۔

مان لیجیے $P(x, y)$ منحنی پر کوئی نقطہ ہے۔ Y -محور O پر مماس ہے۔ مان لیجیے $s = OP$ قوس

دی ہوئی مسادات سے ہم پاتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2a}{y}$$



34

$$(i) \dots \therefore \tan \psi = \frac{dx}{dy} = \frac{y}{2a}$$

جہاں ψ وہ زاویہ ہے جو کہ Y-محور اور کسی نقطہ P پر مماس کے درمیان بنتا ہے ساتھ ہی

$$s = \int_0^y \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^y \sqrt{4a^2 + y^2} dy$$

$$(ii) \dots = \frac{1}{2a} \left[\frac{y\sqrt{4a^2 + y^2}}{2} + \frac{4a}{2} \log \frac{y + \sqrt{y^2 + 4a^2}}{2a} \right]$$

اب (i) اور (ii) سے y استقاط کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$s = a [\tan \psi \sec \psi + \log (\tan \psi + \sec \psi)].$$

جو کہ درکارنجی مساوات ہے۔

3۔ مبدأ کو ثابت نقطہ لیتے ہوئے سائیکلائڈ

$$x = a(\theta + \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$$

کی نجی مساوات حاصل کیجیے (تصویر 30 دیکھیے)

ثابت نقطہ O پر مماس X-محور ہے۔ مان لیجیے $P(\theta)$ سائیکلائڈ پر کوئی متغیر نقطہ

ہے۔ ہم پاتے ہیں

$$\frac{dx}{d\theta} = a(1 + \cos \theta), \frac{dy}{d\theta} = a \sin \theta.$$

$$\therefore \tan \psi = \frac{dy}{dx} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = \tan \frac{\theta}{2}$$

$$(i) \dots \Rightarrow \psi = \frac{\theta}{2}.$$

ساتھ ہی

$$s = \int_0^{\theta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

$$= 2a \int_0^{\theta} \cos \frac{\theta}{2} d\theta$$

$$(ii) \dots\dots\dots = 4a \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|_0^{\theta} = 4a \sin \frac{\theta}{2}$$

اب (i) اور (ii) سے ہم پاتے ہیں۔

$$s = 4a \sin \psi$$

جو کہ سائیکلائڈ کی درکار نجی مساوات ہے۔

مشقیں

1. ثابت کیجیے کہ نصف-کعبی (semi-cubic) مکانی

$$ay^3 = x^3$$

کی نجی مساوات، نوک (cusp) کو ثابت نقطہ لینے پر

$$27s = 8a (\sec^3 \psi - 1)$$

ہوتی ہے۔


2. ثابت کیجیے کہ نقطہ (a, 0) کو ثابت نقطہ لینے پر اسٹرائٹ

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

کی نجی مساوات $s = 3/2a \sin^3 \psi$ ہوتی ہے۔

8.42- قطبی مساوات سے نجی مساوات حاصل کرنا

مان لیجیے $r = f(\theta)$ کسی دیے ہوئے منحنی کی قطبی مساوات ہے اور ثابت نقطہ A کا سمتیہ زاویہ (vectorial angle) α ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ A پر مماس ابتدائی خط کے



متوازی ہے اور P منحنی پر کوئی ایسا نقطہ ہے جس کا سمتیہ زاویہ θ ہے۔

مان لیجیے قوس $s = AP$

ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \tan \phi = r \frac{d\theta}{dr} = \frac{f(\theta)}{f'(\theta)}$$

جہاں ϕ نصف قطری سمتیہ (radius vector) اور مماس کے بیچ کا زاویہ ہے۔
ساتھ ہی

$$(ii) \dots \psi = \theta + \phi.$$

$$s = \int_{\alpha}^{\theta} \sqrt{\left\{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right\}} d\theta$$

$$(iii) \dots = \int_{\alpha}^{\theta} \sqrt{[f^2(\theta) + f'^2(\theta)]} d\theta$$

اب (i), (ii) اور (iii) سے θ اور ϕ اسقاط کرنے پر درکار نجی مساوات ملتی ہے۔

مثال

قطب (pole) کو ثابت نقطہ لیتے ہوئے کارڈائڈ

$$r = a(1 - \cos \theta)$$

کی نجی مساوات نکالیے۔ (تصویر 31 دیکھیے)

ابتدائی خط قطب پر مماس ہے۔ ہم پاتے ہیں

$$\frac{dr}{d\theta} = a \sin \theta$$

$$\therefore \tan \phi = r \frac{d\theta}{dr} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} = \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\theta}{2}$$

(i) $\psi = \varphi + \theta = \frac{3\theta}{2}$ پھر ساتھ ہی

$$s = \int_0^{\theta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

$$= 2a \int_0^{\theta} \sin \frac{\theta}{2} d\theta$$

(ii) $= -4a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right|_0^{\theta} = 4a \left[1 - \cos \frac{\theta}{2} \right]$

اب (i) اور (ii) سے ہم پاتے ہیں

$$s = 4a \left[1 - \cos \frac{\psi}{3} \right]$$

جو کہ درکارنجی مساوات ہے۔

مشق: ثابت کیجیے کہ $\theta = 0$ کو ثابت نقطہ لینے پر کارڈائلٹ

$$r = a(1 + \cos \theta)$$

کی نجی مساوات $s = 4a \sin(\psi/3)$ ہے۔

8.5۔ علیس کی قوسی اصلاح (Rectification) $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$

ہم پاتے ہیں:

$$\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 = a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta$$

$$= a^2 \sin^2 \theta + a^2(1 - e^2) \cos^2 \theta$$

$$= a^2 (1 - e^2 \cos^2 \theta)$$

جہاں e علیس کا خروج مرکز (eccentricity) ہے۔ اس طرح علیس کی لمبائی

$$= 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

اس تکملہ کو جبری، لوگاریتمی، قوتی (exponential)، مثلثاتی یا معکوس مثلثاتی تفاعلوں کے محدود تعداد کے مرکب (combination) کی طرح نہیں رکھا جاسکتا۔ اسے ایک نئے قسم کے تفاعلوں کی ارقام میں رکھ سکتے ہیں جن کو قلیسی تفاعل (Elliptic Functions) کہتے ہیں۔ لیکن ہم ذیل طریقہ اختیار کر سکتے ہیں:-
دور کئی فارمولے سے ہم پاتے ہیں

$$*(1 - e^2 \cos^2 \theta)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} e^2 \cos^2 \theta - \frac{1}{8} e^4 \cos^4 \theta - \frac{1}{16} e^6 \cos^6 \theta - \dots$$

$$\therefore \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

$$= 1 - \frac{1}{2} e^2 \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} e^4 \frac{3.1. \pi}{4.2.2} - \frac{1}{16} e^6 \frac{5.3.1. \pi}{6.4.2.2} - \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{8} e^2 \pi - \frac{3}{128} e^4 \pi - \frac{5}{512} e^6 \pi - \dots$$

اس طرح قلیس کا محیط ہم کہتے ہی اعشاریہ تک معلوم کر سکتے ہیں۔

باب 8 پر مشقیں

1. کارڈائٹ $r = a(1 - \cos \theta)$ کے اس حصے کی لمبائی نکالو جو دائرہ $r = a \cos \theta$

کے باہر ہو۔

2. ثابت کیجیے کہ خط $4r \cos \theta = 3a$ کارڈائٹ $r = a(1 + \cos \theta)$ کے دو ایسے

حصوں میں کاٹتا ہے کہ دونوں حصوں کے قوسوں کی لمبائیاں برابر ہوں۔

3. ثابت کیجیے کہ غنی $r = a(1 + \cos 2\theta)$ کے لوپ کی لمبائی

یاد رہے کہ یہ ممکن ہے کہ مسئلہ

فٹکشنوں کے جوڑ کا مکملہ انگلوں کے جوڑ کے برابر ہوتا ہے

لامتناہی سلسلے کے لیے درست نہ ہو لیکن جو صورت زیر غور ہے اس میں یہ مسئلہ درست ہے لیکن اس کا ثبوت کتاب کے معیار سے باہر ہے۔

$$-\frac{2}{3}\sqrt{3}[2\sqrt{3}+\log(\sqrt{3}+2)]a$$

4. ثابت کیجیے کہ $\theta = \pi/6$ والا نقطہ منحنی $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$ کے پہلے ربع والے قوس کو دو ایسے حصوں میں بانٹتا ہے جن کی لمبائیوں کا تناسب ایک اور 3 کا ہو۔ منحنی

$$x \cos \theta = a \cos (\tan \theta - \theta)$$

$$y \cos \theta = a \sin (\tan \theta - \theta)$$

کے لیے $\theta = 0$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ والے نقطوں کے درمیان قوس کی لمبائی نکالیے۔

6. ثابت کیجیے کہ منحنی $4(x^2+y^2)-a^2=3a^{2/3}y^{2/3}$ کی کل لمبائی $6a$ ہے۔

$$\left[\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right] = \frac{a^{4/3}}{4y^{1/3}(a^{2/3}-y^{2/3})}$$

7. منحنی

$$x = a(\sin \theta + \frac{1}{2} \sin 3\theta), y = a(\cos \theta - \frac{1}{2} \cos 3\theta)$$

کی ترسیم کیجیے اور یہ ثابت کیجیے کہ اس کی لمبائی $8a$ ہے۔

$$x = a(\theta + \cos \theta \sin \theta - \sin \theta)$$

$$y = a(\cos^3 \theta - \cos \theta)$$

کی ترسیم کیجیے اور $\theta = 0$ سے $\theta = 2\pi$ تک کے قوس کی لمبائی نکالیے۔

9. منحنی $y = e^x$ کے $x = 0$ اور $x = 1$ والے نقطوں کے درمیان قوس کی لمبائی نکالیے۔

10. منحنی $r = a/\theta^2$ کے $\theta = 1$ سے $\theta = 2$ تک کے قوس کی لمبائی

نکالیے۔

11. خط $y = mx$ منحنی $y = ax^2$ کا جو حصہ کاٹتا ہے اس کے قوس کی لمبائی

اور اس حصہ کا رقبہ نکالے۔

12۔ اگر منحنی $r = a \tan \theta/a$ کے لیے مبدا اور $\theta = 2\pi$ والے نقطے کے درمیان کے قوس کی لمبائی 's' ہو اور ان نقطوں کے درمیان منحنی کے تحت رقبہ Δ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$\Delta = a(s - a\pi)$$

13۔ اگر $r = a$ اور $r = 2a$ والے نقطوں کے درمیان منحنی

$$a\theta = \sqrt{(r^2 - a^2)} - a \sec^{-1}(r/a)$$

کے قوس کی لمبائی 's' ہو اور اس سے قطب پر بنے قطع کا رقبہ 'A' ہو تو ثابت کیجیے کہ $\sqrt{3}A = as$

14۔ ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x = a \sin \theta - b \sin 2\theta, y = a \cos \theta - b \cos 2\theta$$

کا محیط (perimeter) اس علیس کے محیط کے برابر ہے جس کے نصف۔ محاور (semi-axes) $a+2b$ اور $a-2b$ ہوں۔

15۔ ثابت کیجیے کہ $\theta = \pi/4$ کو ساکت نقطہ لینے پر منحنی

$$x = e^\theta \sin \theta, y = e^\theta \cos \theta$$

کی نجی مسادات

$$se^{(-\pi/4)} + \sqrt{2} = \sqrt{2} (\cosh \psi - \sinh \psi),$$

16۔ نقطہ (1, 0) کو ثابت نقطہ لیتے ہوئے منحنی $y = \log x$ کی نجی مسادات معلوم کیجیے۔

17۔ عام علامتوں (usual notation) میں ثابت کیجیے کہ

$$s = \int_{r_1}^{r_2} \frac{r dr}{\sqrt{(r^2 - p^2)}}$$

اور ثابت کیجیے کہ حدود $r = b$ اور $r = c$ کے درمیان منحنی $p^2(a^2 + r^2) = a^2 r^2$

یکمیلی احصاء

کے قوس کی لمبائی، حدود $x = b$ اور $x = c$ کے درمیان زائد $xy = a^2$ کے قوس کی لمبائی کے برابر ہے۔

[تفرقی حساب سے]

$$\left[\frac{ds}{dr} = \sec \varphi = \frac{1}{\cos \varphi} = \frac{r}{\sqrt{(r^2 - p^2)}} \right]$$


جوابات

1. $4a\sqrt{3}$.
5. $\frac{1}{2} a \tan^2 \alpha$.
8. $a(4\sqrt{3} + \frac{1}{2} \pi)$.
9. $\sqrt{(e^2 + 1)} - \log \{[1 + \sqrt{(1 + e^2)}]/(\sqrt{2} + 1)\} - (\sqrt{2} - 1)$
10. $\frac{a^2}{2} \{2\sqrt{5} - \sqrt{2} + \log \{(\sqrt{2} - 1)/(\sqrt{5} - 2)\}\}$.
11. $\frac{a}{27 m^3} [(4m^2 + 9)^{3/2} - 8m^3], \quad \frac{a^2}{10 m^3}$.
16. $s = \frac{\sqrt{2}}{\cos \psi - \sin \psi} - \sqrt{2} + \log(\sqrt{2} + 1) - \log \frac{\sqrt{2} + \cos \psi - \sin \psi}{\cos \psi + \sin \psi}$.

گردشی ٹھوس کے حجم (Volumes) اور سطح (Surfaces)

9.1۔ مان لیجیے AB کسی منحنی کا قوس ہے اور CD ایسا خط ہے جو کہ منحنی کو نہیں کاٹتا۔

خط CD پر دو عمود ($perpendiculars$) AL اور BM ڈالیے۔



اب قطعہ $ALMBA$ کو خط CD کے گرد گھمانے

پر ایک گردشی ٹھوس (solid of revolution) ملتا ہے۔ اس ٹھوس کو قوس AB کو CD کے گرد

گھمانے پر بنا ہوا گردشی ٹھوس کہتے ہیں۔

اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ایسے گردشی

ٹھوس کا حجم اور اس کی سطح کا رقبہ کیسے نکالا جاتا ہے۔

منحنی جس خط CD کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ اس خط کو گردش کا محور (axis of

revolution) کہتے ہیں۔

پہلے ہم x -محور کو ہی گردش کا مرکز لیتے ہوئے گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

کے فارمولے حاصل کریں گے۔ بعد میں کسی بھی خط کو گردش کا مرکز لے کر گردشی

ٹھوس کے حجم اور سطح کے فارمولے نکالیں گے۔


9.2۔ گردشی ٹھوس کا حجم (Volume): یہ ثابت کرنا کہ منحنی $y = f(x)$ کے

$x = a$ اور $x = b$ کے درمیان والے قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردشی ٹھوس کا حجم


$$\int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \text{ یعنی } \int_a^b \pi y^2 dx,$$

ہوتا ہے۔ اگرچہ قوس x -محور کو نہ کاٹتا ہو۔

مان لیجیے $y = f(x)$ پر فصل a اور b والے نقطے ترتیب وار G اور H ہیں اور $P(x, y)$ منحنی پر کوئی متغیر (variable) نقطہ ہے۔



تصویر 37



تصویر 38

مان لیجیے قوس GP کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردشی ٹھوس کا حجم V ہے۔ اس طرح x, V کا فنکشن ہے۔ ہم P کے قریب منحنی پر ایک ایسا نقطہ $Q(x + \Delta x, y + \Delta y)$ لیتے ہیں کہ کسی نقطہ کے منحنی پر P سے Q تک چلنے پر عرض ordinate یا تو لگاتار بڑھتا ہو (جیسے تصویر 37 میں) یا لگاتار گھٹتا ہو (جیسے تصویر 38 میں)۔ اب مستطیل (rectangles) NP اور MQ منسلک کر لیجیے۔

اب قوس PQ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے ٹھوس کا حجم ΔV اُن دونوں ٹکڑیوں (discs) کے مجموعوں کے درمیان ہے جو کہ مستطیلوں NP اور MQ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنتیں۔

تصویر 37 کے لیے ہم پاتے ہیں

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

$$\begin{aligned} \Rightarrow \pi y^2 \Delta x &< \Delta V < \pi(y + \Delta y)^2 \Delta x \\ \Rightarrow \pi y^2 &< \frac{\Delta V}{\Delta x} < \pi(y + \Delta y)^2 \\ \Rightarrow \frac{dV}{dx} &= \pi y^2 \end{aligned}$$

تصویر 38 کے لیے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \pi(y + \Delta y)^2 \Delta x &< \Delta V < \pi y^2 \Delta x \\ \Rightarrow \pi(y + \Delta y)^2 &< \frac{\Delta V}{\Delta x} < \pi y^2 \\ \Rightarrow \frac{dV}{dx} &= \pi y^2 \quad (\text{پہلے کی طرح}) \end{aligned}$$

اس لیے

$$\int_a^b \pi y^2 dx = \int_a^b \frac{dV}{dx} dx = \left| V \right|_a^b$$

$$= (x \text{ پر } V \text{ کی قیمت}) - (x \text{ پر } V \text{ کی قیمت})$$

$$= (x \text{ پر } V \text{ کی قیمت}) - 0$$

$$= \text{توس } GH \text{ کو } x\text{-محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم}$$

نوٹ: ادھر کی بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے منحنی $x = f(y)$ کے $y = a$ اور $y = b$ والے نقطوں کے درمیان والے توس کو y -محور کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے

$$\int_a^b \pi x^2 dy$$

ہوتا ہے، جب کہ توس y -محور کو کاٹتا نہ ہو۔

مثالیں

1. علیپس $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردشی

ٹھوس کا حجم نکالیے۔ (تصویر 10 دیکھیے)


یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ قوس ABA' کو x -محور کے گرد گھمانے پر وہی گردش ٹھوس ملے گا جو کہ پورے علیس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنتا ہے۔ ساتھ ہی، یہ حجم اسی گردش ٹھوس کے حجم کا دگنا ہے جو کہ قوس AB کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنتا ہے لہذا درکار حجم

$$= 2\pi \int_0^a y^2 dx = 2\pi \frac{b^2}{a^2} \int_0^a (a^2 - x^2) dx \\ = 2\pi \frac{b^2}{a^2} \left[a^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^a = \frac{4}{3} \pi ab^2.$$

2- سائیکلائڈ

$$x = a(\theta + \sin \theta), y = a(1 + \cos \theta)$$

کے ایک قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردش ٹھوس کا حجم نکالیے۔
قوس $A'BA$ کو گھمانے پر بنے ہوئے گردش ٹھوس کا حجم اُس ٹھوس کے حجم کا دگنا ہے جو قوس AB کو گھمانے پر بنتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی نقطہ BA پر B سے A کی



تصویر 39

طرف بڑھتا ہے، θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے۔

اس لیے درکار حجم

$$= 2\pi \int_0^{\pi a} y^2 dx, \quad (OA = \pi a. \text{ جہاں})$$


تغیر x کی تبدیلی کر کے θ لانے پر درکار حجم

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi \int_0^\pi a^2(1+\cos \theta)^2 a(1+\cos \theta) d\theta \\
 &= 2\pi a^3 \int_0^\pi 8 \cos^4 \frac{\theta}{2} d\theta \\
 &= 32\pi a^3 \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \cos^4 \varphi d\varphi, \quad (\varphi = \frac{\theta}{2} \text{ جہاں}) \\
 &= 32\pi a^3 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 &= 5\pi^2 a^3.
 \end{aligned}$$

3۔ کارڈوائڈ $r = (1+\cos \theta)$ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنے گردشی

ٹھوس کا حجم نکالے۔
درکار حجم



$$= \pi \int_0^{2a} y^2 dx \quad (OA = 2a \text{ کیونکہ})$$

متغیر x کی تبدیلی کر کے θ لانے پر ہم پاتے ہیں

تصویر 40

$$x = r \cos \theta = a \cos \theta (1 + \cos \theta)$$

$$y = r \sin \theta = a \sin \theta (1 + \cos \theta)$$

$$dx = -a (\sin \theta + 2 \sin \theta \cos \theta) d\theta$$

ساتھ ہی $\theta = 0$ پر $x = 2a$ اور $\theta = \pi$ پر $x = 0$ ۔

$$\therefore V = -\pi \int_\pi^0 a^2 \sin^2 \theta (1 + \cos \theta)^2 a \sin \theta (1 + 2 \cos \theta) d\theta$$


$$= \pi a^3 \int_0^\pi \sin^3 \theta (1 + \cos \theta)^2 (1 + 2 \cos \theta) d\theta$$

$$= \pi a^3 \int_0^\pi 8 \sin^3 \frac{\theta}{2} \cos^3 \frac{\theta}{2} \cdot 4 \cos^4 \frac{\theta}{2} \left(4 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 \right) d\theta$$

$$\begin{aligned}
 &= 128 \pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^3 \frac{\theta}{2} \cos^3 \frac{\theta}{2} d\theta - 32 \pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^3 \frac{\theta}{2} \cos^7 \frac{\theta}{2} d\theta \\
 &= 256 \pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^3 \phi d\phi - 64 \pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^7 \phi d\phi \\
 &\quad (\phi = \theta/2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 256 \pi a^3 \frac{2.8.6.4.2}{12.10.8.6.4.2} - 64 \pi a^3 \frac{2.6.4.2}{10.8.6.4.2} \\
 &= \frac{64 \pi a^3}{25} - \frac{8 \pi a^3}{5} = \frac{8 \pi a^3}{5}
 \end{aligned}$$

4. لیمسکیٹ $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنے گردش
 ٹھوس کا حجم نکالے۔
 کل منحنی کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر
 بنے گردش ٹھوس کا حجم اُس گردش ٹھوس کے حجم
 کا دگنا ہے جو کہ پہلے ربع والے قوس کو ابتدائی
 خط کے گرد گھمانے پر بنتا ہے۔
 لہذا درکار حجم



$$= 2\pi \int_0^a y^2 dx \quad \text{کیونکہ } OA = a$$

متغیر x کی تبدیلی کر کے θ لانے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}
 x &= r \cos \theta = a \sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta \\
 \Rightarrow dx &= \left(-a \sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta - \frac{a \sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} \cos \theta \right) d\theta \\
 &= -a \frac{\sin 3\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta
 \end{aligned}$$

$$y^2 = r^2 \sin^2 \theta = a^2 \cos 2\theta \sin^2 \theta \quad \text{ساتھ ہی}$$

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

پھر $x = 0$ پر $\theta = \pi/4$ اور $x = a$ پر $\theta = 0$ ، اس لیے

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= -2\pi a^3 \int_{\pi/4}^0 a^2 \cos 2\theta \sin^3 \theta \frac{\sin 3\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta \\ &= 2\pi a^3 \int_0^{\pi/4} \sin^3 \theta \sin 3\theta \sqrt{\cos 2\theta} d\theta \\ &= 2\pi a^3 \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta (3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta) \sqrt{\cos 2\theta} d\theta \end{aligned}$$

ہم رکھتے ہیں

$$\cos \theta = t \Rightarrow -\sin \theta d\theta = dt$$

اس لیے

$$\text{حجم} = -2\pi a^3 \int_1^{\sqrt{1/2}} (1-t^2) (4t^2-1) \sqrt{2t^2-1} dt$$

ہم لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} (1-t^2) (4t^2-1) \sqrt{2t^2-1} &= \frac{(1-t^2) (4t^2-1) (2t^2-1)}{\sqrt{2t^2-1}} \\ &= \frac{-8t^6 + 14t^4 - 7t^2 + 1}{\sqrt{2t^2-1}} \end{aligned}$$

مان لیجیے (§5.4 دیکھیے)

$$\begin{aligned} \int \frac{-8t^6 + 14t^4 - 7t^2 + 1}{\sqrt{2t^2-1}} dt &= (at^6 + bt^4 + ct^2 + dt + et + f) \sqrt{2t^2-1} \\ &+ g \int \frac{dt}{\sqrt{2t^2-1}} \end{aligned}$$

تفریق کرنے اور $\sqrt{2t^2-1}$ سے ضرب دینے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} -8t^6 + 14t^4 - 7t^2 + 1 &= (5at^4 + 4bt^3 + 3ct^2 + 2dt + e) (2t^2-1) \\ &+ 2t (at^5 + bt^4 + ct^2 + dt^2 + et + f) + g. \end{aligned}$$

اب ہاکی یکساں قوتوں کے ضربوں کی برابری پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} 12a &= -8; & 10b &= 0; & 8c - 5a &= 14; \\ 6d - 4b &= 0; & 4e - 3c &= -7; & -2d + 2f &= 0; \\ -e + g &= 1. \end{aligned}$$

اس لیے

$$a = \frac{9}{8}, b = 0, c = \frac{4}{3}, d = 0, e = -\frac{2}{3}, f = 0, g = \frac{1}{4}.$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_1^{\sqrt{2}} \frac{-8t^6 + 14t^4 - 7t^2 + 1}{\sqrt{(2t^2-1)}} dt &= \left(-\frac{2}{3} t^3 + \frac{4}{3} t^2 - \frac{3}{4} t \right) \sqrt{(2t^2-1)} \Big|_1^{\sqrt{2}} \\ &\quad + \frac{1}{4} \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dt}{\sqrt{(2t^2-1)}} \\ &= \frac{1}{12} - \frac{1}{4} \left| \frac{\log [\sqrt{2}t + \sqrt{(2t^2-1)}]}{\sqrt{2}} \right|_1^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{12} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \log (\sqrt{2}+1). \end{aligned}$$

$$\therefore V = \frac{\pi a^3}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \log (\sqrt{2}+1) - \frac{1}{3} \right]$$

مشقیں

1- منحنی $2ay^2 = x(x-a)^2$ کے لوپ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

2- منحنی $a^2y^2 = x^2(2a-x)(x-a)$ کے لوپ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

3- منحنی $xy^2 = 4(2-x)$ اور y -محور سے گھرا ہوا رقبہ نکالیے اور اس گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے جو منحنی کو y -محور کے گرد 360° گھمانے پر بنتا ہو۔

4- یہ ثابت کیجیے کہ ایک علیس کو اس کے محور اصغر (minor axis) کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم اُن گردشی ٹھوسوں کے جموں کا اوسط نسبتی (mean proportional) ہوتا ہے جو کہ علیس اور اُس کے امدادی دائرے (auxiliary circle) کو علیس کے محور اکبر کے گرد گھمانے پر بنتے ہیں۔

5- ہائپر سائیکلوئڈ $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے تکلی نما

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

(spindle shaped) گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

6۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $y = a^3/(a^2 + x^2)$ کو اُس کے لامتناہی مماس (asymptote) کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $\pi^2 a^3/2$ ہوتا ہے۔

7۔ ثابت کیجیے کہ منحنیوں $y^2 = x^3$ اور $x^2 = y^3$ کے درمیان گھرے ہوئے رقبے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم $5\pi/2k$ ہوتا ہے۔

8۔ منحنی $y^2 = x^2(a-x)/(a+x)$ کے لوپ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم نکالیے۔

9۔ ثابت کیجیے کہ سائیکلائڈ $x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنی چرخی (reel) کا حجم $\pi^2 a^3$ ہوتا ہے۔

10۔ ثابت کیجیے کہ سائیکلائڈ

$$x = a(\theta + \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$$

کو y -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $\pi a^3 (\frac{3}{2}\pi^2 - \frac{8}{3})$ ہوتا ہے۔

11۔ منحنی $y = \sqrt{1+x^2}$ کے $x = 0$ اور $x = 4$ کے بیچ والے قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم نکالیے۔

12۔ منحنی $y = e^x \sin x$ کی ترسیم کیجیے جبکہ x صفر سے π تک بڑھے اور اس قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $\pi(e^{2\pi} - 1)/8$ ثابت کیجیے۔

13۔ منحنیوں $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کی ترسیم کیجیے جبکہ x 0 سے $\pi/2$ تک بڑھے۔ ثابت کیجیے کہ ان دونوں منحنیوں کے درمیان گھرے ہوئے رقبے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم $\pi(\pi - 2)/4$ ہوتا ہے۔

14۔ منحنی $y^2 = x^3 + 5x$ اور دو خطوط $x = 2$ اور $x = 4$ کے درمیان گھرے ہوئے رقبے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

1۔ ایکٹرنری $y = c \cosh (x/c)$ کے $x = a$ اور $x = b$ والے نقطوں کے درمیان کے قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

16 ثابت کیجیے کہ مکانی $y^2 = 4ax$ اور اس کے بریچہ (evolute)

$$27ay^3 = 4(x-2a)^3$$

کے درمیان گھرے رتبے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردش ٹھوس کا حجم $80\pi a^3$ 17- ثابت کیجیے کہ مکانی اور اس کے وتر خاص کے بسروں پر کھینچے گئے مماسوں کے درمیان گھرے رتبے کو مکانی کے محور کے گرد گھمانے پر بنے گردش ٹھوس کا حجم $2a^3\pi/3$ ہوتا ہے، جہاں $4a$ مکانی کے وتر خاص کی لمبائی ہے۔


18- منحنی $y = x \sin mx$ ، $x = 0$ اور $x = 2\pi/m$ کے درمیان گھرے رتبے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردش ٹھوس کا حجم نکالیے۔

19- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = a \cos 3\theta$ کے $\theta = -\pi/6$ اور $\theta = \pi/6$ کے درمیان والے لوپ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر گردش ٹھوس کا حجم $19\pi a^3/960$ ہوتا ہے۔

20- ثابت کیجیے کہ مکان $r = a + b \cos \theta$ ($a > b$) کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $4\pi a(a^2 + b^2)/3$ ہوتا ہے۔

جوابات

1. $\pi a^3/24$.
2. $23a^3\pi/60$.
3. $4\pi, 4\pi^2$.
5. $32\pi a^3/105$.
8. $\frac{3}{2}\pi a^3 \log(8/e^2)$.
11. $76\pi/3$.
14. 90π .
15. $\left[\frac{\pi c^2}{4} \left(2x + \sinh \frac{2x}{c} \right) \right]_a^b$.
18. $\pi^2(8\pi^2 - 3)/6m^2$.



9.3 گردش کا محور:


ہم §9.2 میں حاصل ہوئے نتیجے کو ذیل معنی دے سکتے ہیں:-
 y منحنی کے کسی بھی نقطہ P سے گردش کے محور پر ڈالے گئے عمود PM

کی لمبائی ہے، جہاں M وہ نقطہ ہے جس پر عمود گردش کے محور کو کاٹتا ہے۔ x -محور کے کسی ساکت نقطہ O سے M تک کی دوری ہے۔ قوس کے کناروں G اور H سے محور پر ڈالے گئے عمود جن نقطوں A اور B پر محور کو کاٹتے ہیں ان کے O سے فاصلے a اور b ہیں۔
اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قوس GH کو خط AB کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم

$$\int_{OA}^{OB} \pi(MP^2) d(OM).$$

ہوتا ہے۔

1- سیسائیڈ $y^2(2a-x) = x^3$ کو اس کے لامتناہی مماس (asymptote) کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔



تصویر 43

منحنی کا لامتناہی مماس $x = 2a$ ہے۔ منحنی پر واقع کسی نقطہ $P(x, y)$ سے لامتناہی مماس پر ڈالے گئے عمود MP کی لمبائی $(2a-x)$ ہے۔ لامتناہی مماس جس نقطہ پر x -محور کو کاٹتا ہے اس نقطہ A کو ہم گردش کے محور کا ثابت نقطہ لے لیتے ہیں۔ تشاکل کی وجہ سے، پورے منحنی کو لامتناہی مماس کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم اس حجم کا دوگنا ہوگا جو کہ منحنی کے پہلے ربع والے حصے کو لامتناہی مماس کے گرد گھمانے پر بنتا ہے۔

اس لیے درکار حجم

$$= 2\pi \int_0^{\infty} (MP)^2 d(AM) = 2\pi \int_0^{\infty} (2a-x)^2 dy$$

ہم متغیر y کے بجائے x لاتے ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$dy = \frac{(3a-x)\sqrt{x}\sqrt{2a-x}}{(2a-x)^3} dx$$

اس لیے

$$\text{حجم} = 2\pi \int_0^{2a} (3a-x) \sqrt{2a-x} \sqrt{x} dx.$$


تکملہ نکالنے کے لیے ہم رکھتے ہیں

$$x = 2a \sin^2 \theta.$$

اور تب

$$\begin{aligned} \text{تکملہ} &= 16\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3-2\sin^2 \theta) \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= 16\pi a^3 \left[3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta \cos^2 \theta d\theta \right] \\ &= 16\pi a^3 \left[\frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} \right] \\ &= 2\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

2- ثابت کیجیے کہ علیحدہ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے وتر $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ سے کٹے ہوئے چھوٹے والے قطع کو اس وتر کے گھمانے پر بنے گردش ٹھوس کا حجم $\frac{1}{2} (10 - 3\pi) a^2 b^2 (a^2 + b^2) - \frac{1}{2}$ ہوگا۔



تصویر 44

وتر $x/a + y/b = 1$ نقطوں A اور B کو ملانے والا خط ہے۔ کوئی بھی نقطہ $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$

علیحدہ کے چھوٹے والے قوس پر لے لیجیے۔ عمود

MP کی لمبائی $\frac{ab(\cos \theta + \sin \theta - 1)}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ہے۔

ہم گردش کے محور AB پر نقطہ A کو ثابت نقطہ لے لیتے ہیں۔ اب ہمیں لمبائی AM معلوم کرنا ہے۔ اب

$$\begin{aligned}
 AM^2 &= AP^2 - PM^2 \\
 &= (a \cos \theta - a)^2 + (b \sin \theta)^2 - \frac{a^2 b^2 (\cos \theta + \sin \theta - 1)^2}{a^2 + b^2} \\
 &= a^2 (\cos \theta - 1)^2 + b^2 \sin^2 \theta \\
 &\quad - \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} [(\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta + 2 \sin \theta (\cos \theta - 1)] \\
 &= \frac{a^2 (\cos \theta - 1)^2 + b^2 \sin^2 \theta - 2 a^2 b^2 \sin \theta (\cos \theta - 1)}{a^2 + b^2} \\
 &= \frac{[a^2 (\cos \theta - 1) - b^2 \sin \theta]^2}{a^2 + b^2}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow AM = \frac{a^2 (1 - \cos \theta) + b^2 \sin \theta}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\Rightarrow d(AM) = \frac{a^2 \sin \theta + b^2 \cos \theta}{\sqrt{a^2 + b^2}} d\theta$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (MP)^2 d(AM) \quad \text{اس لیے درکار حجم}$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^2 b^2 (\cos \theta + \sin \theta - 1)^2}{(a^2 + b^2)} \cdot \frac{a^2 \sin \theta + b^2 \cos \theta}{\sqrt{a^2 + b^2}} d\theta$$

$$= \frac{\pi a^2 b^2}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2 \sin \theta + b^2 \cos \theta) \times (2 + 2 \sin \theta \cos \theta - 2 \sin \theta - 2 \cos \theta) d\theta$$

$$= \frac{2\pi a^2 b^2}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[(a^2 \sin \theta + b^2 \cos \theta) + a^2 \sin^2 \theta \cos \theta + b^2 \cos^2 \theta \sin \theta - (a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta) - (a^2 + b^2) \sin \theta \cos \theta \right] d\theta$$

$$= \frac{2\pi a^2 b^2}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \left[(a^2 + b^2) + \frac{a^2}{3} + \frac{b^2}{3} - \left(\frac{a^2 \pi}{4} + \frac{b^2 \pi}{4} \right) - \frac{(a^2 + b^2)}{2} \right]$$

3۔ منحنی $2ay^2 = x(x-a)^2$ کے لوپ کو خط $y = a$ کے گرد گھمانے پر بننے
 ٹھوس کا حجم نکالیے۔




 اس کا لوپ $x = 0$ اور $x = a$ کے درمیان ہے۔ لوپ کو گردش کے محور $y = a$ کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردش ٹھوس کا حجم' قوسوں OBA اور OCA کو $y = a$ کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردش ٹھوسوں کے حجموں کے فرق کے برابر ہوگا۔ اب قوس OBA کے کسی نقطہ کے لیے

$$y = \frac{\sqrt{x(x-a)}}{\sqrt{(2a)}} = -\frac{\sqrt{x(a-x)}}{\sqrt{(2a)}}$$

اور قوس OCA کے کسی نقطہ کے لیے

$$y = - \frac{\sqrt{x(x-a)}}{\sqrt{(2a)}} = \frac{\sqrt{x(a-x)}}{\sqrt{(2a)}}$$

توس OBA کی گردش سے بنے ٹھوس کا حجم

$$= \pi \int_0^a \left(a + \frac{\sqrt{x(a-x)}}{\sqrt{2a}} \right)^2 dx.$$

اور توس OCA کی گردش سے بنے ٹھوس کاجم

$$= \pi \int_0^a \left(a - \frac{\sqrt{x(a-x)}}{\sqrt{2a}} \right)^2 dx.$$

اس لیے درکار حجم، جو کہ ان دونوں کا فرق ہے، وہ

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

$$= \frac{4a\pi}{\sqrt{(2a)}} \int_0^a \sqrt{x(a-x)} dx$$

$$= \frac{4a\pi}{\sqrt{(2a)}} \left| \frac{2}{3} ax^{3/2} - \frac{2}{5} x^{5/2} \right|_0^a = \frac{8\sqrt{2}\pi a^3}{15}$$

مشقیں

1- ثابت کیجیے کہ y -محور اور $xy^2 = a^2b^2$ کے $x < 0$ والے قوس سے گھرے ہوئے رقبے کو گردش کے محور $x = -2a$ کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم $2\pi(\pi - \frac{3}{4})a^2b$ ہوگا۔

2- ثابت کیجیے کہ خط $x = a/2$ ، $xy^2 = a^2b^2$ کو جن دو حصوں میں کاٹتا ہے، ان میں سے چھوٹے حصے کو اسی خط کے گرد 360° گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم $\pi a^2b(\frac{3}{4}\sqrt{3} - \frac{\pi}{4})$ ہوگا۔

3- ثابت کیجیے کہ منحنیوں $xy^2 = a^2(a-x)$ ، $(a-x)y^2 = a^2x$ کے درمیان کے رقبے کو خط $x = a/2$ کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم $\pi a^3(4-\pi)/4$ ہوگا۔

4- دو مکافیوں $x^2 = 4ay$ اور $x^2 = 4a(2a-y)$ کے درمیان گھرے رقبے کو خط $y = a$ گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

5- ثابت کیجیے کہ نصف قطر (radius) a والے دائرے کے ایک ربع کو اس کے وتر کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے تنکلی نما (spindle) ٹھوس کا حجم $(\pi/6\sqrt{2})(10-3\pi)a^3$ ہوگا۔

6- ثابت کیجیے کہ مکافی $y^2 = 4ax$ کے راس (vertex) کو وتر خاص کے ایک سرے سے ملانے والے وتر مکافی کا جو حصہ کاٹتا ہے اسے اس وتر کے گرد 360° گھمانے پر بنے ہوئے گردشی ٹھوس کا حجم $(2\sqrt{5})\pi a^3/75$ ہوگا۔

7- ثابت کیجیے کہ $xy^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b$) کو اس کے چھوٹے محور کے

ایک سرے پر کھینچے گئے مماس کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم $2\pi^2 ab^3$ ہوگا۔
8- منحنی $(a-x)y^2 = a^2x$ کو اس کے لامتناہی مماس کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

9- مکانی $y = 4ax$ کے اُس قوس کو جو اس سے وتر خاص کے ایک سرے کو ملانے والے وتر سے کٹتا ہے، اگر اسی سرے پر کھینچے گئے مماس کے گرد گھمایا جائے تو ثابت کیجیے کہ اس طرح بنے گردشی ٹھوس کا حجم $7\sqrt{2}\pi a^3/60$ ہوگا۔

10- مکانی کے وتر خاص کے ایک سرے اور اس کو ملانے والے وتر کے گرد اگر اس وتر سے کٹے ہوئے مکانی کے قوس کو گھمایا جائے تو بنے ہوئے گردشی ٹھوس کا حجم نکالیے۔

11- ثابت کیجیے کہ منحنی $y = x^2 e = x^2 e^x$ کے $x > 0$ والے قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کا حجم $3\pi/4$ ہوگا۔

12- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = a + b \sec \theta$ کو اس کے لامتناہی مماس کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردشی ٹھوس کا حجم $2\pi a^3 (\frac{3}{2}a + \frac{1}{2}b\pi)$ ہوگا۔

جوابات

4. $32\pi a^3/15$.

8. $\frac{1}{2}\pi^2 a^3$


10. $(2/15\sqrt{5})\pi a^3$

9.4 مخروط کے فرسٹم (frustum of a cone) کی سطح کا رقبہ

ہم برآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ جس قائم دائری مخروط (right circular cone) کے دائری قاعدے (circular base) کا نصف قطر (radius) r ہو اور جس کی ترچھی اونچائی (slant height) l ہو، اُس کی سطح کا رقبہ $\pi r^2 l$ ہوتا ہے۔
ایسے مخروط کو بھاڑ کر اگر اس کے کسی مولد خط (generator) کے سہارے پھیلا دیں۔

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

تو ایک ایسا دائری قطع (circular sector) بنے گا جس کا نصف قطر OA ترہی ادنیائی کے برابر ہوگا اور جس کا قوس AB مخروط کے قاعدے (base) کے محیط (circumference) کے برابر ہوگا۔




تصویر 46

اس دائری قطع اور ساتھ ہی مخروط کی سطح کا رقبہ بھی $\pi r l$ ہوتا ہے۔

اگر مخروط کا نصف راسی۔ زاویہ (semi-vertical angle) α ہو تو ہم پاتے ہیں

$$r/l = \sin \alpha$$

لہذا مخروط کی سطح کا رقبہ $\pi l^2 \sin \alpha$ ہوگا۔
اب مخروط VAB کے فرسٹ $CABD$ پر غور کیجیے۔ مان لیجیے اس کے دائری قاعدوں (circular bases) کے نصف قطر $O'A$ اور OC ترتیب وار r_1 اور r_2 ہیں اور اس کی ترہی ادنیائی CA ہے۔
فرسٹ کی سطح کا رقبہ



تصویر 47

$$= \pi(AV^2 - CV^2) \sin \alpha$$

$$= \pi(AV - CV)(AV \sin \alpha + CV \sin \alpha)$$

$$= \pi AC(O'A + OC)$$

$$= \pi l(r_1 + r_2)$$

$$= \pi X (\text{ترہی ادنیائی})$$

9.5- گردشی سطح
(Surface of revolution)


یہ ثابت کرنا کہ منحنی $y = f(x)$ کے فاصلہ a اور b والے نقطوں کے درمیان والے قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنی ہوئی گردشی

سطح کا رقبہ

$$\int_a^b 2\pi y \frac{ds}{dx} dx = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx$$

ہوتا ہے۔

مان لیجیے قوس پر $G[a, f(a)]$ کوئی ثابت نقطہ ہے اور $P(x, y)$ متغیر نقطہ ہے۔ مان لیجیے کہ قوس پر واقع نقطہ H کے مختصات $[b, f(b)]$ ہیں۔ قوس GP کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنی گردش سطح کے رقبے کو اگر σ کہیں، تو σ کا x کا تفاعل ہے۔



تصویر 48

ہم قوس پر P کے قریب ایک نقطہ $Q(x + \Delta x, y + \Delta y)$ لیتے ہیں۔ قوس PQ کے x -محور کے گرد گھمانے پر بنی گردش سطح کا رقبہ $\Delta \sigma$ ہے۔

مان لیجیے (قوس GP) اور (قوس PQ) $s = (GP)$ اور $\Delta s = (PQ)$ دتر PQ کو x -محور کے گرد گھمانے پر ہمیں ایک ایسے مخروط کا فرسٹم ملتا ہے جس کی ترچھی ادبچائی PQ ہے اور جس کے دائری قاعدوں کے نصف قطر MP اور NQ ہیں۔ اس فرسٹم کی سطح کا رقبہ

$$= \pi(PM + QN) PQ = \pi(y + y + \Delta y) PQ$$

مان لیجیے یہ $\Delta \Sigma$ ہے۔

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

اب ہم یہ مفروضہ (axiom) لے لیتے ہیں کہ

$$\lim \frac{\Delta \Sigma}{\Delta x} = \lim \frac{\Delta \sigma}{\Delta x} \Leftrightarrow \frac{d\Sigma}{dx} = \frac{d\sigma}{dx}$$

اب

$$\begin{aligned} \frac{\Delta \Sigma}{\Delta x} &= \pi(2y + \Delta y) \frac{PQ}{\Delta x} \\ &= \pi(2y + \Delta y) \times \frac{PQ \text{ دائر}}{PQ \text{ قوس}} \times \frac{PO \text{ قوس}}{\Delta x} \end{aligned}$$

انتہائیں لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{d\Sigma}{dx} = 2\pi y \cdot 1 \cdot \frac{ds}{dx} = 2\pi y \frac{ds}{dx},$$

$$\therefore \frac{d\sigma}{dx} = 2\pi y \frac{ds}{dx}.$$

اب

$$\int_a^b 2\pi y \frac{ds}{dx} dx = \int_a^b \frac{d\sigma}{dx} dx = \left| \sigma \right|_a^b$$

$$= (\sigma \text{ پر } x = a \text{ کی قیمت}) - (\sigma \text{ پر } x = b \text{ کی قیمت})$$

قوس GH سے بنی گردشی سطح کا رقبہ =

نوٹ: s کو غیر تالچ متغیر لینے پر ہم دیکھتے ہیں کہ گردشی سطح کا رقبہ

$$= \int 2\pi y ds.$$

منحنی کی قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کے لیے، جہاں کہ θ غیر تالچ متغیر ہے، گردشی

سطح کا رقبہ

$$= \int 2\pi y \frac{ds}{d\theta} d\theta.$$

منحنی کی پیرامیٹری مساوات $x = f(t)$, $y = \varphi(t)$ کے لیے، جہاں t پیرامیٹر ہے، گردشی

سطح کا رقبہ

$$= \int 2\pi y \frac{ds}{dt} dt.$$

مثالیں

1۔ ابتدائی خط کے گرد کارڈوائڈ $r = a(1 + \cos \theta)$ کو گھمانے پر بنے گردشی
ٹھوس کی سطح کا رقبہ نکالیے۔
(تصویر 31 دیکھیے)

درکار سطح

$$= \int_0^\pi 2\pi y \frac{ds}{d\theta} d\theta.$$

اب

$$y = r \sin \theta = a \sin \theta (1 + \cos \theta)$$

$$\begin{aligned} \frac{ds}{d\theta} &= \sqrt{\left[r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right]} \\ &= \sqrt{[a^2(1 + \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta]} \\ &= 2a \cos \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

اس لیے


$$\begin{aligned} \text{سطح} &= \int_0^\pi 2\pi a \sin \theta (1 + \cos \theta) 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 4\pi a^2 \int_0^\pi \sin \theta (1 + \cos \theta) \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 4\pi a^2 \int_0^\pi 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cdot 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 32\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos^4 \varphi d\varphi, \quad (\varphi = \frac{\theta}{2} \text{ جہاں}) \\ &= 32\pi a^2 \left[-\frac{\cos^5 \varphi}{5} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32}{5} \pi a^2. \end{aligned}$$

2۔ سائیکلائیڈ

$$x = a(\theta - \sin \theta), y = a(1 - \cos \theta)$$

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنی گردشی سطح کا رقبہ نکالے



تصویر 49

ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\theta} &= \sqrt{\left[\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2\right]} \\ &= \sqrt{[a^2(1 - \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta]} \\ &= 2a \sin \frac{\theta}{2}\end{aligned}$$

حصہ OPA کے لیے θ صفر سے 2π تک بدلتا ہے


$$\begin{aligned}\text{درکار سطح} &= \int_0^{2\pi} 2\pi y \frac{ds}{d\theta} \cdot d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi a(1 - \cos \theta) \cdot 2a \sin \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 16\pi a^2 \int_0^{\pi} \sin^2 \varphi d\varphi, \quad (\varphi = \frac{\theta}{2} \text{ جہاں}) \\ &= 32\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi = 32\pi a^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{64\pi a^2}{3}\end{aligned}$$

9.6 - پاپس کے مسئلے (Theorems of Pappus)

9.61 - گردشی حجم: کسی بند ہموار منحنی کو اُسی ہموار (plane) کے کسی خط کے گرد (جو منحنی کو نہ کاٹے) گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم، اُس منحنی سے گھرے رقبے کو اُس رقبے کے مرکز وسطانی (centroid) کے طے کیے راستے کی لمبائی سے ضرب دے کر حاصل ہوتا ہے۔

تکمیلی احصاء

ہم x -محور کو گردش کا محور لے لیتے ہیں۔ مان لیجیے منحنی ایسا ہے کہ منحنی پر فصلہ a اور b والے نقطوں کے درمیان y -محور کے متوازی کوئی بھی خط اُسے صرف دو نقطوں P_1 اور P_2 پر کاٹتا ہے۔



تصویر 50

مان لیجیے $MP_1 = y_1$, $MP_2 = y_2$ اور یہ دونوں x کے تفاعل ہیں۔ x کی قیمت a سے b تک بدلتی ہے۔
اب گردش ٹھوس کا حجم V

$$V = \pi \int_a^b y_2^2 dx - \pi \int_a^b y_1^2 dx$$

$$(i) \dots\dots\dots = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2) dx$$

ساتھ ہی منحنی سے گھری رقبے کے مرکز دسطانی (centroid) کا عرض $\bar{y}$

$$\bar{y} = \frac{\int_a^b \frac{1}{2}(y_1 + y_2)(y_2 - y_1) dx}{A} \quad \text{ذیل ہے :-}$$

$$(2) \dots\dots\dots = \frac{1}{2} \frac{\int_a^b (y_2^3 - y_1^3) dx}{A}$$

جہاں A اُس قطعہ کا رقبہ ہے۔

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

اب (1) اور (2) سے ہم پاتے ہیں

$$V = 2\pi \bar{y} A$$

جس سے نتیجہ ثابت ہو گیا کیونکہ مرکز وسطانی کے طے کیے ہوئے راستے کی لمبائی $2\pi \bar{y}$ ہے۔

9.7۔ گردشی سطح: کسی بند ہوا رمنحنی کو اس ہوا کے کسی خط کے گرد (جو رمنحنی کو نہ کاٹے) گھمانے پر بنی ہوئی گردشی سطح کا رقبہ رمنحنی کی لمبائی کو رمنحنی کے مرکز وسطانی کے طے کیے ہوئے راستے کی لمبائی سے ضرب دے کر حاصل ہوتا ہے۔

ہم محور کو گردش کا محور لے لیتے ہیں
(تصویر 50 دیکھیے)

گردشی سطح S

$$(1) \dots \dots \dots S = \int_0^l 2\pi y \, ds,$$

جہاں رمنحنی کے توس کی لمبائی ہے۔ یہاں ہم نے y کو s کا تفاعل مانا ہے۔
مرکز وسطانی کا عرض $\bar{y}$ ذیل ہے :-

$$(2) \dots \dots \dots \bar{y} = \frac{\int_0^l y \, ds}{l}$$

اب (1) اور (2) سے

$$S = 2\pi \bar{y} l$$

جس سے نتیجہ ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ $2\pi \bar{y}$ مرکز وسطانی کے طے کیے ہوئے راستے کی لمبائی ہے۔

مشقیں

1۔ نصف قطر a والے کرہ (sphere) کا حجم نکالیے۔

تکلی احصاء

2- پیرابولا $y^2 = 4ax$ کے وتر خاص سے کیٹے والے مبدا کی طرف والے حصہ کو x محور کے گرد گھمانے پر بنی گردشی سطح کا رقبہ نکالیے۔

3- کانہی $y^2 = 4ax$ کے وتر خاص سے کیٹے والے مبدا کی طرف والے قوس کو مبدا پر والے تماس کے گرد گھمانے پر بنی چرخ نما گردشی سطح کا رقبہ نکالیے۔

4. ایسٹرائٹ $x = a \cos^2 t, y = a \sin^2 t$ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنی ہوئی گردشی سطح کا رقبہ نکالیے۔

5. لینسکیٹ $r = a^2 \cos 2\theta$ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنی ہوئی گردشی سطح کا رقبہ نکالیے۔

6. کارڈائٹ $r = a(1 - \cos \theta)$ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنی گردشی سطح کا رقبہ نکالیے۔

7. منحنی $r = 2a \cos \theta$ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنی گردشی سطح کا رقبہ نکالیے۔

8. ثابت کیجئے کہ سائیکلائیڈ

$$x = a(\theta + \sin \theta), y = a(1 + \cos \theta)$$

کے دو متواتر (cusps) کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے رقبے کا سائیکلائیڈ اور x -محور کے گرد گھرنے والے رقبے سے تناسب 64 اور 9 کا ہے۔

9- یعنی $8a^2y^2 = x^2(a^2 - 2x^2)$ کا پہلے ربع والا قوس x -محور اور y -محور کے گرد گھمائے جانے پر سطحیں A اور B بنا ما ہے۔ یہ ثابت کیجئے کہ A اور B کے رقبوں میں $3\sqrt{2}$ اور 2 کا تناسب ہے۔

یہ بھی دکھائیے کہ پہلے ربع والے قوس کو y -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم وہی ہوگا جو کہ اس قائم اسطوانہ (right cylinder) B کا ہے جس کے دائری قاعدے کا نصف قطر $a/4$ ہو اور اونچائی پہلے ربع والے قوس کی لمبائی کے برابر ہو۔

10- ثابت کیجئے کہ علیحدہ $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنی گردشی سطح کا رقبہ

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

$$2\pi ab[\sqrt{(1-e^2)} + (1/e) \sin^{-1} e]$$

ہوگا، جہاں e علیپس کا خردوج (eccentricity) ہے۔

11- نصف قطر a والے دائرے کا ایک قوس اپنے وتر خاص کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ اگر قوس کی لمبائی $2a\alpha$ ہو ($\alpha < \pi/2$) تو ثابت کیجیے کہ گردشی سطح کا رقبہ

$$4\pi a^2 (\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)$$

12- منحنی $y = \sin x$ کے $x = 0$ اور $x = \pi$ کے درمیان کے قوس کو اگر x -محور کے گرد گھمائیں تو ثابت کیجیے کہ گردشی سطح کا رقبہ

$$\pi^2 [\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]$$

13- ثابت کیجیے کہ ٹریکٹریس (Tractrix)

$$x = a \cos t + \frac{1}{2} a \log \tan^2 \frac{t}{2}, y = a \sin t$$

کو اس کے لامتناہی مماس کے گرد گھمائے پر بنی سطح کا رقبہ نصف قطر a والے کرہ (sphere) کے رقبے کے برابر ہوگا۔

جوابات

1. $4a^2\pi$.

2. $8a^2\pi(2\sqrt{2}-1)/3$.

3. $a^2\pi[3\sqrt{2}-\log(\sqrt{2}+1)]$.

4. $12\pi a^2/5$.

5. $2\sqrt{2}\pi a^2(\sqrt{2}-1)$.

6. $32\pi a^2/5$.

7. $4\pi a^2$.

باب 9 پر مشقیں

1- ثابت کیجیے کہ منحنی $y = 1 - x^2$ کے لوپ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کی سطح کا رقبہ 3π اور اس کا حجم $3\pi/4$ ہوگا۔

2- نصف قطر a والے دائرے کے ایک ربع اور اس کے کنارے پر مماس کے درمیان گھرا ہوا رقبہ ان ماسوں میں سے کسی ایک کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ثابت کیجیے کہ

(i) گردش ٹھوس کا حجم $\pi a^3/6 (10-3\pi)$ ہوگا۔

(ii) گردش سطح کا رقبہ $\pi (\pi-2) a^2$ ہوگا۔

3۔ سائیکلائڈ

$$x = a (\theta - \sin \theta), y = a (1 - \cos \theta)$$

نقطوں $(0, 0)$ اور $(a\pi, 2a)$ کے درمیان والا قوس ان نقطوں کو ملانے والے وتر کے گرد گھرایا جاتا ہے۔ ثابت کیجیے کہ گردش سطح کا رقبہ

$$\frac{32 a^2 \pi (\pi-2)}{3\sqrt{\pi^2+4}}$$

4۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $x^2 y^2 = a(x-a)(x-b)^2$ کے لوپ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردش ٹھوس کا حجم

$$\pi a \left\{ \frac{1}{3} a^2 + 2ab - \frac{2}{3} b^2 + b(2a+b) \log(b/a) \right\}.$$

5۔ علیس $b-x^2+a^2y^2=a^2b^2$ کو محور اکبر کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس میں ایک دائری کاٹ والا اسطوانہ نما (cylindrical) سوراخ بنایا گیا ہے جس کا محور خود محور اکبر (major axis) ہے۔ ثابت کیجیے کہ باقی بچے ٹھوس کا حجم

$$4\pi b^2/3a^2$$

ہے جہاں کہ 21 سوراخ کی لمبائی ہے۔

6۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $y = c \cosh(x/c)$ کے $(0, c)$ اور (x, y) نقطوں کے درمیان والے قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ہوئے گردش سطح کا رقبہ

$$\pi c \left(x + c \sinh \frac{x}{c} \cosh \frac{x}{c} \right)$$

7۔ ثابت کیجیے کہ علیس $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ کے پہلے ربع والے قوس کو خط $y = b$ کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $\pi ab^2 \left(\frac{2}{3} - \frac{\pi}{6} \right)$ ہوگا۔

8۔ منحنی $y^2 = b^2 \log(ax)$ کے $x = a$ اور $x = b$ والے حصے کو (جہاں

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

9. اگر مکافی x محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم نکالے۔
 $r = 2a(1 + \cos \theta)$ کے باہر لیکن کارڈائڈ $2a = r(1 + \cos \theta)$ کے اندر کا رقبہ ابتدائی خط کے گرد گھمایا جائے تو ثابت کیجیے کہ گردشی ٹھوس کا حجم $18\pi a^3$ ہوگا۔

10. ثابت کیجیے کہ منحنی $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ کے ایک لوپ کو خط $\theta = \frac{1}{2}\pi$ کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $\pi^2 a^3 / 4\sqrt{2}$ ہوگا۔
 11. ثابت کیجیے کہ ٹریکٹریس (Tractrix)

$$x = a [\cos t + \frac{1}{2} \log \tan^2 \frac{1}{2}t], \quad y = a \sin t$$

کو اس کے لامتناہی مماس کے گرد گھمانے پر ٹھوس کا حجم $2\pi a^3/3$ ہوگا۔
 12. ثابت کیجیے کہ ٹریکٹریس

$$x = a(u - \tanh u) \quad y = a \operatorname{sech} u$$

کو ox کے گرد گھمانے پر بنی سطح کا رقبہ نصف قطر a والے کمرہ کی سطح کے رقبہ کے برابر ہوگا۔

13. منحنی $y = \tanh x$ اس کے لامتناہی مماس $y = 1$ اور y -محور کے گرد گھرا ہوا رقبہ اگر لامتناہی مماس کے گرد گھمایا جائے تو ثابت کیجیے کہ گردشی ٹھوس کا حجم $\pi \log(4/e)$ ہوگا۔

14. ثابت کیجیے کہ منحنی $r = a(1 + 2 \cos \theta)$ ایک بیرونی اور ایک اندرونی لوپ سے مل کر بنا ہے۔ اگر اندرونی لوپ کو ابتدائی خط کے گرد 180° گھمائیں تو ثابت کیجیے کہ بنے ہوئے ٹھوس کا حجم $\pi/12$ ہوگا۔

15. منحنی $r = a(1 + \cos \theta)$ کا $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ کے درمیان والا قوس اگر خط $\theta = 0$ کے گرد گھمایا جائے تو ثابت کیجیے کہ گردشی ٹھوس کا حجم $\frac{1}{2}a^2\pi$ اور گردشی سطح کا رقبہ $\frac{1}{2}(8 - \sqrt{2})a^2\pi$ ہوگا۔

16. کارڈائڈ $r = a(1 + \cos \theta)$ کے $-\pi/8 \leq \theta \leq \pi/8$ والے قوس کو خط

تکلی احصاء

۱۔ کے گرد گھمانے پر بنی گردشی سطح کا رقبہ نکالے۔

جوابات

8. $\pi b^2 [a - b - b \log (a/b)]$.

16. $48\sqrt{2\pi a^2/5}$.

متفرق مشقیں 3

1۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $y = c \cosh (x/c)$ پر کوئی دو نقطوں کے درمیان کے قوس اُن نقطوں کے عضوں اور x -محور کے درمیان گھرا ہوا رقبہ، اُس قوس کی لمبائی کے تناسب سے بدلتا ہے۔

2۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $y^2 (a+x) = x^2 (3a-x)$ کے کسی بھی نقطہ کو

$$x = a \sin 3\theta \operatorname{cosec} \theta, \quad y = a \sin 3\theta \sec \theta$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ بھی ثابت کیجیے کہ منحنی کے لوپ کا رقبہ اور منحنی اور اُس کے لامتناہی مماس کے درمیان گھرا ہوا رقبہ دونوں $3\sqrt{3}a^2$ ہیں۔

3۔ ثابت کیجیے کہ اسٹریٹ میں کوئی بھی مماس منحنی کے دو کناروں کے درمیان کے قوس کو ایسے قوسوں میں تقسیم کرتا ہے جن کی لمبائیوں کا وہی تناسب ہے جو محاور کے درمیان کے ٹہوٹے مماس کے حصوں کا۔

4۔ منحنی $y = a \cosh (x/a)$ پر دو نقطے $A(0, a)$ اور $P(x, y)$ ہیں اور s قوس AP کی لمبائی ہے۔ اگر منحنی x -محور کے گرد گردش کرے تو ثابت کیجیے کہ گردش ٹھوس کا وہ حصہ جو کہ A اور P سے جانے والی x -محور کے عمود ہوا سطحوں کے درمیان آتا ہے، اُس کی گردش سطح کا رقبہ s اور حجم v میں یہ رشتہ ہے۔

$$a s = 2v = \pi a (ax + sy)$$

5۔ منحنی $6xy = x^4 + 3$ کے $x = 1$ اور $x = 4$ والے نقطوں کے درمیان کے

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

توس کی لمبائی نکالے۔ اگر اس توس کو oy کے گرد گھمائیں تو بنے ہوئے گردشی سطح کا رقبہ نکالے۔

6- منحنی $9y^2 = x(3-x)^2$ کے مبدا سے لے کر نقطہ (x, y) تک کے توس کی لمبائی اگر s ہو تو ثابت کیجیے کہ $3s^2 = 3y^2 + 4x^2$ ۔
اگر اس منحنی کے لوپ کا محیط s ہو، اس کا رقبہ A ہو اور لوپ کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی B ہو، تو ثابت کیجیے کہ

$$A = \frac{1}{12} BS$$

7- منحنی $25x^2y^2 = (x^2 + 5y^2)^2$ کے $x = a$ اور $x = 4a$ والے نقطوں کے درمیان توس کی لمبائی

8- $y = e^{-2x} \sin px$ اور $y = 0$ کے درمیان کے سبھی لوپوں کے رقبوں کا جوڑ نکالے۔

9- $x = 0$ اور $x = \pi$ کے درمیان، x -محور اور منحنی

$$y = a (\sin x + \frac{1}{2} \sin 3x + \frac{1}{4} \sin 5x),$$

سے گھرا ہوا رقبہ A نکالے اور اسے x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم نکالے اور دکھائیے کہ $4V = \pi^2 aA$

10- ثابت کیجیے کہ مکانی کے کسی قطع (segment) کا رقبہ اس مثلث کے رقبے کا رد تہائی ہوتا ہے جو قطع کو قاعدہ (base) لے کر اسے کے سروں پر کھینچے گئے ماسوں سے بنا ہو۔

11- اگر کسی مکانی کے لمبائی c والے ماسکی وتر (focal chord) سے کٹے ہوئے قطع کا رقبہ A ہو تو ثابت کیجیے کہ وتر خاص $36A^2/c^3$ ہوگا۔

12- ثابت کیجیے کہ منحنی $x^5 + 2a^2xy - ay^2 = 0$ کے لوپ کا رقبہ $32a^2/105$ ہے۔

13- ثابت کیجیے کہ منحنی $r = 3 \operatorname{cosec} \theta - 5$ کے لوپ کا رقبہ

$$12 - 30 \log 3 + 25 \left(\frac{1}{2} \pi - \tan^{-1} \frac{5}{3} \right) \text{ ہے۔}$$

تکملی احصاء

14- منحنی $r^2 = a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta$ (جبکہ $a^2 > b^2$)

کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم اور گردشی سطح کا رقبہ نکالیے۔

15- علیحدہ $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ کا وتر خاص سے کٹا ہوا قطع اگر قریبی سرے پر کھینچے گئے مماس کے گرد گھمایا جائے تو بنی ہوئی چرخہ کا حجم معلوم کیجیے۔

16- ذیل کے لوسائی (loci) کے درمیان گھرب رقبوں کو OX کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کے حجم نکالیے:

(i) $y = 0, 3x - 4y = 0, x^2 + y^2 = 25$ کے درمیان پہلے رچ والا۔

(ii) $x^2 + y^2 - 12a^2 = 0, y^2 = 4ax$

17- ثابت کیجیے کہ $y = \log x$, $y = 0$ اور $x = 2$ کے درمیان گھرب رقبے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $2\pi(1 - \log 2)^2$ ہوگا۔

18- زنجیرہ $y = c \cosh(x/c)$ اس کے برعکس (evolute) اور اس involute کو بیچے جو کہ $x = 0$ پر زنجیرہ سے ملتا ہے۔ اگر ان سے متعلق قوسوں کی لمبائیاں نقطہ $x = 0$ سے ناپنے پر ترتیب دار s, s_1 اور s_2 ہوں تو ثابت کیجیے کہ

$$\frac{2s_1 s_2}{s^3} = \log \left(1 + \frac{s_1^2}{s^2} \right)$$

اشارہ: اس سوال میں involute ذیل ہے۔

$$x = c (\cos t + \log \tan \frac{1}{2}t), y = c$$

19- علیحدہ $1/r = 1 + e \cos \theta$ کا رقبہ نکالیے۔ نصف قطر a کا کسی اندرونی نقطے کی نسبت سے، جس کا مرکز سے فاصلہ c ہو، پیڈل (pedal) کھینچیے اور ثابت کیجیے کہ اس کا رقبہ $\frac{\pi}{2} (2a^2 + c^2)$ ہے۔

(کسی منحنی کا پیڈل (pedal) کسی نقطہ کی نسبت سے، ان نقطوں کا طریق (Locus) ہوتا ہے جن پر اس نقطے سے ڈالے گئے عمود منحنی کے مماسوں سے ملتے ہوں۔)

20- ثابت کیجیے کہ نصف قطرہ والے دائرے کے لیے ایسے نقطے کی نسبت سے جس کی

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

مرکز سے دوری a ہو، بیڈل کے سب سے چھوٹے لوپ کا رقبہ $\frac{1}{2}(2\pi - 3\sqrt{3})a^2$ ہوگا۔
21۔ قطبی مساوات

$$r = a(2 \cos \theta + \cos 3\theta)$$

دائے منحنی کی ترسیم کیجیے
ثابت دیکھیے کہ نصف قطری سمتیہ کے اعلیٰ ترین قیمتیں $3a$ اور $a/3\sqrt{3}$ ہیں
بڑے لوپ کا رقبہ

$$(\frac{5}{2}\pi + \frac{3}{2}\sqrt{3})a^2$$

اور چھوٹے لوپ کا رقبہ

$$(\frac{5}{2}\pi - \frac{3}{2}\sqrt{3})a^2$$

22۔ منحنی $y^4 - 2axy^2 + x^4 = 0$ کی ترسیم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ اس کو x -محور
کے گرد گھمانے پر بنی گردشی سطح کا رقبہ $\pi a^2 / 2\sqrt{2}$ ہوگا اور گردشی ٹھوس کا حجم
 $2\pi a^3 / 3$ ہوگا۔

23۔ منحنی $r = a(\sec \theta - \cos \theta)$ اور خط $r = a \sec \theta$ کے درمیان گھرا ہوا
رقبہ نکالیے۔

24۔ ثابت کیجیے کہ منحنی

$$x = a\sqrt{1-t^2}, y = at\sqrt{1-t^2}$$

کے لوپ کا رقبہ $2a^3/3$ ہوگا، جہاں کہ حذر کی (square root) مثبت علامت ہے۔

25۔ ذیل قطع کا رقبہ نکالیے۔

$$x^2 + y^2 \leq 9, y^2 \leq 8x$$

26۔ نقطہ $(a, 0)$ کو ثابت نقطہ لیتے ہوئے منحنی $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ کی نجی مساوات

حاصل کیجیے۔

27۔ اگر A کسی پیرا بولا کا راس ہو، P اس پر کوئی بھی نقطہ ہو اور P, PN کا معین
ہو تو ثابت کیجیے کہ P کے لا انتہا بڑھنے پر

$$\frac{AN - (AP \text{ قوس})}{PN}$$

مائل بر صفر ہوتا ہے۔
ثابت کیجیے کہ لیماسن $r = a + b \cos \theta$ کا محیط (perimeter) اس طیس
کے محیط کے برابر ہے جس کے نصف محاور (semi-axes) $a+b$ ، $a-b$ ہوں۔
29. PQ مکانی $y^2 = 4ax$ کا ایک متغیر وتر ہے جس کی مستقل لمبائی $2c$
ہے۔ ثابت کیجیے کہ P اور Q پر کھینچے گئے مماسوں کے نقطہ تقاطع کا لوکس

$$x = \frac{y^2}{4a} - \frac{c^2 a}{4a^2 + y^2}$$

ہوگا۔ یہ بھی ثابت کیجیے کہ اس منحنی اور دیے ہوئے پیرابولا کے درمیان کا رقبہ
 $\frac{2}{3}c^2$ ہوگا۔

30. ثابت کیجیے کہ منحنی

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$$

کو y -محور کے گرد گھمانے پر بننے والے ٹھوس کا حجم $\sqrt{\pi}/h$ ہوگا۔

31. ثابت کیجیے کہ $\frac{1}{2} = \frac{1}{\pi}$ کو ثابت نقطہ لینے پر ٹریکس

$$x = a \cos t + a \log \tan \frac{1}{2}t, y = a \sin t,$$

کی نجی مساوات

$$s = a \log \cos \psi.$$

32. ثابت کیجیے کہ منحنی

$$y = a \log \sec (x/a)$$

کی نجی مساوات

$$s = a \log (\tan \psi + \cos \psi)$$

33. (a, 0) کو ثابت نقطہ لے کر مساوی زاویائی کمانی (equiangular spiral)

$$r = ae^{\theta \cot \alpha}$$

گردشی ٹھوس کے حجم اور سطح

کی نجی مساوات نکالیے۔

34۔ کارڈوائڈ $r = a(1 + \cos \theta)$ کی کارٹینیسی پیرامیٹری مساوات حاصل کیجیے جبکہ $\theta = 0$ سے ناپے گئے توس کی لمبائی کو پیرامیٹر لیا جائے۔

35۔ ثابت کیجیے کہ لینسکیٹ $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ کو قطب پر کے ایک مماس کے گرد گھمانے پر بنی گردشی شکل کا سطح کا رقبہ $4\pi a^2$ ہوگا اور گردشی حجم $\pi^2 a^3 / 4$ ہوگا۔

36۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $r \cos \theta = a \cos 2\theta$ کے لوپ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس کا حجم $2\pi a^3 (\log_e 2 - \frac{3}{2})$ ہوگا۔

37۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $x^7 + y^7 = 7ax^3y^4$ کے لوپ کا رقبہ اس منحنی کی لامتناہی شاخ اور اس کے لامتناہی مماس کے درمیان کے رقبے کے برابر ہے۔

38۔ منحنی $x^4 = ay^3 - axy^2$ کی ترسیم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ اس کے لوپ کا رقبہ $a^2/210$ ہے۔

39۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $y^4 - 2c^2y^2 + a^2x^2 = 0$ کے کسی بھی لوپ کا رقبہ

$$4\sqrt{2}c^3/3a \text{ ہے۔}$$

40۔ منحنی

$$x = a(\cos \phi + \log \tan \frac{1}{2}\phi), y = a \sin \phi.$$

کے لیے اگر s سے اس توس کی لمبائی ظاہر کریں جسے y محور سے ناپا گیا ہو تو ثابت کیجیے کہ x کے لامتناہی ہونے پر

$$\lim (s - x) = a(1 - \log 2)$$

41۔ منحنی $x^2y^2 = a^2(x^2 + y^2)$ اور اس کے لامتناہی مماسوں کے درمیان گھرا

ہوا اگل رقبہ نکالیے۔

42۔ منحنی $x^2(x^2 + y^2) = a^2(y^2 - x^2)$ اور اس کے لامتناہی مماسوں کے

درمیان گھرا ہوا اگل رقبہ نکالیے۔

43۔ اگر کسی منحنی کے لیے

$$\begin{aligned} x \sin \theta + y \cos \theta &= f'(\theta) \\ x \cos \theta - y \sin \theta &= f''(\theta) \end{aligned}$$

تو ثنابت کیجیے کہ

$$s = f(\theta) + f''(\theta) + c.$$

جوابات

2. $a^3 \log(250/e^3).$

5. $87/8, (255 + 8 \log 2)/4.$

7. $67a/10.$

8. $p(e^{k\pi/p} + 1)/(p^2 + k^2)(e^{k\pi/p} - 1).$

9. $518a^3/525; 259\pi^2 a^3/450$

14. $\pi \left[\frac{b^2 a}{2} + \frac{a^3}{3} + \frac{b^4}{4\sqrt{(a^2 - b^2)}} \log \frac{2a^2 - b^2 + 2a\sqrt{(a^2 - b^2)}}{b^2} \right];$
 $\pi \left[a^3 + \frac{b^4}{\sqrt{(a^2 - b^2)}} \log \frac{a^2 + \sqrt{(a^2 - b^2)}}{b^2} \right].$

15. $(2b\pi/3a) [6a^2b - b^3 - 3ab\sqrt{(a^2 - b^2)} - 3a^3 \sin^{-1}(b/a)].$

16. $50\pi/3, \frac{5}{2} (6\sqrt{3} - 5) \pi a^3,$ 23. $3a^2\pi/4.$

25. $2 \left(\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{9\pi}{4} - \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{1}{3} \right).$

26. $s = \frac{a}{2} - \frac{a}{2} \cdot \frac{\cos \psi - \sin \psi}{(\cos \psi + \sin \psi)^2} + \frac{\sqrt{2}a}{4} \log(1 + \sqrt{2})$
 $- \frac{\sqrt{2}a}{4} \sinh^{-1} \frac{\cos \psi - \sin \psi}{\cos \psi + \sin \psi}.$

33. $s = a \sec a \left[e^{\psi \cot a} - 1 \right]$

34. $x = 2a \left[1 - \frac{s^2}{8a^2} \right] \left[1 - \frac{s^2}{16a^2} \right], y = s \left[1 - \frac{s^2}{16a^2} \right]^{3/2}$

41. $4a^3.$

42. $a^3 (\pi + 2).$

10

مرکز ثقل؛ جمود کا معیار اثر

[Moment of Inertia] [Centre of Gravity]

10-1 تمہید (Introduction)؛ 7، 8 اور 9 میں ہم نے جیوٹری میں تکمیلی احصاء کے استعمال پڑھے جو کہ تین قسم کی چیزوں، لمبائیاں، رتبے اور حجم نکالنے سے متعلق تھے۔ اس باب میں تکمیلی احصاء کا استعمال میکینکی حساب (Mechanics) میں کریں گے اور اس سلسلے میں مرکز ثقل اور جمود کے معیار اثر (Moment of Inertia) پر غور کریں گے۔

کسی کڑے مادے کے نظام (rigid material system) کے مرکز ثقل کی اہمیت اس اعتبار سے خاصی ہے کہ اکثر statics اور Dynamics میں بھی کسی دے ہوئے کڑے مادے کے نظام کے بدلے ہم ایسا ذرہ تصور کرتے ہیں جو کہ اُس نظام کے مرکز ثقل پر مقیم ہو اور جس کا وزن اُس دیے ہوئے نظام کے وزن کے برابر ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کتاب میں ہمارا سابقہ صرف معمولی تکملوں سے رہا ہے، دوہرے (double) یا تہرے (triple) تکملوں سے نہیں، اس لیے یہاں یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی بھی اختیاری نظام (arbitrary system) کے مرکز ثقل حاصل کرنے کے فارمولے نکال سکیں۔ لہذا، ہم صرف کچھ خاص قسم کے نظاموں پر ہی

غور کریں گے۔

کڑے اجسام (rigid bodies) کی (Dynamics) میں کسی دیے ہوئے خط کے گرد، کڑے مادے کے نظام کے جہود کے معیار اثر کی بھی خاصی اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم صرف کچھ خاص قسم کے نظاموں پر ہی غور کریں گے۔

10.2۔ مرکز ثقل: کسی دیے ہوئے کڑے مادی نظام میں مادے کی تقسیم جدا

جدا (Discrete) یا مسلسل (Continuous) طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ مادے کی تقسیم جدا جدا ہو تو Statics میں ثابت کیا گیا ہے کہ اگر کسی ہموار سطح پر n ذرے ہوں جن کے وزن

$$w_1, w_2, \dots, w_r, \dots, w_n$$

ہوں اور ان کے مقامات کے مختصات

$$(x_1, y_1), \dots, (x_r, y_r), \dots, (x_n, y_n)$$

ہوں تو اس نظام کا مرکز ثقل $(\bar{x}, \bar{y})$ ذیل فارمولے سے حاصل ہوتا ہے:۔

$$(1) \dots \dots \dots \bar{x} = \frac{\sum_{r=1}^n w_r x_r}{\sum_{r=1}^n w_r}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{r=1}^n w_r y_r}{\sum_{r=1}^n w_r}$$

اگر ہر نقطہ پر کشش یکساں ہو اور اسے g سے ظاہر کریں جس سے کہ

$$w_r = m_r g$$

ہو، جہاں m_r اس ذرے کی مقدار ہے جس کا وزن w_r ہے، تو ہم پاتے ہیں


$$(2) \dots \dots \dots \bar{x} = \frac{\sum_{r=1}^n m_r x_r}{\sum_{r=1}^n m_r}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{r=1}^n m_r y_r}{\sum_{r=1}^n m_r}$$

رشتہ (2) کی وجہ سے مرکز کشش کو اکثر مرکز مقدار یا مرکز جہود (Centre of Inertia) بھی کہتے ہیں۔

اب ہم جدا جدا تقسیم کے لیے اوپر لکھے فارمولے کی توسیع کر کے مسلسل تقسیم ہونے پر مرکز ثقل کا فارمولا نکالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ مسلسل تقسیم والی صورت میں مرکز ثقل کا فارمولا جدا جدا تقسیم والے فارمولے سے ایک انتہائی عمل (limiting process) سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمل یہ ہے کہ مسلسل تقسیم کو پہلے مناسب طریقے سے چنے گئے ذروں کے نظام سے بدلا جائے گا اور اس کے مرکز ثقل سے انتہائی عمل کے ذریعے مسلسل تقسیم کے لیے مرکز ثقل معلوم کیا جائے گا۔

10.3 - مادہ کی مسلسل تقسیم کے لیے مرکز ثقل نکالنا

10.31 - ایک ہموار یکساں منحنی (plane uniform curve) کا مرکز کشش : منحنی $y = f(x)$ کا وہ حصہ لیجیے جو کہ فاصلہ a اور b والے نقطوں A اور B کے درمیان ہے دراصل ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ قوس ایک پتے کڑے تار کی شکل میں ہے۔



OX پر AL اور RM عمود ڈالیے اور وقفہ $[a, b]$ کو لمبائی h کے n برابر کے ٹکڑوں میں بانٹیں اس طرح ہم کو فاصلوں (abscissae)

$a, a+h, \dots, a+(r-1)h, a+rh, \dots, a+nh$ والے نقطے ملتے ہیں جن کو ہم دوبارہ

$x_0, x_1, \dots, x_{r-1}, x_r, \dots, x_n$

لکھ سکتے ہیں۔ ان نقطوں پر عرض کھینچیے جو کہ قوس AB سے نقطوں

$$P_0 = A, P_1, P_2, \dots, P_{r-1}, P_r, \dots, P_n = B$$

پر ملیں۔ ہم لکھتے ہیں

$$y_r = f(x_r) = f(a + rh)$$

مان لیجیے (قوس $s_r = AP_r$)

اب ہم قوس $P_{r-1} P_r$ کی جگہ اُس کے شروع کے نقطے P_r پر اس قوس کے برابر کا وزن $\rho(s_{r+1} - s_r)$ تصور کرتے ہیں، جہاں کہ ρ کثافت (density) یعنی مادہ فی اکائی لمبائی ہے۔

اس طرح ہمیں n وزنوں کا نظام ملتا ہے جن کی مقداریں (masses)

$$\rho(s_1 - s_0), \dots, \rho(s_{r+1} - s_r), \dots, \rho(s_n - s_{n-1})$$

ہیں اور یہ اُن نقطوں پر مقیم ہیں جن کے مختصات

$$(x_0, y_0), \dots, (x_r, y_r), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1})$$

ہیں، اس نظام کا مرکز ثقل

$$\left[\frac{\sum \rho(s_{r+1} - s_r) x_r}{\sum \rho(s_{r+1} - s_r)}, \frac{\sum \rho(s_{r+1} - s_r) y_r}{\sum \rho(s_{r+1} - s_r)} \right]$$

یعنی

$$\left[\frac{\sum (s_{r+1} - s_r) x_r}{\sum (s_{r+1} - s_r)}, \frac{\sum (s_{r+1} - s_r) y_r}{\sum (s_{r+1} - s_r)} \right]$$

ہوگا جبکہ $u = r$ سے $n = 1$ تک ہے۔

ان وزنوں فارمولوں میں نسب نما 1 ہے، جو کہ پورے قوس کی لمبائی ہے۔ ہم لکھتے ہیں

$$(s_{r+1} - s_r) x_r - x_r \left(\frac{s_{r+1} - s_r}{x_{r+1} - x_r} \right) (x_{r+1} - x_r) = x_r \frac{s_{r+1} - s_r}{x_{r+1} - x_r} \cdot h.$$

انتہا لینے پر ہمیں ملے گا

$$\lim_{x_{r+1} \rightarrow x_r} \left(\frac{s_{r+1} - s_r}{x_{r+1} - x_r} \right) = \left(\frac{ds}{dx} \right)_x =$$

اس لیے تخمیناً ہم لکھتے ہیں

$$(s_{r+1} - s_r) x_r = x_r \left(\frac{ds}{dx} \right)_{x=x_r} \cdot h$$

جس سے کہ مرکز ثقل

$$\left[\frac{h \sum_{r=0}^{n-1} x_r \left(\frac{ds}{dx} \right)_{x=x_r}}{1}, \frac{h \sum_{r=0}^{n-1} y_r \left(\frac{ds}{dy} \right)_{y=y_r}}{1} \right]$$

ملتا ہے۔

مکملی احصاء کے بنیادی مسئلے (fundamental theorem) سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائیں لینے پر یہ ذیل کی طرف مائل ہوگا۔

$$\frac{\int_a^b x \frac{ds}{dx} dx}{1}, \frac{\int_a^b y \frac{ds}{dy} dx}{1}$$

جو کہ دیے ہوئے منحنی کے مرکز ثقل کے مختصات ہیں۔

نوٹ 1: ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ادھر کے عمل میں P_r, P_{r+1} کی مقدار نقطہ P_r پر لینے کے بجائے P_{r+1} پر لیتے تب بھی انتہائیں لینے پر وہی نتیجہ ملتا جو اس وقت ملا

نوٹ 2: اگر ہم لکھیں

$$x \frac{ds}{dx} = \phi(x), \quad y \frac{ds}{dy} = \psi(x)$$


تو ہم دیکھتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} h \sum_{r=0}^{n-1} x_r \left(\frac{ds}{dx} \right)_r &= h \sum_{r=0}^{n-1} \phi(a+rh) \\ h \sum_{r=0}^{n-1} y_r \left(\frac{ds}{dy} \right)_r &= h \sum_{r=0}^{n-1} \psi(a+rh) \end{aligned}$$

لہذا ہمیں جو فارمولے ملتے ہیں وہ بالکل اُسی شکل کے ہیں جس طرح کے تکلی احصاء کا بنیادی مسئلہ ثابت کرتے وقت ملتے تھے۔

10-32- یکساں ہموار رقبہ (uniform plane area) کا مرکز ثقل نکالنا

اُس رقبہ پر غور کیجیے جو کہ منحنی $y = f(x)$ ، محور اور دو عرضوں $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ دراصل ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ رقبہ مادہ کی ایک ہموار پتلی چادر کی شکل میں ہے۔



LM کو لمبائی h والے n برابر کے ٹکڑوں میں بانٹ بیجیے۔ ان کے فاصلے

$$a, a+h, \dots, a+rh, \dots, a+nh = b$$

ہیں جنہیں دوبارہ اس طرح لکھ سکتے ہیں:-

$$x_0, x_1, \dots, x_r, \dots, x_n$$

ان پر عرض کھینچے جو کہ منحنی کو نقطوں

$$A = P_0, P_1, \dots, P_r, \dots, P_n = B$$

پر کاٹیں۔ ہم لکھتے ہیں:-

$$y_r = f(x_r) = f(a+rh)$$

اور P_r, P_{r+1} کے نیچے والے رقبے کے بجائے مستطیل (rectangle) P_r, Q_{r+1} لیتے ہیں جس کا رقبہ $h y_r$ اور مرکز ثقل

$$\left[\frac{1}{2} (x_r + x_{r+1}), \frac{1}{2} y_r \right]$$

ہے۔ اب ہم اس مستطیل کے بجائے ایسا ذرہ لیتے ہیں جس کی مقدار (mass) $\rho h y_r$ ہو اور جو نقطہ $\left[\frac{1}{2} (x_r + x_{r+1}), \frac{1}{2} y_r \right]$ پر مقیم ہو۔ اس طرح ہمیں n ذرے حاصل ہوتے ہیں جن کا مرکز ثقل

$$\left[\frac{\sum \rho h y_r \cdot \frac{1}{2} (x_r + x_{r+1})}{\sum \rho h y_r}, \frac{\sum \rho h y_r \cdot \frac{1}{2} y_r}{\sum \rho h y_r} \right]$$

مرکز ثقل: جہود کا معیار اتر

ہیں۔ اب $h \leftarrow 0$, $n \leftarrow \infty$ لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\lim \Sigma hy_r = \int_a^b y \, d.$$

$$\lim \Sigma hy_r \cdot \frac{1}{2}(x_r + x_{r+1}) = \int_a^b yx \, dx$$

$$\lim \Sigma \frac{1}{2}hy_r^2 = \frac{1}{2} \int_a^b y^2 \, dx$$

اس لیے انتہائیں لینے پر وہ نقطہ ملتا ہے جس کے مختصات

$$\left(\frac{\int_a^b xy \, dx}{\int_a^b y \, dx}, \frac{\frac{1}{2} \int_a^b y^2 \, dx}{\int_a^b y \, dx} \right)$$

ہیں اور اسے ہم دیے ہوئے چادری رقبے کا مرکز ثقل لیتے ہیں۔
نوٹ 1: اسی طرح یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ منحنی $x = f(y)$ ، محور اور دو فصولوں $y = c$ اور $y = d$ کے درمیان گھرے ہوئے یکساں رقبے کا مرکز ثقل

$$\left(\frac{\frac{1}{2} \int_c^d x^2 \, dy}{\int_c^d x \, dy}, \frac{\int_c^d yx \, dy}{\int_c^d x \, dy} \right)$$


ہوگا۔

نوٹ 2: قطع کے رقبے کا مرکز کشش بمکانا

منحنی $r = f(\theta)$ اور دو نصف قطری سمتوں (radii

vectors) $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ کے درمیان گھرے

رقبے پر غور کیجیے۔



ہم زاویہ AOB کو n برابر والے حصوں میں بانٹتے ہیں اور ان لیتے ہیں کہ ہر حصہ h کے برابر ہے۔ مان لیجیے

0 سے گزرنے والے دو خطوط OP_r اور OP_{r+1} ہیں جو کہ OX سے زاویے $\alpha + hr$ اور $\alpha + h(r+1)$ بناتے ہیں۔ ہم پاتے ہیں

$$OP_r = f(\alpha + hr)$$

اب توس P, P_{r+1} سے گھرے رقبے کے بجائے مثلث $OP_r P_{r+1}$ کا رقبہ لے لیجیے۔ اس مثلث کا مرکز ثقل 0 سے گزرنے والے وسطانی خط (median) پر ایک نقطہ ہوگا ہم اس نقطے کے بجائے OP_r پر 0 سے $\frac{1}{3} OP_r$ فاصلے والا نقطہ لے لیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اس نقطہ پر ایسا ذرہ رکھا ہوا ہے جس کی مقدار (mass) کے برابر ہے۔ لہذا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک مقدار

$$\frac{1}{3} OP_r OP_{r+1} \sin h$$

نقطہ

$$\left[\frac{2}{3} OP_r \cos(\alpha + hr), \frac{2}{3} f(\alpha + hr) \sin(\alpha + hr) \right]$$

پر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اس نقطہ پر جس کے مختصات

$$\left[\frac{2}{3} f(\alpha + hr) \cos(\alpha + hr), \frac{2}{3} f(\alpha + hr) \sin(\alpha + hr) \right]$$

ہیں۔ اس لیے n ذروں کے اس نظام کے مرکز ثقل کا فاصلہ

$$\frac{\sum \rho \frac{1}{3} f(\alpha + hr) f(\alpha + h(r+1)) \sin h \cdot \frac{2}{3} f(\alpha + hr) \cos(\alpha + hr)}{\sum \rho \frac{1}{3} f(\alpha + hr) f(\alpha + h(r+1)) \sin h}$$

اس کا تخمینہ

$$\frac{\frac{2}{3} \sum f^3(\alpha + hr) \cos(\alpha + hr)}{\sum f^2(\alpha + hr) h}$$

ہوتا ہے، جو کہ انتہا لینے پر

$$\frac{\frac{2}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3 \cos \theta \, d\theta}{\int_{\alpha}^{\beta} r^2 \, d\theta}$$

یعنی

$$\frac{2}{3} \int_{\alpha}^{\beta} f^3(\theta) \cos \theta \, d\theta \quad \int_{\alpha}^{\beta} f^2(\theta) \, d\theta$$

ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ مرکز ثقل کا عرض

$$\frac{2}{3} \int_a^b r^3 \sin \theta \, d\theta \quad / \quad \int_a^b r^2 \, d\theta$$

آتا ہے۔

10-33۔ گردشی حجم کا مرکز ثقل نکالنا

اب منحنی $y = f(x)$ کا وہ حصہ جو فاصلوں a اور b والے نقطوں کے درمیان ہے اسے x -محور کے گرد گھمانے پر بنے گردشی ٹھوس کے حجم کا مرکز ثقل حاصل کرنا ہے۔ شکل کی وجہ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ مرکز ثقل x -محور پر واقع ہوگا۔ ہم LM کو لمبائی h والے n حصوں میں بانٹتے ہیں اور اس طرح ہمیں وہ نقطے ملتے جن کے فاصلے

$$a, a+h, \dots, a+rh, \dots, a+nh = b$$

ہیں، جن کو دوبارہ

$$x_0, x_1, \dots, x_r, \dots, x_n$$

لکھ سکتے ہیں۔ ان پلیمے ان نقطوں سے گزرنے والے معین منحنی کو نقطوں


$$P_0 = A, P_1, \dots, P_r, \dots, P_n = B.$$

پر کاٹتے ہیں۔ P_r کا عرض

$$= f(a+rh) = y_r \quad (\text{کہہ لیجیے})$$

اب حجم کا وہ حصہ جو کہ قوس P_r, P_{r+1} کو x -محور کے گرد گھمانے پر حاصل ہوتا ہے اس کے بجائے مستطیل P_r, Q_{r+1} کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے حجم کو لے لیجیے

یہ بعد والا حجم



تصویر 54

pnahy, 2

ہے۔ اس کا مرکز ثقل $Q_r Q_{r+1}$ کے وسطانی نقطہ پر ہے جس کا فاصلہ $\frac{1}{2}(x_r + x_{r+1})$ ہے۔ اب پھر اس حجم کے بجائے اس کے برابر مقدار (mass) والا کوئی ذرہ تصور کیجیے جو کہ $Q_r Q_{r+1}$ کے وسطانی نقطہ پر رکھا ہو۔ n ذروں کے اس نظام کے مرکز ثقل کا فاصلہ

$$\frac{\sum_{r=0}^{n-1} \rho \pi h y_r^2 \cdot \frac{1}{2}(x_r + x_{r+1})}{\sum_{r=1}^{n-1} \rho \pi h y_r^2}$$

اب $0 \sim n$ اور $\infty \leftarrow n$ ہونے پر انتہا لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\int_a^b xy^2 dx \quad / \quad \int_a^b y^2 dx$$

جو کہ گردشِ حجم کے مرکز کشش کا درکار فاصلہ ہے۔

10-34۔ گردشِ سطح کا مرکز ثقل (تصویر 54 دیکھیے)

اب ہم قوس AB کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنی گردشِ سطح کا مرکز ثقل نکالیں گے۔ قوس $P_r P_{r+1}$ سے بنی ہوئی گردشِ سطح کے بجائے ہم وتر $P_r P_{r+1}$ سے بنی گردشِ سطح لیتے ہیں جس کا رقبہ § 9-5 کے مطابق

$$\pi(y_r + y_{r+1}) P_r P_{r+1}$$

ہے۔ اس کا مرکز ثقل $Q_r Q_{r+1}$ کا وسطانی نقطہ ہے۔

اب ہم اس سطح کے بجائے ایک ایسا ذرہ تصور کرتے ہیں جو $Q_r Q_{r+1}$ کے وسطانی نقطہ پر رکھا ہو اور جس کی مقدار (mass) اس طرح کی مقدار کے برابر ہو۔ ذروں کے اس نظام کا مرکز ثقل x -محور پر واقع ایسا نقطہ ہے جس کا فاصلہ

$$\frac{\sum \rho \pi (y_r + y_{r+1}) P_r P_{r+1} \cdot \frac{1}{2}(x_r + x_{r+1})}{\sum \rho \pi (y_r + y_{r+1}) P_r P_{r+1}}$$

مرکز ثقل: جہود کا معیار اثر

ہے، جس کا تخمینہ

$$\frac{\sum_{r=0}^{n-1} h(y_r + y_{r+1}) \left(\frac{ds}{dx} \right)_{x=x_r} \frac{1}{2}(x_r + x_{r+1})}{\sum_{r=0}^{n-1} h(y_r + y_{r+1}) \left(\frac{ds}{dx} \right)_{x=x_r}}$$

ہے جو کہ انتہائی پر

$$\int_a^b xy \frac{ds}{dx} dx \bigg/ \int_a^b y \frac{ds}{dx} dx$$

آتا ہے۔

مثالیں

1۔ منحنی

$$x = a \sin^3 \theta, y = a \cos^3 \theta$$

کے پہلے ربع والے قوس کا مرکز ثقل نکالے۔

ہم پاتے ہیں (10:31 §)


$$\bar{x} = \frac{\int_0^a x \frac{ds}{dx} dx}{\int_0^a \frac{ds}{dx} dx}; \bar{y} = \frac{\int_0^a y \frac{ds}{dx} dx}{\int_0^a \frac{ds}{dx} dx}$$

ساتھ ہی

$$\begin{aligned} \int_0^a x \frac{ds}{dx} dx &= \int_0^{\pi/2} x \frac{ds}{dx} \frac{dx}{d\theta} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} x \frac{ds}{d\theta} d\theta = \frac{3a^3}{5} \end{aligned}$$

$$\int_0^a \frac{ds}{dx} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{ds}{dx} \frac{dx}{d\theta} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{ds}{d\theta} d\theta = \frac{3a}{2}$$

$$\therefore \bar{x} = \frac{2a}{5}$$




اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ

$$\bar{y} = \frac{2a}{5}$$

2۔ اس یکساں مادی چادر (lamina) کا مرکز ثقل نکالیں جو x -محور، y -محور اور علیحدہ 1 کے پہلے ربع والے حصوں کے درمیان گھری ہو۔

ہم پاتے ہیں (§ 10.32)



$$\bar{x} = \frac{\int_0^a xy dx}{\int_0^a y dx}$$


$$= \frac{\int_0^a x \cdot \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx}{\int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx} = \frac{4a}{3\pi}$$

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^a y^2 dx}{\int_0^a y dx} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^a \frac{b^2}{a^2} (a^2 - x^2) dx}{\int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx} = \frac{4b}{3\pi}$$

3۔ نصف قطر a والے یکساں ٹھوس نصف کرہ (hemisphere) کا مرکز ثقل نکالیں۔

نصف کرہ کو ہم وہ گردشی ٹھوس سمجھ سکتے ہیں جو کہ دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے پہلے ربع والے قوس کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے۔

ہم پاتے ہیں



$$\bar{x} = \frac{\int_0^a xy^2 dx}{\int_0^a y^2 dx} = \frac{\int_0^a x(a^2 - x^2) dx}{\int_0^a (a^2 - x^2) dx} = \frac{3a}{8}$$

مرکز ثقل، جمود کا معیار اثر

10-4- جمود کا معیار اثر (Moment of Inertia)

توزیع کے مطابق کسی بھی دیے ہوئے خط کی نسبت سے مقدار m والے ذرے کا جمود کا معیار اثر mr^2 ہوتا ہے، جہاں r خط سے ذرہ کا فاصلہ ہو۔ متناہی تعداد میں لیے گئے، مقداروں

$$m_1, \dots, m_i, \dots, m_n$$

والے ذروں کا دیے ہوئے خط کی نسبت سے جمود کا معیار اثر

$$\sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

ہوتا ہے، جہاں کہ

$$r_1, \dots, r_i, \dots, r_n$$


دیے ہوئے خط سے ذروں کے فاصلے ہوں۔

ماڈل کی مسلسل تقسیم (continuous distribution) ہونے پر جمود کا معیار اثر ایک انتہائی عمل سے نکالتے ہیں۔ وہ عمل ذیل کی مثالوں سے سمجھایا جائے گا۔

مثالیں

1- لمبائی $2a$ والے پتلی یکساں چھڑی (rod) کا بہ لحاظ اس خط کے جمود کا

معیار اثر نکالیں جو چھڑی کے ایک کنارے سے گزرے اور اُس پر عمود ہو۔



تصویر 58

مان لیجیے چھڑی AB ہے۔ A کو مبدا اور AB کو x-محور مان لیجیے۔ ہم کو بہ لحاظ A سے گزرنے والے خط کے جمود کا معیار اثر چاہیے، جہاں کہ AY خط AB پر عمود ہے۔

AB کو ہم لمبائی h والے n برابر ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں اور اس طرح سے ملے

نقاط تقسیم

$$A = P_0, P_1, \dots, P_r, \dots, P_n = B$$

ہیں۔ اس

$$AP_r = \frac{2a}{n} r = hr.$$

اب چٹری کے ٹکڑے P_r, P_{r+1} کے بجائے ہم ایک ایسا ذرہ تصور کرتے ہیں جس کی مقدار اس ٹکڑے کی مقدار کے برابر ہے۔ اگر ρ چٹری کی کثافت (density) ہو تو اس ذرہ کی مقدار

ہوگی اور اس لیے AY کی نسبت سے اس کے جہود کا معیار اثر $(hr)^2 \rho h$ ہوگا۔ اس طرح سے ان ذروں کے نظام کے جہود کا معیار اثر

$$\sum_{r=0}^{n-1} (hr)^2 \rho h = \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n-1} \left(\frac{r}{n} \right)^2$$

ہوگا۔ جب $n \rightarrow \infty$, $h \rightarrow 0$, اس طرح کہ $nh = 2a$ تو اس کی انتہا

$$\int_0^{2a} \rho x^2 dx = \frac{8a^3}{3} \rho = M \frac{4a^2}{3}$$


ہوگی، جہاں M کل چٹری کی مقدار ہے۔

منشوق: ثابت کیجئے کہ لمبائی $2a$ اور مقدار M کی کسی پتلی یکساں کا اس خط کے لحاظ سے جہود کا معیار اثر

$$M \frac{4a^2}{3}$$

ہوگا جو اس کے وسطانی نقطہ سے گزرے اور اس پر عمود ہو۔

2۔ نصف قطر a کی کسی پتلی یکساں دائرہ نما ٹکیہ (disc) کا اُاس کے کسی قطر (diameter) کے لحاظ سے جمود کا معیار اثر نکالے



دیے ہوئے قطر کو x محور اور مرکز کو مبدأ لے لیجیے۔ قطر AB کو لمبائی h والے n برابر کے حصوں میں بانٹ لیجیے اور ان حصوں کے کناروں پر عمود کھینچیے۔ ٹکیہ (disc) کے اس حصہ کو Q_r اور Q_{r+1} سے گزرنے والے عضوں کے درمیان ہے، لمبائی $2y_r$ کی ایسی چھڑی سے بدل دیجیے جس کا یہ لحاظ OX جمود کا معیار اثر

$$2\rho y_r h \cdot \frac{y_r^2}{3}$$

ہو۔ اب یہ لحاظ OX ان چھڑوں کے نظام کے جمود کا معیار اثر

$$\sum_{r=0}^{n-1} 2\rho y_r h \cdot \frac{y_r^2}{3}$$

یہاں $y_r = f(-a + hr)$ جہاں کہ

$$f(x) = \sqrt{(a^2 - x^2)}$$

اگر $n \rightarrow \infty$ ، $h \rightarrow 0$ ، تو انتہا لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\int_{-a}^{+a} \frac{2\rho}{3} (a^2 - x^2)^{3/2} dx = \frac{\rho\pi a^4}{4} = \frac{Ma^2}{4}$$

جہاں M نمائیکہ (disc) کی مقدار (mass) ہے۔
 مشق: ثابت کیجیے کہ مقدار M اور نصف قطر a والی یکساں دائرہ نمائیکہ (disc) کا بہ لحاظ اُس خط کے جو اس کی سطح پر عمود ہو اور اُس کے مرکز سے گزرتا ہو۔ جمود کا معیار اثر $Ma^2/2$ ہے۔

3. نصف قطر a والے یکساں ٹھوس کرہ (sphere) کا بہ لحاظ اُس کے کسی قطر کے جمود کا معیار اثر نکالے

قطر کو n برابر حصوں میں بانٹ کر اُس کے کناروں سے محور پر عمودی ہموار (perpendicular planes) کھینچیے۔ دو ساتھ ساتھ کی (consecutive) عمودی ہمواروں کے درمیان گھرے ہوئے ہر کرہ کے ٹکڑے کے بجائے ایک پتلی دائرہ نمائیکہ (disc) لینے برہم پاتے ہیں کہ درکار جمود کا معیار اثر

$$= \int_{-a}^{+a} \pi \rho (a^2 - x^2) \frac{1}{2} (a^2 - x^2) dx$$

$$= \frac{8 \rho \pi a^6}{15} = \frac{2a^2}{5} \cdot \frac{4a^2}{3} \rho = \frac{2a^2}{5} M$$

جہاں M کرے کی مقدار ہے۔

باب 10 پر مشقیں

1. نصف قطر a والے کسی یکساں تار کا مرکز ثقل نکالے جو کہ ذیل شکل میں ہو۔
 (i) نصف دائرہ (ii) دائرہ کا ربع
2. نصف قطر a والے کسی ایسے دائری قوس کا مرکز ثقل نکالے جو کہ مرکز پر 2θ کا زاویہ بناتا ہے۔
3. ثابت کیجیے کہ سائیکلاڈ $x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ کے پہلے ربع والے قوس کا مرکز ثقل

$$\left[\left(\pi - \frac{4}{3} \right) a, \frac{2}{3} a \right] \text{ ہوگا۔}$$

4. مکانی $y = 4ax$ کے اُس قوس کا مرکز ثقل نکالے جو کہ اُس کے راس اور وتر میں

○ کے ایک سرے $(a, 2a)$ کے درمیان ہو۔

5. ثابت کیجئے کہ زنجیر $y = c \cosh(x/c)$ کے راس $(0, c)$ اور نقطہ (x, y) کے

درمیان والے قوس کا مرکز ثقل

$$\left[x - \frac{c(y-c)}{s}, \frac{y}{2} + \frac{cx}{2s} \right]$$

ہوگا، جہاں s قوس کی لمبائی ہے۔

6. x -محور اور علیحدہ $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ کے اُس حصے سے گھری ہوئی یکساں چادر

کا مرکز ثقل معلوم کیجئے جس کے لیے y مثبت ہو۔

7. ثابت کیجئے کہ مکانی $x^2 = 4ay$ ، محور اور میں $x = b$ کے درمیان گھرے رتبے

کا مرکز ثقل $(3b/4, 3/40 \cdot b^2/a)$ ہے۔

8. ثابت کیجئے کہ کارڈوائڈ $r = a(1 + \cos \theta)$ سے گھرے رتبے کا مرکز ثقل ابتدائی خط

پر ہے اور اُس کا قطب (pole) سے فاصلہ $5a/6$ ہے۔

9. منحنی $y = \sin x$ کے ایک محراب (arch) کے مرکز ثقل کے مختصات نکالے۔

10. اُس رتبے کا مرکز ثقل نکالے جو کہ مکافوں $y = ax$ اور $x^2 = by$ کے درمیان

گھرا ہو۔

11. محور y ، محور اور منحنی $y = 2 + x - x^2$ کے درمیان گھرے پہلے رتبے والے

رتبے کا مرکز ثقل نکالے۔

12. ایک چوٹی پتلی یکساں کثافت (uniform density) والی چادروں جو منحنیوں

$y = x^2$ اور خط $x = 2$ سے گھری ہوئی ہے، اُس کا مرکز نکالے۔

13. ثابت کیجئے کہ منحنی $y^2 = x^2(a-x)$ کے لوپ کے رتبے کا مرکز ثقل

ہوگا۔ $\frac{4}{3} (3\pi - 8)/(4 - \pi)$

14۔ ثابت کیجیے کہ منحنی $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ کے ایک لوپ سے گھرے رقبے کے مرکز ثقل کا فاصلہ $\pi a\sqrt{2}/8$ ہوگا۔

15۔ منحنی $y = \sin x$, $y = 0$ اور $x = \pi/4$ سے گھرے رقبے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس جسم کا مرکز ثقل نکالیے۔

16۔ عرض $x = b$ سے کٹے ہوئے مکافی $y^2 = 4ax$ کے حصے کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس جسم کا مرکز ثقل نکالیے۔

17۔ $r = a(1 + \cos \theta)$ کو ابتدائی خط کے گرد گھمانے پر بنی (i) گردشی سطح کا (ii) گردشی جسم کا مرکز ثقل نکالیے۔

18۔ ذیل کا مرکز ثقل نکالیے:-

(i) کسی نصف کرہ کی سطح کا۔

(ii) کسی قائم دائری مخروط کی منحنیاتی سطح کا (curved surface)

19۔ علیس $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ کا ایک ربع والا حصہ محور اکبر (major axis) کے گرد گھمانے پر بنے ٹھوس جسم کا مرکز ثقل نکالیے۔

20۔ ایک یکساں کثافت (uniform density) کی چادر جو x -محور منحنی $y = \cos x$ کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ اُس کا بہ لحاظ y -محور کے جمود کا معیار اثر نکالیے۔

21۔ علیس $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ کو x -محور کے گرد گھمانے پر بنے جسم کا بہ لحاظ x -محور کے جمود کا معیار اثر نکالیے۔

22۔ نصف قطر r اور اونچائی h والے قائم ٹھوس اسطوانہ (right solid cylinder) کا بہ لحاظ اُس کے محور جمود کا معیار اثر نکالیے۔

23۔ نصف قطر a والے کھوکھلے کرہ کا 'بہ لحاظ اُس کے کسی قطر کے جمود کا معیار اثر نکالیے۔

مرکز ثقل: جہود کا معیار اثر

جوابات

$$(2\sqrt{2} a/\pi, 2\sqrt{2} a/\pi). \quad (II) \quad (\bar{x} = 0, \bar{y} = 2a/\pi) \quad (I) - 1$$

2- تنصیفی نصف قطر (bisecting radius) پر مرکز سے $a \sin \theta/\theta$ کی دوری پر۔

$$\left[\frac{a}{4} \cdot \frac{3\sqrt{2} - \log(1+\sqrt{2})}{\sqrt{2} + \log(1+\sqrt{2})}, \frac{4a}{3} \cdot \frac{\sqrt{8}-1}{\sqrt{2} + \log(1+\sqrt{2})} \right] - 4$$

$$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{8} \right) - 9 \quad (0, 4b/3\pi) - 6$$

$$\left(\frac{4}{5}, \frac{24}{25} \right) - 11 \quad \left(\frac{9}{20} a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{3}{2}}, \frac{9}{20} a^{\frac{3}{2}} b^{\frac{1}{2}} \right) - 10$$

$$\bar{x} = (\pi^2 - 4\pi + 8)/8(\pi - 2) - 15 \quad \left(\frac{3}{2}, 0 \right) - 12$$

$$\frac{4}{5} a \quad (II) \quad \bar{x} = \frac{50}{63} a \quad (I) - 17 \quad \bar{x} = \frac{2}{3} b - 16$$

18- (i) تنصیفی نصف قطر کے وسطی نقطہ پر
(ii) محور کو 2:1 کی نسبت میں تقسیم کرنے والے نقطہ پر

$$\rho(\pi^2 - 8)/2 - 20 \quad \bar{x} = 3a/8 - 19$$

21- $2b^2 M/5$ جہاں M ٹھوس کی مقدار ہے۔

22- $\frac{1}{2} M r^2$ جہاں کہ M اور r ترتیب وار قاعدہ (base) کی مقدار اور نصف قطر ہیں۔

23- $\frac{1}{2} M a^2$ جہاں کہ M اور a ترتیب وار مقدار اور نصف قطر ہیں۔



پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

(Differential Equations)

11.1۔ تفرقی مساوات وہ مساوات ہے جس میں تابع اور غیر تابع متغیر اور تابع متغیر کے تفرقی سر ہوتے ہیں۔
تفرقی مساواتوں کی کچھ مثالیں یہ ہیں :-

$$(1) (2x+3y) \frac{dy}{dx} + (7x^3+8y) = 0. \quad (2) \frac{dy}{dx} + y \cos x = \sin x.$$

$$(3) \frac{d^2y}{dx^2} + a^2x = 0. \quad (4) \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{3/2} = \frac{d^2y}{dx^2}.$$

$$(5) x^3 \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^2 + y \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y^4 = 0. \quad (6) x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = nz$$

$$(7) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

کسی تفرقی مساوات میں اگر ایک ہی غیر تابع متغیر (independent variable) ہو تو وہ معمولی تفرقی مساوات کہلاتی ہے اور اگر دو یا زیادہ غیر تابع متغیر ہوں تو اسے جزوی (partial) تفرقی مساوات کہتے ہیں۔
اس طرح، تفرقی مساواتیں (1) اور (5) معمولی ہیں لیکن (6) اور (7) جزوی ہیں۔

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

اب ہم صرت معمولی تفرقی مساواتوں پر ہی غور کریں گے۔
کسی تفرقی سر میں آنے والے اعلیٰ ترین مشتق (highest derivative) کے رتبے کو
تفرقی مساوات کا رتبہ کہتے ہیں۔

کسی تفرقی مساوات کو اگر یوں لکھیں کہ اس میں آنے والے تفرقی سر میں جزی
علامت (radicals sign) اور کسریں (fractions) نہ رہ جائیں تو جو اعلیٰ ترین مشتق کی
ڈگری ہوتی ہے، وہی تفرقی مساوات کی ڈگری کہلاتی ہے۔

اس طرح ادپر لکھی تفرقی مساواتوں میں سے :-

(1) اور (2) پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی ہیں؛

(3) اور (7) دوسرے رتبے اور پہلی ڈگری کی ہیں؛

(4) دوسرے رتبے اور دوسری ڈگری کی ہے؛

(5) دوسرے رتبے اور تیسری ڈگری کی ہے۔

کسی تفرقی مساوات کا حل (solution) 'متغیروں کے درمیان وہ رشتہ ہے جس

میں تفرقی سر نہ ہوں اور جو ایسا ہو کہ وہ رشتہ اور اس سے حاصل تفرقی سر اس تفرقی

مساوات کو مطمئن (satisfy) کریں۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ تفرقی مساوات اپنے

حل سے تفرق کرنے پر اور جبری اسقاط (elimination) کے عمل کے ذریعے حاصل کی جاسکتی

ہے۔ اس بنا پر تفرقی سر کے حل کو اس کا ابتدائی (primitive) بھی کہتے ہیں

مثالیں

1. ثبات کیجیے کہ $y = A \cos x + B \sin x$ تفرقی مساوات

$$d^2y/dx^2 + y = 0$$

کا ایک حل ہے۔

یہاں 'ہم پاتے ہیں

$$dy/dx = -A \sin x + B \cos x$$

$$d^2y/dx^2 = -A \cos x - B \sin x = -y$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$$

جو کہ دی ہوئی تفرقی مساوات ہے۔
2۔ ثابت کیجیے کہ

$$(i) \dots\dots\dots y = A \cos x + \sin x$$

تفرقی مساوات

$$(ii) \dots\dots\dots \cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$$

کا ایک حل ہے۔

اب (i) کا تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(iii) \dots\dots\dots dy/dx = -A \sin x + \cos x$$

اب y اور dy/dx کی قیمتیں (ii) کی بائیں جانب رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x$$

$$= \cos x (-A \sin x + \cos x) + (A \cos x + \sin x) \sin x = 1$$

اس طرح سے دی ہوئی تفرقی مساوات مطابقت میں ہوتی ہے۔

ثابت کیجیے کہ

$$(i) \dots\dots\dots Ax^2 + By^2 = 1$$

تفرقی مساوات

$$(ii) \dots\dots\dots x \left[y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] - y \frac{dy}{dx} = 0$$

کا حل ہے۔

نوٹ کیجیے کہ اس تفرقی مساوات میں مستقل A اور B نہیں ہیں اور یہ دوسرے رتبے کی ہے۔

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

لگاتار دو مرتبہ (i) کا تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(iii) \dots\dots\dots Ax + By \frac{dy}{dx} = 0,$$

$$(iv) \dots\dots\dots A + B \left[\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y \frac{d^2y}{dx^2} \right] = 0$$

اب (iii) اور (iv) سے A اور B اسقاط کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$x \left[y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] - y \frac{dy}{dx} = 0$$

جو کہ دی ہوئی تفرقی مساوات ہے۔

4۔ مستقل h اور k اسقاط کر کے وہ تفرقی مساوات حاصل

کیجیے جس کا حل $(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2$ ہو۔

دو چیزوں کا اسقاط کرنے کے لیے تین رشتے ہونا چاہیے، اس لیے دیے ہوئے رشتے کے علاوہ، اس کا تفرق دو مرتبہ کر کے دو رشتے حاصل کریں گے۔

اس طرح ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots\dots\dots (x-h) + (y-k) \frac{dy}{dx} = 0.$$

$$(ii) \dots\dots\dots 1 + (y-k) \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0$$

اب (i) اور (ii) سے ہم پاتے ہیں

$$y-k = - \frac{1 + (dy/dx)^2}{d^2y/dx^2},$$

$$x-h = \frac{[1 + (dy/dx)^2] dy/dx}{d^2y/dx^2}$$

ان قیمتوں کو دیے ہوئے رشتے میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^3 = a^2 \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^3$$

مشقیں

1- مستقل a اور b استقاط کر کے وہ تفرقی مساوات حاصل کیجیے جس کا حل

$$xy = ce^x + be^{-x} + x^2$$

2- وہ تفرقی مساوات حاصل کیجیے جس کا حل

$$y = Ae^x + Be^{3x} + Ce^{5x}$$

3- مستقل a استقاط کر کے وہ تفرقی مساوات حاصل کیجیے جس کا حل

$$y^2 = 4a(x+a)$$

4- منحنيوں کی قسم $y = e^x(A \cos x + B \sin x)$ کے لیے تفرقی مساوات حاصل کیجیے جہاں کہ A اور B اختیاری مستقل ہیں۔

جوابات

$$1. x \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} - xy + x^2 - 2 = 0. \quad 2. \frac{d^3y}{dx^3} - 9 \frac{d^2y}{dx^2} + 23 \frac{dy}{dx} - 15y = 0.$$

$$3. y \left[1 - \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = 2x \frac{dy}{dx}. \quad 4. \frac{d^2y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + 2y = 0.$$

11.2 - اختیاری مستقلوں (arbitrary constants) کی تعداد

جس تفرقی مساوات کا حل

$$(i) \dots \dots \dots f(x, y, c_1, \dots, c_n) = 0.$$

ہے، جہاں $c_1, \dots, c_n$ اختیاری مستقل ہیں، اُس تفرقی مساوات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں n مستقلوں کا استقاط کرنا ہوگا جس کے لیے $(n+1)$ مساواتیں درکار ہوں گی۔ دیے ہوئے حل اور اُس کا لگاتار n مرتبہ تفرق کرنے پر ہمیں $(n+1)$ رشتے (relation)

مل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے حاصل ہوئی تفرقی مساوات کا رتبہ n ہوگا۔
اس کے حل (i) میں n اختیاری مستقل $c_1, c_2, \dots, c_n$ ہوتے ہیں۔

11-21. عام اور مخصوص حل (General and particular solutions)

تفرقی مساوات کے اس حل کو عام حل کہتے ہیں جس میں اختیاری مستقلوں کی تعداد مساوات کے رتبے کے برابر ہو۔ دوسرے حل جو عام حل میں مستقلوں کو خاص قیمتیں دینے پر حاصل ہوتے ہیں وہ مخصوص حل کہلاتے ہیں۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی تفاعل کے عام تکملے میں اختیاری مستقل ہوتا ہے۔ اس لیے تفرقی مساوات کے حل میں جو تکملے کے اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، اختیاری مستقلوں کی تعداد اتنی ہی ہونا چاہیے جتنی بار حل تکملے کے لیے تکمل کا عمل کیا جائے اور یہ تعداد تفرقی مساوات کے درجے کے برابر ہوتی ہے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رتبہ n والی تفرقی مساوات کے نہایت عام حل (must general solution) میں n اور صرف n غیر متوقع (independent) اختیاری مستقل ہونا چاہیے۔

نوٹ 1: ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہر ایک تفاعل کا تکملہ مکان ممکن نہیں یعنی متناہی تعداد میں جبری مثلثاتی، معکوس مثلثاتی، لوگارتھی یا قوتی تفاعلوں کے جبری مرکب تفاعل کا تکملہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی قسم کا ہو۔ تفرقی سرور میں اس کے امکانات اور بھی کم ہیں۔ پھر بھی تکمل کی طرح یہاں بھی تفرقی مساوات کی کچھ معیاری قسمیں (standard forms) ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی بھی تفرقی مساوات کو حل کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں ان معیاری قسموں میں سے کچھ پر غور کیا جائے گا۔

اب اس باب میں ہم صرف پہلے رتبے کی تفرقی مساواتوں پر غور کریں گے۔

نوٹ 2: ایک کارآمد علامت پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی نہایت عام تفرقی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x, y)}{\varphi(x, y)}$$

ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ کارآمد ہوتا ہے کہ اسے یوں لکھا جائے۔

$$\varphi(x, y) dy = f(x, y) dx$$

11-3 متغیر الگ الگ ہو جانے والی مساوات (variables separable) د

مساوات ہیں جو اس طرح لکھی جاسکیں کہ dx کا ضربیہ صرف x کا تفاعل ہو اور dy کا ضربیہ صرف y کا تفاعل ہو۔

لہذا اس طرح کی مساوات کی عام شکل

$$(i) \dots\dots\dots f(x) dx + \varphi(y) dy = 0$$

ہوتی ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں۔

$$f(x) + \varphi(y) \frac{dy}{dx} = 0$$

اب یہ لحاظ x تکمیل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\int f(x) dx + \int \varphi(y) \cdot \frac{dy}{dx} dx = c,$$

$$\Rightarrow \int f(x) dx + \int \varphi(y) dy = c$$

جو کہ (i) کا حل ہے۔

اس لیے، (i) کو حل ترتیب وار x اور y کے لحاظ سے $f(x)$ اور $\varphi(y)$ کے تکمیل کے نال کر ان تکملوں کے جوڑ کو ایک مستقل کے برابر رکھنے پر ملتا ہے۔

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

مثالیں

1۔ حل کیجیے

$$(x^3 + x) dx + (y^3 + y) dy = 0$$

یہاں ہم پاتے ہیں

$$x(x^2 + 1) dx + y(y^2 + 1) dy = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x dx}{x^2 + 1} + \frac{y dy}{y^2 + 1} = 0$$

اس لیے یہ ایسی مساوات ہے جس میں متغیر الگ الگ ہو سکتے ہیں۔
اس لیے اس کا حل

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{y}{y^2 + 1} dy = c,$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \log(y^2 + 1) = c,$$

$$\Rightarrow \log(x^2 + 1)(y^2 + 1) = 2c,$$

$$\Rightarrow (x^2 + 1)(y^2 + 1) = e^{2c} = a.$$

ہم نے $e^{2c} = a$ رکھا ہے، چونکہ c اختیاری مستقل ہے، اس لیے a بھی اختیاری مستقل ہے۔ لہذا

$$(x^2 + 1)(y^2 + 1) = a$$

درکار عام حل ہے جس میں اختیاری مستقل a ہے۔

2۔ ایسا منحنی معلوم کیجیے کہ اس کے ہر نقطے پر مماس نصف قطری سمتیہ سے ایک مستقل زاویہ ϕ بنائے

اگر ϕ سے نصف قطری سمتیہ اور منحنی کے کسی مماس کے درمیان کا زاویہ ظاہر کریں، تو

$$\tan \phi = r \frac{d\theta}{dr}$$

تکلی احصا

چونکہ $\varphi = \alpha$ اس لیے

$$\tan \varphi = r \frac{d\theta}{dr}$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{r} = \cot \alpha d\theta$$

$$\Rightarrow \log r = \theta \cot \alpha + c,$$

$$\Rightarrow r = e^c \cdot e^{\theta \cot \alpha} = ae^{\theta \cot \alpha},$$

$$\therefore r = ae^{\theta \cot \alpha},$$

درکار منحنی ہے، خواہ α کوئی بھی مستقل ہو۔

مشقیں

ذیل تفرقی مساواتیں حل کیجیے۔

$$y(1+x)dx + x(1+y)dy = 0. \quad -1$$

$$y \sqrt{1+x^2} dx + x \sqrt{1+y^2} dy = 0. \quad -2$$

$$(x^2 - yx^2) dy + (y^2 + xy^2) y dx = 0. \quad -3$$

$$\sqrt{[(1+x^2)(1+y^2)]} dx + xy dy = 0. \quad -4$$

$$y - x \frac{dy}{dx} = a \left(y^2 + \frac{dy}{dx} \right). \quad -5$$

$$\operatorname{cosec} x \log y dy + x^2 y^2 dx = 0. \quad -6$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x + x \cos x}{y(2 \log y + 1)}. \quad -7$$

$$x^{-1} \cos^2 y dy + y^{-1} \cos^2 x dx = 0. \quad -8$$

$$x \sqrt{y} dx + (1+y) \sqrt{1+x} dy = 0. \quad -9$$

$$y \log (\sec x + \tan x) dx = \cos x \log (\sec y + \tan y) dx. \quad -10$$

$$(3 + 2 \sin x + \cos x) dy = (1 + 2 \sin y + \cos y) dx. \quad -11$$

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرق مساواتیں

$$(e^x + 1) y \, dy = (y + 1) e^x \, dx. \quad - 12$$

$$\frac{dy}{dx} = e^{x+y} + x^2 e^y. \quad - 13$$

14 - اُن معینوں کی مساوات معلوم کیجیے جن کا

(i) کارٹیزی تحت مماس (sub-tangent) مستقل (constant) ہو۔

(ii) کارٹیزی تحت عماد (sub-normal) مستقل ہو۔

(iii) قطبی تحت مماس مستقل ہو۔

(iv) قطبی تحت عماد مستقل ہو۔

15 - اُس منحنی کی مساوات نکالیے جس کا کارٹیزی تحت مماس نقطے کے مربع کے معکوس

کی طرح بدلے۔

16 - وہ منحنی معلوم کیجیے جو نقطہ (1, 2) سے گزرے اور x-محور کا وہ حصہ جو اُس کے

کسی بھی نقطہ پر مماس اور مبدا کے درمیان ہے، اُس نقطہ کے متصلے کا ڈگنا ہوگا۔

17 - وہ منحنی معلوم کیجیے جن کے قطبی تحت عماد کے معکوس اور نصف قطری

سمتیہ کے معکوس کا جوڑ مستقل ہو۔

18 - وہ منحنی معلوم کیجیے جو نقطہ (a, π/2m) سے گزرے اور جس کے نصف قطری سمتیہ

اور مماس کے درمیان کا زاویہ سمتیہ زاویہ کا m گنا ہو۔

جوابات

1

$$2. \sqrt{(1+x^2)} + \sqrt{(1+y^2)} - \log \{[\sqrt{(1+x^2)}+1][\sqrt{(1+y^2)}+1]/xy\} = c$$

$$3. 2y^2 \log x = 2y(y-x)/x + 2cy^2 = 1.$$

$$4. \sqrt{(1+x^2)} + \sqrt{(1+y^2)} - \log \{[\sqrt{(1+x^2)}+1]/x\} = c.$$

$$5. (1-ay)(a+x) = cy.$$

$$6. (1+\log y)(y+x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x) = c.$$

7. $y^2 \log y = x \sin x + c.$
8. $(x^2 + y^2) + x \sin 2x + y \sin 2y + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 2y = c.$
9. $(x-2) \sqrt{1+x} + (y+3) \sqrt{y} = c.$
10. $(\log (\sec x + \tan x))^2 - (\log (\sec y + \tan y))^2 = c.$
11. $2 \tan^{-1} (1 + \tan \frac{1}{2} x) = c + \log (1 + 2 \tan \frac{1}{2} y).$
12. $(1+y)(1+e^x) = ce^y.$
13. $e^x + e^{-y} + \frac{1}{2} x^2 = c.$
14. (i) $y = ke^{ax}$. (ii) $y = 2cx + k.$ (iii) $r(k-\theta) = c.$ (iv) $r = c\theta + k.$
15. $y = ce^{ax^3/k}.$
16. $xy = 2.$
17. $\theta = cr - \log r + k.$
18. $r^m = a^m \sin m\theta.$

خطی مساوات (Linear Equations) 11.4

خطی مساوات وہ تفرقی مساوات ہے جس میں تالیج متغیر اور اس کا تفرقی سرور پہلی ڈگری کے ہوں اور ان کا ضرب مساوات میں نہ ہو۔
لہذا پہلے رتبے کے خطی مساوات کی عام شکل

$$(i) \dots \dots \dots \frac{dy}{dx} + Py = Q$$

ہوتی ہے، جہاں کہ P اور Q ، x کے فنکشن ہوں۔
اس مساوات کو حل کرنے کے لیے، دونوں طرف

$$e^{\int P dx}$$

سے ضرب کرتے ہیں اور ہم پاتے ہیں

$$e^{\int P dx} \left[\frac{dy}{dx} + Py \right] = Q e^{\int P dx}$$

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

اب بائیں جانب، ذیل کا تفرقی سر ہے

$$ye^{\int P dx}$$

اس طرح تکمیل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$ye^{\int P dx} = \int Qe^{\int P dx} dx + c$$

$$y = e^{-\int P dx} \left[\int Qe^{\int P dx} dx + c \right]$$

جو کہ درکار حل ہے۔

نوٹ 1: جزو

$$e^{\int P dx}$$

بس سے ضرب کرنے سے (i) کی بائیں جانب x اور y کے ایک تفاعل کا تفرقی سر ہو جاتی ہے اسے تفرقی مساوات کا تکمیلی جزو (integrating factor) کہتے ہیں۔

نوٹ 2: یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تکمیلی جزو سے ضرب دینے پر بائیں جانب y اور تکمیلی فیکٹر کے حاصل ضرب تفاعل کی تفرقی سر ہو جاتی ہے۔

نوٹ 3: یہ یاد رکھنا کارآمد ہوتا ہے کہ مثبت 1 کے لیے

$$\log e = 1.$$

مثالیں

1- حل کیجیے

$$x^2(x^2-1) \frac{dy}{dx} + x(x^2+1)y = (x^2-1)$$

ہم پاتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x^2+1}{x(x^2-1)} y = \frac{1}{x^2}$$

جو کہ خطی ہے۔

یہاں

$$P = \frac{x^2+1}{x(x^2-1)},$$

$$\therefore \int P dx = \int \frac{x^2+1}{x(x^2-1)} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) dx = \log \frac{x^2-1}{x}.$$

اس لیے تکملی جزو

$$= e^{\int P dx} = e^{\log \frac{x^2-1}{x}} = \frac{x^2-1}{x}.$$

اب $(x^2-1)/x$ سے ضرب دینے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{x^2-1}{x} \left[\frac{dy}{dx} + \frac{x^2+1}{x(x^2-1)} y \right] = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{x^2-1}{x}.$$

اس لیے حل

$$y \cdot \frac{x^2-1}{x} = \int \frac{x^2-1}{x^3} dx + c = \log x + \frac{1}{2x^2} + c.$$

2۔ حل کیجیے

$$(x+2y^2) \frac{dy}{dx} = y.$$

اگر y کو تابع متغیر لیتے تو مساوات میں y ہونے کی وجہ سے یہ خطی مساوات نہ ہوتی لیکن x کو تابع متغیر کر ہم اسے یوں لکھ سکتے ہیں:-

$$y \frac{dx}{dy} = x + 2y^2$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = 2y^2,$$

جو کہ خطی مساوات ہے (x کو تابع متغیر لینے پر) تکملی جزو

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

$$= e^{-\int dy/y} = e^{-\log y} = y^{-1} = 1/y$$

اس تکلی جزو سے ضرب دینے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{y} \left(\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} \right) = 2y.$$

اس لیے حل

$$x \frac{1}{y} = y^2 + c$$

یعنی $x = y(c + y^2)$ ہے۔

مشقیں

ذیل مساواتیں حل کیجیے:-

$$(x^2 - 1) \frac{dy}{dx} + 2xy = 1 \quad -1$$

$$\sin x \frac{dy}{dx} + y \cos x = x \sin x \quad -2$$

$$\frac{dy}{dx} + 3x^2 y = x^5 \cdot e^{x^3} \quad -3$$

$$\log x \frac{dy}{dx} + y = 2 \log x \quad -4$$

$$x \sin x \frac{dy}{dx} + (x \cos x + \sin x)y = \sin x \quad -5$$

$$\sin x \cos x \frac{dy}{dx} = y + \sin x \quad -6$$

$$\sin x \frac{dy}{dx} + 2y + \sin x (1 + \cos x) = 0 \quad -7$$

$$(1 + x + xy^2) dy + (y + y^3) dx = 0 \quad -8$$

$$(2x - 10y^2) \frac{dy}{dx} + y = 0 \quad -9$$

$$\sqrt{(x^2 + 1)} \frac{dy}{dx} + y = \sqrt{(x^2 + 1)} - x \quad -10$$

$$(1-x^2)^{3/2} \frac{dy}{dx} + y - 1 = 0 - 11$$

$$x(x^2+1) \frac{dy}{dx} = y(1-x^2) + x^3 \log x - 12$$

$$(x^2-1) \sin x \frac{dy}{dx} + [2x \sin x + (x^2-1) \cos x] y - (x^2-1) \cos x = 0 - 13$$

$$\frac{dy}{dx} + y \sec x = \tan x - 14$$

$$(x + \tan y) dy = \sin 2y dx - 15$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{x + \sqrt{(1-x^2)}}{(1-x^2)^2} - 16$$

$$(1+y^2) dx + (x - e^{-\tan^{-1} y}) dy = 0 - 17$$

$$\frac{dy}{dx} = y \cos x + \cos x \sin^2 x - 18$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1+3x^2}{x(1+x^2)} y = x \frac{1-x^2}{1+x^2} - 19$$

- اور اختیاری مستقل یوں معلوم کیجیے کہ $x = 1$ پر $y = 0$ ہو۔
 20 - وہ منحنی معلوم کیجیے جو نقطہ $(2a, a)$ سے گزرے اور جس کے کارٹینری تحت
 مماس اور فاصلہ کا جوڑ مستقل a کے برابر ہو۔
 21 - وہ منحنی معلوم کیجیے کہ جس کے مماس اور مبدا کے درمیان y - محور کا حصہ نقطہ
 تماس (point of contact) کے فاصلے کی تیسری قوت کی طرح بدلے۔

جوابات

1. $y(1-x^2) = -x + c.$

2. $(y-1) \sin x + x \cos x = c.$

3. $12y = e^{x^3} (2x^3 - 1) + ce^{-x^3}.$

4. $y \log x = c + (\log x)^2.$

5. $xy \sin x + \cos x = c.$

6. $y \cot x = c + \log \tan \frac{x}{2}.$

7. $y \tan^2 \frac{x}{2} = \sin x - x + c.$

8. $xy + \tan^{-1} y = c.$

9. $xy^3 = 2y^5 + c$. 10. $y[x + \sqrt{(x^2 + 1)}] = c + \sinh^{-1} x$.
 11. $\log(y-1) + x/\sqrt{(1-x^2)} = c$. 12. $4(x^2 + 1)y + x^3(1 - 2 \log x) = cx$.
 13. $y(x^3 - 1) \sin x = (x^3 - 3) \sin x + 2x \cos x + c$.
 14. $(y-1)(\sec x + \tan x) + x = c$. 15. $x\sqrt{\cot y} = c + \sqrt{\tan y}$.
 16. $y = x\sqrt{(1-x^2)} + ce^{-x/\sqrt{(1-y^2)}}$. 17. $xe^{\tan^{-1} y} = c + \tan^{-1} y$.
 18. $y + \sin^2 x + 2 \sin x + 2 = ce^{\sin x}$.
 19. $y = cx(1+x^2) + x^3$; $c = -\frac{1}{2}$. 20. $(x-a)y = a^3$.
 21. $2y + kx^3 = cx$.

خطی شکل میں تبدیل ہو سکنے والی مساواتیں

ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات

$$\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n$$

جہاں P اور Q x کے قائل ہیں، خطی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
 y^n سے تقسیم کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + Py^{n+1} = Q$$

اب $z = y^{-n+1}$ رکھنے پر $dz/dx = (-n+1)y^{-n}(dy/dx)$ اور مساوات اب

$$\frac{dz}{dx} + P(1-n)z = Q(1-n)$$

ہو جاتی ہے، جو کہ z کو تابع متغیر لینے پر خطی ہو جاتی ہے۔

مثال

حل کیجیے

$$(x^3 y^3 + xy) dx = dy$$

پہلے ہم مساوات کو یوں لکھتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} - xy = x^2 y^2$$

اب ہر سے تقسیم پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{y^3} \frac{dy}{dx} - \frac{x}{y} = x^2$$

اب ہم رکھتے ہیں

$$-\frac{1}{y} = z \Rightarrow \frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$$

اور پاتے ہیں

$$\frac{dz}{dx} + xz = x^2$$

جو کہ خطی ہے۔ تکملی جزو اب

$$e^{\int x dx} = e^{\frac{1}{2}x^2}$$

ہے اور اس لیے حل

$$ze^{\frac{1}{2}x^2} = \int x^2 e^{\frac{1}{2}x^2} dx + c$$

ہے۔ یہ تکملہ نکالنے کے لیے ہم $x^2/2 = t$ رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \therefore \int x^2 e^{\frac{1}{2}x^2} dx &= 2 \int te^t dt \\ &= 2(te^t - e^t) = 2e^{\frac{1}{2}x^2} (\frac{1}{2}x^2 - 1). \end{aligned}$$

اس لیے حل $z = x^2 - 2 + ce^{-\frac{1}{2}x^2}$ ہے، جہاں کہ $z = 1/y$

مشقیں

ذیل مساواتیں حل کیجیے :-

1. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^2 x.$
2. $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \log x.$

3. $x \frac{dy}{dx} + y = y^3 x^3 \cos x$. 4. $x^3 \frac{dy}{dx} - x^2 y + y^4 \cos x = 0$.
 5. $\frac{dy}{dx} = y \tan x - y^3 \sec x$. 6. $x \frac{dy}{dx} + y = x^3 y^4$.
 7. $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + \frac{x}{1-x^2} = xy^{-\frac{1}{2}}$. 8. $(xy - x^2) \frac{dy}{dx} = y$.
 9. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x-1} = xy^{\frac{1}{2}}$. 10. $\frac{dy}{dx} + xy = y^3 e^{\frac{1}{2}x^2} \log x$.
 11. $y(x^2 y + e^x) dx - e^x dy = 0$.

جوابات

1. $1 + x^2 y + cxy = 0$. 2. $y(1 + cx + \log x) = 1$.
 3. $xy(x \sin x + \cos x + c) + 1 = 1$. 4. $x^3 = (c + 3 \sin x) y^3$.
 5. $\sec x = (c + \tan x) y$. 6. $(-3 \log x + c) x^2 y^3 = 1$.
 7. $\sqrt{y} = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + c\sqrt{1 - x^2}$. 8. $y = (\log y + c)x$.
 9. $y^{\frac{2}{3}} = c(x-1)^{-\frac{2}{3}} + \frac{1}{2}(x-1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}(x-1)$.
 10. $ye^{\frac{1}{2}x^2}(c + x - x \log x) = 1$. 11. $x^2 y + 3e^x = cy$.

11.6. ہم جنس مساوات (Homogeneous Equations.) وہ تفرقی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x, y)}{\phi(x, y)}$$

جس میں $f(x, y)$ اور $\phi(x, y)$ اُسی ڈگری کے x اور y کے ہم جنس تفاعل (homogeneous functions) ہوں، ہم جنس مساوات کہلاتی ہے۔ ایسی مساوات کو $y = vx$ رکھ کر تابع متغیر v کے بجائے متغیر v لے کر حل کر سکتے ہیں۔

یکمیلی احصار

چونکہ $f(x, y)$ اور $\varphi(x, y)$ اسی ڈگری کے، مان لیجیے ڈگری n کے تفاعل ہیں اس لیے انہیں یوں لکھ سکتے ہیں :-

$$f(x, y) = x^n f_1\left(\frac{y}{x}\right) \text{ and } \varphi(x, y) = x^n \varphi_1\left(\frac{y}{x}\right)$$

بجورکہ $y = vx$ ، اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

اب دی ہوئی تفرقی مساوات ذیل ہو جاتی ہے :-

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{f_1(v)}{\varphi_1(v)}$$

$$\frac{\varphi_1(v) dv}{f_1(v) - v\varphi_1(v)} = \frac{dx}{x}$$

جس میں کہ اب متغیر الگ الگ ہو گئے ہیں (separable)

مثال

حل کیجیے

$$x^3 dy + y(x+y) dx = 0$$

یہاں ہم پاتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y(x+y)}{x^3} = 0$$

اس طرح مساوات ہم جنس ہے۔ اب $y = vx$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$v + \frac{xdv}{dx} + v(1+v) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{v^2 + 2v} = -\frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v+2} \right) dv = -\frac{dx}{x}$$

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

اس لیے حل یہ ہے :-

$$\frac{1}{2} \log \frac{y}{y+2} = -\log x + c,$$

$$\Rightarrow \log \sqrt{\left(\frac{y}{y+2}\right)} + \log x = c,$$

$$\Rightarrow \log \left[x \sqrt{\left(\frac{y}{y+2}\right)} \right] = c,$$

$$\Rightarrow x \sqrt{\left(\frac{y}{y+2}\right)} = e^c = a,$$

جہاں a ایک مستقل ہے۔

$$\Rightarrow x^2 y = a^2 (y+2x)$$

مشقیں

حل کیجیے :-

1. $(x+y) dy + (x-y) dx = 0$. 2. $\frac{2dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$.
3. $(x^2+y^2) dx = (x^2y+xy^2) dy$. 4. $(x^2+y^2) \frac{dy}{dx} = xy$.
5. $\frac{dy}{dx} + \frac{x-2y}{2x-y} = 0$. 6. $x \frac{dy}{dx} = y - \sqrt{x^2+y^2}$.
7. $(x^2+xy) dy = (x^2+y^2) dx$. 8. $x^2y dy + (x^3+x^2y+2xy^2-y^3) dx = 0$.
9. $[2\sqrt{(xy)}+x] dy + y dx = 0$. 10. $x^2y dx - (x^3+y^3) dy = 0$.
11. $\frac{dy}{dx} + \frac{x^2+3y^2}{3x^2+y^2} = 0$. 12. $x \sin \frac{y}{x} dy = \left(y \sin \frac{y}{x} - x \right) dx$.
13. $(6x^2+2y^2) dx - (x^3+4xy) dy = 0$.
14. $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$.

جوابات

1. $\frac{1}{2} \log (x^2+y^2) + \tan^{-1} (y/x) = c$. 2. $y - x = c\sqrt{(xy)}$.

3. $y + x \log [c(x-y)] = 0.$

4. $y = ce^{x^2/2y^2}$

5. $(x+y)^2 = c(y-x)$

6. $c-y = \sqrt{(x^2+y^2)}.$

7. $(x-y)^2 = cxe^{-y/x}$

8. $\log \frac{c(y-x)}{x^2(y+x)} = \frac{2x}{x+y}$

9. $\log y + \sqrt{(x/y)} = c.$

10. $x^2 = 3y^2 \log c.$

11. $\log (x+y) + 2xy(x+y)^{-2} = :$

12. $\log x = \cos (y/x) + c.$

13. $(2x+y)(2y-3x) = cx.$

14. $y/x = c + \log y.$

11-7۔ ہم جنس شکل میں تبدیل ہو سکنے والی مساواتیں
ذیل شکل کی مساواتیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{Ax+By+C}$$

ہم جنس شکل میں بدل سکتی ہیں۔ اگرچہ x اور y کے بجائے نئے متغیر x اور y لیں جہاں کہ

$$x = X+h, y = Y+k$$

جبکہ h اور k مستقل ہیں جنہیں ایسا لینا ہے کہ دی ہوئی مساوات ہم جنس ہو جائے
ہم پاتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(Y+k)}{dX} = \frac{dY}{dX} = \frac{dY}{dX} \cdot \frac{dX}{dx} = \frac{dY}{dX}$$

اس لیے مساوات اب ذیل شکل میں بدل جاتی ہے

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX+bY+(ah+bk+c)}{AX+BY+(Ah+Bk+C)}$$

مان لیجیے h اور k ایسے لیے جائیں جو کہ ذیل کو مطمئن کریں:-

$$ah+bk+c = 0, Ah+Bk+C = 0.$$

پہلے رہتے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

تو ان سے ہم پاتے ہیں

$$h = \frac{bC - Bc}{aB - Ab}, k = \frac{Ac - aC}{aB - Ab}$$

جو کہ معنی رکھتا ہے سوائے اس صورت کے جبکہ $aB - Ab = 0$ ہو یعنی $a/A = b/B$

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY}{AX + BY}$$

ہم جنس مساوات

کو بہ آسانی متغیر کی تبدیلی $Y = vX$ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں

اُس صورت میں جبکہ $aB - Ab = 0$ ہو، مان لیجیے کہ

$$\frac{a}{A} = \frac{k}{B} = r \quad (\text{کہہ لیجیے})$$

$$\therefore a = Ar, b = Br$$

اب مساوات یہ ہو جاتی ہے :-

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r(Ax + By) + c}{Ax + By + C}$$

اگر $z = Ax + By$ رکھیں تو $\frac{dz}{dx} = A + B \frac{dy}{dx}$ اور ہم پاتے ہیں

$$\frac{dz}{dx} = B \frac{rz + c}{z + C} + A$$

جس میں کہ متغیر الگ الگ ہو سکتے ہیں (separable)۔

مثال

حل کیجیے

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + 2y + 3}{2x + 3y + 4}$$

یہاں $x = X + h$ اور $y = Y + k$ رکھنے پر مساوات یہ ہو جاتی ہے :-

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X + 2Y + (h + 2k + 3)}{2X + 3Y + (2h + 3k + 4)}$$

تکلی احصاء

اب h اور k ایسے معلوم کرنے ہیں کہ

$$h+2k+5=0, 2h+3k+4=0.$$

$$n=1, k=-2.$$

$$\therefore \frac{dY}{dX} = \frac{X+2Y}{2X+3Y}$$

اب $Y = vX$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$v + X \frac{dv}{dX} = \frac{1+2v}{2+3v}$$

$$\Rightarrow \frac{2+3v}{3v^2-1} dv = -\frac{dX}{X}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{2+\sqrt{3}}{2(\sqrt{3}v-1)} - \frac{2-\sqrt{3}}{2(\sqrt{3}v+1)} \right] dv = -\frac{dX}{X}$$

$$\therefore \frac{2+\sqrt{3}}{2} \log(\sqrt{3}v-1) - \frac{(2-\sqrt{3})}{2} \log(\sqrt{3}v+1) = [-\log X + c] \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{2+\sqrt{3}}{2} \log(\sqrt{3}Y-X) - \frac{2-\sqrt{3}}{2} \log(\sqrt{3}Y+X) = \sqrt{3}c = a.$$

جو کہ درکار حل ہے، جبکہ $X = x-1$ اور $Y = y+2$

مشقیں

ذیل تفرقی مساواتیں حل کیجیے:-

$$1. \frac{dy}{dx} = \frac{x-2y+5}{2x+y-1}$$

$$2. (3y-7x-3) dx + (7y-3x-7) dy = 0.$$

$$3. (4x+6y+5) dx = (2x+3y+4) dy.$$

$$4. \frac{ay}{dx} = \frac{ax+by-a}{bx+ay-b}$$

$$5. (2x+y+1) dx + (4x+2y-1) dy = 0.$$

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

$$6. (2x+3y-6) dy = (6x-2y-7) dx.$$

$$7. (2x+3y-8) dx = (x+y-3) dy.$$

جوابات

$$1. x^4 - y^2 - 4xy + 16x + 2y = c.$$

$$2. e^{(y-x-1)^2} (y+x-1)^3 = 1.$$

$$3. \frac{1}{2} (2x+y^2) + \frac{1}{2} \log (16x+24y+23) = x+c.$$

$$4. (y-x+1)^{a+b} (y+x-1)^{a-b} = c$$

$$5. \log (2x+y-1) + x+2y = c. \quad 6. 3x^3 - \frac{2}{3}y^3 - 2xy - 7x + 6y = c.$$

$$7. \sqrt{3} \log (Y^2 - 2XY - 2X^2) + 2 \log \{[Y - (1+\sqrt{3})X][Y - (1-\sqrt{3})X]\} = c;$$

$$(Y = y-2, \text{ اور } X = x-1 \text{ جہاں})$$

11.8 - راست تفرقی مساواتیں

کسی تفرقی مساوات کو راست تب کہتے ہیں جبکہ اُسے اُس کے ابتدائی سے براہ راست تفرق کر کے حاصل کیا جاسکے، بغیر کسی اور تبدیلی کے (مثلاً استقاط وغیرہ)

مثال: تفرقی مساوات

$$(x^2 - ay) dx + (y^2 - ax) dy = 0$$

راست ہے کیونکہ اسے 'اس کے ابتدائی

$$x^3 - 3axy + y^3 = c$$

سے براہ راست تفرق کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

مسئلہ (Theorem) تفرقی مساوات

$$(i) \dots\dots\dots M+N \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow Mdx+Ndy = 0$$

کے راست ہونے کے لیے ضروری اور کافی شرط یہ ہے کہ

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس شرط کے کافی ہونے کا ثبوت اس کتاب کے معیار کے باہر ہے۔ ہم صرف اس کا ضروری ہونا ثابت کریں گے۔
مان لیجیے کہ ابتدائی

$$(2) \dots\dots\dots f(x, y) = c$$

ہے، جہاں c اختیاری مستقل ہے۔
اب x کی نسبت سے (2) کا تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots\dots\dots \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$$

چونکہ مساوات (1) 'راست ہے' اس لیے (3) اور (1) ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم پاتے ہیں

$$(4) \dots\dots\dots \frac{\partial f}{\partial x} = M$$

$$(5) \dots\dots\dots \frac{\partial f}{\partial y} = N$$

اب (4) اور (5) کا ترتیب وار بمطابق y اور x کے تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

لیکن چونکہ

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اگر مساوات $Mdx + Ndy = 0$ راست ہو تو ہم اسے ذیل طریقے سے حل

کر سکتے ہیں۔ کو مستقل لیتے ہوئے، x کی نسبت سے M کا تکمیل کیجیے پھر N کے پہلے y کو مستقل لیتے ہوئے، x کی نسبت سے N کا تکمیل کیجیے جن میں x نہیں ہے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والے دو حصوں کو جوڑ کر ایک مستقل کے برابر رکھنے پر حل مل جاتا ہے۔
ذیل مثالوں سے یہ طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔

مثال

ثبات کیجیے کہ مساوات

$$(x^4 - 2xy^2 + y^4)dx - (2x^2y - 4xy^3 + \sin y)dy = 0$$

راست ہے اور اسے حل کیجیے

$$M = x^4 - 2xy^2 + y^4 \quad \text{یہاں}$$

$$N = -(2x^2y - 4xy^3 + \sin y)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= -4xy + 4y^3 \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= -4xy + 4y^3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس طرح دی ہوئی مساوات راست ہے۔

تکمیلی احصاء

اب y کو مستقل لیتے ہوئے بلحاظ x کے M کا تکمیل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(1) \dots\dots\dots \frac{1}{3}x^3 - x^2y^2 + xy^4$$

اب N کا صرف ایک رکن $-\sin y$ ایسا ہے جس میں x نہیں ہے۔ اس کا تکملہ

$$(2) \dots\dots\dots \cos y$$

ہے۔ اس لیے ابتدائی

$$\frac{1}{3}x^3 - x^2y^2 + xy^4 + \cos y = c$$

مشقیں

حل کیجیے

1. $(ax + hy + g) dx + (hx + by + f) dy = 0$.
2. $xy dy + (x + y) dx = 0$.
3. $(e^y + 1) \cos x dx + e^y \sin x dy = 0$.
4. $x(y^2 - x^2 - a^2x) dx + y(y^2 + x^2 - b^2y) dy = 0$.
3. $[y(1 + x^{-1}) + \sin y] dx + (x + \log x + x \cos y) dy = 0$.
6. $(x^2 - ay) dx + (y^2 - ax) dy = 0$.

جوابات

1. $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$.
2. $xy + \frac{1}{2}x^2 = c$.
3. $(e^y + 1) \sin x = c$.
4. $6x^2y^3 - 3x^4 + 3y^4 - 4a^2x^3 - 4b^2y^3 = c$.
5. $xy + y \log x + x \sin y = c$.
6. $x^2 + y^2 - 3axy = c$

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

11.9۔ تکمیلی جزو

کبھی کبھی ایسی تفرقی مساواتیں جو راست نہ ہوں کسی مناسب فنکشن سے ضرب کرنے پر راست ہو جاتی ہیں۔ ایسے فنکشن کو تکمیلی جزو کہتے ہیں

مساوات

$$x dy - y dx = 0$$

راست نہیں ہے لیکن $1/y^2$ سے ضرب دینے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{x}{y^2} dy - \frac{1}{y} dx = 0$$

اور ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راست ہے۔

خطی مساوات

$$\frac{dy}{dx} + Py + Q = 0$$

کے لیے تفاعل

$$\int P dx$$

تکمیلی جزو ہے۔ اس کتاب میں تکمیلی جزو معلوم کرنے کے عام قاعدے پر غور کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔

مشقیں

1۔ ثابت کیجیے کہ

$$(y - 2x^2) dx - x(1 - xy) dy = 0$$

1/x³ سے ضرب کرنے پر راست ہو جاتی ہے۔ اس کو حل بھی کیجیے۔

2۔ حل کیجیے

$$y(2xy + e^{xy}) dx - e^{xy} dy = 0.$$

3- حل کیجیے

$$(1+yx) x dy + (1-yx) y dx = 0.$$

جوابات

1. $xy^2 = cx + 2y + 2x^3$. 2. $2x^2y - cy + 2e^x = 0$. 3. $\log \frac{y}{x} - \frac{1}{xy} = c$.

باب 11 پر مشقیں
ذیل تفرقی مساواتیں حل کیجیے۔

$$\cos^3 x \frac{dy}{dx} + y \cos x = \sin x \quad -2 \quad x^2 \frac{dy}{dx} = \frac{y(x+y)}{2} \quad -1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+2y-3}{2x+y-3} \quad -4 \quad \frac{dy}{dx} + y \sec x = \tan x \quad -3$$

$$(x^2+y^2) \frac{dy}{dx} = xy \quad -6 \quad \frac{dy}{dx} + y \cot x = 2 \cos x \quad -5$$

$$\sec^2 x \tan y dx + \sec^2 y \tan x dy = 0 \quad -7$$

$$\frac{dy}{dx} - 2y \tan x = y^2 \tan^3 x \quad -9 \quad 2(1-xy) \frac{dy}{dx} = y^2 \quad -8$$

$$\frac{1}{2x^2} \frac{dy}{dx} + \frac{x+y}{x^2+y^2} = 0 \quad -11 \quad (x^2+y^2)dx - 2xy dy = 0 \quad -10$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{\sqrt{(x^2+a^2)}} = 3x \text{ such that } y = a^2 \text{ when } x = 0 \quad -12$$

$$(x+y) dx + (y-x) dy = 0 \quad -14 \quad x dy - y dx = \sqrt{(x^2+y^2)} dx \quad -13$$

$$y^2(y dx + 2x dy) - x^2(2y dx + x dy) = 0 \quad -15$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x}{1-x^2} y = x\sqrt{y} \quad -17 \quad (1+x^2) \frac{dy}{dx} + y = \tan^{-1} x \quad -16$$

پہلے رتبے اور پہلی ڈگری کی تفرقی مساواتیں

$$\cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x - 19 \quad \frac{dy}{dx} + y \cos x = \sin 2x - 18$$

$$(xy^3 - e^{1/x^2})dx - x^2y dy = 0 - 21 \quad \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{y^3}{x^3} - 20$$

$$(2x - y + 1)dx + (2y - x - 1)dy = 0 - 22$$

$$(y^3 - 2yx^3)dx + (2xy^2 - x^3)dy = 0 - 24 \quad xy^3(xy_1 + y) = x^3 - 23$$

$$(x + y + 1)\frac{dy}{dx} = 1 - 26 \quad \sec^2 y \frac{dy}{dx} + 2x \tan y = x^3 - 25$$

$$(x^2 + 2xy - y^4)dx + (y^2 + 2xy - x^3)dy = 0 - 27$$

28 کسی ہموار سطح میں بھی دائروں کی تفرقی مساوات ذیل شکل میں حاصل

کیجیے :-

$$y_2(1 + y_1^2) - 3y_1y_2^2 = 0$$

29۔ اُن بھی مخروطوں (conics) کی تفرقی مساوات معلوم کیجیے جن کے محاور

مختصات محاور (co-ordinate axes) پر پڑیں۔

30۔ ثابت کیجیے کہ مساوات

$$(4x + 3y + 1)dx + (3x + 2y + 1)dy = 0$$

اُن زاہدوں کے نظام کی مساوات ہیں جن کے لامتناہی مماس

$$x + y = 0, 2x + y + 1 = 0$$

31۔ حل کیجیے

$$\left\{ x \cos \frac{y}{x} + y \sin \frac{y}{x} \right\} y = \left\{ y \sin \frac{y}{x} - x \cos \frac{y}{x} \right\} x \frac{dy}{dx}$$

جوابات

1. $(y - x)^2 = -xy^2$

2. $1 + y = \tan x + ce^{-\tan x}$

3. $(y-1)(1+\sin x) = (c-x) \cos x.$
 4. $c(x-y)^2 = x+y-2.$
 5. $2y \sin x + \cos 2x + c = 0.$
 6. $cy = e^{x^2/2y^2}$
 7. $c \cot x \cot y = 1.$
 8. $xy^2 = 2y+c.$
 9. $y(\sin^2 x + c \cos^2 x) + 3 \cos x = 0.$
 10. $c(x^2-y^2) = x.$
 11. $y^2 + 3yx^2 + 2x^3 = c.$
 12. $y(x + \sqrt{a^2+x^2}) = x^2 + (a^2+x^2)^{3/2}$
 13. $c(\sqrt{x^2+y^2}-y) = 1.$
 14. $c\sqrt{(x^2+y^2)} = e^{\tan^{-1}(y/x)}.$
 15. $xy\sqrt{(x^2-y^2)} = c.$
 16. $y+1 = \tan^{-1} x + ce^{-\tan^{-1} x}.$
 17. $3\sqrt{y+1-x^2} = c(1-x^2)^{1/4}.$
 18. $y+2 = 2 \sin x + ce^{-\sin x}$
 19. $y+1 = \tan x + ce^{-\tan x}.$
 20. $y-2x = ce^{2y}.$
 21. $x^2 y^2 = \frac{1}{2}e^{1/x^2} + c.$
 22. $x^2 - xy + x + y^2 - y = c.$
 23. $2x^2 y^2 = 3a^2 x^2 + c.$
 24. $xy\sqrt{(y^2-x^2)} = c.$
 25. $2 \tan y = x^2 - 1 + ce^{-x^2}$
 26. $x+y+2 = ce^y.$
 27. $c(x^2+y^2) = x+y.$
 29. $xy^2 + xy^2 = y^2x.$
 30. $xy \cos \frac{y}{x} = c.$
-

12

پہلے رتبے کی وہ مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

12-1۔ عام طور پر، ان مساواتوں پر غور کرتے وقت جو کہ پہلے رتبے کی تو ہیں لیکن پہلی ڈگری کی نہیں، dy/dx کے بجائے p لکھتے ہیں۔ اب ذیل قسم کی مساواتوں پر غور کیا جائے گا۔

- 1۔ وہ مساواتیں جنہیں p کے لیے حل کر سکتے ہیں
 - 2۔ وہ مساواتیں جنہیں y کے لیے حل کر سکتے ہیں
 - 3۔ وہ مساواتیں جنہیں x کے لیے حل کر سکتے ہیں
- ان پر ذیل سیکشنوں میں غور کیا جائے گا۔

12-2۔ وہ مساواتیں جنہیں e کے لیے حل کر سکتے ہیں
ذیل کی مثال سے حل نکالنے کا طریقہ سمجھ میں آجائے گا۔

مثال

حل کیجیے

$$p^2 + 2py \cot x = y^3$$

p کے لیے حل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} p &= \frac{-2y \cot x \pm \sqrt{(4y^2 \cot^2 x + 4y^2)}}{2} \\ &= -y \cot x \pm y \operatorname{cosec} x \\ &= y(-\cot x \pm \operatorname{cosec} x). \end{aligned}$$

اس طرح ہم پاتے ہیں

$$(1) \dots\dots\dots \frac{dy}{dx} = y(-\cot x + \operatorname{cosec} x),$$

$$(2) \dots\dots\dots \frac{dy}{dx} = -y(\cot x + \operatorname{cosec} x) \quad \text{اور}$$

اب (1) اور (2) میں متغیر الگ الگ (separable) ہو سکتے ہیں۔

(1) سے ملتا ہے۔

$$\frac{dy}{y} = (-\cot x + \operatorname{cosec} x) dx$$

$$\Rightarrow \log y = -\log \sin x + \log \tan \frac{x}{2} + \log c = \log \frac{c \tan \frac{x}{2}}{\sin x}$$

$$(3) \dots \Rightarrow y = \frac{c \tan \frac{x}{2}}{\sin x} = \frac{c}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{c}{1 + \cos x}$$

پھر (2) سے ملتا ہے

$$\frac{dy}{y} = -(\cot x + \operatorname{cosec} x) dx$$

پہلے رتبہ کی دو مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

$$\Rightarrow \log y = -\left(\log \sin x + \log \tan \frac{x}{2}\right) + \log c$$

$$= \log \frac{c}{\sin x \tan \frac{x}{2}}$$

$$(4) \dots \Rightarrow y = \frac{c}{\sin x \tan \frac{x}{2}} = \frac{c}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{c}{1 - \cos x}$$

اس لیے (1) اور (2) کے حل

$$y - \frac{c}{1 + \cos x} = 0, y - \frac{c}{1 - \cos x} = 0.$$

ہیں اور اس لیے دی ہوئی تفرقی مساوات کا مرکب حل

$$-\frac{c}{1 + \cos x} \left(y - \frac{c}{1 + \cos x}\right) \left(y - \frac{c}{1 - \cos x}\right) = 0.$$

مشقیں

ذیل تفرقی مساوات حل کیجیے۔

1. $x \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + (y-x) \frac{dy}{dx} - 1 = 0.$
2. $y^2 + xyp - x^2p^2 = 0.$
3. $xyp^3 - (x^2 + y^2)p + xy = 0.$
4. $x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + xy \frac{dy}{dx} - 6y^2 = 0.$
5. $p^2y + (x-y)p - x = 0.$

جوابات

1. $(y-c-x)(xy-c) = 0.$
2. $(y^2 - cx^2 + \sqrt{5})(y^2 - cx^2 - \sqrt{5}) = 0.$
3. $(y-cx)(x^2 - y^2 - c) = 0.$
4. $(y - cx^2)(x^2y - c) = 0.$
5. $(x^2 + y^2 - c)(y - x - c) = 0.$

12.3 - وہ مساواتیں جنہیں y کے لیے حل کر سکتے ہیں

مان لیجیے کہ دی ہوئی تفرقی مساوات کو y کے لیے حل کرنے پر

$$(1) \dots\dots\dots y = f(x, p)$$

ملتا ہے۔ اس کا لحاظ x تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$p = \frac{dy}{dx} = \varphi\left(x, p, \frac{dp}{dx}\right)$$

جو کہ متغیروں x اور p میں ایک نئی تفرقی مساوات ہے۔
مان لیجیے اس کو حل کرنا ممکن ہے اور حل

$$(2) \dots\dots\dots F(x, p, c) = 0$$

ہے، جہاں کہ c اختیاری مستقل ہے۔

مساوات (1) کا ذیل حل دو شکلوں میں سے کسی شکل میں بھی رکھا جاسکتا ہے:-

یا تو ہم (1) اور (2) سے p استقاط کریں اور درکار حل $\psi(x, y, c)$ حاصل کریں
یا پھر (1) اور (2) کو x اور y کے لیے حل کر کے درکار حل

$$x = f_1(p, c)$$

$$y = f_2(p, c)$$

حاصل کریں، جہاں کہ p پیرامیٹر ہے۔

مثال

حل کیجیے

$$y + px = p^2 x^2$$

یہاں، لحاظ x تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} + p + x \frac{dp}{dx} = 4x^2 p^2 + 2x^2 p \frac{dp}{dx}$$

پہلے رتبے کی وہ مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

$$\Rightarrow 2p - 4x^3p^3 - 2x^4p \frac{dp}{dx} + x \frac{dp}{dx} = 0,$$

$$\Rightarrow 2p(1 - 2x^3p) + x(1 - 2x^3p) \frac{dp}{dx} = 0.$$

$$\Rightarrow 2p + x \frac{dp}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{p} + \frac{2dx}{x} = 0$$

$$\Rightarrow \log p + 2 \log x = \text{ستقل} - \log c \quad (\text{کہہ لیجیے})$$

$$\Rightarrow px^2 = c \Leftrightarrow p = c/x^2.$$

اب p کی اس قیمت کو دی ہوئی تفرقی مساوات میں (p کے اسقاط کے لیے) رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$y = -c/x + c^2$$

$$\Rightarrow xy = c^2x - c$$

جو کہ درکار حل ہے۔

12.4۔ وہ مساواتیں جنہیں x کے لیے حل کر سکتے ہیں

انہیں بلجیے کر دی ہوئی تفرقی مساوات کو x کے لیے حل کرنے پر ملتا ہے۔

$$(1) \dots \dots \dots x = f(y, p)$$

اسے بلحاظ y تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{p} = \frac{dx}{dy} = \varphi(y, p, dp/dy) \quad (\text{کہہ لیجیے})$$

اس طرح ہمیں متغیروں y اور p میں ایک نئی تفرقی مساوات مل جاتی ہے۔

انہیں بلجیے اس کا حل کرنا ممکن ہے اور حل

$$(2) \dots \dots \dots F(p, y, c) = 0$$

اب پچھلے سیکشن کی طرح (1) اور (2) سے p اسقاط کر کے حل ملے گا، یا (1) اور (2) سے x اور y کی قیمتیں p اور c کے ارتقام میں نکال سکتے ہیں، جہاں کہ p کو پیرامیٹر تصور کر سکتے ہیں۔

مثال

حل کیجیے

$$y = 2px + y^2 p^2$$

اسے x کے لیے حل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$x = \frac{y - y^2 p^2}{2p} = \frac{y}{2p} - \frac{y^2 p^2}{2}$$

اب لحاظ و تفرق کرنے پر ملتا ہے

$$\begin{aligned} \frac{1}{p} - \frac{dx}{dy} &= \frac{1}{2p} - \frac{y}{2p^2} \frac{dp}{dy} - yp^2 - p^2 y \frac{dp}{dy} \\ \Rightarrow \frac{1}{2p} + p^2 y + \left(\frac{y}{2p^2} + p^2 y \right) \frac{dp}{dy} &= 0. \\ \Rightarrow \frac{1 + 2p^2 y}{2p} + \frac{y(1 + 2p^2 y)}{2p^2} \cdot \frac{dp}{dy} &= 0. \\ \Rightarrow 1 + \frac{y}{p} \frac{dp}{dy} &= 0. \\ \Rightarrow \frac{dy}{y} + \frac{dp}{p} &= 0. \\ \Rightarrow \log y + \log p &= \text{مستقل} = \log c \quad (\text{کہہ لیجیے}) \\ \Rightarrow py = c &\Leftrightarrow p = c/y \end{aligned}$$

اب p کی یہ قیمت دی ہوئی مساوات میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$y = \frac{2cx}{y} + y^2 \cdot \frac{c^2}{y^2} \Rightarrow y^2 = 2cx + c^2$$

جو کہ درکار حل ہے۔

پہلے رتبے کی وہ مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

مشقیں

ذیل تفرقی مساواتیں حل کیجیے۔

1. $p^2y + 2px - y = 0$

2. $ap^2 + py - x = 0$

3. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 4xy \frac{dy}{dx} + 8y^2 = 0$

4. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 y^2 - 2x \frac{dy}{dx} + y = 0$

5. $4p^3 + 3xp = y$

جوابات

1. $x = \frac{c(1-p^2)}{p^2}, y = \frac{2c}{p}$

2. $x = \frac{(c-a \cosh^{-1} p)}{\sqrt{(p^2-1)}}, y = \frac{c-a \cosh^{-1} p}{\sqrt{(p^2-1)}} - ap$

3. $64y = c(4x-c)^2$

4. $2cx = c^2 + y^2$

5. $y = -\frac{2}{3}p^3 + cp^{-\frac{1}{2}}, x = -\frac{1}{3}p^3 + \frac{c}{3}p^{-\frac{3}{2}}$

12-5 - کلیرو (Clairut) کی مساوات

تفرقی مساوات

(1) $y = px + f(p)$

کلیرو کی مساوات کہلاتی ہے۔ یہاں $p, f(p)$ کا کوئی تفاعل ہے۔ (1) کا حل نکالنے کے لیے بلحاظ x تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + f'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$\left[x + f'(p) \right] \frac{dp}{dx} = 0$$

$$\begin{aligned} (2) \dots\dots\dots &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{dp}{dx} = 0 \\ x + f'(p) = 0 \end{array} \right. \\ (3) \dots\dots\dots & \end{aligned}$$

اب (2) سے ملتا ہے
(4) $p = c$ (کہہ دیجیے) = مستقل

(1) اور (4) سے p ؛ استقاط کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(5) \dots\dots\dots y = cx + f(c)$$

جو کہ (1) کا حل ہے۔

اگر (1) اور (3) سے p استقاط کریں تو ایسا حل ملتا ہے جو کہ عام حل (5) میں سے نہیں ہے۔ اس حل کو ہم واحد حل (singular solution) کہتے ہیں (12.7 § دیکھیے)
نوٹ: جیسا کہ نیچے کی مثال 2 میں دیکھیں گے، کبھی کبھی تنصیر کی تبدیلی سے دی ہوئی مساوات کلیز کی مساوات بن جاتی ہے۔

مثالیں

1۔ حل کیجیے

$$y = px + \log p$$

کلیز کی اس مساوات کا حل

$$y = cx + \log c$$

ہے جو کہ p کی جگہ اختیاری مستقل c رکھنے پر ملتا ہے۔

2۔ حل کیجیے

$$x^2(y - px) = p^2y$$

ہم رکھتے ہیں

$$x^2 = u, \quad y^2 = v$$

پہلے رتبے کی وہ مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

$$\Rightarrow \frac{ydy}{xdx} = \frac{dv}{du} \Rightarrow p = \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \cdot \frac{dv}{du}.$$

p کی اس قیمت کو دی ہوئی تفرقی مساوات میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$x^2 \left(y - \frac{x^2}{y} \cdot \frac{dv}{du} \right) = \frac{x^2}{y} \left(\frac{dv}{du} \right)^2,$$

$$\Rightarrow \left(y^2 - x^2 \frac{dv}{du} \right) = \left(\frac{dv}{du} \right)^2,$$

$$= \left(v - u \frac{dv}{du} \right) = \left(\frac{dv}{du} \right)^2,$$

$$\Rightarrow v = u \frac{dv}{du} + \left(\frac{dv}{du} \right)^2,$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے، لہذا حل

$$v = cu + c^2$$

$$y^2 = cx^2 + c^2$$

یعنی
3۔ حل کیجیے

$$y = xf_1(p) + f_2(p)$$

یہ کلیرو کی مساوات نہیں ہے
کی نسبت سے تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$p = f_1(p) + xf_1'(p) \frac{dp}{dx} + f_2'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dp} = \frac{f_1'(p)}{p - f_1(p)} x + \frac{f_2'(p)}{p - f_1(p)},$$

جو کہ خطی ہے اگرچہ p کو غیر تالیج متغیر اور x کو تالیج متغیر لیں۔

مان لیجیے اس خطی مساوات کو حل کرنے پر ہمیں

$$\varphi(x, p, c) = 0$$

لے تو اس حل اور دی ہوئی مساوات سے p اسقاط کرنے پر درکار حل ملتا ہے۔

مشقیں

1. $(y - px)(p - 1) = p$.
2. $y = x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$.
3. $y = x \frac{dy}{dx} + e^{dy/dx}$
4. $(px - y)(py + x) = a^2 p$. (یہاں $x^2 = u, y^2 = v$ رکھیے)
5. $y + xp \log p = (2 + 3 \log p)p^2$.
6. $y = 2px - p^2$.

جوابات

1. $(y - xpc - 1) = c$.
2. $y = cx + c^2$.
3. $y = cx + e^c$.
4. $y^2 = c^2 - a^2 c / (1 + c)$.
5. $x = 3p^2 + c p^{-1}, y = 2p^3 - c \log p$.
6. $x = \frac{1}{3} p + c p^{-2}, y = \frac{1}{3} p^3 + 2c p^{-1}$.

12-6 پہلے رتبے کی تفرقی مساوات کا جیومیٹریائی مفہوم

کوئی تفرقی مساوات

$$(1) \dots \dots \dots \varphi(x, y, dy/dx) = 0$$

بیجے اور مان بیجے کہ اس کا عام حل

$$(2) \dots \dots \dots f(x, y, c) = 0$$

ہے، جہاں کہ c اختیاری مستقل ہے۔

اختیاری مستقل c کی ہر قیمت کے لیے، مساوات (2) کسی منحني کی مساوات ہے اس

پہلے رتبے کی وہ مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

لیے مساوات (2) ایک قبیلہ منحنی (family of curves) کی مساوات ہے جہاں کہ c اس قبیلے کا پیرامیٹر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے رتبے کی ہر تفرقی مساوات ایک قبیلہ منحنی کو ظاہر (represents) کرتی ہے۔

اب ہمارے سطح پر کوئی نقطہ لے لیجیے اور اس کے مختصات (x, y) کو (1) اور (2) میں رکھنے پر ملی ہوئی مساواتوں کو حل کیجیے جن میں dy/dx اور c ہیں۔ اس طرح سے ملی ہوئی c کی قیمتیں پیرامیٹر کی وہ قیمتیں ہیں جن سے اس قبیلے کے (x, y) سے گزرنے والے منحنی حاصل ہوتے ہیں اور حاصل کی ہوئی dy/dx کی قیمتیں دیے ہوئے نقطے پر ان منحنیوں کے مماسوں کی ڈھال (slopes) ہیں۔ اس طرح عام طور پر یہ امید کی جاتی ہے کہ مساوات (2) میں c کی ڈگری، مساوات (1) میں dy/dx کی ڈگری کے برابر ضرور ہونا چاہیے، جو کہ تفرقی مساوات کی ڈگری بھی ہے۔

12-7. واحد حل (Singular Solutions)

علاوہ عام حل اور مخصوص حلوں (particular solutions) کے، جو کہ عام حل میں اختیار مستقلوں کو خاص قیمتیں دے کر حاصل کرتے ہیں، کسی تفرقی مساوات کے اور بھی حل ہو سکتے ہیں۔ ایسے دوسرے حل واحد حل (Singular solutions) کہلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذیل نتیجہ ملتا ہے۔
جب بھی قبیلہ منحنی

$$(1) \dots\dots\dots f(x, y, c) = 0$$

جنہیں تفرقی مساوات


$$(2) \dots\dots\dots \varphi(x, y, dy/dx) = 0$$

سے ظاہر کرتے ہوں، اس کے لفاف (envelope) کا وجود ہو تو لفاف کی مساوات ہی تفرقی مساوات (2) کا واحد حل ہے۔

مان لیجیے کہ قبیلہ منحنی کے لفاف کا وجود ہے۔ لفاف پر کوئی نقطہ $P(x, y)$ لے لیجیے اب قبیلہ منحنی کا ایک منحنی ایسے ضرور ہوگا جو لفاف کو (x, y) پر چھوتا ہو۔ مان لیجیے وہ منحنی

$$f(x, y, c_1) = 0$$

ہے۔ اب x, y اور dy/dx کی 'P' والے منحنی سے حاصل قیمتیں دی ہوئی تفرقی مساوات



تصویر 51

کو مطمئن کریں گی۔ ساتھ ہی لفاف سے حاصل P والی اور dy/dx قیمتیں بھی انہیں قیمتوں کے برابر ہوں گی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لفاف پر ہر نقطہ والی x, y اور dy/dx کی قیمتیں دی ہوئی تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔ اس لیے لفاف کی مساوات دی ہوئی تفرقی مساوات کا ایک حل ہے۔

اس حل میں کوئی اختیاری مستقل نہیں ہے اور عام طور پر یہ حل عام حل میں اختیاری مستقلوں کو خاص قیمتیں دے کر نہیں حاصل ہو سکتا۔

12-71۔ واحد حل حاصل کرنا

مان لیجیے

$$\phi(x, y, dy/dx) = 0$$

کوئی تفرقی مساوات ہے اور $f(x, y, c) = 0$ اس کا عام حل ہے۔ اب ہمیں معلوم کر کسی قبیلہ منحنی

$$(1) \dots\dots\dots f(x, y, c) = 0$$

پہلے رتبے کی وہ مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

کے لفاف کی مساوات اُس طریق (Locus) کی مساوات میں شامل (contained) ہے جو کہ (1) اور

$$(2) \dots\dots\dots \frac{\partial f(x, y, c)}{\partial c} = 0.$$

سے c استقاط کرنے پر ملتا ہے۔ مان لیجیے یہ استقاطی (eliminant)

$$(3) \dots\dots\dots \psi(x, y) = 0.$$

ہے۔

چونکہ (3) والا استقاطی لفاف کے علاوہ دوسرے طریق بھی ظاہر کر سکتا ہے، اس لیے اس کی جانچ کر لینا ضروری ہے کہ طریق (3) کا کوئی حصہ دی ہوئی تفرقی مساوات کا حل ہے یا نہیں ہے۔

دوسرا طریقہ : علم مساوات (Theory of equations) سے ہمیں معلوم ہے کہ مساوات (3) ایسے نقطوں (x, y) کا طریق ہے کہ اس کے ہر نقطہ (x, y) کے لیے (1) سے حاصل c کی قیمتوں میں سے کم از کم دو قیمتیں برابر ہوتی ہیں، یعنی (x, y) سے گزرنے والے قبیلہ منحنی کے کم از کم دو منحنی ایک ہی ہوتے ہیں (coincide)۔ چونکہ $\varphi(x, y, dy/dx) = 0$ یعنی $\varphi(x, y, p) = 0$ سے (x, y) گزرنے والے قبیلہ منحنی کے مماسوں کی ڈھال (slopes) ملتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ (3) پر کسی نقطہ (x, y) کے لیے p کی کم از کم دو قیمتیں ضرور برابر ہونی چاہئیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ لفاف اور اس لیے واحد حل بھی، اُس طریق میں شامل ہے جو کہ مساواتوں

$$\varphi(x, y, p) = 0, \quad \frac{\partial \varphi(x, y, p)}{\partial p} = 0.$$

سے p استقاط کرنے پر ملتا ہے۔

مثالیں

1. کلیرو کی مساوات

$$(1) \dots\dots\dots y = px + f(p)$$

کا واحد حل نکائیے۔
عام حل

$$(2) \dots\dots\dots y=cx+f(c)$$

ہے۔ اس لیے اور

$$(3) \dots\dots\dots 0=x+f'(c)$$

سے c استقاط کرنے پر واحد حل ملتا ہے، جہاں کہ (3)، (2) کا لحاظ c تفرق کرنے پر ملا ہے۔

اب کا لحاظ p جزوی تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(4) \dots\dots\dots 0=x+f'(p)$$

اس لیے (1) اور (4) سے p استقاط کرنے پر بھی واحد حل ملتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ استقاطی c ، استقاطی p ایک ہی ہیں۔

2۔ مساوات

$$x^2p^2 + yp(2x+y) + y^2 = 0.$$

کو ماضی $y=u$, $xy=v$ کے ذریعے حل کیجیے اور اُس کا واحد نکائیے۔
ہم پاتے ہیں

$$y=u, \quad x=v/u$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{du} = 1, \quad \frac{dx}{du} = \frac{u \frac{dv}{du} - v}{u^2}$$

ان سے ملتا ہے

$$p = \frac{dy}{dx} = \frac{u^2}{u \frac{dv}{du} - v}$$

دی ہوئی تفرقی مساوات میں یہ قیمتیں رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\left(u \frac{dv}{du} - v \right)^2 + (u^2 + 2v) \left(u \frac{dv}{du} - v \right) + v^2 = 0$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام

(1) $xy = cy + c^2$ یعنی

$$0 = y + 2c.$$
$$y(y+4x) = 0.$$

$p = 0$ رکھنے پر دی ہوئی تفرقی مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

اس لیے $y = 0$ اور $y + 4x = 0$ دونوں واحد حل ہیں۔

مشقیں

$$y^2 - 2pxy + p^2(x^2 - 1) = m^2$$

2۔ ثابت کیجیے کہ مساوات

کے لفاف کی مساوات $-\frac{4}{7}(x^3+y^3)^2-2(x^3-y^3)+1=0$

3۔ مساوات

$$9p^3(1-y)^3 = 4(2-y)$$

کے عام اور واحد حل نکالیے۔

4۔ ثابت کیجیے کہ مساوات

$$x^3(y-px) = p^3y$$

کا کوئی واحد حل نہیں ہے۔

5۔ مساوات $x^3p^3 + x^3yp + a^3 = 0$ کو حل کیجیے اور اس کے واحد حل کے لیے جانچ کیجیے۔

6۔ مساوات

$$y = 2x \frac{dy}{dx} + y^3 \left(\frac{dy}{dx} \right)^3$$

کو حل کیجیے اور اس کا واحد حل بھی نکالیے۔

7۔ ثابت کیجیے کہ $px+y = p^3x^4$ کا واحد حل $4x^3y+1 = 0$ ہے۔

جوابات

1. $0 - cx)^3 = m^3 + c^3, y^3 + m^3x^3 = m^3.$
3. $(x+c)^3 = (y+1)^3(2-y), y = 2.$
5. $c^3x - cxy + a^3 = 0, xy^3 = 4a^3.$
6. $y^3 = 2ax + c^3, 27y^4 + 32x^3 = 0.$

باب 12 پر مشقیں

حل کیجیے :-

$$p = \sin(x-y) \quad -2$$

$$p^3 + py = x(x+y) \quad -1$$

$$p^3xy + p(4x^2 - 3y^2) - 12xy = 0 \quad -4$$

$$p(p-y) = x(x+y) \quad -3$$

پہلے رتبے کی دو مساواتیں جو کہ پہلی ڈگری کی نہیں ہیں

$$p^2x^2 - 2pxy + y^2 + 4p = 0 \quad -6$$

$$(1+p^2)y = 2px \quad -5$$

$$y = 2px + f(p^2x) \quad -8$$

$$p^2(p+m) = a(y+mx) \quad -7$$

$$y = 2px + y^{n-1}p^n \quad -9$$

10. مساوات $xp^2 - (x-a)^2 = 0$ حل کیجیے اور واحد حل کے لیے جانچ کیجیے۔
 11. اسی منحنی کی مساوات حاصل کیجیے جو تفرقی مساوات $y = p^2(x-p)$ کو مطمئن کرے

اور $x = \frac{1}{2}$ پر $p = 0$ ہو۔

12. مساوات $xp^2 - py - y = 0$ حل کیجیے اور خطوں $x^2 + 4xy = 0$ اور اس

تفرقی مساوات کے تکمیلی منحنیوں (integral curves) میں رشتے کی جانچ کیجیے۔
 13. حل کیجیے

$$e^{2x}(p-1) + p^3e^{2y} = 0$$

14. ثابت کیجیے کہ مساوات

$$y + \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dx}{dy} + x \frac{dy}{dx}$$

کے سبھی تکمیلی منحنی (integral curves) یا تو خط مستقیم (straight lines) ہیں یا مکافاتی ہیں۔
 15. ذیل کو حل کیجیے اور واحد حل نکال لے۔

$$(i) (px^2 + y^2)(px + y) = (p+1)^2 \quad (ii) 4p^2x(x-1)(x-2) = (3x^2 - 6x + 2)^2$$

(عوضی $v = x+y$ $u = xy$ استعمال کیجیے)

16. مکمل طور پر حل کیجیے

$$y^2(y-px) = x^4p^2$$

(عوضی $v = 1/y$ $u = 1/x$ استعمال کیجیے)

جوابات

1. $(2y - x^2 - c)(x + y - 1 - ce^{-x}) = 0$.

2. $x + c = \cot \left[\frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}(x-y) \right]$.

3. $(y+x-1-ce^x)(x^2+2y-c) = 0$. 4. $(y-cx^2)(y^2+4x^2+c) = 0$.
5. $x = c(1+p^2)/p^2, y = 2c/p$. 6. $c^2x^2-2cxy+4c+y^2 = 0$.
7. $x = \frac{1}{a} \left\{ \frac{3}{2} p^2 - mp + m^2 \log(p+m) \right\} + c$
 $y = \frac{1}{a} \left\{ p^2 (p - \frac{1}{2}m) + m^2 p - m^2 \log(p+m) \right\} - mc$.
8. $y = 2c\sqrt{x+f(c^2)}$ 9. $y = 2cx + c^n$.
10. $9(\pm y+c)^2 = 4x(x-3a)^2, x = 0$. 11. $(2x-1)^2 = 8y$.
12. $x = c(1+p)e^p, y = cp^2e^p$. 13. $e^y = ce^x + c^2$.
15. (i) $x+y = cxy+c^2, x^2y^2+4(x+y) = 0$.
(ii) $(v+c)^2 = x(x-1)(x-2); x = 0, x = 1, x = 2$.
16. $x = c+c^2xy; y+4x^2 = 0$.
-

13

قبیلہ منحنی کے مستدیر

(Trajectories of a Family of Curves)

13-1 - تعریف . وہ منحنی جو کہ ایک قبیلہ منحنی کے ہر ممبر کو ایک دیے ہوئے اصول کے مطابق کاٹے، اُسے دیے ہوئے قبیلہ منحنی کا مستدیر کہتے ہیں۔
ہم صرف اُس صورت پر غور کریں گے جبکہ مستدیر دیے ہوئے قبیلہ منحنی کے ہر ممبر کو ایک مستقل زاویہ پر کاٹے۔ اگر وہ مستقل زاویہ 90 ڈگری ہو تو ایسے مستدیر کو عمودی مستدیر (Orthogonal Trajectory) کہتے ہیں۔
مثال کے طور پر، مبدا سے گزرنے والا ہر خط، مبدا پر مرکز رکھنے والے دائروں کے قبیلے کا عمودی مستدیر ہے۔

13-2 - کارٹینیسی مختصات
وہ مستدیر حاصل کرنا جو کہ قبیلہ منحنی $f(x, y, c) = 0$ (جہاں c پیرامیٹر ہے) کے ہر ممبر کو ایک مستقل زاویہ پر کاٹے۔

مسادات (I) $f(x, y, c) = 0$

کا لحاظ x تفرق کرنے پر اور حاصل شدہ نتیجہ اور (1) سے c استقاط کرنے پر ہمیں دیے ہوئے قبیلہ منحنی کی تفرقی مساوات ملے گی۔ مان لیجیے وہ

$$(2) \dots\dots\dots \phi\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0.$$

ہے۔

مان لیجیے (X, Y) مستدیر کے کسی نقطہ کے حالیہ مختصات (current co-ordinates) ہیں اور اس طرح dY/dX اُس نقطہ پر مماس کی ڈھال (slope) ہے۔ اب (2) کے کسی ممبر اور مستدیر کے نقطہ تقاطع (point of intersection) پر ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots\dots\dots x = X$$

$$(4) \dots\dots\dots y = Y$$

$$(5) \dots\dots\dots \tan \alpha = \frac{\frac{dy}{dx} - \frac{dY}{dX}}{1 + \frac{dY}{dX} \frac{dy}{dx}}$$

اب (5) سے ملتا ہے۔

$$(6) \dots\dots\dots \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dY}{dX} + \tan \alpha}{1 - \frac{dY}{dX} \tan \alpha}$$

اب (2)، (3)، (4) اور (6) سے x, y اور dy/dx استقاط کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(7) \dots\dots\dots \phi\left(X, Y, \frac{\frac{dY}{dX} + \tan \alpha}{1 - \frac{dY}{dX} \tan \alpha}\right) = 0.$$

یہ درکار مستدیروں کی تفرقی مساوات ہے۔ اس کو حل کرنے پر ہمیں قبیلہ مستدیر کی کارٹیزی مساوات ملتی ہے۔
ضمنی نتیجہ۔ عمودی مستدیر: عمودی مستدیر کے لیے ہمیں (5) کی جگہ

قبیلہ منحنی کے مستدیر

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dY}{dX} = -1$$

لکھنا ہوتا ہے، یعنی

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{dX}{dY}$$

اس طرح، عمودی مستدیر کے قبیلے کی تفرقی مساوات

$$\varphi\left(X, Y, -\frac{dX}{dY}\right) = 0$$

ہے۔ عام علامتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلہ منحنی کی تفرقی مساوات

$$\varphi(x, y, dy/dx) = 0$$

سے متعلق عمودی مستدیروں کے قبیلے کی تفرقی مساوات

$$\varphi(x, y, -dx/dy) = 0$$

ہوتی ہے، جو کہ dy/dx کی جگہ $-dx/dy$ رکھنے پر ملتی ہے۔

13.3 - قطبی مختصات - عمودی مستدیر

قبیلہ منحنی

$$f(r, \theta, c) = 0$$

کے لیے عمودی مستدیر حاصل کرنا، جہاں کہ c پیرامیٹر ہے۔
مساوات

$$(1) \dots \dots f(r, \theta, c) = 0$$

کا لحاظ ہ تفرق کرنے پر اور حاصل شدہ نتیجہ اور (1) سے c استقاط کرنے پر دیے ہوئے قبیلہ منحنی کی تفرقی مساوات ملتی ہے۔ مان لیجیے وہ

(2) $\psi(r, \theta, dr/d\theta) = 0$

ہے۔ اب مان لیجیے (r', θ') مستدیر پر کسی نقطے کے حالیہ مختصات ہیں۔ مان لیجیے مستدیر اور
(2) کے کسی ممبر کے مشترک نقطہ (common point) پر کھینچے گئے ان کے مماس مشترک
نصف قطری سمتیہ (common radius vector) سے زاویہ φ اور φ' بناتے ہیں تو ہم
پاتے ہیں

$$\tan \varphi = r \frac{d\theta}{dr}, \tan \varphi' = r' \frac{d\theta'}{dr'}$$

ساتھ ہی

$$\varphi - \varphi' = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi = \varphi' + \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \tan \varphi = -\cot \varphi'$$

$$\Rightarrow \tan \varphi \tan \varphi' = -1,$$

(3) $\Rightarrow r r' \frac{d\theta}{dr} \frac{d\theta'}{dr'} = -1.$

ساتھ ہی

(4) $r = r'$

(5) $\theta = \theta'$

ہم (3) کو دوسری طرح لکھتے ہیں

(6) $\frac{dr}{d\theta} = -r r' \frac{d\theta'}{dr'}$

اب (2), (3), (4) اور (6) سے r, θ اور $dr/d\theta$ استقفا کرنے پر ہم پاتے ہیں

(7) $\psi\left(r', \theta', -r'^2 \frac{d\theta'}{dr'}\right) = 0,$

یہ قبیلہ مستدیر کی تفرقی مساوات ہے۔

عام علامتوں میں ہم (7) کو یوں لکھ سکتے ہیں

$$\psi\left(r, \theta, -r^2 \frac{d\theta}{dr}\right) = 0.$$

جو کہ (1) میں $r, \theta, dr/d\theta$ کی جگہوں پر ترتیب وار $r, \theta, r \frac{dr}{d\theta}$ رکھ کر حاصل کی جاسکتی ہے۔

مثالیں

1 قبیلہ منحنی

$$(1) \dots\dots\dots \frac{x^a}{a^2+\lambda} + \frac{y^a}{b^2+\lambda} = 1$$

کے عمودی مستدیر معلوم کیجیے، جہاں کہ x قبیلہ منحنی کا پیرامیٹر ہے۔
بلحاظ x کے (1) کا تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(2) \dots\dots\dots \frac{x}{a^2+\lambda} + \frac{y}{b^2+\lambda} \frac{dy}{dx} = 0.$$

اب ہمیں (1) اور (2) سے λ اسقاط کرنا ہے۔
اب (2) سے ملتا ہے

$$x = \frac{b^2x + a^2y \frac{dy}{dx}}{x + y \frac{dy}{dx}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 + \lambda = \frac{(a^2 - b^2)x}{x + y \frac{dy}{dx}}, \\ b^2 + \lambda = \frac{(a^2 - b^2)y \frac{dy}{dx}}{x + y \frac{dy}{dx}} \end{cases}$$

ان قیمتوں کو (1) میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots\dots\dots \left(x - y \frac{dx}{dy}\right) \left(x + y \frac{dy}{dx}\right) = a^2 - b^2$$

جو کہ دیے ہوئے قبیلے کی تفرقی مساوات ہے۔

اب dy/dx کی جگہ $-dx/dy$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$(4) \dots\dots\dots \left(x+y \frac{dy}{dx}\right) \left(x-y \frac{dx}{dy}\right) = a^2 - b^2$$

جو کہ (3) ہی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلہ (1) خود عمودی ہے، یعنی قبیلہ (1) کا ہر ممبر اسی قبیلے کے ہر ممبر کو عمودی طریقے پر کاٹتا ہے۔

2- ہم محاور دایروں (co-axial circles)

$$(1) \dots\dots\dots x^2 + y^2 + 2gx + c = 0.$$

کے عمودی مستدیر حاصل کیجیے، جہاں کہ g پیرامیٹر ہے
(1) کا تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(2) \dots\dots\dots x + y \frac{dy}{dx} + g = 0$$

اب (1) اور (2) سے g اسقاط کرنے پر ملتا ہے۔

$$x^2 + y^2 - 2x \left(x + y \frac{dy}{dx}\right) + c = 0,$$

$$\Rightarrow y^2 - x^2 - 2xy \frac{dy}{dx} + c = 0.$$

اب dy/dx کی جگہ $-dx/dy$ رکھنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمودی مستدیر کی تفرقی مساوات

$$y^2 - x^2 + 2xy \frac{dx}{dy} + c = 0,$$

$$\text{یعنی} \quad 2xy \frac{dx}{dy} - x^2 = -c - y^2 \quad \text{ہے۔}$$

اب $x^2 + y^2$ رکھنے پر ہمیں ایک خطی مساوات ملتی ہے جس میں x تابع متغیر ہے۔
یہ بہ آسانی دیکھا جاسکتا ہے کہ حل

$$x^2 + y^2 + 2fy - c = 0$$

ہے جو کہ ہم محاور دایروں کا قبیلہ ہے جو کہ دیے ہوئے نظام پر عمود ہیں (یہاں f پیرامیٹر ہے)۔

قبیلہ 'مغنی' کے مستدیر

3- کارڈوائٹوں کے قبیلے

$$r = a(1 + \cos \theta)$$

کا عمودی مستدیر نکالیں، جبکہ a پیرامیٹر ہے۔

مسادات

(1) $r = a(1 + \cos \theta)$,

کا θ کی نسبت سے تفرق کرنے پر ملتا ہے۔

(2) $\frac{dr}{d\theta} = -a \sin \theta$

اب (1) اور (2) سے a اسقاط کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{r}{dr/d\theta} = -\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$$

جو کہ دیے ہوئے قبیلے کی تفرقی مسادات ہے۔ اس میں $dr/d\theta$ کی جگہ $-r^2 d\theta/dr$ رکھیں

$$\frac{r}{-r^2 d\theta/dr} = -\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$$

(3) $\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$

اور یہ عمودی مستدیر کی تفرقی مسادات ہے

اب (3) کو حل کرنے کے لیے ہم اُسے یوں لکھتے ہیں

$$\frac{dr}{r} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} d\theta = (\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta) d\theta$$

$$\Rightarrow \log r = \log \tan \frac{\theta}{2} + \log \sin \theta + \log c$$

$$= \log \left(c \sin \theta \tan \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\Rightarrow r = c \sin \theta \tan \theta/2 = 2c \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \tan \frac{\theta}{2}$$

$$= 2c \sin^2 \frac{\theta}{2} = c (1 - \cos \theta)$$

ہم

$$\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = \cot \frac{\theta}{2}$$

کچھ کر بھی مکمل کر سکتے ہیں۔

مشقیں

1. نصف کروی مکائیوں (semicubical parabolas) کے قبیلے $ay^2 = x^3$ کے عمودی مستدیر نکالے جبکہ a پیرامیٹر ہے۔
2. مکائیوں کے قبیلے $y = ax^2$ کے عمودی مستدیر نکالے۔
3. اگر λ پیرامیٹر ہو تو قبیلہ

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda} = 1$$

کے عمودی مستدیر نکالے۔

4. ہم ماسک (confocal) اور ہم محاور (co-axial) مکائیوں

$$r = 2a/(1 + \cos \theta)$$

کے عمودی مستدیر کی مساوات حاصل کیجیے۔

5. برابر سائز کے دائروں کے لیے جن کے مرکز ہم خط ہوں، عمودی مستدیر نکالے۔ ان میں سے کسی عمودی مستدیر کی ترسیم کیجیے۔
6. ذیل کے عمودی مستدیر نکالے۔

$$(i) \quad r\theta = a$$

$$(ii) \quad r = a\theta$$

$$(iii) \quad r^n = a^n \cos n\theta$$

$$(iv) \quad r^n \cos n\theta = a^n$$

$$(v) \quad r = a(1 - \cos \theta)$$

$$(vi) \quad r = c \sin^2 \theta$$

قبیلہ منحنی کے مستدیر

7. منحنیوں کے ذیل قبیلوں کے عمودی مستدیر نکالیے

$$(i) x^{2/3} + y^{2/3} = \lambda^{2/3}.$$

$$(ii) r \sin 2\theta = \lambda.$$

$$(iii) r = \tan(\theta + \alpha).$$

$$(iv) x^2 + y^2 = r^2$$

جوابات

$$1. 3y^2 + 2x^2 = c^2.$$

$$2. x^2 + 2y^2 = c^2.$$

$$3. x^2 + y^2 + c = 2a^2 \log x.$$

$$4. r = 2b/(1 - \cos \theta)$$

$$5. x = r(\tanh t - t) + c, y = r \operatorname{sech} t$$

جبکہ دیا ہوا دائروں کا قبیلہ

$$x^2 + y^2 - 2gx + g^2 = r^2$$

$$6. (i) r^2 = ce^{\theta^2}.$$

$$(ii) r = ce^{-\theta^2/2}$$

$$(iii) r^n = c^n \sin n\theta.$$

$$(iv) r^n \sin n\theta = c^n.$$

$$(v) r = c(1 + \cos \theta).$$

$$(vi) r^2 = c \cos \theta$$

$$7. (i) y^{4/3} - x^{4/3} = c^{4/3}.$$

$$(ii) r^4 \cos 2\theta = c^4.$$

$$(iii) \theta + r = c + r^{-1}.$$

$$(iv) y = mx.$$

14 خطی مساواتیں (Linear Equations)

14.1- خطی تفرقی مساواتیں (Linear Differential Equations) وہ مساواتیں

ہیں جن میں تابع متغیر اور اس کے تفرقی سر صرف پہلی ڈگری میں ہوں اور باہم ضرب نہ ہوئے ہوں۔ اس طرح "دیں رتبے کی عام خطی تفرقی مساوات

$$\frac{d^n y}{dx^n} + P_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + P_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + P_n y = X$$

ہوتی ہے، جہاں $P_1, P_2, \dots, P_n$ اور X صرف x کے فنکشن ہیں۔

عام مساوات پر بحث اس کتاب کے معیار سے باہر ہے اور اس کتاب میں صرف مستقل ضربیوں (constant coefficients) والے خطی تفرقی مساوات اور ہم جنس مساوات (homogeneous equations) پر ہی غور کیا جائے گا۔ پہلے رتبہ کی خطی مساوات پر

§ 10.4 میں غور ہو ہی چکا ہے۔

14.2- مستقل ضربیوں (constant coefficients) والی خطی تفرقی مساوات
تفرقی مساوات

$$(A) \dots \dots \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + a_n y = X$$

حل کرنا، جہاں کہ $a_1, a_2, \dots, a_n$ مستقل ہیں، اور x, X کا تفاعل ہے۔
پہلے تفرقی مساوات

$$(B) \dots \dots \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + a_n y = 0$$

پر غور کیجیے جو کہ (A) کی بائیں جانب کو صفر کے برابر رکھنے پر ملتی ہے۔
اب ہم دیکھیں گے کہ اگر y_1 اور y_2 (B) کے دو حل ہوں تو $c_1 y_1 + c_2 y_2$ بھی
(B) کا حل ہوگا، جہاں c_1 اور c_2 اختیاری مستقل ہیں۔

چونکہ y_1 و y_2 دونوں (B) کے حل ہیں، اس لیے ہم پاتے ہیں

$$(i) \dots \dots \frac{d^n y_1}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y_1}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y_1}{dx^{n-2}} + \dots + a_n y_1 = 0$$

$$(ii) \dots \dots \frac{d^n y_2}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y_2}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y_2}{dx^{n-2}} + \dots + a_n y_2 = 0$$

اگر c_1 اور c_2 دو اختیاری مستقل ہوں، تو ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} & \frac{d^n (c_1 y_1 + c_2 y_2)}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} (c_1 y_1 + c_2 y_2)}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} (c_1 y_1 + c_2 y_2)}{dx^{n-2}} + \dots \\ &= c_1 \left(\frac{d^n y_1}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y_1}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y_1}{dx^{n-2}} + \dots \right) \\ & \quad + c_2 \left[\frac{d^n y_2}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y_2}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y_2}{dx^{n-2}} + \dots \right] \\ &= c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

(i) اور (ii) سے

اس طرح اوپر کہی گئی بات ثابت ہو جاتی ہے۔

چونکہ n درجہ کی تفرقی مساوات کے عام حل میں n اختیاری مستقل ہوتے ہیں، اس لیے اوپر ثابت کیے گئے نتیجے سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر $y_1, \dots, y_n$ مساوات (B) کے n غیر تابع (independent) حل ہوں، تو

$$c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n = u \quad (\text{کہہ لیجیے})$$

مسادات (B) کا عام حل ہوتا ہے، جہاں کہ $c_1, \dots, c_n$ اختیاری مستقل ہیں۔
اب مان لیجیے v مسادات (A) کا کوئی خاص حل ہے جس سے کہ ہم پاتے ہیں

$$\frac{d^n v}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} v}{dx^{n-1}} + \dots + a_n v = X$$

ہم دیکھیں گے کہ

$$c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n + v = u + v$$

مسادات (A) کا عام حل ہے جس میں کہ n اختیاری مستقل ہیں۔
اب ہم پاتے ہیں

$$\frac{d^n (u+v)}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} (u+v)}{dx^{n-1}} + \dots + a_n (u+v)$$

$$= \frac{d^n u}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} u}{dx^{n-1}} + \dots + a_n u$$

$$+ \frac{d^n v}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} v}{dx^{n-1}} + \dots + a_n v$$

$$= 0 + X$$

(کیونکہ u ، (B) کا حل ہے)

$$= X$$

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ $u+v$ ، مسادات (A) کا عام حل ہے۔
اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ تفرقی مسادات (A) کا حل معلوم کرنے کے لیے، جہاں
 $a_1, a_2, \dots$ وغیرہ مستقل ہیں اور X ، x کا کوئی تفاعل ہے۔ ہمیں پہلے اُس سے متعلق مسادات
(B) کے n غیر تالیج حل $y_1, y_2, \dots, y_n$ نکالنے ہوتے ہیں اور (A) کا کوئی ایک حل v
چاہیے ہوتا ہے جس میں کوئی اختیاری مستقل نہ ہو، پھر

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n + v$$

مسادات (A) کا عام حل ہوتا ہے۔

حل کے حصہ $c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ تمامی تفاعل (Complementary Function) اور y کو مخصوص تکملہ (Particular Integral) کہتے ہیں۔
 اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ تفرقی مساوات (A) کو حل کرنے کے لیے ہمیں پہلے تفرقی مساوات (B) کا حل نکالنا سیکھنا ہوگا۔ یہ § 14-5 میں کیا گیا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہم اگلے سیکشن میں عاملوں (operators) کے بارے میں بتائیں گے۔
 مساوات (A) کا تکملہ خاص حاصل کرنے کا طریقہ § 14-7 میں دیا ہوا ہے۔
 نوٹ: یہ آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے کہ جو نتائج اور نکالے گئے ہیں وہ عام خطی تفرقی مساوات کے لیے بھی صحیح ہیں، یعنی جبکہ ضربیہ x کے فنکشن ہوں۔

14-3 - عامل (Operators)

تفرقی سر dy/dx کے حصے d/dx کو ایسا عامل (operator) تصور کر سکتے ہیں جس کے y پر عمل کے نتیجے کے طور پر تفرقی ضربیہ dy/dx حاصل ہو۔
 اس نقطہ نظر سے، d/dx کو عامل کہتے ہیں اور تفاعل y کو متعامل (operand) کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم $d^2/dx^2, d^3/dx^3, \dots$ کو بھی عامل تصور کر سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے، عاملوں $d/dx, d^2/dx^2, \dots$ کو $D, D^2, \dots$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ D کی قوت (power) یہ بتاتی ہے کہ تفرق کتنی بار ہوا ہے، ان خیالات کی توسیع کرتے ہوئے ہم لکھتے ہیں۔

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n y$$

$$\equiv (D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_n) y$$

$$\equiv f(D) y$$

$$D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_n \equiv f(D)$$

اب عامل ہے۔

14.31 - عاملوں کا حاصل ضرب (Product of operators)

اگر $f(D)$ اور $\varphi(D)$ دو عامل ہوں تو $f(D)\varphi(D)$ بھی ایک عامل ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عامل $f(D)$ کو اس فنکشن پر عمل کرنا ہے جو کہ دیے ہوئے فنکشن پر $\varphi(D)$ کے عمل کرنے پر حاصل ہوا ہو۔ مثال کے طور پر ہم

$$(2D-3)(D^2-4D+5)\sin x$$

حاصل کر رہے ہیں۔ اب

$$\begin{aligned}(D^2-4D+5)\sin x &= \frac{d^2 \sin x}{dx^2} - 4 \frac{d \sin x}{dx} + 5 \sin x \\ &= 4 \sin x - 4 \cos x\end{aligned}$$

$$(2D-3)(4 \sin x - 4 \cos x) \quad \text{پھر}$$

$$= 2 \frac{d}{dx} (4 \sin x - 4 \cos x) - 3 (4 \sin x - 4 \cos x)$$

$$= 20 \cos x - 4 \sin x.$$

14.32 - یہ ثابت کرنا کہ

$$(D-\alpha)(D-\beta)y \equiv (D-\beta)(D-\alpha)y$$

جہاں کہ α اور β کوئی بھی مستقل ہیں
ہم پاتے ہیں

$$(D-\beta)y = \frac{dy}{dx} - \beta y.$$

$$\Rightarrow (D-\alpha)(D-\beta)y = (D-\alpha)\left(\frac{dy}{dx} - \beta y\right)$$

$$= \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx} - \beta y\right) - \alpha\left(\frac{dy}{dx} - \beta y\right)$$

$$= \frac{d^2 y}{dx^2} - \beta \frac{dy}{dx} - \left(\alpha \frac{dy}{dx} - \alpha \beta y\right)$$

$$= \frac{d^2 y}{dx^2} - (\beta + \alpha) \frac{dy}{dx} + \alpha\beta y$$

$$= [D^2 - (\alpha + \beta) D + \alpha\beta] y.$$

اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ

$$(D - \beta) (D - \alpha) y = [D^2 - (\alpha + \beta) D + \alpha\beta] y.$$

$$\therefore (D - \alpha) (D - \beta) y = (D - \beta) (D - \alpha) y.$$

لہذا عامل جزوں کی ترتیب کوئی اہمیت نہیں رکھتی
نتیجہ صریح: ہم دیکھ چکے ہیں کہ

$$(D - \alpha) (D - \beta) y = [D^2 - (\alpha + \beta) D + \alpha\beta] y.$$

لہذا، عامل

$$D^2 - (\alpha + \beta) D + \alpha\beta \text{ اور } (D - \alpha) (D - \beta) \text{ ایک ہی ہیں۔}$$

اگر D الجبرائی مقدار ہوتی، یعنی اگر یہ کوئی نمبر ہوتا تو ضرب کے اصولوں سے ہم جانتے ہیں کہ

$$(D - \alpha) (D - \beta) = D^2 - (\beta + \alpha) D + \alpha\beta.$$

عام طور پر، مان لیجئے کہ

$$f(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n.$$

اب D کو ایک نمبر لیتے ہوئے، ہم $f(D)$ کے اجزائے کمال سکتے ہیں، اس طرح ہیں

$$(1) \dots\dots\dots f(D) \equiv (D - m_1) (D - m_2) \dots (D - m_n)$$

مل سکتا ہے۔

اب اوپر کے نتیجے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ D کو عاملی حیثیت دینے پر بھی (1) صحیح ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عمل کرتے وقت (1) کے داہنی جانب کے اجزا کی ترتیب کو ہم جس طرح چاہیں بدل سکتے ہیں۔

14.5 - تفرقی مساوات

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dx} + a_n y = 0$$

کو حل کرنا

اس مساوات کو علامتی شکل (symbolic form) میں لکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$f(D)y = (D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n)y = 0$$

مان لیجیے r_1 ذیل مساوات کا ایک ہی بار آنے والا ریشہ (root) ہے :-

$$(1) \dots \dots f(D) \equiv D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n = 0$$

اب D کو کوئی نمبر تصور کرنے پر ہم لکھتے ہیں

$$f(D) = \varphi(D) (D - r_1)$$

جہاں کہ $\varphi(D)$ و D کا کثیر رکنی (polynomial) ہے۔

ہم پاتے ہیں

$$(2) \dots \dots 0 \equiv f(D)y \equiv \varphi(D) (D - r_1)y$$

اب مساوات

$$(3) \dots \dots (D - r_1)y = 0$$

کا حل دی ہوئی مساوات (2) حل بھی ہوگا۔ اب (3) سے ملتا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - r_1 y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} - r_1 dx = 0$$

$$\Rightarrow \log y = r_1 x$$

$$\Rightarrow y = e^{r_1 x}$$

جہاں کہ اختیاری مستقل نظر انداز کیا گیا ہے۔

لہذا $e^{r_1 x}$ دی ہوئی تفرقی مساوات (2) کا ایک حل ہے۔

اب اگر $x_1, x_2, \dots, x_n$ مساوات (1) کے مختلف ریشے ہوں تو جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے،

$$e^{x_1 x}, \dots, e^{x_n x}$$

دی ہوئی تفرقی مساوات کے "مختلف غیر تابع" (independent) حل ہوں گے۔
لہذا جیسا §14.2 میں دکھایا جا چکا ہے۔

$$c_1 e^{x_1 x} + c_2 e^{x_2 x} + \dots + c_n e^{x_n x}$$

دی ہوئی تفرقی مساوات کا عام حل ہوگا، جہاں کہ $c_1, \dots, c_n$ اختیاری مستقل ہیں۔

وہ صورت جبکہ کئی بار آنے والے ریشے (repeated Roots) ہوں
اگر کچھ ریشے برابر ہوں تب اوپر بتائے طریقے سے چلنے پر "سے کم غیر تابع حل
میں گے اور اس سے پہلے حاصل ہونے والا حل عام حل نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم
ذیل طریقہ اختیار کرتے ہیں:-

پہلے، یہ ماننے پر کہ "کوئی دوبار آنے والا ریشہ ہے" ہم لکھ سکتے ہیں

$$f(D) = \psi(D) (D - \alpha)^2$$

$$\Rightarrow 0 = f(D)y = \psi(D) (D - \alpha)^2 y$$

اب مساوات

$$(i) \dots \dots \dots (D - \alpha)^2 y = 0$$

کا حل صاف طور پر مساوات

$$f(D)y = 0$$

کا حل بھی ہوگا۔

ہم پاتے ہیں

$$(D - \alpha)(D - \alpha)y = 0$$

مان لیجیے

$$(ii) \dots\dots\dots (D-\alpha)y = z$$

تاکہ

$$(D-\alpha)z = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} - \alpha z = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{z} - \alpha dx = 0$$

$$\Rightarrow z = c_1 e^{\alpha x}$$

جس عام حل میں کہ c_1 اختیاری مستقل ہے۔ اب z کی اس قیمت کو (i) میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں،

$$(D-\alpha)y = c_1 e^{\alpha x}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} - \alpha y = c_1 e^{\alpha x}$$

اس خطی مساوات کو تکملی جز $e^{-\alpha x}$ سے ضرب کر کے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$y e^{-\alpha x} = c_1 \int e^{-\alpha x} e^{\alpha x} dx + c_2$$

$$= c_1 x + c_2$$

$$\Rightarrow y = (c_1 x + c_2) e^{\alpha x}$$

جو کہ اس صورت میں (i) کا عام حل ہے، جہاں کہ c_1 اور c_2 دو اختیاری مستقل ہیں۔ لہذا دوبار آنے والے ایک ریشے کے ہونے پر ہمیں ایسا حل ملتا ہے جس میں دو اختیاری مستقل ہوتے ہیں۔

عام طور پر اسی طرح سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ اگر ایک ریشہ α ایسا ہو جو r بار آتا ہو تو حل

$$(c_1 x^{r-1} + c_2 x^{r-2} + \dots + c_{r-1} x + c_r) e^{\alpha x}$$

ہوگا جس میں r اختیاری مستقل ہیں۔
نوٹ: اگر مساوات

$$f(D) = 0$$

کے ضربیہ حقیقی (real) ہوں تو اس کے ریشے (roots) یا تو حقیقی ہوں گے یا جوڑے وار (pairs) زوجی خیالی (conjugate imaginary) ہوں گے۔

$$f(D) y = 0.$$

کا حل اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس میں خیالی مقداریں نہ ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے آیلر کے مسئلے (Euler's Theorem) کا استعمال کرتے ہیں جس کے مطابق

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

مان لیجیے $\alpha + i\beta$ اور $\alpha - i\beta$ مساوات $f(D) = 0$ کی جو زوجی خیالی ریشے ہیں تب ان سے متعلق حل کا حصہ یہ ہوگا:-

$$c_1 e^{(\alpha + i\beta)x} + c_2 e^{(\alpha - i\beta)x}$$

$$= e^{\alpha x} [c_1 e^{i\beta x} + c_2 e^{-i\beta x}]$$

$$= e^{\alpha x} [c_1 (\cos \beta x + i \sin \beta x) + c_2 (\cos \beta x - i \sin \beta x)]$$

$$= e^{\alpha x} [(c_1 + c_2) \cos \beta x + i (c_1 - c_2) \sin \beta x]$$

$$= e^{\alpha x} (p_1 \cos \beta x + p_2 \sin \beta x),$$

جہاں کہ ہم نے $c_1 + c_2 = p_1$ اور $i(c_1 - c_2) = p_2$ لکھا ہے۔

اسی طرح یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ اگر $\alpha + i\beta$ اور $\alpha - i\beta$ زوجی خیالی ریشے ہوں تو بار آئی ہوں تو ان سے متعلق حل کا حصہ

$$e^{\alpha x} [(p_1 + p_2 x + \dots + p_{r-1} x^{r-1}) \cos \beta x + (q_1 + q_2 x + \dots + q_{r-1} x^{r-1}) \sin \beta x].$$

مثالیں

1۔ حل کیجئے

$$(i) \frac{d^2y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = 0, \quad (ii) 4 \frac{d^2y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$(iii) 2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} + 4y = 0.$$

(i) ہم پاتے ہیں

$$(D^2 - 5D + 6)y = 0$$

چونکہ $D^2 - 5D + 6 = 0$ کے ریشے 2 اور 3 حقیقی ہیں، اس لیے عام حل

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} \text{ ہے۔}$$

(ii) ہم پاتے ہیں

$$(4D^2 + 4D + 1)y = 0$$

چونکہ $4D^2 + 4D + 1 = 0$ کے دونوں ریشے $-\frac{1}{2}$ کے برابر ہیں، اس لیے عام حل

$$y = (c_1 x + c_2) e^{-x/2} \text{ ہے۔}$$

(iii) ہم پاتے ہیں

$$(2D^2 + 3D + 4)y = 0$$

چونکہ $2D^2 + 3D + 4 = 0$ کے ریشے $[-3 \pm i\sqrt{23}]$ ہیں، یعنی

$$-\frac{3}{4} \pm i \frac{\sqrt{23}}{4}$$

اس لیے عام حل

$$e^{-3x/4} \left[c_1 \cos \frac{\sqrt{23}}{4} x + c_2 \sin \frac{\sqrt{23}}{4} x \right]$$

ہے، جہاں c_1, c_2 اختیاری مستقل ہیں۔

2. تفرقی مساوات

$$\frac{d^4 y}{dx^4} - 2 \frac{d^3 y}{dx^3} + 5 \frac{d^2 y}{dx^2} - 8 \frac{dy}{dx} + 4y = 0$$

حل کیجیے
ہم پاتے ہیں

$$(D^4 - 2D^3 + 5D^2 - 8D + 4)y = 0$$

اب

$$D^4 - 2D^3 + 5D^2 - 8D + 4 = (D - 1)^2 (D^2 + 4)$$

اس لیے مساوات $D^4 - 2D^3 + 5D^2 - 8D + 4 = 0$ کے ریشے

$$1, 1, 2i, -2i;$$

ہیں۔ اس میں ریشہ 1 دو بار آیا ہے۔ لہذا حل

$$y = (c_1 + c_2 x) e^x + (c_3 \cos 2x + c_4 \sin 2x)$$

3. حل کیجیے

$$(D^3 + 1)y = 0$$

ہم پاتے ہیں

$$D^3 + 1 = (D + 1)(D^2 - D + 1)$$

لہذا مساوات $D^3 + 1 = 0$ کے ریشے وہ ہیں جو $D + 1 = 0$ اور $D^2 - D + 1 = 0$

کے ریشے ہیں۔ اس طرح، ریشے

$$-1, \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}i}{2}$$

$$\therefore y = c_1 e^{-x} + e^{x/2} \left(c_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + c_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right)$$

تکلی احصاء

مشقیں

ذیل تفرنی مساواتیں حل کیجیے:-

$$(D^3 + D + 1)y = 0 \quad 2 \quad \frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 0 \quad 1$$

$$(D^2 + 7D + 10)y = 0 \quad 4 \quad (9D^2 + 12D + 4)y = 0 \quad 3$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} + 13y = 0 \quad 6. \quad \frac{d^2y}{dx^2} + a^2y = 0 \quad 5$$

$$16 \frac{d^2y}{dx^2} + 24 \frac{dy}{dx} + 9y = 0 \quad 8 \quad (8D^2 - 6D - 5)y = 0 \quad 7$$

$$(D^3 + 3D^2 + 3D + 1)y = 0 \quad 10 \quad \frac{d^4y}{dx^4} - y = 0 \quad 9$$

11. y کی وہ قیمت معلوم کیجیے جو مساوات

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} - 12y = 0$$

کو مطمئن کرے جبکہ یہ دیا ہوا ہے کہ $x = 0$ پر $y = 0$ اور $dy/dx = 1$ ہے۔

12. مساوات

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 5y = 0$$

حل کیجیے جبکہ یہ دیا ہوا ہے کہ $x = 0$ پر $y = 1$ اور $dy/dx = 2$ ہے۔

13. مساوات

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \mu x = 0, \mu > 0$$

حل کیجیے جبکہ یہ دیا ہوا ہے کہ $t = \pi/\sqrt{\mu}$ پر $x = a$ اور $dx/dt = 0$ ہے۔

جوابات

1. $y = ae^x + be^{2x}$
2. $y = e^{-\frac{x}{2}} (a \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + b \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x)$
3. $y = (a + bx)e^{-2x/3}$
4. $y = ae^{-5x} + be^{-2x}$
5. $y = c_1 \cos ax + c_2 \sin ax$
6. $y = (a \cos 3x + b \sin 3x)e^{-2x}$
7. $y = ae^{-\frac{x}{2}} + be^{3x/4}$
8. $y = (a + bx)e^{-3x/4}$
9. $y = ae^x + be^{-x} + c \cos x + d \sin x$
10. $y = (a + bx + cx^2)e^{-x}$
11. $y = -\frac{1}{2}e^{-3x} + \frac{1}{2}e^{2x}$
12. $y = e^{2x} \cos x$
13. $x = -a \cos \sqrt{\mu}t$

14.6 - معکوس عامل (Inverse operators)

عامل $\frac{1}{D-\alpha}$ جہاں x کوئی مستقل ہے۔
تعریف: اگر x کا کوئی تفاعل، تو

$$\frac{1}{D-\alpha} x$$

وہ تفاعل ظاہر کرتا ہے جس پر $(D-\alpha)$ کے عمل سے تفاعل x حاصل ہو۔

اس طرح $\frac{1}{D} x$ ، x کے مکمل کو ظاہر کرتا ہے۔

$$\frac{1}{D-\alpha} x$$

ہم لکھتے ہیں

$$y = \frac{1}{D-\alpha} x$$

تعریف سے ہی، y ایسا تفاعل ہے کہ $(D-\alpha)$ کے اس پر عمل کرنے پر نتیجہ x ہو

یعنی

$$(D-\alpha)y=X$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} - \alpha y = X$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے۔

دونوں طرف تکملی جزو $e^{-\alpha x}$ سے ضرب کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ حل یہ ہے۔

$$ye^{-\alpha x} = \int Xe^{-\alpha x} dx + c$$

جس سے کہ

$$y = e^{\alpha x} \left\{ \int Xe^{-\alpha x} dx + c \right\}$$

$$\therefore y = D^{-1}_{-\alpha} X = e^{\alpha x} \left\{ \int Xe^{-\alpha x} dx + c \right\}$$

اگر $\frac{1}{D-\alpha} X$ کی کوئی ایک قیمت درکار ہوتی ہے تو ہم مستقل c نظر انداز کرتے ہیں اور لکھتے ہیں

$$\frac{1}{D-\alpha} X = e^{\alpha x} \int Xe^{-\alpha x} dx$$

علامت $\frac{1}{(D-\beta)(D-\alpha)} X$ کا مطلب یہ ہے کہ $D^{-1}_{-\beta}$ کو $D^{-1}_{-\alpha} X$ پر عمل کرنا ہے۔

مان لیجئے کہ

$$y = \frac{1}{(D-\beta)(D-\alpha)} X$$

تب تعریف سے ہی

$$(D-\beta)y = \frac{1}{D-\alpha} X$$

پھر تعریف سے ہی

$$(D-\alpha)(D-\beta)y = X$$

لہذا علامت $\frac{1}{(D-\beta)(D-\alpha)} X$ کی وہ قیمت ظاہر کرتی ہے جو کہ تفسر فی مساوات $(D-\alpha)(D-\beta)y = X$ کو مطمئن کرے۔

مثالیں

ذیل کی صرف مخصوص قیمتیں حاصل کیجیے :-

$$(i) \frac{1}{D} x^3, \quad (ii) \frac{1}{D^2} x^4, \quad (iii) \frac{1}{D-2} \sin x.$$

$$(iv) \frac{1}{(D-2)(D-3)} e^{2x}.$$

$$(i) \frac{1}{D} x^3 = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4}.$$

$$(ii) \frac{1}{D^2} x^4 = \frac{1}{D} \cdot \frac{1}{D} x^4 = \int \left[\int x^4 dx \right] dx = \int \frac{x^5}{5} dx = \frac{x^6}{30}$$

$$\begin{aligned} (iii) \frac{1}{D-2} \sin x &= e^{2x} \int e^{-2x} \sin x dx \\ &= e^{2x} \frac{e^{-2x}}{\sqrt{5}} \sin \left(x + \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sin \left(x + \tan^{-1} \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

$$(iv) \frac{1}{D-3} e^{2x} = e^{2x} \int e^{-2x} \cdot e^{2x} dx = -e^{2x}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{D-2} \cdot \left(\frac{1}{D-3} e^{2x} \right) &= \frac{1}{D-2} (-e^{2x}) \\ &= e^{2x} \int e^{-2x} (-e^{2x}) dx = e^{2x} \int -1 \cdot dx = -x e^{2x} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{(D-2)(D-3)} e^{2x} = -x e^{2x}.$$

مشقیں

ذیل کی صرف مخصوص قیمتیں حاصل کیجیے۔

$$(i) \frac{1}{D^3} e^{-x};$$

$$(ii) \frac{1}{(D+1)(D-1)} \cos x,$$

$$(iii) \frac{1}{D+2} (x + e^x),$$

$$(iv) \frac{1}{(D+1)(D-1)} e^{2x},$$

$$(v) \frac{1}{D+2} x^2,$$

$$(vi) \frac{1}{(D+3)(D-3)} (\sin 2x + 2e^{2x}).$$

جوابات

$$(i) e^{-x}.$$

$$(ii) -\frac{1}{2} \cos x.$$

$$(iii) -\frac{x}{2} - 1/16 - \frac{1}{2} e^{2x}.$$

$$(iv) \frac{1}{2} x^2 e^{2x}.$$

$$(v) \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2}.$$

$$(vi) -\frac{1}{16} \sin 2x + \frac{1}{2} x e^{2x}.$$

$$(1) \dots \dots \dots f(D) y = X \text{ مساوات 14.7}$$

کا مخصوص تکملہ (particular integral) حاصل کرنا

تعریف کے مطابق

$$(2) \dots \dots \dots \frac{1}{f(D)} X$$

ایسا تفاعل ہے جس پر $f(D)$ کے اعمال سے تفاعل x ملے، لہذا علامت (2) سے تفرقی مساوات (1) کا حل ظاہر ہوتا ہے۔

مان لیجیے

$$f(D) = (D - m_1)(D - m_2) \dots (D - m_n).$$

اس لیے مخصوص تکملہ

$$= \frac{1}{f(D)} X = \frac{1}{(D-m_1)(D-m_2)\dots(D-m_n)} X$$

$$= \frac{1}{(D-m_1)(D-m_2)\dots(D-m_{n-1})} e^{m_n x} \int X e^{-m_n x} dx.$$

ہم لکھتے ہیں

$$X' = e^{m_n x} \int X e^{-m_n x} dx$$

اس لیے مخصوص تکملہ

$$= \frac{1}{(D-m_1)(D-m_2)\dots(D-m_{n-1})} X'$$

$$= \frac{1}{(D-m_1)(D-m_2)\dots(D-m_{n-1})} e^{m_{n-1} x} \int X' e^{-m_{n-1} x} dx$$

اسی طرح سے بڑھتے پر کچھ ہی مرتبہ بعد ہمیں درکار مخصوص تکملہ مل جائے گا۔
دوسرا طریقہ: جزوی کسر (partial fractions) میں توڑنے پر ہم پاتے ہیں۔

$$\frac{1}{f(D)} = \frac{1}{(D-m_1)(D-m_2)\dots(D-m_n)}$$

$$= \frac{A_1}{D-m_1} + \frac{A_2}{D-m_2} + \dots + \frac{A_n}{D-m_n}$$

اس لیے مخصوص تکملہ

$$= A_1 e^{m_1 x} \int X e^{-m_1 x} dx + A_2 e^{m_2 x} \int X e^{-m_2 x} dx + \dots$$

$$+ \dots + A_n e^{-m_n x} \int X e^{-m_n x} dx.$$

نوٹ 1: یہ نہایت ہی عام طریقہ ہے جو کسی بھی صورت میں مخصوص تکملہ نکالنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگلے سیکشنوں میں تفاعل X کی شکل (form) پر منحصر چھوٹے طریقے

بھی بتائے جائیں گے۔

نوٹ 2: چونکہ ہمیں صرف ایک مخصوص تکملہ درکار ہوتا ہے، اس لیے تکمل کرتے وقت اختیاری مستقل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مثالیں

1- مساوات

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} + 2y = e^{2x}$$

حل کیجیے
اسے یوں لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 3D + 2)y = e^{2x}$$

چونکہ $D^2 - 3D + 2 = 0$ کے ریشے 1 اور 2 ہیں، اس لیے تمناؤں فکشن

$$c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

ہے۔
خصوصی تکملہ نکالنے کے لیے ہمیں

$$\frac{1}{(D-2)(D-1)} e^{2x}.$$

حاصل کرنا ہے۔ اب

$$\frac{1}{(D-1)} e^{2x} = e^x \int e^{-x} \cdot e^{2x} dx = e^{2x}$$

$$\frac{1}{D-2} \frac{1}{D-1} e^{2x} = \frac{1}{D-2} e^{2x}$$

پھر

$$= e^{2x} \int e^{-2x} \cdot e^{2x} dx = x e^{2x}$$

اس لیے

خطی مساواتیں

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + x e^{2x},$$

عام حل ہے۔

2. تفرقی مساوات

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = \sec 3x$$

حل کیجیے۔

ہم پاتے ہیں

$$(D^2 + 9)y = \sec 3x$$

چونکہ $D^2 + 9 = 0$ کے ریشے $\pm 3i$ ہیں، اس لیے تمامی تفاعل

$$= a_1 \cos 3x + a_2 \sin 3x$$

پھر مخصوص مکمل

$$= \frac{1}{D^2 + 9} \sec 3x$$

$$= \frac{1}{(D+3i)(D-3i)} \sec 3x,$$

$$= \frac{1}{6i} \left(\frac{1}{D-3i} - \frac{1}{D+3i} \right) \sec 3x$$

$$= \frac{1}{6i} \left[\frac{1}{D-3i} \sec 3x - \frac{1}{D+3i} \sec 3x \right]$$

$$= \frac{1}{6i} \left[e^{3ix} \int e^{-3ix} \sec 3x dx - e^{-3ix} \int e^{3ix} \sec 3x dx \right]$$

اب

$$\int e^{-3ix} \sec 3x dx = \int (\cos 3x - i \sin 3x) \sec 3x dx$$

$$= \int (1 - i \tan 3x) dx = x + \frac{i}{3} \log \cos 3x$$

ساتھ ہی

$$\int e^{3ix} \sec 3x \, dx = \int (\cos 3x + i \sin 3x) \sec 3x \, dx$$

$$= \int (1 + i \tan 3x) \, dx = x - \frac{i}{3} \log \cos 3x$$

اس لیے مخصوص تکملہ

$$= \frac{1}{6i} \left[e^{3ix} \left(x + \frac{i}{3} \log \cos 3x \right) - e^{-3ix} \left(x - \frac{i}{3} \log \cos 3x \right) \right]$$

$$= \frac{1}{6i} \left[(\cos 3x + i \sin 3x) \left(x + \frac{i}{3} \log \cos 3x \right) - (\cos 3x - i \sin 3x) \left(x - \frac{i}{3} \log \cos 3x \right) \right]$$

$$= \frac{1}{6i} \left[2ix \sin 3x + \frac{2i}{3} \cos 3x \log \cos 3x \right]$$

$$= \frac{x}{3} \sin 3x + \frac{\cos 3x}{9} \log \cos 3x$$

$$\therefore y = a_1 \cos 3x + a_2 \sin 3x + \frac{x}{3} \sin 3x + \frac{\cos 3x}{9} \log \cos 3x$$

مشقیں

ذیل مساواتیں حل کیجیے۔

$$1. \quad 9 \frac{d^3 y}{dx^3} - y = e^{-x}.$$

$$2. \quad \frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{dy}{dx} - 2y = 2x.$$

$$3. \quad (D^2 - 2D + 1)y = x^2 - 1.$$

$$4. \quad (6D^2 - D - 2)y = xe^{-x}$$

$$5. \quad (D^2 + 4)y = \tan 2x.$$

$$6. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + a^2 y = \sec ax.$$

جوابات

$$1. \quad y = ae^{-x/3} + be^{x/3} + \frac{1}{8}e^{-x}.$$

$$2. \quad y = ae^{-2x} + be^x - (x + \frac{1}{2}).$$

$$3. \quad y = (a + bx)e^x + (x^2 + 4x + 5).$$

$$4. \quad y = ae^{2x/3} + be^{-x/2} + \frac{1}{8}(12/5 + x)e^{-x}.$$

$$5. y = a \cos 2x + b \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x \log \tan \left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

$$6. y = a_1 \cos ax + a_2 \sin ax + \frac{1}{a} x \sin ax + \frac{1}{a^2} \cos ax \log \cos ax.$$

14-81۔ مخصوص مکملہ نکالنے کا عملی اصول؛ جبکہ تفاعل $x e^{mx}$ جیسا ہو

ہمیں y کی ایک مخصوص قیمت نکالنا ہے جو تفرقی مساوات

$$f(D) y = e^{mx}$$

کو مطمئن کرے، یعنی ہمیں علامت

$$\frac{1}{f(D)} e^{mx}$$

کی قیمت حاصل کرنا ہے، جہاں کہ

$$f(D) \equiv D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n.$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$D^r e^{mx} = m^r e^{mx}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(D) e^{mx} &= (D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n) e^{mx} \\ &= D^n e^{mx} + a_1 D^{n-1} e^{mx} + a_2 D^{n-2} e^{mx} + \dots \\ &\quad + a_{n-1} D e^{mx} + a_n e^{mx} \\ &= m^n e^{mx} + a_1 m^{n-1} e^{mx} + a_2 m^{n-2} e^{mx} + \dots \\ &\quad + a_{n-1} m e^{mx} + a_n e^{mx} \\ &= (m^n + a_1 m^{n-1} + a_2 m^{n-2} + \dots + a_{n-1} m + a_n) e^{mx} \\ &= f(m) e^{mx}. \end{aligned}$$

لہذا، ہم نے دیکھا کہ

$$f(D) e^{mx} = f(m) e^{mx}$$

(i) مان لیجیے

$$f(m) \neq 0$$

اب دونوں طرف $1/f(D)$ سے مل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$e^{mx} = \frac{1}{f(D)} f(m) e^{mx} = f(m) \frac{1}{f(D)} e^{mx}$$

چونکہ $f(m) \neq 0$ ہے، اس لیے $f(m)$ سے تقسیم کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{f(m)} e^{mx} = \frac{1}{f(D)} e^{mx}$$

(H) اب مان لیجیے $f(m) = 0$ جس سے کہ m مساوات $f(D) = 0$ کا ریشہ ہے۔ مان لیجیے m ایسا ریشہ جو r بار آتا ہے۔ تو $(D-m)^r$ ، $f(D)$ کا ایک جز ہوگا۔

$$f(D) = (D-m)^r \varphi(D),$$

جہاں کہ $\varphi(m) \neq 0$ ۔

$$\frac{1}{f(D)} e^{mx} = \frac{1}{(D-m)^r \varphi(D)} e^{mx} = \frac{1}{(D-m)^r} \cdot \frac{1}{\varphi(D)} e^{mx}$$

جیسے کہ (i) میں ثابت کیا جا چکا ہے، ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{\varphi(D)} e^{mx} = \frac{1}{\varphi(m)} e^{mx} \quad (\varphi(m) \neq 0, \text{ کیونکہ})$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{f(D)} e^{mx} &= \frac{1}{(D-m)^r} \frac{1}{\varphi(m)} e^{mx} \\ &= \frac{1}{\varphi(m)} \frac{1}{(D-m)^r} e^{mx}. \end{aligned}$$

اب

$$\frac{1}{D-m} e^{mx} = e^{mx} \int e^{-mx} \cdot e^{mx} dx = x e^{mx}$$

$$\frac{1}{(D-m)^2} e^{mx} = \frac{1}{D-m} \frac{1}{D-m} e^{mx}$$

$$= \frac{1}{D-m} x e^{mx}$$

$$= e^{mx} \int e^{-mx} x e^{mx} dx = \frac{x^2}{2} e^{mx}.$$

خطی مساواتیں

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(D-m)^3} e^{mx} &= \frac{1}{D-m} \frac{1}{(D-m)^2} e^{mx} \\
&= \frac{1}{D-m} \frac{x^2}{2} e^{mx} \\
&= e^{mx} \int e^{-mx} \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^3}{3!} e^{mx}.
\end{aligned}$$

اس طرح سے چلنے پر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(D-m)^r} e^{mx} &= \frac{x^r}{r!} e^{mx}, \\
\therefore \frac{1}{f(D)} e^{mx} &= \frac{1}{\phi(m)} \frac{x^r}{r!} e^{mx},
\end{aligned}$$

$$f(D) = (D-m)^r \phi(D) \quad \text{جہاں کہ}$$

مثالیں

حل کیجیے

$$1. \quad 4 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} - 3y = e^{2x}.$$

$$2. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} + 3y = e^{-3x}.$$

$$3. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + 6 \frac{dy}{dx} + 9y = 2e^{-3x}.$$

1۔ ہم پاتے ہیں

$$(4D^2 + 4D - 3)y = e^{2x}$$

اب $4D^2 + 4D - 3 = 0$ کے ریشے $\frac{1}{2}$ اور $-\frac{3}{2}$ ہیں۔ اس لیے عمومی تفاعل

$$= c_1 e^{x/2} + c_2 e^{-3x/2}$$

$$= \frac{1}{4D^2 + 4D - 3} e^{2x} = \frac{1}{4(2)^2 + 4(2) - 3} e^{2x} = \frac{e^{2x}}{21} \quad \text{خصوصی تکرار}$$

اس لیے حل
ہم پاتے ہیں

$$y = c_1 e^{x/2} + c_2 e^{-3x/2} + \frac{1}{5} e^{3x}$$

$$(D^2 + 4D + 3)y = e^{-2x}$$

اب $D^2 + 4D + 3 = 0$ کے ریشے -1 اور -3 ہیں۔
اس لیے تمامی تفاعل

$$= c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x}$$

خصوصی تکملہ

$$= \frac{1}{D^2 + 4D + 3} e^{-2x}$$

اب $D = -3$, $D^2 + 4D + 3$ پر صفر ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم لکھتے ہیں
خصوصی تکملہ

$$= \frac{1}{(D+3)(D+1)} e^{-2x} = \frac{1}{D+3} \cdot \frac{1}{(-3+1)} e^{-2x}$$

$$= \frac{1}{D+3} \cdot \frac{1}{-2} e^{-2x} = -\frac{x}{2} e^{-2x}$$

اس لیے

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x} - \frac{1}{2} x e^{-2x}$$

عام حل ہے۔

3۔ ہم پاتے ہیں

$$(D^2 + 6D + 9)y = 2e^{-3x}$$

اب $D^2 + 6D + 9 = 0$ کے دونوں ریشے -3 ہی ہیں۔ اس لیے تمامی تفاعل

$$= (c_1 x + c_2) e^{-3x}$$

خصوصی تکملہ

$$= \frac{1}{D^2 + 6D + 9} \cdot 2e^{-3x} = \frac{1}{(D+3)^2} \cdot 2e^{-3x}$$

$$= 2. \frac{1}{(D+3)^2} e^{-3x} = 2. \frac{1}{2} x^2 e^{-3x} = x^2 e^{-3x}$$

اس لیے $y = (c_1 x + c_2) e^{-3x} + x^2 e^{-3x}$ عام حل ہے۔

مشقیں

ذیل تفرقی مساواتیں حل کیجیے :-

1. $6 \frac{d^2 y}{dx^2} + 17 \frac{dy}{dx} + 12y = e^{-x}$ 2. $\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + y = e^{3x} + e^x$
3. $3 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} - y = e^{x/3} + 2e^{2x}$ 4. $(D^3 - 4)y = 3e^{3x} - 4e^{-2x}$
5. $\frac{d^2 y}{dx^2} - (a+b) \frac{dy}{dx} + aby = e^{ax} + e^{bx}$
6. $\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + y = e^{x/2} + e^{-x/2}$
7. $9 \frac{d^2 y}{dx^2} + 12 \frac{dy}{dx} + 4y = e^{-2x/3}$
8. $\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = e^{2x}$
9. $(3D^2 - 4D + 5)y = e^x - 2e^{2x} + 3e^{3x}$
10. $(D-3)^2 y = 2e^{3x} + e^{-x}$
11. $(D^2 - 2D + 1)y = (1 + e^{-x})^2$
12. $(D^2 + 5D + 6)y = e^{2x}$ (جبکہ $dy/dx = 0$ اور $y = 0$ پر $x = 0$)
13. $(D^2 - 7D + 6)y = 2e^{2x}$ (جبکہ $dy/dx = 0$ اور $y = 1$ پر $x = 0$)

جوابات

1. $y = ae^{-2x/3} + b e^{4x/3} + e^{-x}$
2. $y = (a \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + b \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x) e^{x/2} + e^x + \frac{e^{3x}}{4}$

3. $y = ae^{x/3} + be^{-x} + \frac{4}{9}e^{x/3} + \frac{1}{18}e^{2x}$. 4. $y = ae^{2x} + be^{-2x} + \frac{3}{4}xe^{2x} + xe^{-2x}$.
5. $y = c_1e^{ax} + c_2e^{bx} + \frac{x}{a-b}(e^{ax} - e^{bx})$. 6. $y = (a+bx)e^{-x} + e^{x/3} + 4e^{-x/3}$.
7. $y = (a+bx)e^{-2x/3} + \frac{1}{18}x^2e^{-2x/3}$. 8. $y = ae^x + be^{2x} + ce^{-2x} + \frac{x}{2}e^{3x}$.
9. $y = e^{2x/3} \left(a \cos \frac{\sqrt{11}}{3}x + b \sin \frac{\sqrt{11}}{3}x \right) + \frac{1}{4}e^x - \frac{2}{9}e^{2x} - \frac{3}{20}e^{3x}$.
10. $y = (a+bx)e^{2x} + \frac{1}{8}e^{-x} + x^2e^{2x}$. 11. $y = (a+bx)e^x + 1 + \frac{1}{8}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{-x}$.
12. $y = \frac{3}{8}e^{-3x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + \frac{3}{8}e^{2x}$. 13. $y = \frac{3}{8}e^x - \frac{1}{8}e^{4x} - \frac{1}{4}e^{2x}$.

14-82 مخصوص مکملہ حاصل کرنا جبکہ x کی شکل $\cos mx$ یا $\sin mx$ جیسی ہو یہاں ہیں y کی ایک مخصوص قیمت نکالنا ہے جو کہ تفرقی مساوات

$$f(D)y = \sin mx$$

کو مطمئن کرے، اس طرح ہمیں ذیل حاصل کرنا ہے :-

$$\frac{1}{f(D)} \sin mx.$$

پہلے ہم اس صورت پر غور کرتے ہیں جبکہ $f(D)$ میں D کی صرف جفت قوتیں ہوں، یعنی وہ D^2 کا قاعاں ہو۔ مان لیجیے

$$f(D) = \phi(D^2) = (D^2)^n + a_1(D^2)^{n-1} + a_2(D^2)^{n-2} + \dots + a_{n-1}D^2 + a_n$$

ہم پاتے ہیں

$$D \sin mx = m \cos mx$$

$$D^2 \sin mx = (-m^2) \sin mx$$

$$D^4 \sin mx = (-m^2)^2 \sin mx$$

$$D^6 \sin mx = (-m^2)^3 \sin mx$$

وغیرہ

ان کی بدد سے ہم بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\varphi(D^2) \sin mx = \varphi(-m^2) \sin mx$$

مان لیجیے، $\varphi(-m^2) \neq 0$ ، اب دونوں طرف $1/\varphi(D^2)$ سے عمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \sin mx &= \frac{1}{\varphi(D^2)} \varphi(-m^2) \sin mx \\ &= \varphi(-m^2) \frac{1}{\varphi(D^2)} \sin mx. \end{aligned}$$

چونکہ $\varphi(-m^2) \neq 0$ صفر نہیں ہے، اس لیے اس سے تقسیم کرنے پر ملتا ہے

$$\frac{1}{\varphi(-m^2)} \sin mx = \frac{1}{\varphi(D^2)} \sin mx$$

اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ

$$\frac{1}{\varphi(D^2)} \cos mx = \frac{1}{\varphi(-m^2)} \cos mx, \quad [\varphi(-m^2) \neq 0 \text{ اگر}]$$

جب $4(-m^2) = 0$ ہو تو یہ طریقہ نہیں لگ سکتا اور اب جو طریقہ لگانا ہوتا ہے وہ آگے مثال 2 میں بتایا گیا ہے

اب مان لیجیے کہ $f(D)$ میں D کی طاق قوتیں بھی ہیں۔ ایسی صورت میں $f(D)$ کو طاق اور جفت حصوں میں توڑنے پر ہم لکھ سکتے ہیں

$$f(D) = \varphi_1(D^2) + D\varphi_2(D^2)$$

ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(D)} \sin mx &= \frac{1}{\varphi_1(D^2) + D\varphi_2(D^2)} \sin mx \\ &= [\varphi_1(D^2) - D\varphi_2(D^2)] \frac{1}{[\varphi_1(D^2) + D\varphi_2(D^2)][\varphi_1(D^2) - D\varphi_2(D^2)]} \sin mx \\ &= [\varphi_1(D^2) - D\varphi_2(D^2)] \frac{1}{[\varphi_1(D^2)]^2 - D^2[\varphi_2(D^2)]^2} \sin mx \end{aligned}$$

$$= [\varphi_1(D^2) - D\varphi_2(D^2)] \frac{1}{[\varphi_1(-m^2)]^2 - (-m^2)[\varphi_2(-m^2)]^2} \sin mx$$

ہم لکھتے ہیں

$$[\varphi_1(-m^2)] = p, [\varphi_2(-m^2)] = q.$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{f(D)} \sin mx &= \frac{1}{p^2 + m^2 q^2} [\varphi_1(D^2) - D\varphi_2(D^2)] \sin mx \\ &= \frac{1}{p^2 + m^2 q^2} [\varphi_1(-m^2) - D\varphi_2(-m^2)] \sin mx \\ &= \frac{1}{p^2 + m^2 q^2} [\varphi_1(-m^2) \sin mx - m \varphi_2(-m^2) \cos mx] \\ &= \frac{p \sin mx - mq \cos mx}{p^2 + m^2 q^2} \end{aligned}$$

نیچے دیے ہوئے چھوٹے طریقے کی دلیل (justification) اوپر حاصل شدہ نتیجے سے

ملتی ہے ہم لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(D)} \sin mx &= \frac{1}{\varphi_1(D^2) + D\varphi_2(D^2)} \sin mx \\ &= \frac{1}{\varphi_1(-m^2) + D\varphi_2(-m^2)} \sin mx \\ &= \frac{1}{p + Dq} \sin mx \\ &= (p - Dq) \frac{1}{(p + Dq)(p - Dq)} \sin mx \\ &= (p - Dq) \frac{1}{p^2 - D^2 q^2} \sin mx \\ &= (p - Dq) \frac{1}{p^2 + m^2 q^2} \sin mx \\ &= \frac{1}{p^2 + m^2 q^2} (p - Dq) \sin mx \\ &= \frac{1}{p^2 + m^2 q^2} (p \sin mx - mq \cos mx) \end{aligned}$$

جو کہ وہی ہے جو کہ اوپر مل چکا ہے۔

اگر $x, \cos mx$ جیسا ہو تب بھی اسی طرح مخصوص مکملہ نکال سکتے ہیں

مثالیں

1. حل کیجیے

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = \sin 3x.$$

ہم پاتے ہیں

$$(D^2 - 5D + 6)y = \sin 3x$$

اب $D^2 - 5D + 6 = 0$ کے ریشے 2 اور 3 ہیں اور اس لیے تمامی تفاعل

$$c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$$

ہے۔ ساتھ ہی، مخصوص مکملہ

$$= \frac{1}{D^2 - 5D + 6} \sin 3x.$$

اب D کی جگہ -3 یعنی 9 - لکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$\text{مخصوص مکملہ} = \frac{1}{-9 - 5D + 6} \sin 3x$$

$$= \frac{1}{-3 - 5D} \sin 3x$$

$$= -(3 - 5D) \frac{1}{(3 - 5D)(3 + 5D)} \sin 3x$$

$$= -(3 - 5D) \frac{1}{9 - 25D^2} \sin 3x$$

$$= -(3 - 5D) \frac{1}{9 - 25(-9)} \sin 3x$$

$$= \frac{1}{234} (3 - 5D) \sin 3x$$

$$= -\frac{1}{234} (3 \sin 3x - 15 \cos 3x)$$

$$= -\frac{1}{78} (\sin 3x - 5 \cos 3x)$$

$$\therefore y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} - \frac{1}{78} (\sin 3x - 5 \cos 3x)$$

$$(D^2 + 4)y = \cos 2x \quad \text{2۔ حل کیجیے}$$

اب $D^2 + 4 = 0$ کے ریشے $2i$ اور $-2i$ ہیں، اس لیے

$$= c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x \quad \text{تمامی تفاعل}$$

ساتھ ہی

$$= \frac{1}{D^2 + 4} \cos 2x \quad \text{فصوص تکملہ}$$

چونکہ D^2 کی جگہ پر -2^2 یعنی -4 رکھنے پر $D^2 + 4$ صفر ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں § 14.82 میں بتایا گیا طریقہ نہیں لگ سکتا۔

اب جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے :-
حقیقی حصہ (real part) کا فصوص تکملہ

$$\frac{1}{D^2 + 4} e^{2ix}$$

اب $D = 2i$ رکھنے پر $D^2 + 4$ صفر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم لکھتے ہیں

$$D^2 + 4 = (D - 2i)(D + 2i)$$

$$\frac{1}{D^2 + 4} e^{2ix} = \frac{1}{(D - 2i)(D + 2i)} e^{2ix}$$

$$= \frac{1}{4i} \frac{1}{D - 2i} e^{2ix}$$

$$= \frac{1}{4i} x e^{2ix}$$

خطی مساواتیں

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{4}ix (\cos 2x + i \sin 2x) \\
&= \frac{1}{4}x \sin 2x - i \cdot \frac{1}{4}x \cos 2x \\
y &= c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + \frac{1}{4}x \sin 2x
\end{aligned}$$

3۔ حل کیجیے

$$(D^3 + 1)y = \cos 2x$$

یہ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ تمامی تفاعل

$$= c_1 e^{-x} + e^{\frac{x}{2}} \left(c_2 \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + c_3 \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)$$

ساتھ ہی

خصوصی تاملہ

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{D^3 + 1} \cos 2x \\
&= \frac{1}{D \cdot D^2 + 1} \cos 2x \\
&= \frac{1}{D(-2^2) + 1} \cos 2x \\
&= \frac{1}{1 - 4D} \cos 2x \\
&= (1 + 4D) \frac{1}{(1 + 4D)(1 - 4D)} \cos 2x \\
&= (1 + 4D) \frac{1}{1 - 16D^2} \cos 2x \\
&= (1 + 4D) \frac{1}{1 - 16(-4)} \cos 2x \\
&= \frac{1}{88} (1 + 4D) \cos 2x = \frac{1}{88} (\cos 2x - 8 \sin 2x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore y &= c_1 e^{-x} + e^{x/2} \left(c_2 \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + c_3 \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right) \\
&\quad + \frac{1}{88} (\cos 2x - 8 \sin 2x).
\end{aligned}$$

مشقیں

ذیل تفرقی مساواتیں حل کیجیے۔

1. $\frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = \cos 2x.$
2. $(D^2 + 4D - 3)y = 2 \sin 3x.$
3. $\frac{d^2y}{dx^2} + a^2y = \sin ax.$
4. $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = \cos 3x + \sin 3x.$
5. $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = e^x - \cos 2x.$
6. $\frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + y = 2 \sin 3x.$
7. $2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 4y = 3 \cos \frac{x}{2}$
8. $(D^2 - 8D + 9)y = 40 \sin 5x.$
9. $(4D^2 + 16D - 9)y = 4e^{x/2} + 3 \sin \frac{1}{2}x.$
10. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = \cos^2 x.$
11. $(D^2 + D + 1)y = (1 + \sin x)^2.$
12. $(D^4 - 2D^2 + 1)y = \cos x.$
13. $(D^3 + D^2 + D + 1)y = \sin 2x.$
14. Solve $\frac{d^2y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + 10y + 37 \sin 3x = 0$

اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر y معلوم کیجیے جبکہ یہ دیا ہوا ہو کہ $x=0$ پر $y = 3$ اور $dy/dx = 0$

جوابات

1. $y = ae^{2x} + be^x - \frac{1}{20} \cos 2x - \frac{3}{20} \sin 2x.$
2. $y = ae^{(-2+\sqrt{7})x} + be^{(-2-\sqrt{7})x} - \frac{1}{12} (\cos 3x + \sin 3x).$
3. $y = c_1 \cos ax + c_2 \sin ax - \frac{x \cos ax}{2a}.$
4. $y = a \cos 2x + b \sin 2x - \frac{1}{8} (\cos 3x + \sin 3x).$
5. $y = a \cos 3x + b \sin 3x + \frac{1}{10} e^x - \frac{1}{8} \cos 2x.$

$$6. y = ae^{\frac{3+\sqrt{5}}{2}x} + be^{\frac{3-\sqrt{5}}{2}x} + \frac{18}{145}\cos 3x - \frac{16}{145}\sin 3x.$$

$$7. y = \left(a \cos \frac{\sqrt{23}}{4}x + b \sin \frac{\sqrt{23}}{4}x \right) e^{3x/4} + \frac{3}{8} \left(7 \cos \frac{x}{2} - 3 \sin \frac{x}{2} \right)$$

$$8. y = ae^{(4+\sqrt{7})x} + be^{(4-\sqrt{7})x} + \frac{5}{8} (5 \cos 5x - 2 \sin 5x).$$

$$9. y = ae^{x/2} + be^{-x/2} + \frac{1}{8}xe^{x/2} - \frac{48}{1625} \left(4 \cos \frac{x}{4} + \frac{37}{4} \sin \frac{x}{4} \right)$$

$$10. y = ae^{2x} + be^{-2x} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \cos 2x \right).$$

$$11. y = \left(a \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + b \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) e^{-x/2} + \frac{3}{2} + \frac{1}{26} (3 \cos 2x - 2 \sin 2x) - 2 \cos x.$$

$$12. y = (a+bx)e^x + (c+dx)e^{-x} + \frac{1}{2} \cos x.$$

$$13. v = a \cos x + b \sin x + ce^{-x} + \frac{1}{x^2} (2 \cos 2x - \sin 2x).$$

$$14. y = e^{-x} (a \cos 3x + b \sin 3x) + 6 \cos 3x - \sin 3x. \quad y = 1.$$

14.83۔ مخصوص تکملہ حاصل کرنا جبکہ x کی شکل x^m جیسی ہو، جہاں کہ m

مثبت کامل عدد ہے

یہاں ہمیں

$$\frac{1}{f(D)} x^m$$

حاصل کرنا ہے۔

عام طریقہ یہ ہے کہ D کو ایک نمبر تصور کرتے ہوئے $f(D)$ کو D کی صعودی (ascending) کامل عدد قوتوں (integral powers) میں کھولا جائے اور پھر ہر رکن x^m پر عمل کرے اور ان اعمال سے حاصل نتائج کا جوڑ درکار قیمت ہوگی۔ چونکہ x^m کی $(m+1)$ واں اور اس سے بڑے تفرقی سر صفر ہیں اس لیے یہ کافی ہے کہ $f(D)$ کو D کی صعودی قوتوں میں صرف m دیں قوت تک کھولا جائے۔ اس طرح سے کھولنے کی توجیہ (justification) نیچے دیے میا ختے (discussion) سے واضح ہو جائے گی۔

§ 14.7 کی طرح $1/f(D)$ کو جزوی کسروں میں توڑنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{f(D)} = \frac{A_1}{D - \alpha_1} + \frac{A_2}{D - \alpha_2} + \dots + \frac{A_n}{D - \alpha_n}$$

اب D کو ایک نمبر تصور کرتے ہوئے $1/(D - \alpha_1)$ کو یوں کھولتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{1}{D - \alpha_1} &= -\frac{1}{\alpha_1} \left(1 - \frac{D}{\alpha_1} \right)^{-1} \\ &= -\frac{1}{\alpha_1} \left(1 + \frac{D}{\alpha_1} + \frac{D^2}{\alpha_1^2} + \frac{D^3}{\alpha_1^3} + \dots \right) \end{aligned}$$

اب D کو عامل لینے پر بھی اس رشتے کے صحیح ہونے کی دلیل دینی ہے، یعنی یہ ثابت کرنا ہے کہ

$$\frac{1}{D - \alpha_1} X = -\frac{1}{\alpha_1} \left(1 + \frac{D}{\alpha_1} + \frac{D^2}{\alpha_1^2} + \frac{D^3}{\alpha_1^3} + \dots \right) X.$$

جہاں کہ X کا تفاعل ہے معکوس عامل (inverse operator) کی تعریف کے مطابق ایسا تبھی ہوگا جبکہ

$$(D - \alpha_1) \left[-\frac{1}{\alpha_1} \left(1 + \frac{D}{\alpha_1} + \frac{D^2}{\alpha_1^2} + \dots \right) X \right] = X.$$

اور ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت (fact) ہے۔

اس طرح ہم نے دیکھا کہ $1/f(D)$ کی جزوی کسریں 'بہ دلیل' D کی صودی کامل عدد قوتوں کے ارقام میں کھولی جاسکتی ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ اگر خود $1/f(D)$ کو D کی صودی کامل عدد قوتوں کے ارقام میں کھولتے تو وہی ملتا جو جزوی کسروں کے اس طرح کھولنے پر اُن کا جوڑ ہوتا ہے۔

مثال

حل کیجیے

$$(D^3 + 2D^2 + 4D + 8)y = x^3$$

ہم پاتے ہیں

$$D^3 + 2D^2 + 4D + 8 = D^2(D+2) + 4(D+2) \\ = (D+2)(D^2 + 4)$$

اس لیے $D^3 + 2D^2 + 4D + 8 = 0$ کے ریشے $2i, -2i$ اور -2 ہیں۔
لہذا تمامی تفاعل

$$= c_1 e^{-2x} + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x$$

پھر، مخصوص تکملہ

$$= \frac{1}{D^3 + 2D^2 + 4D + 8} x^2$$

$$= \frac{1}{8} \left[1 + \frac{4D + 2D^2 + D^3}{8} \right]^{-1} x^2$$

$$= \frac{1}{8} [1 - \frac{1}{8}D + 0D^2 + \dots] x^2$$

$$= \frac{1}{8} [x^2 - x].$$

$$\therefore y = c_1 e^{-2x} + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x + \frac{1}{8} (x^2 - x).$$

مشقیں

حل کیجیے۔

1. $\frac{d^3 y}{dx^3} + 2 \frac{dy}{dx} + y = 2x + x^2$
2. $\frac{d^3 y}{dx^3} - \frac{d^2 y}{dx^2} - 6 \frac{dy}{dx} = 1 + x^2$
3. $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = x^2$
4. $(D^4 + D^3 + D^2 - D - 2) = x^2$

جوابات

1. $y = (a + bx) e^{-2x} + x^2 - 2x + 2$
2. $y = a + b e^{2x} + c e^{-2x} - \frac{1}{8} (\frac{3}{8} x^3 + \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{8} x)$

$$3. y = ae^{ax} + be^{-ax} - \frac{1}{2} (x^2 + \frac{1}{2}).$$

$$4. y = ae^{-x} + be^x + e^{-\frac{1}{2}x} (c \cos \frac{\sqrt{7}}{2} x + d \sin \frac{\sqrt{7}}{2} x) - (x^2 - x + \frac{1}{2})$$

14.9۔ اگلے دو سیکشنوں میں ہم وہ فارمولے حاصل کریں گے جو کہ مخصوص تکملہ نکالنے کے لیے اس وقت کارآمد ہوتے ہیں جبکہ تفرقی مساوات ذیل شکلوں میں ہو۔

$$f(D) y = e^{ax} V$$

$$f(D) y = xV$$

جہاں کہ x, V کا کوئی تفاعل ہے۔

14.91۔ یہ ثبات کرنا کہ

$$\frac{1}{f(D)} e^{ax} V = e^{ax} \frac{1}{f(D+a)} V$$

جہاں کہ x, V کا کوئی تفاعل ہے۔

پہلے ہم x کے کسی تفاعل V_1 پر غور کرتے ہیں جسے بعد میں V کے ارتام میں حاصل کریں گے۔
ہم پاتے ہیں

$$D(e^{ax} V_1) = e^{ax} DV_1 + ae^{ax} V_1$$

$$= e^{ax} (D+a) V_1$$

عام طور سے تفرقی حساب کے لینیئر کے مسئلے (Leibnitz's theorem) سے

$$D^r (e^{ax} V_1) = e^{ax} D^r V_1 + {}^r C_1 a e^{ax} D^{r-1} V_1 + {}^r C_2 a^2 e^{ax} D^{r-2} V_1$$

$$+ \dots + a^r e^{ax} V_1$$

$$= e^{ax} (D^r + {}^r C_1 a D^{r-1} + {}^r C_2 a^2 D^{r-2} + \dots + a^r) V_1$$

$$= e^{ax} (D+a)^r V_1$$

$$\begin{aligned}
 \therefore f(D) e^{ax} V_1 &= (D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_n) e^{ax} V_1 \\
 &= e^{ax} [(D+a)^n + a_1 (D+a)^{n-1} + \dots + a_n] V_1 \\
 &= e^{ax} f(D+a) V_1
 \end{aligned}$$

$$(1) \dots \therefore f(D) e^{ax} V_1 = e^{ax} f(D+a) V_1.$$

اب مان لیجیے کہ V_1 ذیل سے ملتا ہے :-

$$\begin{aligned}
 f(D+a) V_1 &= V \\
 (2) \dots \dots \dots V_1 &= \frac{1}{f(D+a)} V
 \end{aligned}$$

اب (1) اور (2) سے

$$f(D) e^{ax} \frac{1}{f(D+a)} V = e^{ax} V$$

دونوں طرف $\frac{1}{f(D)}$ سے عمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$e^{ax} \frac{1}{f(D+a)} V = \frac{1}{f(D)} e^{ax} V.$$

لہذا ہمیں درکار نتیجہ حاصل ہو گیا۔

مثال

حل کیجیے

$$\frac{d^3 y}{dx^3} - 2 \frac{dy}{dx} + 4y = e^x \cos x$$

ہم پاتے ہیں

$$(D^3 - 2D + 4) y = e^x \cos x$$

اب $D^3 - 2D + 4 = 0$ کے ریشے $1 \pm \sqrt{3}i$ ہیں، اس لیے تمامی تفاعل

$$= e^x (c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{D^2-2D+4} e^x \cos x \\
 &= e^x \frac{1}{(D+1)^2-2(D+1)+4} \cos x \\
 &= e^x \frac{1}{D^2+3} \cos x = e^x \frac{1}{(-1^2)+3} \cos x \\
 &= \frac{1}{2} e^x \cos x
 \end{aligned}$$

$$\therefore y = e^x (c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x) + \frac{1}{2} e^x \cos x$$

مشقین

حل کیجیے

1. $(D^2+3D+2)y = e^{2x} \sin x$.
2. $\frac{d^2y}{dx^2} + 2y = x^2 e^{3x} + e^x \cos 2x$.
3. $(D^3-D^2+3D+5)y = e^x \cos 2x$.
4. $(D^3-7D-6)y = e^{2x} (1+x)$.

جوابات

1. $y = ae^{-2x} + be^{-x} + \frac{1}{17} (11 \sin x - 7 \cos x) e^{2x}$.
2. $y = a \cos \sqrt{2}x + b \sin \sqrt{2}x - \frac{1}{17} (\cos 2x - 4 \sin 2x) e^x + \frac{1}{17} (x^2 - 12x/11 + 50/121) e^{3x}$.
3. $y = ae^{-x} + (b \cos 2x + c \sin 2x) e^x - \frac{1}{18} x e^x (\cos 2x - \sin 2x)$.
4. $y = ae^{-x} + be^{3x} + ce^{-2x} - \frac{1}{17} (17/12 + x) e^{2x}$.

14.92 - یہ ثابت کرنا کہ

$$\frac{1}{f(D)} x^V = \left[x - \frac{1}{f(D)} f'(D) \right] \frac{1}{f(D)} V$$

یہاں بھی، ہم x کا کوئی تفاعل V_1 لے کر چلتے ہیں جسے V کے ارتقام میں بعد میں حاصل کریں گے۔
ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} D(xV_1) &= xDV_1 + V_1 = xDV_1 + (D)' V_1, \\ D^2(xV_1) &= xD^2V_1 + 2DV_1 = xD^2V_1 + (D^2)' V_1, \end{aligned}$$

وغیرہ

عام طور سے

$$\begin{aligned} D^r(xV_1) &= xD^rV_1 + rD^{r-1}V_1 = xD^rV_1 + (D^r)' V_1, \\ \therefore f(D)xV_1 &= (D^n + a_1D^{n-1} + a_2D^{n-2} + \dots + a_n)xV_1 \end{aligned}$$

$$(1) \dots\dots\dots = xf(D)V_1 + f(D)V_1$$

اب ہم V_1 ایسا معلوم کرتے ہیں کہ

$$(2) \dots\dots\dots f(D)V_1 = V \Rightarrow V_1 = \frac{1}{f(D)} V$$

(1) اور (2) سے ہم پاتے ہیں

$$f(D)x \frac{1}{f(D)}V = xV + f'(D) \frac{1}{f(D)}V$$

اب $1/f(D)$ سے عمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$x \frac{1}{f(D)}V = \frac{1}{f(D)}xV + \frac{1}{f(D)}f'(D) \frac{1}{f(D)}V$$

$$\frac{1}{f(D)}xV = x \frac{1}{f(D)}V - \frac{1}{f(D)}f'(D) \frac{1}{f(D)}V$$

$$= \left[x - \frac{1}{f(D)}f'(D) \right] \frac{1}{f(D)}V.$$

مثالیں

1. حل کیجیے

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = x \sin x.$$

ہم پاتے ہیں

$$(D^2 + 4)y = x \sin x$$

چونکہ $D^2 + 4 = 0$ کے ریشے $\pm 2i$ ہیں، اس لیے ہم پاتے ہیں

$$\text{تمامی تفاعل} = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

$$\text{مخصوص تکملہ} = \frac{1}{D^2 + 4} x \sin 2x$$

$$= \left[x - \frac{1}{D^2 + 4} 2D \right] \frac{1}{D^2 + 4} \sin x$$

$$= \left(x - \frac{1}{D^2 + 4} 2D \right) \frac{1}{3} \sin x$$

$$= \frac{x}{3} \sin x - \frac{2}{3} \frac{1}{D^2 + 4} \cos x$$

$$= \frac{x}{3} \sin x - \frac{2}{9} \cos x$$

$$\therefore y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + \frac{x}{3} \sin x - \frac{2}{9} \cos x.$$

2. حل کیجیے

$$\frac{d^4y}{dx^4} - y = x^3 \sin x$$

ہم پاتے ہیں

$$(D^4 - 1)y = x^3 \sin x.$$

یہ برآسانی دیکھا جاسکتا ہے کہ تمامی تفاعل

$$= c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x.$$

پھر تکملہ خاص

$$= \frac{1}{D^2-1} x^2 \sin x$$

اب

$$x^2 \sin x = x(x \sin x)$$

لکھ کر ارد اور ثابت کیے گئے نتیجے میں $x \sin x = x$ لیتے ہوئے اس نتیجے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے چھوٹا طریقہ یہ ہے :- ہم پاتے ہیں

$$\frac{1}{D^2-1} x^2 e^{ix} \text{ کا خیالی حصہ = مخصوص تکملہ}$$

اب

$$\begin{aligned} \frac{1}{D^2-1} x^2 e^{ix} &= e^{ix} \frac{1}{(D+i)^2-1} x^2 \\ &= e^{ix} \frac{1}{D^2+4D^2i-6D^2-4Di} x^2 \\ &= e^{ix} \frac{1}{-4Di} \left[1 + \frac{-6D+4D^2i+D^3}{4i} \right]^{-1} x^2 \\ &= -\frac{e^{ix}}{4i} \frac{1}{D} \left[1 + \frac{-6D+4D^2i+D^3}{4i} + \left(\frac{-6D+...}{4i} \right)^2 \right] x^2 \\ &= i \frac{e^{ix}}{4} \frac{1}{D} \left[1 - \frac{3D}{2i} - \frac{5}{4} D^2 \dots \dots \right] x^2 \\ &= \frac{i}{4} e^{ix} \frac{1}{D} \left[x^3 + 3ix - \frac{5}{2} \right] \\ &= \frac{i}{4} e^{ix} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3i}{2} x^2 - \frac{5}{2} x \right] \\ &= \frac{i \cos x - \sin x}{4} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{3i}{2} x^2 - \frac{5}{2} x \right) \end{aligned}$$

جس کا کہ خیالی حصہ

$$= \frac{\cos x}{4} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{5}{2} x \right) - \frac{3}{8} x^2 \sin x$$

$$\therefore y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x \\ + \frac{\cos x}{4} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{5}{2} x \right) - \frac{3}{8} x^3 \sin x.$$

مشقیں

حل کیجیے

1. $(D^2 + 2D + 1)y = x \sin x.$

2. $(D^2 + 1)y = x^2 \sin 2x$

جوابات

1. $y = (a+bx)e^{-x} + \frac{1}{2}(1-x)\cos x + \frac{1}{2}\sin x.$

2. $y = a \cos x + b \sin x - \frac{1}{8}(x^3 - \frac{2}{3}x^2) \sin 2x - \frac{5}{8}x \cos 2x.$

14-10 ہم جنس خطی مساواتیں (Homogeneous linear Equations)
مساوات

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + a_2 x^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = X$$

حل کرنا جہاں کہ $a_n, \dots, a_1$ مستقل ہوں اور x, X کا کوئی تفاعل ہو۔

استعمال (transformation) $z = \log x$ یعنی $x = e^z$ سے دی ہوئی مساوات
مستقل ضربیوں (constant coefficients) میں بدل جائے گی۔

ہم پاتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dz}$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d^2 y}{dz^2} \cdot \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^3} \cdot \frac{dy}{dz} = \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^2 y}{dz^2} - \frac{dy}{dz} \right)$$

اسی طرح،

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \left(\frac{d^3 y}{dz^3} - 3 \frac{d^2 y}{dz^2} + 2 \frac{dy}{dz} \right) \frac{1}{x^3}$$

اب ہم لکھتے ہیں

$$D \equiv \frac{d}{dz}$$

لہذا ہم ادھر کے نتائج کو دوبارہ یوں لکھ سکتے ہیں :-

$$x \frac{dy}{dx} = Dy,$$

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = D(D-1)y,$$

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = (D^3 - 3D^2 + 2D)y = D(D-1)(D-2)y.$$

اب ریاضیاتی توسیع (mathematical induction) سے ہمیں ذیل نتیجہ ملے گا۔

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} = D(D-1)(D-2)\dots(D-n+1)y$$

اس لیے دی ہوئی مساوات تبدیل ہو کر

$$[D(D-1)(D-2)\dots(D-n+1) + a_1 D(D-1)\dots(D-n+2) + \dots + a_n] y = Z$$

$$\varphi(D)y = Z \quad \text{یعنی}$$

ہو جاتی ہے، جہاں کہ Z کا وہ تفاعل ہے جو کہ x سے عوضی $z = \log x$ کے حاصل ہوا ہے۔

یہاں z غیر تابع متغیر ہے۔

اب یہ مساوات پہلے بتائے گئے طریقوں سے حل ہو سکتی ہے۔

مثال

حل کیجیے

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2y = 10 \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

استعمال $z = \log x$ کرنے پر مساوات یہ ہو جاتی ہے۔

$$[D(D-1)(D-2) + 2D(D+1) + 2]y = 10(e^z + e^{-z}); D = d/dz$$

$$(D^3 - D^2 + 2)y = 10(e^z + e^{-z}). \quad \text{یا}$$

یہاں z غیر تابع اور y تابع متغیر ہیں۔

اب، طریقہ آزمائش (by trial) سے مساوات $D^3 - D^2 + 2 = 0$ کا ایک ریشہ

-1 ہے، اس لیے $D^3 - D^2 + 2$ کا ایک جزو $D+1$ ہے۔

در اصل ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} D^3 - D^2 + 2 &= D^3 + D^2 - 2D^2 + 2 \\ &= D^2(D+1) - 2(D^2-1) \\ &= (D+1)(D^2-2D+2). \end{aligned}$$

اب $D^3 - 2D + 2 = 0$ کے ریشے $1 \pm i$ ہیں، اس لیے $D^3 - D^2 + 2 = 0$ کے

ریشے $1-i, 1+i, -1$ ہیں۔ لہذا تمامی تفاعل

$$= c_1 e^{-z} + e^z (c_2 \cos z + c_3 \sin z)$$

$$= c_1 x^{-1} + x(c_2 \cos \log x + c_3 \sin \log x)$$

ساتھ ہی مخصوص تکملہ

$$= \frac{1}{D^3 - D^2 + 2} 10(e^z + e^{-z})$$

$$= 10 \frac{1}{D^3 - D^2 + 2} e^z + 10 \frac{1}{D^3 - D^2 + 2} e^{-z}$$

خطی مساواتیں

$$\begin{aligned}
&= 10 \frac{1}{1^2 - 1^2 + 2} e^x + 10 \frac{1}{(D+1)(D^2 - 2D + 2)} e^{-x} \\
&= 5e^x + 10 \frac{1}{D+1} \frac{e^{-x}}{(-1)^2 - 2(-1) + 2} \\
&= 5e^x + 2x e^{-x} = 5x + 2x^{-1} \log x.
\end{aligned}$$

$$\therefore y = c_1 x^{-1} + x(c_2 \cos \log x + c_3 \sin \log x) + 5x + 2x^{-1} \log$$

مشقیں

حل کیجیے

1. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 7x \frac{dy}{dx} + 5y = 2x^6$.
2. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 4y = x^3$.
3. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y = (1-x)^2$.
4. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y = x + x^2 \log x + x^3$.
5. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - 20y = (x+1)^2$.

جوابات

1. $y = ax^{-5} - bx^{-2} + \frac{1}{4}x^2$.
2. $y = ax^2 + bx^{-2} + \frac{1}{8}x^3$.
3. $y = (a+b \log x)x^{-1} + 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2$.
4. $y = ax^2 + bx + \frac{1}{3}x^3 - x \log x + x^2 [\frac{1}{2}(\log x)^2 - \log x]$.
5. $y = c_1 x^4 + c_2 x^{-6} - \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{80}$.

باب 14 پر مشقیں

حل کیجیے

1. $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2m \frac{dy}{dx} + m^2 y = \sin nx$.
2. $\frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = \sin 3x \cos x$.

3. $\frac{d^2y}{dx^2} - 6 \frac{dy}{dx} + 8y = (e^{2x} - 1)^2$ 4. $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 1$
 (جبکہ $x = 0$ پر $y = 0$ اور $x \rightarrow -\infty$ پر y متناہی ہو)
5. $4 \frac{d^2y}{dx^2} - y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 6. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} - 13y = e^{x/2} - \sin \frac{x}{2}$
7. $4 \frac{d^2y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 2y = \cos^2(x + \frac{1}{2}\pi)$ 8. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + y = e^{2x} \sin 2x$
9. $\frac{d^4y}{dx^4} - y = e^x \cos x$ 10. $\frac{d^4y}{dx^4} + 2 \frac{d^2y}{dx^2} + y = x^2 \cos x$
11. $(D^3 - 1)y = xe^x + \cos^2 x$ 12. $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = \cos 2x + x^2$
13. $\frac{d^2y}{dx^2} + y = xe^{2x}$ 14. $(D^2 + 4)y = x \cos 2x$
15. $(D^2 + 3D + 2)y = x^2 \cos x$ 16. $(D^2 - 4D - 5)y = xe^{-x}$
17. $(D^2 + 9)y = \cos^2 \frac{3x}{2}$
18. $(D^5 + D^4 + 4D^3 + 4D^2 + 4D + 4)y = \cos 3x \cos x$
19. $(x^2 D^2 + xD - 4)y = x^2$ 20. $(x^3 D^3 + 3x^2 D^2 + xD + 1)y = x \log x$
21. $x \frac{d^3y}{dx^3} + \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x}$ 22. $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{6}{x^2}y = x \log x$
23. $(x+1)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3(x+1) \frac{dy}{dx} + 4y = x^2$
24. $x^2 D^2 y - 3x Dy + 5y = x^2 \sin(\log x)$
25. $(x+3)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 4(x+3) \frac{dy}{dx} + 6y = x$
26. $(D^4 + D^2 + 1)y = e^{(-x/2)} \cos \frac{x\sqrt{3}}{2}$

جوابات

1. $y = (a+bx)e^{mx} + \frac{(m^2 - n^2) \sin nx + 2mn \cos nx}{(m^2 + n^2)^2}$
2. $y = a \cos 2x + b \sin 2x - \frac{1}{4} \sin 4x - \frac{1}{4} x \cos 2x$

3. $y = ae^{4x} + be^{2x} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4}xe^{4x} + xe^{2x}$.
4. $y = e^x - 1$.
5. $y = ae^{-x/12} + be^{-x/12} - \frac{1}{8}(\sin x + \sqrt{3} \cos x)$.
6. $y = ae^{(2+\sqrt{17})x} + be^{(2-\sqrt{17})x} - \frac{4}{8^2}e^{x/8} - \frac{1}{170^2}(-59 \sin x/8 + 6 \cos x/8)$
7. $y = \left(a \cos \frac{x}{2} + b \sin \frac{x}{2} \right) e^{x/2} + \frac{1}{320}[(7+4\sqrt{3}) \cos 2x + (4-7\sqrt{3}) \sin 2x]$.
8. $y = ae^{(2+\sqrt{3})x} + be^{(2-\sqrt{3})x} - \frac{1}{4}e^{2x} \sin 2x$
9. $y = ae^{-x} + be^{-x} + c \cos x + d \sin x - \frac{e^x}{5} \cos x$.
10. $y = (a+bx) \cos x + (c+dx) \sin x - \frac{1}{48}(9x^2-x^4) \cos x + \frac{1}{18}x^3 \sin x$.
11. $y = ae^x + [b \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + c \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x] e^{-\frac{x}{2}} - \frac{1}{8} + \frac{1}{4}(x^2/8 - x) e^x - \frac{1}{180}(8 \sin 2x + \cos 2x)$.
12. $y = (a \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + b \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x) e^{-\frac{x}{2}} - \frac{1}{18}(3 \cos 2x - 2 \sin 2x) + (x^2 - 2x)$
13. $y = (a \cos x + b \sin x) + \frac{1}{8}(x - \frac{4}{8})e^{2x}$.
14. $y = (a \cos 2x + b \sin 2x) + \frac{1}{8}x \cos 2x + \frac{x^2}{8} \sin 2x$.
15. $y = ae^{-2x} + be^{-2x} + \frac{1}{18}(\cos x + 3 \sin x)x^2 - \frac{1}{8}(17 \sin x - 6 \cos x) + \frac{1}{888}(81 \sin x - 133 \cos x)$
16. $y = ae^{5x} + be^{-x} - \frac{1}{8}x(1+3x)e^{-x}$.
17. $y = a \cos 3x + b \sin 3x + \frac{1}{8}(3x \sin 3x + 2)$.
18. $y = ae^{-x} + (bx+c) \cos \sqrt{2}x + (dx+e) \sin \sqrt{2}x + \frac{1}{888}(\cos 4x + 4 \sin 4x) + \frac{1}{24}(\cos 2x + 2 \sin 2x)$.
19. $y = ax^3 + bx^{-2} + \frac{x^3}{4} \log x$.
20. $y = ax^{-1} + \sqrt{x}[b \cos (\frac{1}{2}\sqrt{3} \log x) + c \sin (\frac{1}{2}\sqrt{3} \log x)] + \frac{x}{2} \log x - \frac{3x}{4}$.
21. $y = a + (b \log x + c)x + \frac{x^2}{2}(\log x)^2$.
22. $y = ax^3 + bx^{-2} + \frac{1}{8}(5 \log x - 2)x^3 \log x$.
23. $y = (x+1)^2[a \log(x+1) + b] + \frac{1}{2}[2(x+1)^2\{\log(x+1)\}^2 - 8x - 7]$.
24. $y = x^2[a \cos(\log x) + b \sin(\log x)] - \frac{x^2}{2} \log x \cos(\log x)$.
25. $y = a(x+3)^2 + b(x+3)^2 + \frac{1}{2}(x+2)$.
26. $y = e^{-\frac{x}{2}} \left\{ \left(\frac{1}{4}x + a \right) \cos \frac{x\sqrt{3}}{2} + \left(b + \frac{x}{4\sqrt{3}} \right) \sin \frac{x\sqrt{3}}{2} \right\} + ce^{x/2} \cos \left(\frac{\sqrt{3}x}{2} + d \right)$.

متفرق مشقیں 4

ذیل تفرقی مساواتیں حل کیجیے۔

$$(y \sin x - 1) dx + \cos x dy = 0 \quad -2 \quad \frac{dy}{dx} - \frac{\tan y}{1+x} = (1+x) e^x \sec y \quad -1$$

$$(x+y)^3 dx = dy \quad -4$$

$$(x+y)^3 dx = xy dy \quad -3$$

$$\frac{x+y-a}{x+y-b} \frac{dy}{dx} = \frac{x+y+a}{x+y+b} \quad -6$$

$$2xy^3 dx = e^x (dy - y dx) \quad -5$$

$$x \frac{dy}{dx} - 2y = x^3 + \sin \frac{1}{x^3} \quad -8$$

$$\frac{dy}{dx} + y \cot x = \sin x \quad -7$$

$$x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2 \operatorname{cosec} 2x \quad -9$$

$$2 \cos x \frac{dy}{dx} + 4y \sin x = \sin 2x \quad -10$$

$$(جیکہ x = \pi/3 پر y = 0)$$

$$xy - \frac{dy}{dx} = y^3 e^{-x^2} \quad -12$$

$$x \frac{dy}{dx} + 3y = x^4 y^3 e^{1/x^2} \quad -11$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6x-4y+3}{3x-2y+1} \quad -14$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x+y)}{x(x-y)} \quad -13$$

$$x^2 y \frac{dy}{dx} = xy^3 - e^{-1/x^3} \quad -16$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-y+1}{x+2y-3} \quad -15$$

$$(x+y+1) dy = dx \quad -18 \quad 3e^x \tan y + (1-e^x) \sec^2 y \frac{dy}{dx} = 0 \quad -17$$

$$(3x-2y+1) dx + (2x-3y+4) dy = 0 \quad -20 \quad x \frac{dy}{dx} + y \log y = xye^x \quad -19$$

$$(2xy+y-\tan y) dx + (x^2-x \tan^2 y + \sec^2 y) dy = 0 \quad -21$$

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = x^3 + \tan \frac{1}{x^2} \quad -22$$

$$23 \text{ مساوات } \frac{dy}{dx} + 2y \tan x = \sin x \text{ حل کیجیے اور } y \text{ کی کم از کم قیمت معلوم کیجیے جب کہ } x = 0 \text{ پر } y = 2$$

$$(x^2+3x+2) \frac{dy}{dx} + (2x+1)y = (xy+2y)^2 \quad -24$$

$$(x+2y^2) \frac{dy}{dx} = y \quad -25$$

26- ثابت کیجیے کہ $y - \tan x + c$ کے عمودی مستدیر منحنی

$$4y+2x+\sin 2x+c=0$$

ہوتے ہیں۔

27- ثابت کیجیے کہ قبیلہ منحنی $x^2-y^2=c$ کا ہر ممبر قبیلہ منحنی $xy=a$ کے ہر ممبر کو

90° پر کاٹتا ہے۔

28- ثابت کیجیے کہ قبیلہ منحنی $r \sin^2 \theta = A$ کے عمودی مستدیر منحنی $r^2 \cos \theta = A$

ہوتے ہیں۔

29- ثابت کیجیے کہ قبیلہ منحنی $(r^2-1) \sin \theta = cr$ کے عمودی مستدیر

$$(r^2+1) \cos \theta = cr$$

ہوتے ہیں۔

30- وہ قبیلہ منحنی معلوم کیجیے جن کے کسی نقطے پر قطبی تحت مماس (polar sub-

tangent) اس نقطہ پر نصف قطری سمتیہ (radius vector) سے متناسب

(proportional) ہو۔

31- وہ قبیلہ منحنی معلوم کیجیے جن کے کسی نقطہ پر مماس اور اسی نقطہ کے نصف قطری

سمتیہ کے درمیان کا زاویہ سمتیہ زاویہ (vectorial angle) کا m گنا ہو۔

32- قبیلہ منحنی

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{a}{x}$$

کے عمودی مستدیر نکالیے۔

33- ثابت کیجیے کہ ہموار سطح پر بھی مکانیوں کی تفرقی مساوات

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^{-2/3} = 0$$

34۔ اس منحنی کی کارٹیزی مساوات معلوم کیجیے جس کے لیے مبداء سے ڈالے گئے کسی مماس پر عمود کی لمبائی نقطہ تماس (point of contact) کے فاصلے کے برابر ہو۔

35۔ ایسا منحنی معلوم کیجیے کہ اس کے x -محور کے اور کسی دو عرضوں کے درمیان گھرا ہوا رقبہ ان دونوں عرضوں کے درمیان کے قوس سے متناسب (proportional) ہو۔

36۔ تفرقی مساوات

$$\frac{d^3 y}{dx^3} + 3 \frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}$$

کا وہ حل نکالیے جس میں $x = 0$ رکھنے پر $y = 0$ اور $dy/dx = 0$ ہوں۔
37۔ مساوات

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} - 3x \frac{dy}{dx} + 4y = x^3$$

حل کیجیے جبکہ دیا ہوا ہے کہ $x = 1$ پر $y = 0$ اور $x = e$ پر $y = e^3$ ہے۔
38۔ تفرقی مساوات

$$4xy \frac{dy}{dx} = 4y^3 - x^2$$

کا وہ حل نکالیے جس میں $x = 1$ رکھنے پر $y = 0$ ہو۔
39۔ حل کیجیے

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + (\sin x + \cos x) y \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2} y^3 \sin 2x = 0$$

40۔ تفرقی مساوات

$$(D^3 + D^2 - 2) y = x^3 e^x$$

کا وہ حل نکالیے جو کہ ذیل شرائط پوری کرے۔

$x = 0$ پر $y = 0$ ہو اور $x \rightarrow -\infty$ پر $y \rightarrow 0$ ہو۔

41۔ حل کیجیے

$$(D^4 + 2D^3 + 1)y = 24x \sin x.$$

42۔ حل کیجیے

$$(D-1)^3 (D^2+1)^2 y = \sin^2 \frac{x}{2} + e^x$$

جوابات

1. $(1+x)(e^x+c) = \sin y.$
2. $y = c \cos x + \sin x.$
3. $cx^3(x+2y) = e^{2y/3}.$
4. $x+y = \tan(x+c).$
5. $e^x + (c+x^2)y = 0.$
6. $2(x-y+c) = (b-a) \log[(x+y)^2 - ab]$
7. $(2y + \cos x) \sin x = c + x$
8. $2y = cx^2 + 2x^2 \log x + x^2 \cos(x^{-2}),$
9. $y = cx + x \log \tan x.$
10. $y \sec^2 x = \sec x - 2$
11. $y^2 x^2 (c + e^{1/x^2}) = 1$
12. $y^2 (c + 2x) = e^{x^2}.$
13. $xy^{-1} + \log xy = c.$
14. $4x - 2y - 2 \log(3x - 2y + 3) = c.$
15. $xy + y^2 - 3y = x^2 + x + c.$
16. $3y^2 + 2x^2 e^{-1/x^2} = cx^2.$
17. $\sqrt{y} \tan y = c(1 - e^y).$
18. $x + y + 2 = ce^y.$
19. $x \log y = (x-1)e^y + c.$
20. $(y-x-1)(y+x-3)^2 = c.$
21. $x^2 y + xy - x \tan y + \tan y = c.$
22. $xy^{-2} = \log x + \frac{1}{2} \cos x^{-2} + c.$
23. $y = \cos x + c \cos^2 x; -\frac{1}{2}.$
24. $x+1 = y(x+2)^2 + cy(x+2)^2.$
25. $x = y^2 + cy.$
30. مسادی زاویہ اسپائرل
31. $r^m = a^m \sin m\theta$
32. $(x^{2/3} + c^{2/3})^3 = \frac{9}{2} ay^2$
34. $x^2 + y^2 = 2cx.$
35. $y = k \cosh \frac{x+c}{k}$ (قبیلہ زنجیرہ)
جہاں کہ k دیا ہوا تناسبی مستقل ہے۔

36. $y = (x-1) e^{-x} + e^{-2x}.$

37. $x^2 \log x \log (ex) = 2y.$

38. $xe^{2y^3/x^3} = 1.$

39. $(cy - e^{-\sin x})(cy - e^{\cos x}) = 0.$

40. $y = e^x \left(\frac{x^4}{20} - \frac{4x^3}{25} + \frac{33x^2}{125} - \frac{144x}{625} \right).$

41. $y = (c_1x + c_2) \cos x + (c_3x + c_4) \sin x - (3 \cos x + x \sin x) x^2.$

42. $y = (c_1 + c_2x) \cos x + (c_3 + c_4x) \sin x + (c_5 + c_6x + \frac{1}{3}x^3) e^x - \frac{1}{3}x^2 \sin x + \frac{1}{3}$

ضمیمہ I (APPENDIX I)

بیٹا اور گاما تفاعل

A.1 - غیر واجب تکملوں (improper integrals) کا تقارب (Convergence) غیر واجب معین تکملوں کے تصور سے باب 1 میں ہی واقفیت ہو چکی ہے۔ اب ہم مثبت مکالمیوں کے غیر واجب تکملوں کے وجود (جسے تقارب (convergence) بھی کہتے ہیں) کے لیے دو موازنی جانچیں (comparison tests) بھی حاصل کریں گے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیٹا (Beta) اور گاما (Gamma) تفاعلوں کا تقارب ہمیشہ معین تکملوں کے کرایا جاسکے۔

A.21 - وہ صورت جب کہ قطعہ تکمل (Region of Integration) لامتناہی (Infinite) ہو

اگر x کے ∞ کی طرف مائل ہونے پر

$$\varphi(x) = \int_a^x f(x) dx$$

ایک متناہی انتہا (finite limit) کی طرف مائل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ غیر واجب تکملہ

$$(1) \dots \dots \dots \int_a^{\infty} f(x) dx$$

∞ پر تقارب کر رہا ہے اور وہ انتہا تکملہ (1) کی قیمت کہلاتی ہے۔

اگر x کی x سے بڑی ہر قیمت کے لیے $f(x)$ مثبت ہو تو معین تکملہ کے رقبے والے مفہوم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ $\varphi(X)$ کا ایک کیفی صعودی (monotonically increasing) تفاعل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر واجب تکملہ

$$\int_a^{\infty} f(x) dx$$

تب اور صرف تب بھی ∞ پر تقارب کرے گا جب کہ $\varphi(X)$ اوپر حد سے محدود ہو (bounded above) یعنی ایسے مثبت نمبر k کا وجود ہو کہ x کی ہر قیمت کے لیے

$$\varphi(X) \leq k$$

اس سلسلے میں تقارب کے لیے کارآمد اور کافی جانچ (sufficient test) یہ ہے:-
مسئلہ (Theorem): اگر x کی a کے برابر یا اس سے بڑی ہر قیمت کے لیے $f(x)$ اور $F(x)$ دو مثبت تفاعل ہوں اور اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = 1$$

جہاں 1 نہ تو صفر ہے اور نہ ∞ تو یا

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \quad \text{اور} \quad \int_a^{\infty} F(x) dx$$

دونوں تکملے متقارب (convergent) ہوں گے یا دونوں غیر متقارب (non convergent) ہوں گے۔
مان لیجیے کہ ϵ کوئی مثبت نمبر ہے۔ تب ایک ایسے نمبر X_0 کا وجود ہوگا کہ

$$\left| \frac{f(x)}{F(x)} - 1 \right| < \epsilon \quad \text{ہر} \quad x \geq X_0 \quad \text{کے لیے}$$

یعنی

$$(2) \dots \text{کے لیے} \quad x \geq X_0 \quad \text{ہر} \quad (1-\epsilon) F(x) < f(x) < (1+\epsilon) F(x)$$

اب (2) سے ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots \dots \int_{X_0}^X (l-\varepsilon) F(x) dx \leq \int_{X_0}^X f(x) dx \leq \int_{X_0}^X (l+\varepsilon) F(x) dx$$

اب مان لیجیے کہ

$$\int_a^{\infty} \bar{F}(x) dx$$

تقارب کرتا ہے، تب

$$\int_{X_0}^{\infty} F(x) dx$$

بھی تقارب کرے گا، جس سے کہ

$$\int_{X_1}^X F(x) dx$$

اور اسی سے

$$(l+\varepsilon) \int_{X_0}^X F(x) dx$$

کی اوپر سے محدود (bounded above) ہے۔ اب (3) سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

$$\int_{X_0}^X f(x) dx$$

اوپر سے محدود ہے۔ لہذا

$$\int_{X_0}^{\infty} f(x) dx$$

اور اسی لیے

$$\int_a^{\infty} f(x) dx$$

بھی متقارب ہیں۔

دوسری صورتوں میں بھی (3) سے اسی قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں۔

* معین تکملوں کے جیومیٹریائی مفہوم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔

A.22۔ وہ صورت جبکہ تکاملیہ لامتناہی ہو

اب مان لیجیے کہ وقفہ $(a, b-h)$ میں $f(x)$ مسلسل (continuous) ہے اور انہیں نیچے
 کہ جب $x \leftarrow b$ تو $f(x) \leftarrow \infty$
 ہم کہتے ہیں

$$\varphi(h) = \int_a^{b-h} f(x) dx$$

اب اگر h کے مائل بے صفر ہونے پر $\varphi(h)$ کسی متناہی انتہا کی طرف مائل ہو تو ہم کہتے
 ہیں کہ غیر واجب تکملہ

$$(4) \dots \dots \dots \int_a^b f(x) dx$$

b پر تقارب کرتا ہے اور اس حد کو (4) کی قیمت کہتے ہیں
 اگر $f(x)$ مثبت ہو تو h کے کم ہونے پر $\varphi(h)$ ایک کیفی صعودی ہوگا اور اس لیے مثبت
 تکاملیہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تکملہ (4) تب اور صرف تب ہی متقارب ہوگا جب کہ $\varphi(h)$ اوپر
 سے محدود ہو، یعنی ایسے نمبر کا وجود ہو کہ

$$\varphi(h) < k \quad (h \text{ کے ہر مثبت قیمت کے لیے})$$

جیسا کہ تکملہ کی لامتناہی حدیں ہونے کی صورت میں دکھایا گیا، یہاں ثابت کیا جاسکتا
 ہے کہ اگر $f(x)$ اور $F(x)$ مثبت ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{F(x)} = l$$

جہاں l نہ تو صفر ہے اور نہ ∞ ، تب یا

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{اور} \quad \int_a^b F(x) dx$$

دونوں تکملے b پر متقارب ہوں گے یا دونوں غیر متقارب ہوں گے۔
 اسی طرح کے نتائج a پر تقارب کے لیے ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

A.3 - تین اہم موازنی تکملے (Comparison Integrals)

$$(i) \int_a^{\infty} \frac{dx}{x^{\mu}}, (a > 0), (ii) \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^{\mu}}, (iii) \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^{\mu}}$$

$$(i) \text{ تکملہ } \int_a^{\infty} \frac{dx}{x^{\mu}}$$

تب اور صرف تبھی متقارب ہوگا جبکہ $\mu > 1$ ہو۔

اگر $\mu \neq 1$ ہو تو ہم پاتے ہیں

$$\varphi(X) = \int_a^X \frac{dx}{x^{\mu}} = \frac{1}{1-\mu} \left| \frac{1}{x^{\mu-1}} \right|_a^X = \frac{1}{1-\mu} \left[\frac{1}{X^{\mu-1}} - \frac{1}{a^{\mu-1}} \right]$$

جو کہ X کے مائل بہ ∞ ہونے پر $1/(\mu-1)a^{\mu-1}$ پر مائل ہوگا اگر $\mu > 1$ اور مائل بہ ∞ ہوگا اگر $\mu < 1$ ہو۔
اگر $\mu = 1$ تو ہم پاتے ہیں

$$\varphi(X) = \int_a^X \frac{dx}{x} = \log X - \log a$$

جو کہ $X \leftarrow \infty$ ہونے پر مائل بہ ∞ ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ ثابت ہو گیا

$$(ii) \text{ تکملہ } \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^{\mu}}$$

تب اور صرف تبھی متقارب ہوگا جب کہ $\mu < 1$ ہوگا۔

اگر $\mu \neq 1$ ہو تو ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \varphi(h) &= \int_a^{b-h} \frac{dx}{(b-x)^{\mu}} = \frac{1}{\mu-1} \left| \frac{1}{(b-x)^{\mu-1}} \right|_a^{b-h} \\ &= \frac{1}{\mu-1} \left[\frac{1}{h^{\mu-1}} - \frac{1}{(b-a)^{\mu-1}} \right] \end{aligned}$$

جو کہ $h \rightarrow 0$ ہونے پر مائل ہے $1/(1-\mu)(b-a)^{\mu-1}$ ہوگا اگرچہ $\mu < 1$ ہو اور مائل ہے ∞ ہوگا اگرچہ $\mu > 1$ ہو۔
اگر $\mu = 1$ ہو تو ہم پاتے ہیں

$$\varphi(h) = \int_a^{b-h} \frac{dx}{b-x} = - \left| \log(b-x) \right|_a^{b-h} = \log(b-a) - \log h.$$

جو کہ h کے مائل ہے صفر ہونے پر لامتناہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس طرح نتیجہ ثابت ہو گیا۔

(iii) تکملہ

$$\int_a^0 \frac{dx}{(x-a)^{\mu}}$$

تب اور صرف تب بھی تقارب ہوگا جب کہ $\mu < 1$ ہو۔
یہ نتیجہ بھی اوپر (ii) کی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے۔

مثالیں

1 ذیل کے تقارب کی جانچ کیجیے۔

$$(i) \int_1^{\infty} \frac{x dx}{(1+x)^3}.$$

$$(ii) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}}$$

(i) ہم پاتے ہیں

$$f(x) = \frac{x}{(1+x)^3}$$

مان لیجیے

$$F(x) = \frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$$

تب

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(1+x)^3} = 1$$

اس لیے

$$\int_1^{\infty} f(x) dx \text{ اور } \int_1^{\infty} F(x) dx$$

ایک ہی صفت رکھتے ہیں لیکن § A.3 (i) کے مطابق بعد والا مکملہ متقارب ہے۔ لہذا دیا
ہوا مکملہ بھی متقارب ہے۔
(ii) ہم پاتے ہیں

$$f(x) = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}}$$

مان بیجیے

$$F(x) = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$$

تب

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{(1+x)^{\frac{1}{2}}} = 1$$

اب § A.3 (i) سے مکملہ

$$\int_1^{\infty} F(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx, \mu = \frac{1}{2} < 1$$

مقارب نہیں ہے۔ لہذا دیا ہوا مکملہ بھی متقارب نہیں ہے۔

2- ذیل کے تقارب کی جانچ کیجیے:-

$$(i) \int_0^1 \frac{dx}{x^{1/3}(1+x^2)} \quad (ii) \int_0^1 \frac{dx}{x^2(1+x)^2} \quad (iii) \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x^{1/3}(1-x)^{1/3}}$$

(i) تکالیف $1/x^{1/3}(1+x^2)$ مثبت ہے اور x کی ہر قیمت کے لیے یہ مسلسل تفاعل

ہے، سوائے زیریں حد صفر پر اور یہ $x \rightarrow 0$ ہونے پر مائل بہ ∞ ہوتا ہے۔

ہم کہتے ہیں

$$f(x) = \frac{1}{x^{1/3}(1+x^3)}$$

اور مان لیتے ہیں

$$F(x) = \frac{1}{(x-0)^{1/3}} = \frac{1}{x^{1/3}}$$

تب

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{F(x)} = 1$$

اور § A-3 (iii) سے

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{1/3}} dx, \quad (\mu = \frac{1}{3} < 1)$$

مقارب ہے۔ لہذا دیا ہوا اکملہ بھی مقارب ہے۔

(ii) ہم لکھتے ہیں

$$f(x) = \frac{1}{x^2(1+x)^2}$$

اور مان بیچے

$$F(x) = \frac{1}{x^2}$$

تب

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{F(x)} = 1$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx, \quad (\mu = 2 > 1)$$

مقارب نہیں۔ لہذا دیا ہوا اکملہ مقارب نہیں۔

(iii) وقفہ $[1, 1]$ میں x کی قیمت کے لیے تکاملیہ مثبت اور سلسل ہے، سوائے اوپری حد 1 کے لیے اور یہ $x \leftarrow 1$ ہونے پر ∞ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہم لکھتے

ہیں

$$f(x) = \frac{1}{x^{1/3}(1-x)^{1/3}}$$

اور مان لیجیے

$$F(x) = \frac{1}{(1-x)^{1/3}}$$

تب

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{F(x)} = 1$$

اور § A.3 (ii) سے

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx, \quad (\mu = \frac{1}{3} < 1)$$

مقارب ہے۔ اس لیے دیا ہوا کلمہ بھی مقارب ہے۔

مشقیں

ذیل کے تقارب کی جانچ کیجیے:-

$$(i) \int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$$

$$(ii) \int_0^1 \frac{x^{a-1}}{1+x} dx.$$

$$(iii) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{x}}{\sin x} dx.$$

$$(iv) \int_0^1 \frac{dx}{[(x-1)^a(x-2)]^{1/3}}$$

جوابات

(i) مقارب

(ii) مقارب اگرچہ $a > 0$

(iii) مقارب

(iv) غیر مقارب

A.4- بیٹا تفاعل (Beta Function). $B(m, n)$

$$\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx \quad \text{تکملہ}$$

پر غور کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

- (i) اگر $m \geq 1$ ہو تو تکاملیہ $x = 0$ پر مسلسل ہے اور اگر $m < 1$ ہو تو x کے مائل بے صفر ہونے پر تکاملیہ مائل بہ ∞ ہوتا ہے۔
(ii) اگر $n \geq 1$ ہو تو تکاملیہ $x = 1$ پر مسلسل ہے اور اگر $n < 1$ ہو تو x کے 1 کی طرف مائل ہونے پر تکاملیہ مائل بہ ∞ ہوتا ہے۔
(iii) 0 اور 1 کے علاوہ تکاملیہ x کی ہر قیمت کے لیے مسلسل ہے۔
اس لیے اگر $m \geq 1$ اور $n \geq 1$ ہوں تو تکملہ

$$\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx$$

ایک واجب تکملہ ہوگا اور اس شکل میں اس کا تعارف در متغیروں m اور n کے ایک تفاعل کی حیثیت سے ہے، جہاں کہ
 $m \geq 1, n \geq 1$

اب ہم یہ مان کر کہ $m < 1$ یا $n < 1$ ہے، غیر واجب تکملوں

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx \quad \text{اور} \quad \int_0^{\frac{1}{2}} x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx$$

کے 0 اور 1 پر تقارب کی جانچ کرتے ہیں۔

0 پر تقارب:

ہم لکھتے ہیں

$$f(x) = x^{m-1}(1-x)^{n-1} = (1-x)^{n-1}/x^{1-m}$$

مان لیجئے

$$F(x) = \frac{1}{x^{1-m}}$$

اس لیے x کے مائل بہ صفر ہونے پر $f(x)/F(x) \rightarrow 1$ ۔

چونکہ

$$\int_0^1 F(x) dx$$

تب اور صرف تبھی متقارب ہے جب کہ $0 < m \Leftrightarrow 1-m < 1$ ہو اس لیے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ تکملہ

$$\int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

0 پر تب اور صرف تبھی متقارب ہوگا جب کہ m مثبت ہو۔

1 پر تقارب

یہاں

$$f(x) = x^{m-1} (1-x)^{n-1} = x^{m-1} / (1-x)^{1-n}$$

لکھنے اور یہ مان لینے پر کہ $F(x) = 1/(1-x)^{1-n}$ ، ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تکملہ

$$\int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

1 پر تب اور صرف تبھی متقارب ہوگا جب کہ n مثبت ہو۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علامت

$$\int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

تبھی معنی رکھتا ہے جب کہ m اور n مثبت ہوں۔ m اور n کی مثبت قیمتوں کے لیے متعارف (defined) تفاعل

$$\int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

تکلی احصاء

بیٹا تفاعل (Beta function) کہلاتا ہے اور ہم کہتے ہیں

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx, \quad (m > 0, n > 0)$$

یہ $\sin \theta$ رکھنے پر ہم دیکھتے ہیں،

$$B(m, n) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta \cdot d\theta$$

اس لیے اگر $2m-1$ اور $2n-1$ مثبت کامل اعداد ہوں اور دونوں جفت نہ ہوں تو ہم پاتے ہیں

$$B(m, n) = 2 \frac{(2m-2)(2m-4)\dots(2n-2)(2n-4)\dots}{(2m+2n-2)(2m+2n-4)\dots}$$

لیکن اگر دونوں جفت ہوں تو اوپر کی کسر کو $\frac{\pi}{2}$ سے ضرب دینے پر $B(m, n)$ کی قیمت ملتی ہے۔

مشقیں

1۔ ثابت کیجیے۔

$$(i) \frac{B(p, q+1)}{q} = \frac{B(p+1, q)}{p} = \frac{B(p, q)}{p+q}$$

$$(ii) B(p, q) = B(p+1, q) + B(p, q+1).$$

2۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \sin^p \theta \cos^q \theta \, d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{p+1}{2}, \frac{q+1}{2}\right)$$

جہاں کہ $q > -1$ اور $p > -1$ ۔

3۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 x^{m-1} (1-x^2)^{n-1} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m}{2}, n\right)$$

4 - حاصل کیجیے:

$$(i) \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(ii) \int_0^2 x^4(8-x^3)^{-1/3} dx$$

5 - ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^p x^m(p^q - x^q)^n dx = \frac{p^{qn+m+1}}{q} B\left(n+1, \frac{m+1}{q}\right)$$

اگرچہ $p > 0, q > 0, m+1 > 0, n+1 > 0$

6 - حاصل کیجیے:

$$\int_a^b (x-a)^{l-1} (b-x)^{m-1} dx. \quad (l > 0, m > 0)$$

(یہاں $x=py+q$ رکھیے جہاں $y=0$ پر $x=a$ اور $y=1$ پر $x=b$)

7 - (a) ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}} dx = B(p, q)$$

یہاں $t = x/(1+x)$ رکھیے تاکہ x کے 0 سے ∞ تک بدلنے پر t 0 سے 1

تک بدلے۔

$$\int_0^\infty \frac{x^{m-1} dx}{(a+bx)^{m+n}} = \frac{1}{a^n b^m} B(m, n)$$

8 - ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{x^{m+1} + x^{n-1}}{(1+x)^{m+n}} dx = B(m, n)$$

(ہم پاتے ہیں)

$$B(m, n) = \int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{(1+x)^{m+n}} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{x^{m-1}}{(1+x)^{m+n}} dx + \int_1^\infty \frac{x^{m-1}}{(1+x)^{m+n}} dx$$

تکملی احصاء

اب سب سے داہنی طرف کے تکملہ میں $x = 1/t$ رکھیے
9۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1} + x^{n-1}}{(1+x)^{m+n}} dx = 2 B(m, n)$$

10۔ $\frac{x}{1-x} = \frac{at}{1-t}$ رکھتے ہوئے a کو مناسب طریقے سے لے کر ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 x^{-1/3} (1-x)^{-2/3} (1+2x)^{-1} dx = \frac{1}{9^{1/3}} B\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

11۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{x^{l-1} (1-x)^{m-1}}{(b+cx)^{l+m}} dx = \frac{B(l, m)}{(b+c)^l b^m}$$

12۔ حاصل کیجیے

$$\int_0^1 \frac{(1-x^2)^{3/4}}{(1+x^2)^2} dx$$

13۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{2m-1} \theta \sin^{2n-1} \theta}{(a \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta)^{m+n}} d\theta = \frac{B(m, n)}{2a^m b^n}$$

(پہلے لکھیے)

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{2m-1} \theta \sin^{2n-1} \theta}{(a \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta)^{m+n}} d\theta &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{2m-1} \theta \sin^{2n-1} \theta}{[a + (b-a) \sin^2 \theta]^{m+n}} d\theta \\ &= \left[\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^{n-1} (1-x)^{m-1}}{[a + (b-a)x]^{m+n}} dx \right] \end{aligned}$$

14۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^{n-1} x}{(a+b \cos x)^n} dx = \frac{2^{n-1}}{(a^2-b^2)^{n/2}} B\left(\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}n\right)$$

اگر $a^2 > b^2$ ہے۔

15۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt = n^x B(x, n+1) = \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)}$$

جہاں $x > 0$ ہے اور $n = 1, 2, \dots$

جوابات

4. (i) $\frac{1}{5} B\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$

(ii) $\frac{16}{3} B\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right)$

6. $(b-a)^{l+m-1} B(l, m)$

12. $\frac{1}{4(2)^{1/4}} B\left(\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$

A.5 - گاماتفاعل (Gamma function)

$$\int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx \quad \text{مکملہ}$$

پر غور کیجیے۔

اگر $a \geq 1$ ہو، تو $x = 0$ پر تکاملیہ مسلسل ہے اور اگر $a < 1$ ہو تو x کے مائل
بہ صفر ہونے پر تکاملیہ مائل بہ ∞ ہو جاتا ہے۔

اب ہمیں دو مکملوں

$$\int_1^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx \quad \text{اور} \quad \int_0^1 x^{a-1} e^{-x} dx$$

کے ترتیب وار 0 اور ∞ پر تقارب کی جانچ کرنا ہے۔

0 پر تقارب
ہم لکھتے ہیں

$$f(x) = x^{a-1} e^{-x} = e^{-x/x^{1-a}}$$

اور مان لیجیے

$$F(x) = 1/x^{1-a}$$

چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{F(x)} = 1$$

اور تکملہ

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{1-a}} dx$$

تب اور صرف تب بھی متقارب ہے جب کہ $(1-a) < 1$ یعنی $a > 0$ ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ

$$\int_0^1 x^{a-1} e^{-x} dx$$

0 پر تب اور صرف تب بھی متقارب ہے جب کہ $a > 0$ ہو

پر تقارب ∞

اس صورت میں، موازنی جانچ جس شکل میں دی گئی ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ a کی ہر قیمت کے لیے

$$e^x > x^{a+1}$$

$$\therefore e^{-x} < x^{-a-1}$$

اور

$$x^{a-1} e^{-x} < x^{a-1} x^{-a-1} = 1/x^2$$

$$\therefore \int_1^X x^{a-1} e^{-x} dx < \int_1^X \frac{1}{x^2} dx.$$

ساتھ ہی

$$\int_0^X \frac{1}{x^2} dx = \left| -\frac{1}{x} \right|_1^X = -\frac{1}{X} + 1 < 1 \quad (X > 1 \text{ کے لیے})$$

بیٹا اور گاما تفاعل

لہذا $\int_1^X x^{a-1} e^{-x} dx$ اوپر سے محدود ہے۔
اس لیے a کی ہر قیمت کے لیے $\int_1^X x^{a-1} e^{-x} dx$ پر تقارب ہے۔
اوپر جو بتایا گیا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

$\int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$
تب معنی رکھتا ہے جب کہ a کوئی مثبت نمبر ہو۔

تفاعل
$$\int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$$

جس کا تعارف a کی مثبت قیمتوں کے لیے ہے، اسے گاما تفاعل (Gamma Function) کہتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$$

حصہ سے تکمل کر کے، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ

$$\Gamma(a+1) = a \Gamma(a)$$

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر a مثبت کامل عدد ہو، تو $\Gamma(a) = (a-1)!$

A.6 بیٹا اور گاما تفاعلوں میں رشتہ

اب ہم ذیل سے ثابت کریں گے

$$B(m, n) = \frac{\Gamma(m) \Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}, (m > 0, n > 0)$$

ہم پاتے ہیں

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$


$$(I) \dots \dots \dots = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2m-1} \theta \sin^{2n-1} \theta d\theta$$

($x = \sin^2 \theta$ رکھنے پر)

اور

$$\Gamma(m) = \int_0^{\infty} x^{m-1} e^{-x} dx$$

$$(2) \dots\dots\dots = 2 \int_0^{\infty} r^{2m-1} e^{-r^2} dr$$



($x = r^2$ رکھنے پر)

مان بیجیے کہ E وہ مربع ہے جو کہ

خطوط

$$x = 0, x = R; y = 0, y = R$$

کے درمیان گھرا ہوا ہے۔

ہم پاتے ہیں

$$4 \iint_E x^{2m-1} y^{2n-1} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

تصویر 52

$$= \left[\int_0^R 2x^{2m-1} e^{-x^2} dx \right] \left[\int_0^R 2y^{2n-1} e^{-y^2} dy \right]$$

اب دائرہ $x^2 + y^2 = R^2$ کا مثبت ربع، مربع E کا حصہ ہے اور خود R دائرہ $x^2 + y^2 = 2R^2$ کے مثبت ربع کا ایک حصہ ہے۔ ان دائروں کے مثبت ربعوں کو ہم ترتیب وار E_1 اور E_2 سے ظاہر کرتے ہیں۔

چونکہ مکالمیہ مثبت ہے، اس لیے ہم پاتے ہیں

$$4 \iint_{E_1} x^{2m-1} y^{2n-1} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq 4 \iint_R x^{2m-1} y^{2n-1} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

$$\leq 4 \iint_{E_2} x^{2m-1} y^{2n-1} e^{-x^2-y^2} dx dy.$$

اب تغیروں کو r, θ میں بدلنے پر، جہاں کہ $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ہے

ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}
4 \iint_{E_1} x^{2m-1} y^{2n-1} e^{-x^2-y^2} dx dy \\
= 4 \int_0^{\pi/2} \cos^{2m-1} \theta \sin^{2n-1} \theta d\theta \int_0^R e^{-r^2} r^{2m+2n-1} dr \\
= 2B(m, n) \int_0^R e^{-r^2} r^{2m+2n-1} dr.
\end{aligned}$$

اسی طرح

$$4 \iint_{E_2} x^{2m-1} y^{2n-1} e^{-x^2-y^2} dx dy = 2B(m, n) \int_0^{2\sqrt{R}} e^{-r^2} r^{2m+2n-1} dr$$

لہذا ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}
B(m, n) \int_0^R 2e^{-r^2} r^{2(m+n)-1} dr \\
\leq \left[\int_0^R 2e^{-x^2} x^{2m-1} dx \right] \left[\int_0^R 2e^{-y^2} y^{2n-1} dy \right] \\
\leq B(m, n) \int_0^{2\sqrt{R}} 2e^{-r^2} r^{2(m+n)-1} dr.
\end{aligned}$$

اب مان لیجیے $R \leftarrow \infty$ ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned}
B(m, n) \Gamma(m+n) &\leq \Gamma(m) \Gamma(n) \leq B(m, n) \Gamma(m+n). \\
\Rightarrow B(m, n) \Gamma(m+n) &= \Gamma(m) \Gamma(n), \\
(1) \dots \Rightarrow B(m, n) &= \frac{\Gamma(m) \Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}
\end{aligned}$$

ضمنی نتیجہ 1 (Cor 1) $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ لینے پر ہم دیکھتے ہیں $m = n = \frac{1}{2}$

$$B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{[\Gamma(\frac{1}{2})]^2}{\Gamma(1)}$$

ساتھ ہی

$$B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^0 \theta \sin^0 \theta d\theta = \pi$$

اور

$$\Gamma(1) = \int_0^1 e^{-x} dx = 1$$

$$\therefore [\Gamma(\frac{1}{2})]^2 = \pi$$

$$\Rightarrow \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$$

کیونکہ $\Gamma(1)$ یقیناً مثبت ہے۔

(1) طالب علم اس نتیجہ کو براہ راست، اسی طرح ثابت کر سکتے ہیں جس طرح رشتہ (1) ثابت کیا تھا۔

ضمنی نتیجہ 2 (Cor. 2)

یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$$

ضمنی نتیجہ 3 (Cor 3)

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2m) = 2^{2m-1} \Gamma(m) \Gamma(m+\frac{1}{2})$$

ہم پاتے ہیں

$$(1) \dots \frac{\Gamma(m) \Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} = B(m, n) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta d\theta$$

اب $m = n$ لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma(m) \Gamma(m)}{\Gamma(2m)} &= 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cos^{2m-1} \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2^{2m-2}} \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} 2\theta d\theta \\ &= \frac{1}{2^{2m-1}} \int_0^{\pi} \sin^{2m-1} \varphi d\varphi \quad (2\theta = \varphi) \end{aligned}$$

$$(2) \dots \dots \dots = \frac{1}{2^{2m-2}} \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \varphi d\varphi$$

بیٹا اور گاما تفاعل

اب (1) میں $n = \frac{1}{2}$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots\dots\dots \frac{\Gamma(m) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(m+\frac{1}{2})} = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta d\theta.$$

اب (2) اور (3) سے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma(m) \Gamma(m)}{\Gamma(2m)} &= \frac{1}{2^{2m-1}} \frac{\Gamma(m) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(m+\frac{1}{2})} \\ \Rightarrow 2^{2m-1} \Gamma(m) \Gamma(m+\frac{1}{2}) &= \Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(2m) \\ &= \sqrt{\pi} \Gamma(2m) \quad \left(\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} \text{ کیونکہ} \right) \\ &\text{لہذا نتیجہ ثابت ہو گیا۔} \end{aligned}$$

مشقیں

1. ذیل کو گاما تفاعل کے ارقام میں رکھیے:-

$$I_n = \int_0^1 x^p (1-x^q)^n dx$$

جہاں q, p اور n مثبت ہوں۔

2. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{n} \frac{\Gamma(\frac{1}{n})}{\Gamma(\frac{1}{2} + \frac{1}{n})} = 2 \frac{\frac{2-n}{n} \left[\Gamma(\frac{1}{n}) \right]^2}{n \Gamma(\frac{2}{n})}$$

3. ثابت کیجیے کہ

$$(i) B(m, m) B(m+\frac{1}{2}, m+\frac{1}{2}) = \pi m^{-1} 2^{1-4m}.$$

$$(ii) B(x, x) = 2^{1-2x} B(x, \frac{1}{2}).$$

4. ثابت کیجیے کہ

$$\Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{3}{2}) = \sqrt{2\pi}$$

5. ثابت کیجیے کہ

- (i) $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin \theta}} \times \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin \theta} d\theta = \pi.$
- (ii) $\int_0^{\infty} \sqrt{y} e^{-y^2} dy \times \int_0^{\infty} \frac{e^{-y^2}}{\sqrt{y}} dy = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$
- (iii) $\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx \times \int_0^{\infty} x^3 e^{-x^2} dx = \frac{\pi}{16\sqrt{2}}$
- (iv) $\left\{ \int_0^{\pi/2} \sin^p x dx \right\} \left\{ \int_0^{\pi/2} \sin^{p+1} x dx \right\} = \frac{\pi}{2(p+1)}$

6. ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^4} dx = \frac{1}{12} \sqrt{\left(\frac{2}{\pi}\right)} \left[\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \right]^2$$

7. ثابت کیجیے کہ لیمنسکیٹ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ کا محیط $\frac{a}{\sqrt{\pi}} \left[\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \right]^2$ ہے۔

8. اگر n مثبت کامل عدد ہو تو ثابت کیجیے کہ n ختمیوں

$$x^{2n} + y^{2n} = 1 \text{ اور } x^2 + y^2 = 1$$

سے گھریزوں کا تناسب $n2^{1/n}/(n+1)$ ہوتا ہے۔

ضمیمہ 2 (APPENDIX 2)

تکمیلی علامت کے تحت تفرق

A-7۔ دو متغیروں کے تفاعل $f(x, y)$ جو کہ خطوط

$$x = a, x = b; y = c, y = d$$

سے گھرے مستطیل (rectangle) پر متعارف (defined) ہے، اُس کے مکمل

$$\int_a^b f(x, y) dx$$

پر غور کیجیے۔ صاف طور پر، یہ y کا تفاعل ہے۔ ہم لکھتے ہیں

$$\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ $\varphi(y)$ ، y کا مسلسل تفاعل ہے۔

ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بہ لحاظ y ، $f(x, y)$ کے پہلے رتبے کے جزوی تفرقی سر
 $f_y(x, y)$ کا وجود ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ $f(x, y)$ اور $f_y(x, y)$ مسلسل ہیں، یہ ثابت
 کیا جائے گا کہ

$$\varphi'(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx$$

یا دوسرے الفاظ میں

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx$$

یعنی تفرق اور تکمل کی ترتیب باہم بدلی جاسکتی ہے۔
ہم پاتے ہیں

$$\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

مان لیجیے Δy سے y میں کسی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تب ہم پاتے ہیں

$$\varphi(y + \Delta y) = \int_a^b f(x, y + \Delta y) dx.$$

$$\therefore \varphi(y + \Delta y) - \varphi(y) = \int_a^b [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)] dx.$$

اب تفرقی احصاء کے لیگرانج (Lagrange's) کے اوسط قیمت مسئلہ - (mean value theorem) کا استعمال کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y) = \int_a^b \Delta y f_y(x, y + \theta \Delta y) dx, 0 < \theta < 1$$

$$= \Delta y \int_a^b f_y(x, y + \theta \Delta y) dx$$

$$\Rightarrow \frac{\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} = \int_a^b f_y(x, y + \theta \Delta y) dx$$

$$\Rightarrow \frac{\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} = \int_a^b f_y(x, y) dx + \int_a^b [f_y(x, y + \theta \Delta y) - f_y(x, y)] dx.$$

مان لیجیے ϵ پہلے سے دیا ہوا مثبت نمبر ہے۔ تب $f_y(x, y)$ کے مسلسل ہونے کی وجہ سے ایسے مثبت نمبر δ کا وجود ہوگا کہ جب $|\Delta y| < \delta$ ہو تو

$$(2) \dots \dots \dots |f_y(x, y + \theta \Delta y) - f_y(x, y)| < \epsilon$$

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے δ, x پر منحصر نہیں۔ اس طرح سے وقفہ $[a, b]$ میں x کی ہر قیمت کے لیے غیر مساوی (inequality) (2) صحیح ہے۔

اس طرح جب $\delta \leq |\Delta y|$ ہو تو

$$\left| \int_a^b [f_v(x, y + \theta \Delta y) - f_v(x, y)] dx \right| < \varepsilon (b-a)$$

یعنی

$$\left| \frac{\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} - \int_a^b f_v(x, y) dx \right| < \varepsilon (b-a)$$

جب کہ $\delta \leq |\Delta y|$ ہو۔

لہذا

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} = \int_a^b f(x, y) dx$$

یعنی

$$\varphi'(y) = \int_a^b f_v(x, y) dx.$$

نوٹ : یہ ہو سکتا ہے کہ طالب علم (1) میں $0 < \Delta y$ کی صورت میں انتہائیں لے کر نتیجہ نکالنا چاہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اس طرح ہم انتہا کے وجود کو مان لینے کے علاوہ، اصل مشکل اور دل چسپی کی بات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طرح (1) میں $0 < \Delta y$ ہونے پر انتہائیں لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi'(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_a^b f_v(x, y + \theta \Delta y) dx$$

* یہ یکساں تسلسل (uniform continuity) کا نتیجہ ہے۔ ثبوت اس کتاب کے معیار کے باہر ہے۔
 1. معین مکملہ کے رقبہ کے مفہوم سے یہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر $|f(x)| \leq k$ ہو تو

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq k(b-a)$$

اور اگر اب ہم لکھیں

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_a^b f_v(x, y + \theta \Delta y) dx \\ = \int_a^b \lim_{\Delta y \rightarrow 0} f_v(x, y + \theta \Delta y) dx \\ = \int_a^b f_v(x, y) dx \end{aligned}$$

تو ہم یہ مان کر ایسا کر رہے ہیں کہ تکملہ کی انتہا، انتہا کے تکملہ کے برابر ہے۔
یعنی انتہا اور تکملہ کے عمل باہم بدل سکتے ہیں۔ دراصل جو ثبوت دیا گیا ہے وہ یہ مان لینے
کی توجیہ (justification) دیتا ہے۔

A.8 - وہ صورت جب کہ تکملی حدیں متغیر ہوں (variable limits of integration)

$$\varphi(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx,$$

پر غور کیجئے جہاں کہ تکمل کی حدیں $g(y)$ اور $h(y)$ خود ہی y کے تفاعل ہیں۔
ہم مان لیتے ہیں کہ بلحاظ y ، $g(y)$ اور $h(y)$ کے پہلے رتبے کے تفرقی سروں کا وجود
ہے اور یہ ثابت کریں گے کہ

$$\varphi'(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} f_v(x, y) dx + h'(y) f[h(y), y] - g'(y) f[g(y), y].$$

لیما (Lemma): اب ہمیں ذیل نتیجہ کی ضرورت ہوگی جسے تکملی احصاء کا اوسط قیمت
مسئلہ (Mean value theorem of the Integral Calculus) کہتے ہیں۔

اگر $f(x)$ وقفہ $[a, b]$ میں مسلسل ہو تو a اور b کے درمیان ایسے نمبر ξ کا
وجود ہوگا کہ

مکملی علامت کے تحت تفرق

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f(\xi)$$

معین مکملہ کے رقبے والے مفہوم اور اس کے انتہائی مجموعہ کی انتہا والے مفہوم سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

جہاں m اور M وقفہ $[a, b]$ میں $f(x)$ کی اعلیٰ ترین (greatest values) اور کمترین (least) قیمتیں ہیں۔ اس طرح m اور M کے درمیان ایسے نمبر k کا وجود ہوگا کہ

$$\int_a^b f(x) dx = k(b-a)$$

جو کہ کوئی بھی مسلسل تفاعل اپنی اعلیٰ ترین اور کم ترین قیمتوں کے درمیان کی ہر قیمت لیتا ہے، اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے نمبر k کا وجود ہوگا کہ $k = f(\xi)$ لہذا

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f(\xi)$$

اب ہم مسئلہ ثابت کریں گے

ہم پاتے ہیں

$$\varphi(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx,$$

$$\varphi(y + \Delta y) = \int_{g(y + \Delta y)}^{h(y + \Delta y)} f(x, y + \Delta y) dx$$

$$= \int_{g(y + \Delta y)}^{g(y)} f(x, y + \Delta y) dx + \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y + \Delta y) dx \\ + \int_{h(y)}^{h(y + \Delta y)} f(x, y + \Delta y) dx.$$

$$\therefore \varphi(y + \Delta y) - \varphi(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)] dx$$

$$+ \int_{h(y)}^{h(y + \Delta y)} f(x, y + \Delta y) dx - \int_{g(y)}^{g(y + \Delta y)} f(x, y + \Delta y) dx$$

تکملی احصاء

اب تکملی احصاء کے اوسط قیمت مسئلہ سے

$$\int_{h(y)}^{h(y+\Delta y)} f(x, y+\Delta y) dx = [h(y+\Delta y) - h(y)] f(\xi, y+\Delta y)$$

اور

$$\int_{g(y)}^{g(y+\Delta y)} f(x, y+\Delta y) dx = [g(y+\Delta y) - g(y)] f(\eta, y+\Delta y)$$

جہاں کہ ξ ایسا نمبر ہے جو $h(y)$ اور $h(y+\Delta y)$ کے درمیان ہے اور η ایسا نمبر ہے جو $g(y)$ اور $g(y+\Delta y)$ کے درمیان ہے۔

$$\therefore \varphi(y+\Delta y) - \varphi(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} \Delta y f_v(x, y+\theta \Delta y) dx$$

$$+ [h(y+\Delta y) - h(y)] f(\xi, y+\Delta y) - [g(y+\Delta y) - g(y)] f(\eta, y+\Delta y)$$

$$\Rightarrow \frac{\varphi(y+\Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} = \int_{g(y)}^{h(y)} f_v(x, y+\theta \Delta y) dx + \frac{h(y+\Delta y) - h(y)}{\Delta y} f(\xi, y+\Delta y)$$

$$(1) \dots \dots \dots - \frac{g(y+\Delta y) - g(y)}{\Delta y} f(\eta, y+\Delta y)$$

اب § A.7 کی طرح سے

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_{g(y)}^{h(y)} f_v(x, y+\theta \Delta y) dx = \int_{g(y)}^{h(y)} f_v(x, y) dx.$$

اس لیے جب $0 \leftarrow \Delta y$ ہو تو (1) میں انتہائیں لینے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi'(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} f_v(x, y) dx + h'(y) f[h(y), y] = g'(y) f[g(y), y]$$

A.9- غیر واجب تکملوں کے لیے تکملی علامت کے تحت تفرق

اوپر جو نتائج حاصل کیے گئے ہیں ان کا استعمال غیر واجب تکملوں کے لیے نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں مزید جانچ کی ضرورت ہے کہ یہ نتائج غیر واجب تکملوں کے لیے بھی

صحیح ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ بات اس کتاب کے معیار کے باہر ہے۔ آگے جب بھی کسی غیر واجب محمولہ سے سابقہ ہوگا تو یہ مان لیں گے کہ ان نتائج کے بجا ہونے کی ضروری شرائط پوری ہو رہی ہیں۔

مشقیں

۱. حاصل کیجیے

$$\int_0^{\pi/2} \log (\alpha \cos^2 \theta + \beta \sin^2 \theta) d\theta, \quad (\alpha > 0, \beta > 0)$$

$$\varphi(\alpha, \beta) = \int_0^{\pi/2} \log (\alpha \cos^2 \theta + \beta \sin^2 \theta) d\theta$$

$$\therefore \varphi_\alpha(\alpha, \beta) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 \theta}{\alpha \cos^2 \theta + \beta \sin^2 \theta} d\theta$$

$$(1) \dots \dots \dots = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\alpha + \beta \tan^2 \theta}$$

$$= \int_0^\infty \frac{dt}{(1+t^2)(\alpha + \beta t^2)}$$

($t = \tan \theta$ رکھنے پر)

$$= \frac{1}{\alpha - \beta} \int_0^\infty \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{\beta}{\alpha + \beta t^2} \right) dt \quad (\alpha \neq \beta \text{ اگر })$$

$$= \frac{1}{\alpha - \beta} \left[\tan^{-1} t - \frac{\beta}{\sqrt{\alpha\beta}} \tan^{-1} \sqrt{\beta} t \right]_0^\infty$$

$$= \frac{1}{\alpha - \beta} \left[\frac{\pi}{2} - \sqrt{\left(\frac{\beta}{\alpha} \right) \frac{\pi}{2}} \right] = \frac{\pi}{2\sqrt{\alpha}(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})}$$

اگر $\beta = \alpha$ ہو تو (1) سے ہم پاتے ہیں

$$\varphi_\alpha(\alpha, \beta) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 \theta}{\alpha} d\theta = \frac{\pi}{4\alpha}$$

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ

$$\varphi_\alpha(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2\sqrt{\alpha}(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})}$$

اب α کی نسبت سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(2) \dots \dots \dots \varphi(\alpha, \beta) = \pi \log (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}) + c$$

جہاں کہ c, α پر منحصر نہیں ہے۔
ساتھ ہی ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha, \beta) &= \int_0^{\pi/2} \log (\alpha \cos^2 \theta + \beta \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \log \left[\alpha \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) + \beta \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right] d\theta \\ &\quad (4.92 \text{ § دیکھیے}) \end{aligned}$$

$$(3) \dots \dots \dots = \int_0^{\pi/2} \log (\alpha \sin^2 \theta + \beta \cos^2 \theta) d\theta = \varphi(\beta, \alpha)$$

چونکہ $\varphi(\alpha, \beta) = \varphi(\beta, \alpha)$ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ (2) میں c, β پر منحصر نہیں ہے۔
لہذا c ایک مطلق مستقل (absolute constant) ہے۔

اب

$$\varphi(1, 1) = \int_0^{\pi/2} \log (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) dx = 0$$

پھر (2) میں $\alpha = \beta = 1$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں

$$0 = \varphi(1, 1) = \pi \log 2 + c$$

$$c = -\pi \log 2 \quad \text{یعنی}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha, \beta) &= \pi \log (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}) - \pi \log 2 \\ &= \pi \log \left[\frac{1}{2} (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}) \right]. \end{aligned}$$

2 حاصل کیجیے

$$\int_0^a \frac{\log (1+ax)}{1+x^2} dx$$

اور ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^1 \frac{\log (1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \log 2$$

ہم دیکھتے ہیں

$$(1) \dots \dots \dots \varphi(a) = \int_0^a \frac{\log(1+ax)}{1+x^2} dx.$$

$$\therefore \varphi'(a) = \int_0^a \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\log(1+ax)}{1+x^2} \right) dx + 1 \cdot \frac{\log(1+a^2)}{1+a^2}$$

$$= \int_0^a \frac{x}{(1+ax)(1+x^2)} dx + \frac{\log(1+a^2)}{1+a^2}$$

جزوی کسروں میں توڑنے پر ہم پاتے ہیں

$$\frac{x}{(1+ax)(1+x^2)} = \frac{a}{(1+a^2)(1+ax)} + \frac{x+a}{(1+a^2)(1+x^2)}.$$

$$\therefore \int_0^a \frac{x}{(1+ax)(1+x^2)} dx = -\frac{1}{1+a^2} \left| \log(1+ax) \right|_0^a$$

$$+ \left| \frac{1}{2(1+a^2)} \log(1+x^2) \right|_0^a + \left| \frac{a \tan^{-1} x}{1+a^2} \right|_0^a$$

$$= -\frac{1}{2(1+a^2)} \log(1+a^2) + \frac{a}{1+a^2} \tan^{-1} a$$

$$\therefore \varphi'(a) = \frac{1}{2(1+a^2)} \log(1+a^2) + \frac{a}{1+a^2} \tan^{-1} a.$$

اب تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi(a) = \frac{1}{2} \left[\int \frac{1}{1+a^2} \log(1+a^2) da + \int \frac{a}{1+a^2} \tan^{-1} a da \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\tan^{-1} a \log(1+a^2) - \int \frac{2a}{1+a^2} \tan^{-1} a da \right]$$

$$+ \int \frac{a}{1+a^2} \tan^{-1} a da + c,$$

جہاں کہ داہنی طرف کے پہلے تہملہ پر حصہ سے تکمل کا اصول لگایا گیا ہے اور c اختیاری مستقل ہے۔

اس طرح

$$(2) \dots \dots \dots \varphi(a) = \frac{1}{2} \tan^{-1} a \log(1+a^2) + c$$

اب (1) سے ہم دیکھتے ہیں کہ $\varphi(0) = 0$ پھر (2) میں $a = 0$ رکھنے پر $0 = c$ ملتا

ہے۔ اس لیے

$$\varphi(a) = \frac{1}{2} \tan^{-1} a \log(1+a^2)$$

اس میں $a = 1$ رکھنے پر

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2} dx = \varphi(1) = \frac{1}{2} \tan^{-1} 1 \log 2 = \frac{\pi}{8} \log 2.$$

3۔ ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^\infty \frac{\tan^{-1} ax}{x(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{2} \log(1+a) \quad (a \geq 0 \text{ اگر})$$

اور $a < 0$ ہونے پر اس تکملہ کی قیمت نکالے۔
ہم لکھتے ہیں

$$(1) \dots \dots \dots \varphi(a) = \int_0^\infty \frac{\tan^{-1} ax}{x(1+x^2)} dx.$$

تکمیلی علامت کے تحت تفرق کو سمجھتے ہوئے ہم پاتے ہیں

$$\begin{aligned} \varphi(a) &= \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{1-a^2} \left[\frac{1}{1+x^2} - \frac{a^2}{1+a^2x^2} \right] dx \\ &= \frac{1}{1-a^2} \left[\tan^{-1} x - a \tan^{-1} ax \right]_0^\infty \end{aligned}$$

$$(2) \dots \dots \dots = \frac{1}{1-a^2} \left(\frac{\pi}{2} - a \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2(1+a)}$$

یہاں a مثبت ہونے پر ہم پاتے ہیں

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\tan^{-1} ax) = \frac{\pi}{2}$$

یہ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ (2) اُس وقت بھی صحیح ہے جب کہ $a = 0$ ہو۔
اب (2) کا لحاظ تکمیل کر کے ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots \dots \dots \varphi(a) = \frac{\pi}{2} \log(1+a) + c$$

تکملی علامات کے تحت تفرق

جہاں c اختیاری مستقل ہے۔
ساتھ ہی (1) سے

$$\varphi(0) = 0$$

اس طرح (3) میں $a = 0$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں
 $c = 0$

$$\therefore \varphi(a) = \frac{1}{2}\pi \log(1+a)$$

اب مان لیجئے کہ a منفی ہے۔ ہم پاتے ہیں

$$\varphi'(a) = \frac{1}{1-a^2} \left| \tan^{-1} x - a \tan^{-1} ax \right|_0^\infty$$

$$(4) \dots\dots\dots = \frac{1}{1-a^2} \left[\frac{\pi}{2} - a \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = \frac{\pi}{2(1-a)}$$

کیونکہ a منفی ہے، اس لیے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\tan^{-1} ax) = -\frac{\pi}{2}$$

اب (4) کا تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi(a) = -\frac{\pi}{2} \log(1-a) + c.$$

پہلے کی طرح یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ $c = 0$ ہے۔ لہذا ہم پاتے ہیں

$$\varphi(a) = -\frac{\pi}{2} \log(1-a)$$

4۔ حاصل کیجیے

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x} \frac{\sin \beta x}{x} dx, (\alpha \geq 0 \text{ جہاں})$$

اور یہ نتیجہ نکالنے کے لیے کہ

$$\int_0^\infty \frac{\sin \beta x}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (\beta > 0 \text{ اگر}) \\ 0 & (\beta = 0 \text{ اگر}) \\ -\frac{\pi}{2} & (\beta < 0 \text{ اگر}) \end{cases}$$

ہم لکھتے ہیں

$$(1) \dots\dots\dots \varphi(\alpha, \beta) = \int_0^\infty e^{-\alpha x} \frac{\sin \beta x}{x} dx$$

تکلی علامت کے تحت تفرق کو بجائے ہوئے بلحاظ β تفرق کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi_\beta(\alpha, \beta) = \int_0^\infty e^{-\alpha x} \cos \beta x dx$$

$$= \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \quad (\alpha > 0 \text{ دیکھیے}) \quad \text{مثال 2}$$

اب بلحاظ β تکمل کرنے پر ملتا ہے۔

$$(2) \dots\dots\dots \varphi(\alpha, \beta) = \tan^{-1} \frac{\beta}{\alpha} + c$$

جہاں c کوئی مستقل ہے۔ اب (1) سے ہم پاتے ہیں

$$(3) \dots\dots\dots \varphi(\alpha, 0) = c$$

اور (2) میں $\beta = 0$ رکھنے پر $c = 0$ ملتا ہے۔ لہذا

$$(4) \dots\dots\dots \varphi(\alpha, \beta) = \tan^{-1} \frac{\beta}{\alpha}$$

جہاں کہ $\alpha > 0$

ساتھ ہی ہم مان لیتے ہیں کہ $\varphi(\alpha, \beta)$ ، α کا مسلسل تفاعل ہے اگر $\alpha > 0$ ہو۔
(1) سے ہم پاتے ہیں

$$\varphi(0, \beta) = \int_0^\infty \frac{\sin \beta x}{x} dx,$$

اور (4) سے ملتا ہے

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \varphi(0, \beta) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(\tan^{-1} \frac{\beta}{\alpha} \right) = \begin{cases} \pi/2, & (\beta > 0 \text{ اگر}) \\ 0, & (\beta = 0 \text{ اگر}) \\ -\pi/2, & (\beta < 0 \text{ اگر}) \end{cases}$$

تکملی علامت کے تحت تفرق

ساتھ ہی تسلسل (continuity) کی وجہ سے

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \varphi(\alpha, \beta) = \varphi(0, \beta)$$

$$\therefore \int_0^{\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx = \begin{cases} \pi/2 & (\beta > 0 \text{ اگر}) \\ 0 & (\beta = 0 \text{ اگر}) \\ -\pi/2 & (\beta < 0 \text{ اگر}) \end{cases}$$

خاص کر ہم پاتے ہیں

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

تکملی علامت کے تحت تفرق کو بجا مان کر ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{4}\alpha^2}$$

ہم لکھتے ہیں

$$(1) \dots \dots \dots \varphi(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx.$$

$$\therefore \varphi'(\alpha) = -\int_0^{\infty} x e^{-x^2} \sin \alpha x dx$$

حصہ سے تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$\varphi'(\alpha) = \left[\frac{1}{2} e^{-x^2} \sin \alpha x \right]_0^{\infty} - \frac{\alpha}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx$$

$$= 0 - \frac{\alpha}{2} \varphi(\alpha) = -\frac{\alpha}{2} \varphi(\alpha),$$

$$\Rightarrow \frac{\varphi'(\alpha)}{\varphi(\alpha)} = -\frac{\alpha}{2}$$

تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(2) \dots \dots \dots \log \varphi(\alpha) = -\frac{1}{4}\alpha^2 + c_1 \Rightarrow \varphi(\alpha) = c e^{-\frac{1}{4}\alpha^2}$$

اب (1) میں $\alpha = 0$ رکھنے پر ہم پاتے ہیں۔

$$(3) \dots \dots \dots \varphi(0) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

(A.6 § کا ضمنی نتیجہ 2 دیکھیے)

اب (2) میں $\alpha = 0$ رکھنے پر $\varphi(0) = c$ ، اس لیے

$$\varphi(\alpha) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-\alpha^2}$$

6-ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1} \alpha x \tan^{-1} \beta x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2} \log \left[\frac{(\alpha + \beta)^{\alpha + \beta}}{\alpha^{\alpha} \beta^{\beta}} \right]$$

ہم لکھتے ہیں

$$(1) \dots \dots \dots \varphi(\alpha, \beta) = \int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1} \alpha x \tan^{-1} \beta x}{x^2} dx$$

تکملی علامت کے تحت تفرق کو بجا مانے، ہوئے، ہم پاتے ہیں

$$(2) \dots \dots \dots \varphi_{\alpha}(\alpha, \beta) = \int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1} \beta x}{x(1 + \alpha^2 x^2)} dx.$$

$$\begin{aligned} \varphi_{\beta\alpha}(\alpha, \beta) &= \int_0^{\infty} \frac{1}{(1 + \beta^2 x^2)(1 + \alpha^2 x^2)} dx \\ &= \frac{1}{\alpha^2 - \beta^2} \int_0^{\infty} \left(\frac{\alpha^2}{1 + \alpha^2 x^2} - \frac{\beta^2}{1 + \beta^2 x^2} \right) dx, \\ &\quad (\text{اگر } \alpha \neq \beta) \\ &= \frac{1}{\alpha^2 - \beta^2} \left[\alpha \tan^{-1} \alpha x - \beta \tan^{-1} \beta x \right]_0^{\infty} \end{aligned}$$

$$(3) \dots \dots \dots = \frac{\pi}{2(\alpha + \beta)}$$

جہاں α, β مثبت مانے گئے ہیں۔

یہ آسانی سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نتیجہ (3) تب بھی صحیح رہتا ہے جب کہ $\alpha = \beta$ ہو۔
اب بظاہر (3) کا تکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(4) \dots \dots \dots \varphi_{\alpha}(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \log(\alpha + \beta) + f(\alpha)$$

مکملی علامات کے تحت تفرق

جہاں $f(\alpha)$ کا اختیاری تفاعل ہے۔

اب (2) سے

$$(5) \dots \dots \dots \varphi_{\alpha}(\alpha, 0) = 0$$

پھر (4) اور (5) سے ہم پاتے ہیں

$$0 = \frac{\pi}{2} \log \alpha + f(\alpha),$$

$$\Rightarrow f(\alpha) = -\frac{\pi}{2} \log \alpha.$$

$$(6) \dots \dots \dots \varphi_{\alpha}(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \log(\alpha + \beta) - \frac{\pi}{2} \log \alpha$$

اسی طرح ہمیں مل سکتا ہے

$$(7) \dots \dots \dots \varphi_{\beta}(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \log(\alpha + \beta) - \frac{\pi}{2} \log \beta$$

اب لحاظ α ، (6) کا مکمل کرنے پر ہم پاتے ہیں

$$(8) \dots \varphi(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} [(\alpha + \beta) \log(\alpha + \beta) - (\alpha + \beta)] - \frac{\pi}{2} (\alpha \log \alpha - \alpha) + g(\beta)$$

جہاں کہ $g(\beta)$ کا کوئی اختیاری تفاعل ہے۔

(8) سے ہم پاتے ہیں

$$(9) \dots \dots \dots \varphi_{\beta}(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \log(\alpha + \beta) + g'(\beta)$$

پھر (7) اور (9) سے ملتا ہے

$$g'(\beta) = -\frac{\pi}{2} \log \beta$$

$$(10) \dots \dots \dots \therefore g(\beta) = -\frac{\pi}{2} [\beta \log \beta - \beta] + c$$

اب (8) اور (1) سے

$$(11) \dots \dots \dots 0 = \varphi(\alpha, 0) = g(0)$$

پھر (10) اور (11) سے ہمیں $c = 0$ ملتا ہے، اس لیے

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha, \beta) &= \frac{\pi}{2} [(\alpha + \beta) \log(\alpha + \beta) - (\alpha + \beta)] \\ &\quad - \frac{\pi}{2} (\alpha \log \alpha - \alpha) - \frac{\pi}{2} (\beta \log \beta - \beta) \\ &= \frac{\pi}{2} [(\alpha + \beta) \log(\alpha + \beta) - \alpha \log \alpha - \beta \log \beta] \\ &= \frac{\pi}{2} \log \frac{(\alpha + \beta)^{\alpha + \beta}}{\alpha^{\alpha} \beta^{\beta}}\end{aligned}$$

مشقیں

(ذیل کے غیر واجب تکملوں کے لیے تکملی علامت کے تحت تفرق کو بجا مان سکتے ہیں)
1- تکملہ

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{a + b \cos x}, \quad a > 0, |b| < a.$$

کی قیمت حاصل کیجیے اور یہ نتیجہ نکال لے کر

$$\int_0^{\pi} \frac{ax}{(a + b \cos x)^2} = \frac{\pi a}{(a^2 - b^2)^{3/2}} \quad \text{اور} \quad \int_0^{\pi} \frac{\cos x \, dx}{(a + b \cos x)^2} = -\frac{\pi b}{(a^2 - b^2)^{3/2}}$$

2- نتائج

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a}, \quad a > 0, \quad \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}, \quad n > -1$$

سے شروع کر کے یہ نتائج نکال لے کر

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax} dx = \frac{m!}{a^{m+1}}, \quad \int_0^1 x^n (\log x)^m dx = \frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$$

3. جہاں m کوئی مثبت کامل عدد ہے۔ کسی مناسب تکملہ سے شروع کر کے، ثبات کیجیے کہ

$$\int_0^x \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{1}{2a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + \frac{x}{2a^2(x^2 + a^2)}$$

4- تکملی علامت کے تحت تکملوں

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a} = \frac{\pi}{2\sqrt{a}}, \quad a > 0.$$

کا تفرق کر کے ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2^n a^{n+\frac{1}{2}}}.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+a)^{n+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2^n n! a^{n+\frac{1}{2}}}.$$

5. ثابت کیجیے کہ اگر $y > 0$ ہو تو

$$\int_0^{\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} y.$$

6. اگر $|a| < 1$ تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi} \log(1+a \cos x) dx = \pi \log \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1-a^2} \right].$$

7. اگر $|a| < 1$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$(i) \int_0^{\pi} \frac{\log(1+a \cos x)}{\cos x} dx = \pi \sin^{-1} a.$$

$$(ii) \int_0^{\pi/2} \frac{\log(1+\cos \alpha \cos x)}{\cos x} dx = \frac{\pi^2 - 4\alpha^2}{8}$$

8. اگر $x^2 \leq 1$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^{\pi/2} \log(1-x^2 \cos^2 \theta) d\theta = \pi \log \{1 + \sqrt{1-x^2}\} - \pi \log 2$$

9. حاصل کیجیے

$$\int_0^{\pi/2} \log \left(\frac{a+b \sin \theta}{a-b \sin \theta} \right) \operatorname{cosec} \theta d\theta. \quad (a > b)$$

10. حاصل کیجیے :-

$$I(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{\log(1+y \sin^2 x)}{\sin^2 x} dx$$

یہ دکھا کر کہ

$$I(y) = \frac{\pi}{2\sqrt{1+y}}.$$

11- ثابت کیجیے کہ

$$y = \frac{1}{k} \int_0^x f(t) \sin k(x-t) dt$$

تفرقی مساوات

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + k^2 y = f(x)$$

کو مطمئن کرتا ہے، جہاں k کوئی مستقل ہے۔
12- مان لیجیے کہ

$$u = \int_0^\infty e^{-x \cos \theta} x^{n-1} \sin (x \sin \theta) dx,$$

$$v = \int_0^\infty e^{-x \cos \theta} x^{n-1} \cos (x \sin \theta) dx.$$

یہ ثابت کیجیے کہ

$$\frac{du}{d\theta} = -nv, \frac{dv}{d\theta} = nu$$

اور

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + n^2 u = 0, \frac{d^2 v}{d\theta^2} + n^2 v = 0$$

یہ نتیجہ نکالیے کہ

$$u = \Gamma(n) \cos n\theta, v = \Gamma(n) \sin n\theta$$

13- ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^\infty e^{-ax} x^{m-1} \cos bx dx = \frac{\Gamma(m) \cos m\theta}{r^m}$$

جہاں کہ $r^2 = a^2 + b^2$ اور $\theta = \tan^{-1}(a/b)$

14- ثابت کیجیے کہ

$$\int_0^\infty \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

15- ثابت کیجیے کہ

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2} + \alpha} \sin \theta \cos^{-1} (\cos \alpha \operatorname{cosec} \theta) d\theta = \frac{\pi}{2} (1 - \cos \alpha).$$

تکلی علامت کے تحت تفرق

16. پہلے رتبے والی وہ تفرقی مساوات حاصل کیجیے جس کو

$$\varphi(y) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \sin 2yx \, dx$$

مطمن کرے۔ یہ بھی ثابت کیجیے کہ

$$\varphi(y) = \int_0^y e^{x^2 - y^2} \, dx$$

جوابات

9. $\pi \sin^{-1}(b/a).$

10. $\pi[\sqrt{1+y}-1].$

16. $\frac{d\varphi}{dy} + 2y \varphi(y) = 1$

لغت (انگریزی سے اردو)

A			
About	گرد	Arc	توس
Abscissa	فصلہ	Arch	محراب
Absolute value	مطلق قیمت	Area	رقبہ
According as	بموجب اس کے کہ	Area function	رقبہ تفاعل
Algebraic	جبری	Ascending	صعودی
Analytical proof	تحلیلی ثبوت	Assigned value	مقررہ قیمت
Angle	زاویہ	Assumption	مفروضہ
Anti-clockwise	ظان عکس وار	Astroid	ایسٹروئڈ
Appendix	ضمیمہ	Asymptote	لامتناہی مماس
Applications	استعمال	Author	مصنف
Approximation	تخمینہ	Auxiliary Circle	معاون دائرہ
Approximately	تخمیناً	Axes	محاور
Approximate value	تخمینی قیمت	Axiom	بہیمہ
Arbitrary	اختیاری	Axis	محور
		B	
Arbitrary	اختیاری مستقل	Base	قاعدہ
Constant		Binomial	دو درجہ کی مسئلہ
Arbitrary system	اختیاری نظام	theorem	

Bisecting radius	تصنیفی نصف قطر	Cissoid	سیسائڈ
Bounded above	اوپر سے محدود	Class	قسم
Branches	شاخیں	Clock-wise	ساعت وار
By trial	طریقہ آزمائش سے	closed Curve	بند منحنی
		Co-axial	ہم محور
		Coefficient	سہ ضریب
		Coincide	منطبق ہونا
		Collinear	ہم خط
		Combination	مربک
		Common	مشترک
		Common ratio	مشترک تناسب
		Common tangent	مشترک مماس
		Compare	موازنہ کرنا
		Comparison	موازنہ
		Comparison	
		integrab	موازنہ کی تکمیل
		Comparison test	موازنہ کی جانچ
		Complementary	
		Integrals	تمامی تفاعل
		Complete integral	کامل تکملہ
		Concentric	ہم مرکز
		Conditions	شرائط
		Cone	مخروط
Calculate	حاصل کرنا		
Cartesian	کارٹیزی		
Cases	صورتیں		
Catenary	زنجیرہ		
Centre	مرکز		
Centre of gravity	مرکز ثقل		
Centre of Inertia	مرکز جمود		
Centroid	مرکز وسطانی		
Change	تبدیلی		
Chord	وتر		
Circle	دائرہ		
Circular base	دائری قاعدہ		
Circular sector	دائری قطع		
Circular disc	دائری ڈسک		
Circumference	محیط		

Confocal	ہم فوکی	Curve	متعنی
Conic	مخروطی	Curved Surface	سطح خمیدہ
Conjugate	زوجی	Cycloid	سائیکلائڈ
Conjugate imaginary } imaginary }	زوجی خیالی	Cylinder	اسطوانہ
Constant	مستقل	Decompose	اجزا کرنا
Constant of integration }	مکملی مستقل	Deduce	نتیجہ نکالنا
Contact	تماس	Definition	تعریف
Continuity	تسلسل	Definite integral }	معین تکملہ
Continuous	مسلل	Degree	ڈگری، درجہ
Continuous distribution }	مسلل تقسیم	Denominator	نسب نما
Convention	رداج	Denote	ظاہر کرنا
Convergence	تقارب	Dependent	سایج - منحصر
Convergent	متقارب	Density	کثافت
Co-ordinates	نقطعات	Derivative	مشتق
Co-ordinate axes }	نقطہ محاور	Describe	طے ہونا
Corresponding	مطابق	Determine	حاصل کرنا
Corolary	ضمنی نتیجہ	Developed	تدریجی
Current		Diagonal	دتر
Co-ordinates }	حالیہ نقطہ	Diameter	قطر
		Differentiable }	قابل تفرق

Differential	} تفرقی سر	Eliminant	اسقاطی
Coefficient		Eliminate	اسقاط
Differential	} تفرقی احصا	Ellypse	علیس
Calculus		Ellyptic	} علیسی تفاعل
Differential	} تفرقی مساوی	function	
equation		Employ	استعمال کرنا
Differentiate	تفرق کرنا	Envelope	لفاف
Differentiation	تفرق	Equality	تساوی
Digit	ہندسہ	Equation	مساوات
Disc	ملکیہ	Equations	مساواتیں
Discontinuous	غیر مسلسل	Equiangular	} مساوی زاویہ کی
Discontinuity	غیر تسلسل	spiral	
Discrete	جدا جدا	Even	جفت
Discussion	مباحثہ	Evolute	برہنجیہ
Distribution	تقسیم	Exact	راست
Double	دہرا	Exercises	مشقیں
Double tangent	دہرا مماس	Exist	وجود ہونا
Duplication	} مشقی فارمولا	Expansion	کھولنے پر
formula		Exponential	} قوتی تفاعل
E		function	
Eccentricity	خروج المرکز	Extension	توسیع
Elementary	} ابتدائی اسکالہ	F	حقیقت
integral		Fact	

Family of Curves	قبیلہ منحنی	Geometrical	جیومیٹریائی
Finite	مقتنا ہی	interpretation	مفہوم
Fixed ordinate	ثابت عرض	Graph	گراف
Fixed point	ثابت نقطہ	Gravitation	کشش
Focal chord	ماسکی وتر	H	
Focus	ماسک	Hemisphere	نصف کرہ
Folium	فولیم	Highest	بالا ترین
Form	شکل	Hint	اشارہ
Formula	فارمولا	Homogeneous function	ہم جنس تفاعل
Four-leaved rose	چار پتہ گلاب	Homogeneous equation	ہم جنس مساوات
Fraction	کسر	Hyperbola	زائد
Fractional	کسری	Hyperbolic spiral	زائدی کمائی
Frustum	فرسٹم		
Function	تفاعل		
Fundamental	بنیادی		
G		Image	عکس
General form	عام شکل	Imaginary	خیالی
General integral	عام تکامل	Imply	مراد رکھنا (تب)
General Solution	عام حل	Improper	غیر واجب
Generalization	توسیع	Increment	اضافہ
Generalized	توسیع شدہ	Infinite-	قیمت کا
Generator	مولد	valuedness	عدم تعین

Indefinite	غیر معین	Integral	} کامل عدد و قس
Indefinite integral	غیر معین تکملہ	powers	
Independent	غیر تابع	Integrate	تکمیل کرنا
Independent variable	غیر تابع متغیر	integration	تکمیل
Interminate	غیر حاصی	Integration by parts	} حصہ سے تکمیل
Index	قوت	substitution	
Induction	استقرا	Integration by successive reduction	} متواتر تحلیل سے تکمیل
Inequality	غیر تسادی		
Inequality sign	علامت غیر تسادی	Integrating factor	} تکمیلی جزو
Infinite	لامتناہی		
Infinite series	لامتناہی سلسلہ	Interpretation	فہم
Infinitesimal	صغاری	Intrivisic equation	} نجی مساوات
Infinity	لامتناہی		
Initial line	ابتدائی خط	Intrinsic co-ordinates	} نجی مختصات
Integer	کامل عدد		
Integrable	قابل تکمیل	Introduction	تہمید
Integrand	سکالمیہ	Irrational	غیر ناطق
Integral	تکمیلہ	Intuitively	وجدانی طور پر
Integral Calculus	تکمیلی حساب	Invariant	لا متغیر
Integral curve	تکمیلی منحنی	Inverse	مکوس

Inverse function	مکوس تفاعل	Limiting value	انتہائی عمل
Inverse operator	مکوس عامل	Line	خط
Inverse ratio	مکوس نسبت	Lines	خطوط
Inverse trigonometric function	مکوس مثلثاتی تفاعل	Linear	خطی
		Linear	خطی
		Combination	تکلیب
Jointly	اشترک سے	Linear differential equation	خطی تفرقی مساوات
Justification	توجیہ		
		Linear equations	خطی مساواتیں
Lamina	مادی چادر	Locus	طریق
Latus rectum	دتر خاص	Logarithm	لوگار تھم
Left hand side	بائیں جانب	Logical	منطقی
Legitimate conclusion	درست نتیجہ	Justification	توجیہ
Lemma	لیما	Loop	لوپ
Lemniscate	لیمنسکیٹ	Lomer	زیریں انتہا
Length of an arc	توس کی لمبائی	limit	
Lesser indices	کمتر قوتیں		
Limit	انتہا	Major axis	محور اکبر
Limit of a sum	انتہاء مجموعہ	Mass	مقدار

Mathematical	} حسابی استقرا	Numerical	تعدادی
induction		Numerically	تعدادی حیثیت سے
Maximum	اعظم	n^{th} power	n ویں قوت
Mean proportional	اوسط نسبتی	n^{th} root	n وال ریشہ
Mean value	} اوسط قیمت مسئلہ		
theorem		0	
Mechanics	مکینیکی	Odd	طاق
Mid point	وسطی نقطہ	Operand	متعمل
Minimum	اقل (کمترین)	Operator	عامل
Minor axis	محور اصغر	Opposite	بالمقابل و مخالف
Miscellaneous	متفرق	Order	رتبہ
Moment of	} جوہر کا معیار اثر	Ordinate	عرض
Inertia		Origin	مبدأ
Monotonically	} یک کیفی	Orthogonal	عمودی
decreasing		Orthogonal trajectory	عمودی مستدیر
Monotonically	} یک کیفی		
increasing		P	
N		Parabola	مکانی
Negative	نفی (منفی)	Parallel	متوازی
Non-convergent	غیر متقارب	Parameter	پیرامیٹر
Normal	عماد	Parametric equation	پیرامیٹری مساوات
Notations	علامتیں	Pairwise	جوڑے وار
Numerator	شمار کنندہ	Partial	جزوی

Partial fraction	جزدی کسر	Polar sub-tangent	قطبی تحت مماس
Particle	زره	Polar sub-normal	قطبی تحت عماد
Particular solution	مخصوص حل	Pole	قطب
Particular integral	تکمله خاص	Polygon	کثیرضلعی
		Polynomial	شیررکنی
Pedal	پدیل	Position	مقام
Perfect square	مربع کامل	Positive	مثبت
Perimeter	محیط	Power	قوت
Permutation	ترتیب	Primitive	آبائی
Perpendicular	عمود	Process	عمل
Plane	ہموار	Product	اصل ضرب
Plane region	ہموار خطہ	Property	خصوصیت
Plane surface	ہموار سطح	Properties	خصوصیات
Point of contact	نقطہ تماس	Proportion	تناسب
Points of division	نقاط تقسیم	Proportional Proposition	متناسب قول
Point of intersection	نقطہ تماس	Q	
Polar co-ordinates	قطبی مختصات	Quadratic	دو درجی
		Quadrant	ربع
		Quadrature	تربیع
Polar equation	قطبی مساوات	Quantity	مقدار

Quotient	خارج قسمت	Region	خطہ
R		Region of integration	خطہ تکمیل
Radical axis	اصلی محور	Relation	رشتہ و رابطہ
Radical sign	علامت جذر	Remainder	باقی
Radius	نصف قطر	Represent	ظاہر کرنا
Radius vector	نصف قطری سمتی	Result	نتیجہ
Rate	شرح	Reverse	اُلٹ جانا
Ratio	نسبت	Revolution	گردش
Rational	ناطق	Right Circular cylinder	قائم دائری اسطوانہ
Rational function	ناطق تفاعل	Right circular cone	قائم دائری مخروط
Real	حقیقی	Rigid bodies	کڑے مجسمے (ٹھوس)
Real part	حقیقی حصہ	Rigid material system	کڑے مادی نظام
Real roots	حقیقی ریشے	Rod	چھڑ
Reciprocal	مقلوب	Roots	ریشے
Rectangle	مستطیل	S	
Rectangular axes	قائم محاور	Section	باب
Rectangular hyperbola	قائم زائد	Sectorial-area	رتبہ قطع
Rectification	توسی اصلاح	Segment	قطع
Reduction	تویل	Semi-axes	نصف محاور
Reduction formula	تویلی فارمولا		

Semi-cubic	نصف کعبی	Square	مربع
Semi-cubical	نصف کعبی مکانی	Square root	جذر
parabola		Squaring	مربع لینے پر
Semi-vertical	نصف راسی زاویہ	Standard forms	معیاری شکلیں
angle		Standard results	معیاری نتائج
Separable	علیحدہ پذیر	Step	قدم
Series	سلسلہ	Steps	اقدام
Single-valued	واحد قیمتی	Straight line	خط مستقیم
Sign	علامت	Strophoid	اسٹروفائڈ
Sign of	علامت تکمل	Study	مطالعہ
integral		Sub-normal	تحت عماد
Singular Solution	واحد حل	Sub-tangent	تحت مماس
Simpson's rule	سمسکا اصول	Substitution	عوضی
Slant height	ترجھی اونچائی	Successive	متواتر
Slope	دھال	Successive reduction	متواتر تحویل
Smallest	کمترین	Sufficient test	کافی جانچ
Solid	ٹھوس	Suitable	مناسب
Solid of revolution	گردشی ٹھوس	substitution	عوضی
Solution	حل	Surd	سرد
Solve	حل کرنا	Surface	سطح
Sphere	کرہ	Symbols	علامتیں
Spindle-Shaped	سکھلی نما		

Surface of revolution	گردشی سطح	Transpose	منتقل کرنا
		Transposition	منتقلی
Symmetrical	تشاکل	Trigonometric	ثلثاتی
Symmetry	تشاکل	Triple	تیرہ
System	نظام	U	
Systematic	باقاعدہ	Unequal	غیر مساوی
T		Unequal roots	غیر مساوی ریشے
Table	جدول	Uniform	یکساں
Tagent	ماس	Uniform	یکساں تسلسل
Tangential	ماسی	continuity	
Tend	مائل ہونا	Unique	یکتا
Term	رکن	Unit	اکائی
Terms	ارکان	Unknown	نامعلوم
Terms of	ارقام میں	Upper limit	اوپری حد
Theorem	مسئلہ	V	
Theory of equations	نظریہ مساوات	Value	قیمت
Three-leaved rose	تین پتیہ گل	Variable	متغیر
		Variable point	متغیر نقطہ
Trace	ترسیم کرنا	Variables	علیحدہ پذیر متغیر
Tractrix	ٹریکٹریس	Separable	
Trajectory	مستدیر	Variation	تغیر
Transformation	استحالہ	Vector	سمتی

Vectorial angle	سستی زاویہ	W	
Vertex	راس	Whole number	کامل عدد
Volume	حجم	With respect to	بمناظر

نفت

(اردو سے انگریزی)

Reverse	اُلٹ جانا	Primitive	آبائی (ابتدائی)
Separable	الگ الگ ہو جانے والے	Initial line	ابتدائی خط
Auxiliary circle .	امدادی (معاون) دائرہ	Arbitrary	اختیاری
Limit	انتہا	Arbitrary constant	اختیاری مستقل
Limiting process	انتہائی عمل	Terms	ارکان
Calculus	احصاء	Application	استعمال
Terms of	ارتقام میں	Employ	استعمال کرنا
Transformation	استحاله	Induction	استقرا
Cylinder	اسطوانہ	Strophoid	اسٹروفائیڈ
Limiting value	انتہائی قیمت	According as	اس کے بموجب کہ
Upper limit	اوپری حد	Elimination	استقاط
Bounded above	اوپر سے محدود	Eliminant	استقاطی
Mean proportional	اوسط نسبتی	Hint	اشارہ
Mean-value theorem	اوسط قیمت مسئلہ	Jointly	اشتراک سے
Astroid	ایسٹرائڈ	Increment	اضافہ
		Highest (Maximum)	اعلیٰ ترین
		Unit	اکائی

Analytical proof	تحلیلی ثبوت	ب	
Approximately	تخمیناً	Section	باب (سیکشن)
Approximate value	تخمینی قیمت	Opposite	بالمقابل
		Remainder	باقی
Developed	تدریجی	Evolute	برہنجیہ
Section	تراش	Closed Curve	بند منحنی
Quadrature	ترجیع	Fundamental	بنیادی
Slant height	ترجیحی اونچائی	Fundamental theorem	بنیادی مسئلہ
Trace	ترسیم کرنا		
Continuity	تسلل	پ	
Symmetry	تشکل	Padal	پیڈل
Numerically	تعدادی حیثیت سے	Parameter	پیرامیٹر
Definition	تعریف	Parametric equation	پیرامیٹری مساوات
Variation	تغیر		
Differentiation	تفرق	ت	
Differentiate	تفرق کرنا	Dependent	تابع
Differential Calculus	تفرقی احصاء	Dependent Variable	تابع متغیر
Differential Coefficient	تفرقی سر	Sub-normal	تحت عماد
		Sub-tangent	تحت مماس
Differential equation	تفرقی مساوات	Reduction	تحویل
		Reduction formula	تحویلی فارمولا
Convergence	تقارب		

	ط		Integrand	ملکا ملیہ
Tractrix	طریکٹریکس		Integrate	مکمل کرنا
Disc	ملکیہ		Integration	مکمل
Solid	ٹھوس		Integral	مکملہ
	ث		Integral Calculus	مکملی احصاء
Fixed	ثابت		Integrating factor	مکملی جزو
Fixed point	ثابت نقطہ		Constant of	مکملی مستقل
Fixed ordinate	ثابت عرض		integration	
Proof	ثبوت		Integral Curve	مکملی منحنی
	ج		Contact	تماس
Algebraic	جبری		Complementary	تامی تفاعل
Discrete	جدا جدا		function	
Square root	جذر		Introduction	تہدید
Radical sign	علامت جذر		Proportion	تناسب
Partial	جزوی		Bisecting	تقسیمی نصف قطر
Partial	جزوی کسریں		radius	
fractions			Justification	توجیہ
Even	جفت		Generalization	توسیع
Moment of	جمود کا معیار اثر		Generalized	توسیع شدہ
Inertia			Three-leaved	تین پتیہ گلاب
Pair-wise	جوڑے وار		rose	
Geometrical	جیومیٹریائی		Triple	تیرہ
interpretation				

Straight line	خط مستقیم	Four-leaved rose	چهار پتی گل
Lines	خطوط	Rod	چھڑی
Region	خطہ		
Region of integration	خطہ تکمل		
Linear	خطی	Product	حاصل ضرب
Linear Combination	خطی مرکب	Current	حالیہ غمضات
Linear differential equation	خطی تفرقی مساوات	Coordinates	حالیہ غمضات
Linear equations	خطی مساواتیں	Mathematical induction	حسابی توسیع
Anti - clock wise	خلاف ساعت وار	Integration by parts	حصہ سے تکمل
Curved Surface	خمیدہ سطح	Fact	حقیقت
Imaginary	خیالی	Real	حقیقی
Imaginary roots	خیالی ریشہ	Real roots	حقیقی ریشہ
		Real part	حقیقی حصہ
		Solution	حل
		Solve	حل کرنا
Circle	دائرہ	Quotient	خارج قسمت
Circular disc	دائری ٹکڑہ	Eccentricity	خروج مرکز
Circular sector	دائری قطع	Property	خصوصیت
Circular base	دائری قاعدہ	Line	خط

Hyperbolic	زائدی	Legimate	} درست نتیجہ
Angle	زاویہ	conclusion	
Catenary	زنجیرہ	Quadratic	دو درجی
Conjugate	زدجی	Binomial	} دور کنی مسئلہ
Conjugate imaginary	زدجی خیالی	theorem	
Lower limit	زیریں حد	Double tangent	دوہرہ تماس
	س	Degree	ڈگری، درجہ
Cycloid	سائیکلوئڈ	Slope	ڈھال
Coefficient	س		
Surd	سرڈ	Relation	رابطہ
Surface	سطح	Vertex	راس
Series	سلسلہ	Vertical	راسی
Summation	} سلسلوں کا جوڑ نکالنا	Quadrant	ربع
of series		Order	رتبہ
Clock - wise	ساعت وار	Relation	رشتہ
Vector	سمتی	Area	رقبہ
Vectorial angle	سمتیہ زاویہ	Area function	رقبہ تفاعل
Simpson's rule	سمس کا اصول	Term	رکن
Cisoid	سیسائڈ	Convention	دواج
	شش	Roots	ریشے
Branches	شاخیں		
Conditions	شرائط	Hyperbola	زائد

Ordinate	عرض	Form	شکل
Image	عکس	Numerator	شمار کنندہ
Sign ; Symbol	علامت		ص
Notations	علامتیں	Increasing	صعودی
Ellypse	علیپس	Case	صورت
Ellyptic function	علیپسی تفاعل		ض
Trigonometry	علم مثلث	Product	ضرب
Normal	عماد	Coefficient	ضربہ
Perpendicular	عمود	Appendix	ضمیمہ
Orthogonal	عمودی	Corollary	ضمنی نتیجہ
Orthogonal trajectory	عمودی مستدیر		ط
Substitution	عوضی	Odd	طاق
Integration by Substitution	عوضی سے تکمیل	Locus	طریق
	ع	By trial	طریقہ آزمائش سے
		Described	طے ہونا
			ظ
		Represent; Denote	ظاہر کرنا
Independent	غیر تابع		ع
Independent variable	غیر تابع متغیر	General integral	عام تکملہ
		General Solution	عام حل
Interminate	غیر حاصلی	Operator	عامل
Irrational	غیر ناطق	Numerical	عددی (تعدادی)
Indefinite	غیر معین	Discontinuity	عدم تسلسل

Family of Curves	قبیلہ منحنی	Indefinite	}	غیر معین تکملہ
Step	قدم	integral		
Class	قسم	Inequality		غیر مساوی
Pole	قطب	Unequal roots		غیر مساوی ریشے
Polar	قطبی	Discontinuous		غیر مسلسل
	قطبی تحت ماس	Improper		غیر واجب
Polar	} قطبی مختصات	Improper	}	غیر واجب تکملہ
Co-ordinater		integral		
Polar equation	قطبی مساوات	Formula		فارمولا
Diameter	قطر	Abscissa		فصلہ
Sectorial area	قطعہ کارقبہ	Folium		فولیم
Power; index	قوت		ق	
Exponential	} قوتی تفاعل	Integrable		قابل تکمل
function		Differentiable		قابل تفرق
Arc	قوس	Base		قاعدہ
Length of	} قوس کی لمبائی	Right Circular	}	قائم دائری مخروط
an arc		Cone		
Rectification	قوسی اصلاح	Right Circular	}	قائم دائری
Proposition	قول	Cylinder		
Value	قیمت	Rectangular axes		قائم محاور
Integer;	} کامل عدد	Rectangular	}	قائم زاہد
whole number		hyperbola		

Surface of revolution	گردشی سطح	Integral powers	کامل عدد قوتیں
Infinite	لا انتہائی	Density	شکانت
Infinity	لا انتہائی	Polynomial	کثیر رکنی
Infinite Series	لا انتہائی سلسلہ	Cartesian	کارٹینیسی
Asymptote	لا انتہائی مماس	Sufficient test	کافی جانچ
Envelope	لفاف	Sphere	کرہ
Loop	لوپ	Rigid material system	کڑا مادی نظام
Logarithm	لوگارتم	Rigid bodies	کڑے اجسام
Lemma	لیما	Fraction	کسر
Lemniscate	لیمنیکیٹ	Lesser indices	کمتر قوتیں
Discussion	مباحثہ	Minimum	کمترین عاقل
Origin	مبدأ	Graph	گراف
Lamina	مادی چادر	About	گرد
Focus	ماسک	Revolution	گردش
Focal chord	ماسکی وتر	Centre of rotation	گردش کا مرکز
Limit of a Sum	مجموعہ کی انتہا	Solid of revolution	گردشی ٹھوس
Symmetrical	متشاکل	Volume of revolution	گردشی حجم
Operand	متعل		
Variable	متغیر		

Cone	مخروط	Variable	متغیر (الگ ہونے والے)
Conic	مخروطی	Separable	
Imply	مراد رکھنا	Convergent	متقارب
Square	مربع	Proportional	متناسب
Squaring	مربع لینے پر	Finite	متناہی
Combination	مرکب	Successive	متواتر تحویل
Centre of Inertia	مرکز جہود	reduction	
Centre of gravity	مرکز ثقل	Successive	متواتر
Particular	مخصوص تکملہ	differentiation	
integral		Positive	مثبت
Particular	مخصوص حل	Trigonometric	مثلثاتی
Solution		Solid	مجسم ٹھوس
Centroid	مرکز وسطانی	Bounded	محدود
Equation	مسوات	Arch	محراب
Equations	مسواتیں	Axis	محور
Equality	مساوی	Major axis.	محور اکبر
Equiangular	مساوی زاویہ کی	Minor axis	محور اصغر
spiral		Perimeter;	محیط
Trajectory	مستدیر	circumference	
Rectangle	مستطیل	Co-ordinate	مختص
Constant	مستقل	Co-ordinates	مختصات
Continuous	مسل	Co-ordinate	مختصاتی محاور
		axes	

Mass	مقدار	Continuous	مسلسل تقسیم
Assigned value	مقررہ قیمت	distribution	
Reciprocal	مقلوب	Theorem	مسئلہ
Parabola	مکانی	Common	مشترک
Parabolic	مکانیہ	Common ratio	مشترک تناسب
Mechanics	مکینیکی	Common tangent	مشترک مماس
Tangent	مماس	Duplication	تثنی فارمولا
Transposition	منتقلی	formula	
Dependent	منحصر	Author	مصنف
Curve	منحنی	Corresponding	مطابقی
Curved	منحنیاتی	Absolute	مطلق
Surface	(خمیدہ سطح)	Absolute value	مطلق قیمت
Logical	منطقی	Inverse	معکوس
justification	توجہ	Inverse function	معکوس تفاعل
Negative	منفی (نفی)	Inverse operator	معکوس عامل
Comparison	موازنہ	Inverse	معکوس
Compare	موازنہ کرنا	trigonometric	مثلثاتی
Comparison	موازنہ	function	تفاعل
integral	موازنہ	Determination	معلوم کرنا
Comparison	موازنہ	Standard forms	معیاری شکلیں
tests	موازنہ	Definite integral	معین تکملہ
Generator	مولد	Interpretation	مفہوم
Tend	ماائل ہونا	Position	مقام

Theory of equation	نظریہ مساوات	Rational	ناطق
Negative	نفی (منفی)	Rational function	ناطق تفاعل
Points of division	نقاط تقسیم	n^{th} power	n دین قوت
Points of intersection	نقطہ تقاطع	n^{th} root	n وال ریشہ
Point of contact	نقطہ تماس	Unknown	نامعلوم
Cusp	نوک	Result	نتیجہ
	و	Intrinsic co-ordinates	منجی مختصات
Singular Solution	واحد حل	Intrinsic equation	منجی مساوات
Single - Valued	واحد قیمتی	Denominator	نسب نما
Chord	وتر	Ratio	نسبت
Latus rectum	وتر خاص	Semi - vertical angle	نصف ارضی زاویہ
Intuitively	دجائی طور پر	Radius	نصف قطر
Extension	دست (توسیع)	Radius vector	نصف قطری سمتیہ
	0	Hemisphere	نصف کرہ
Homogeneous	ہم جنس	Semi-cubic	نصف کعبی
Homogenous equation	ہم جنس مساوات	Semi-axes	نصف محاور
Homogenous function	ہم جنس تفاعل	System	نظام
		Aspect; theory	نظریہ

Concentric	ہم مرکز	Homogenous	ہم جنس
Unique	یکتا	linear	خطی
Monotonically increasing	یک کیفی صعودی	equation	مسادات
Monotonically decreasing	یک کیفی نزولی	Collinear	ہم خط
Uniform	یکساں	Confocal	ہم ماسک
		Co-axial	ہم محور
		Area of plane	ہموار سطح
		surface	کارقبہ
		Plane region	ہموار خط

نوٹ: ایس۔ ایم۔ منظر

قیمت 22-25

نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا